

LIBRARY
OF
A·S·HITCHCOCK
AND
AGNES·CHASE

Sept. 4, 1915.

Gram 113-115

G. Engelmann
1826

CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

SYSTEMA VEGETABILIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS ET AQUILAE RUBRAE, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMEN II.

CLASSIS 6—15.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1825.

SYSTEMA
VEGETABILIUM.

VOLUMEN SECUNDUM.

CLASSIS VI.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

I. *Palmae*, *floribus ſpathaceis.*

1156. *Calamus.* Perianth. utrumque 3phyllum. Stylus 3fidus. Bacca loricata 3ſperma. Embryo baſilaris.

1157. *Licuala* Thunb. Perianth. utrumque 3partitum. Stamina in urceolum connata. Stylus ſimplex. Drupa 1ſperma. Embryo lateralis.

1158. *Taliera* Mart. Cal. 3fidus. Cor. 3petala. Stamina baſi connata. Stylus ſimplex. Baccae 3 1ſpermae. Embryo verticalis.

1159. *Mauritia* L. fil. Flores polygami. Cal. 3fidus. Cor. 3petala vel 3partita. Antherae lineares erectae. Stigma 3lobum. Bacca teſſellato-corticata 1ſperma. Embryo lateralis.

1160. *Geonoma* W. Flores diclini, alveolis racheos immerſi. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala vel 3partita. Stam. ex urceolo dentato, dentibus ſingulis diantheris. Stylus lateralis vel baſilaris. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris, vel lateralis.

1161. *Kunthia* Humb. Flores monoeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Filamenta libera. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1162. *Acrocomia* Mart. Flores monoeci foveis immerſi. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 1ſperma, putamine lateribus 3poro. Embryo lateralis intra porum.

1163. *Aſtrocaryon* Meyer. Flores monoeci, ♂ foveolis immerſi, ♀ infra ſpicas ♂ ſolitarii. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Drupa fibroſa 1ſperma, 3pora. Embryo intra porum.

1164. *Thrinax* L. fil. Flores ☿. Cal. 1ſepalus 6dentatus. Cor. 0. Antherae lineares. Stigma infundibuliforme. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris?

II. *Bromelieae*, *ſpathis perianthioque duplici inſtructae.*

1165. *Bromelia.* Cal. 3partitus corolla brevior. Cor. 3partita ſtaminifera. Bacca infera 3locularis polyſperma.

1166. *Guzmannia* R. et P. Cal. 3ſepalus inferus. Cor. 3petala convoluta. Stamina receptaculo inſerta. Stigmata 3. Capſ. 3locularis 3valvis.

1167. *Aechmea* R. et P. Cal. duplex 3ſepalus, exter. inferus, int. ſuperus. Cor. 3petala baſi ſquamis inſtructa, ante antheſin convoluta. Stigma 3lobum. Capſ. 3locularis 3valvis.

1168. *Pitcarnia* Herit. Ait. Cal. 3partitus inferus. Cor. 3partita basi squamis instructa. Stigmata 3. Caps. 3locularis. Semina subalata.
1169. *Pourretia* R. et P. Cal. 3partitus inferus. Cor. 3partita; basi nuda. Stigmata 3. Caps. 3locularis. Semina nuda.
1170. *Tillandsia*. Cal. 3partitus inferus. Cor. 3partita. Caps. 3valvis. Semina papposa.
1171. *Cartonema* R. Br. Cal. 3partitus acutus inferus. Cor. 3petala. Stamina receptaculo inserta. Stigma barbatum. Caps. 3locularis, loculis 2spermis.
1172. *Acanthospora* *. Cal. 2sepalus inferus. Cor. 3petala convoluta. Stigmata 3 fimbriata. Caps. 3locularis. Semina funiculo setaceo ad placentam 3alatam fixa.

III. *Haemodoreae.*

1173. *Barbacenia* Vand. Cal. corollinus infundibuliformis 6fidus extus glanduloso-pilosus. Filamenta tubo corollae inserta 2fida dorso antherifera. Caps. 3locularis polysperma.
1174. *Conostylis* R. Br. Cal. corollinus superus lanatus. Stamina tubo inserta, antherae anticae. Caps. 3locularis polysperma apice dehiscens, stylo coronata.
1175. *Schwägrichenia* *. Cal. corollinus superus tubulosus extus hispidus, laciniis subsecundis. Stamina fauci inserta ascendentia, antherae erectae. Caps. 3locularis polysperma apice dehiscens, stylo deciduo.
1176. *Lanaria* Ait. Cal. corollinus superus extus plumoso-lanatus. Filamenta tubo inserta, antherae incumbentes. Caps. 3locularis oligosperma.
1177. *Lophiola* Ker. Cal. corollinus inferus bracteatus barbatus. Stamina hypogyna. Caps. 3locularis polysperma.
1178. *Phlebocarya* R. Br. Cal. corollinus superus 6partitus imberbis. Stamina fauci inserta. Antherae 4gonae subsessiles. Stigma simplex. Nux corticata coronata 1sperma.

IV. *Spathaceae.*

1. *Fructus superi.*

* *Perianthium duplex.*

1179. *Mnasium* Schreb. Spatha 2valvis multiflora. Perianth. ext. 3partitum lanceolatum, int. 3lobum abbreviatum cum staminibus connatum. Stigmata convoluta. Ovaria 3 globosa.
1180. *Pollia* Thunb. Spathae breves bracteiformes. Perianth. ext. obtusum, int. acuminatum. Stamina receptaculo inserta. Bacca globosa polysperma.
1181. *Tulbaghia.* Perianth. ext. infundibuliforme 6partitum, int. 3lobum, lobis 2fidis, aut 3phyllum, 6dentatum. Antherae sessiles 2seriales ad internam perianthii int. paginam. Caps. 3locularis, seminibus 3quetris.
1182. *Albuca.* Perianth. ext. patulum calycinum, int. fornicatum apice subglandulosum. Stamina subinde abortientia incrassata. Stigma 3quetrum pyramidatum.
1183. *Massonia.* Perianth. ext. 6petalum patulum: int. tubulosum, dentibus staminiferis. Caps. 3alata.

** *Perianthium simplex.*

1184. *Agapanthus* Herit. Cor. regularis infundibuliformis. Stamina declinata tubo inserta. Capſ. 3locularis elongata. Semina hinc alata.
1185. *Ornithogalum.* Cor. 6petala patens. Filamenta baſi dilatata receptaculo inſerta. Capſ. 3locularis. Embryo axilis.
1186. *Allium.* Cor. 6petala patens. Filamenta vel aequalia petalorum baſi inſerta, vel baſi dilatata ſubconnata, vel 3cuſpidata. Capſ. 3locularis. Embryo eccentricus.
1187. *Sowerbaea* Sm. Cor. 6petala patens perſiſtens. Stamina baſi petalorum inſerta, alterna abortientia. Capſ. 3locularis, ſeminibus binis peltatis in quovis loculo.
1188. *Bulbocodium.* Cor. infundibuliformis, tubo elongato. Stamina unguibus laciniarum inſerta. Stigma 3fidum. Capſ. trigona.
1189. *Blandfordia* Sm. Cor. tubuloſa, limbo 6lobo. Stamina tubo inſerta. Antherae baſi excavatae. Capſ. prismatica 3partibilis: ſemina pubeſcentia marginibus ſuturae affixa.
1190. *Funkia* *. Cor. campanulata ſubringens. Stamina declinata baſi corollae inſerta. Capſ. 3locularis: ſemina arillata, embryonibus pluribus.
1191. *Yucca.* Cor. campanulata 6fida. Filamenta clavata. Ovarium 3quetrum ſtamina excedens. Capſ. carnoſa 6locularis.
1192. *Pontederia.* Cor. 6fida ringens. Stamina tria longiora ori, tria baſi corollae inſerta. Stylus declinatus. Capſ. carnoſa 3locularis.

2. *Fructus inferi.*

* *Perianthium duplex.*

1193. *Narciſſus.* Perianth. ext. regulare 6fidum patens, int. tubuloſum, limbo crenulato, dentato aut lobato. Stamina inaequalia tubo adnata. Stigma 3lobum. Capſ. 3locularis.
1194. *Caloſtemma* R. Br. Perianth. ext. tubuloſum, limbo 6fido erecto, int. tubuloſum, ore dentato, dentibus alternis antheriferis. Bacca ſphaerica ſub-1ſperma.
1195. *Pancratium.* Perianth. ext. infundibuliforme, limbo 6fido patente, int. tubuloſum vel dentibus marginis, vel interna pagina ſtaminiferum. Capſ. 3locularis polyſperma.
1196. *Galanthus.* Perianth. utrumque 3petalum, int. brevius emarginatum. Stamina brevia receptaculo inſerta. Antherae apice ſetaceae. Capſ. 3locularis; ſeminum ſtrophiolo membranaceo.

** *Perianthium ſimplex.*

1197. *Leucoïum.* Cor. 6petala campanulata regularis, petalis apice incraſſatis. Antherae 2loculares apice dehiſcentes. Stylus clavatus. Capſ. 3locularis.
1198. *Amaryllis.* Cor. 6partita ſubregularis vel ringens, fauce nuda vel ſquamis coronata. Stamina declinata vel recta. Capſ. 3locularis.
1199. *Crinum.* Cor. 6partita ſubregularis, laciniis apice uncinatis. Stamina recta tubo inſerta. Capſ. 3locularis.
1200. *Eucroſia* Ker. Cor. 6partita ringens, tubo breviſſimo. Stamina declinata monadelpha exſerta. Capſ. 3locularis.

1201. *Haemanthus.* Spatha multivalvis multiflora. Cor. 6partita. Bacca sub-3sperma.
1202. *Sternbergia* Kit. Spatha 1flora. Cor. 6partita subregularis. Stamina basi laciniarum inserta. Antherae 4loculares. Stigma 3gonum. Caps. 3locularis. Semina strophiolata.
1203. *Strumaria* Jacqu. Cor. infundibuliformis 6fida regularis. Stamina tubo inserta. Pistillum basi incrassatum. Stigma 3fidum. Caps. globosa 3locularis: semina compressa.
1204. *Cyrtanthus* Ait. Cor. tubuloso-clavata incurva, limbo 6fido abbreviato. Stamina tubo inserta. Semina membrana laxe involuta.
1205. *Eustephia* Cav. Spatha 4valvis. Cor. tubulosa 6partita. Stamina 3cuspidata tubo inserta.
1206. *Hypoxis.* Spathae bracteiformes. Cor. 6partita plana extus calycina persistens. Discus nectariferus staminifer. Stigmata 3. Caps. 3locularis non dehiscens. Sem. globosa, strophiolo rostrato.
1207. *Curculigo* Gärtn. Cor. hypocrateriformis, tubus persistens stylo accretus. Stigmata 3. Bacca oligosperma, strophiolo rostrato.

V. *Liliaceae.*

1. *Fructus superi triloculares.*

1208. *Lilium.* Cor. campanulata 6partita regularis, sulcis nectariferis in laciniis. Caps. 6sulca, valvis reticulo fibroso nexis: semina compressa.
1209. *Tulipa.* Cor. 6petala campanulata, basi nuda. Stylus 0. Stamina receptaculo inserta.
1210. *Fritillaria.* Cor. 6petala basi nectarifera. Semina compressa marginata.
1211. *Erythronium.* Cor. 6petala campanulata, limbo reflexo: petalis tribus interioribus basi 2callosis. Caps. valvis placentiferis.
1212. *Adamsia* W. Cor. 1petala 6partita. Coronula faucis 6dentata. Filamenta brevissima. Stigma simplex.
1213. *Gloriosa.* Cor. 6petala, petalis elongatis reflexis. Stylus declinatus stigmate 3lobo. Semina globosa.
1214. *Hemerocallis.* Cor. 6partita campanulata. Stamina basi corollae inserta declinata. Semina globulosa.
1215. *Hyacinthus.* Cor. 6fida regularis. Stamina tubo inserta. Ovarium glandulis tribus nectariferis. Loculi capsulae oligospermi.
1216. *Muscari* Desf. Cor. globoso-ovata s. cylindrica, fauce constricta, limbo abbreviato 6dentato.
1217. *Scilla.* Cor. subrotata. Stamina aequalia basi petalis adnata. Semina globosa.
1218. *Aloë.* Cor. tubulosa basi nectarifera, limbo 6fido regulari aut 2labiato. Stamina receptaculo inserta. Placenta centralis a valvis formata. Semina 3quetra vel compressa margine alato.
1219. *Lomatophyllum* W. Cor. 6petala basi sicca in tubum connivens. Stamina receptaculo inserta. Placenta centralis, valvis discretis.
1220. *Tritoma* Ker. Cor. 1petala 6dentata. Stamina receptaculo inserta, alterna longiora, exserta.
1221. *Aletris.* Cor. infundibuliformis rugosa farinosa. Stamina basi corollae inserta. Stylus divisus.

1222. *Veltheimia* Gled. Cor. tubuloſa 6dentata. Stamina tubo inſerta. Capſ. 3alata, loculis 2ſpermis.
1223. *Drimia* Jacqu. Cor. breviſſime tubuloſa 6partita, laciniis revolutis. Stamina baſi corollae inſerta. Stigma capitatum.
1224. *Millea* Cav. Cor. infundibuliformis, limbo 6partito. Antherae fauci inſertae. Germen pedicellatum.
1225. *Polianthes*. Cor. infundibuliformis, limbo 6partito. Stam. tubo inſerta. Sem. plana.
1226. *Eucomis* Herit. Cor. ſubrotata regularis. Filamenta nectario adnata. Sem. ovata.
1227. *Erioſpermum* Jacqu. Cor. campanulata 6petala. Filamenta baſi dilatata. Sem. lana obvoluta.
1228. *Phormium*. Cor. 6petala: petala ext. calycina breviora, int. conniventia. Stam. receptaculo inſerta corolla longiora. Capſ. torta elongata.
1229. *Lachenalia* Jacqu. Cor. 6petala: petala int. longiora. Stam. erecta. Capſ. 3alata. Sem. globoſa.
1230. *Uropetalum* Ker. Cor. 6partita, laciniis ext. longioribus calycinis ſubcaudatis, int. conniventibus. Stam. tubo inſerta. Sem. plana.
1231. *Cyanella*. Cor. 6petala, petalis 3 int. propendentibus. Stam. inf. declinata. Anthera unica maxima.

2. *Fructus inferi triloculares.*

1232. *Agave*. Cor. tubuloſa, limbo 6partito. Stam. tubo inſerta. Capſ. 3gona polyſperma.
1233. *Doryanthes* Corr. Cor. 6partita. Filamenta corolla breviora. Antherae erectae baſi excavatae. Stylus 3ſulcus 6partibilis. Sem. 2ſerialia.
1234. *Alſtrömeria*. Cor. 6partita ſubbilabiata extus calycina, laciniis duabus baſi nectariferis. Stam. baſi corollae inſerta declinata. Capſ. 6angularis. Sem. globoſa.

3. *Bacca infera.*

1235. *Gethyllis*. Cor. 6fida tubo gracili elongato radicali. Stam. ſubtriadelpha. Antherae contortae. Bacca 1locularis polyſperma.

VI. *Aſphodeleae.*

1. *Capſulares.*

1236. *Aſphodelus*. Cor. patula. Filamenta baſi fornicata. Sem. 3quetra.
1237. *Eremurus* M. B. Cor. 6petala poſt antheſin involuta. Stam. impubera intra corollam conduplicata, effoeta longiſſime exſerta. Stylus fecundatus reflexus.
1238. *Anthericum*. Cor. patens decidua. Filamenta filiformia receptaculo inſerta. Stylus declinatus. Ovarii ſulci nectariferi.
1239. *Bulbine* W. Cor. patens decidua. Filamenta barbata.
1240. *Arthropodium* R. Br. Cor. patens, petalis interioribus undulatis. Filamenta geniculata barbata. Antherae baſi emarginatae. Capſ. 3locularis oligoſperma.
1241. *Chlorophytum* Ker. Cor. patens 6partita perſiſtens. Filamenta filiformia. Capſ. 3loba, lobis venoſis.

1242. *Caesia* R. Br. Cor. patens decidua. Filamenta imberbia utrinque angustata. Semina ventricosa strophiolata.
1243. *Tricoryne* R. Br. Cor. patens decidua. Filamenta barbata. Caps. 3 evalves 1spermae clavatae.
1244. *Thysanotus* R. Br. Cor. 6partita patens, laciniis interioribus latioribus fimbriato-ciliatis. Stam. hypogyna declinata. Antherae inaequales. Caps. 3locularis; semina bina strophiolata.
1245. *Narthecium* Möhr. Cor. 6partita persistens. Filamenta barbata. Caps. 3locularis. Sem. lanceolata utrinque processibus filiformibus.
1246. *Czackia* Andrz. Cor. 6petala subcampanulata. Stam. declinata. Stigma 3lobum. Caps. 3locularis 6gona. Sem. angulata.
1247. *Conanthera* R. et P. Cor. supera 6petala, reflexa, petalis alternis inaequalibus. Antherae in conum coalitae. Filamenta subglandulosa. Caps. 3locularis oligosperma.
1248. *Laxmannia* R. Br. Cor. 6partita persistens. Filamenta subulata glabra basi corollae inserta. Antherae peltatae. Caps. 3locularis. Sem. subsolitaria peltata.
1249. *Baumgartenia* *. Cor. bracteata infundibuliformis, limbo 6partito. Stam. fauci inserta. Caps. bracteis inclusa 3locularis.
1250. *Xanthorrhoea* Sm. Cor. bracteata 6partita, laciniis interioribus conniventibus. Stam. basi corollae inserta glabra exserta. Caps. lignea 3locularis, seminibus subsolitariis compressis.
1251. *Herreria* R. et P. Cor. rotata 6partita. Stigma 3quetrum. Caps. 3alata 3locularis. Sem. alata.

2. *Bacciferae.*

1252. *Dianella* Lam. Cor. 6partita decidua. Filamenta incurva apice incrassata stuposa. Antherae lineares basi insertae. Bacca globosa polysperma.
1253. *Dracaena*. Cor. 6partita. Filamenta medio incrassata corollae inserta. Stigma 3fidum. Bacca 3locularis, loculis 2spermis.
1254. *Sanseviera* Thunb. Cor. tubulosa, limbo revoluto 6fido. Filamenta fauci imposita filiformia. Bacca 3locularis, loculis 1spermis.
1255. *Luzuriaga* R. et P. Cor. 6partita aequalis decidua. Stamina basi laciniarum inserta, filamentis filiformibus apice incurvis, antheris sagittatis filamenta superantibus. Bacca oligosperma.
1256. *Eustrephus* R. Br. Cor. 6partita, laciniis interioribus fimbriatis. Filamenta brevissima hypogyna. Bacca 3locularis, seminibus strophiolatis.
1257. *Asparagus*. Cor. 6partita decidua. Stamina basi corollae inserta. Antherae basi emarginatae. Bacca sub-3locularis oligosperma.

VII. *Sarmentaceae.*

1258. *Convallaria*. Cor. tubulosa, limbo 6fido. Filamenta tubo adnata. Bacca supera 3locularis, loculis oligospermis.
1259. *Smilacina* Desf. Cor. 6petaloidea rotata s. stellata. Filamenta perigyna. Bacca 3locularis.
1260. *Ophiopogon* Ker. Cor. semisupera urceolata. Antherae sessiles. Bacca 1-3sperma.
1261. *Ledebouria* Roth. Cor. 6petala connivens persistens. Filamenta petalorum basi inserta. Stigma simplicissimum. Utriculi 3 1spermi.

1262. *Burchardia* R. Br. Cor. 6petala patens, unguibus foveola nectarifera. Stamina basi petalorum inserta. Antherae peltatae. Stylus 3fidus. Caps. 3locularis polysperma.
1263. *Schelhammera* R. Br. Cor. 6petala campanulata, petalis unguiculatis staminiferis. Antherae posticae. Stigmata 3. Caps. 3locularis oligosperma. Sem. ventricosa.
1264. *Uvularia.* Cor. 6partita campanulata, foveis nectariferis in basi corollae. Filamenta brevissima. Stigmata 3 revoluta. Caps. 3valvis, valvis septiferis. Semina globosa strophiolata.
1265. *Streptopus* Mx. Cor. 6partita campanulata, laciniis basi nudis. Stigma simplex. Bacca 3locularis, semina umbilico nudo.
1266. *Drymophila* R. Br. Cor. 6petala decidua. Stamina hypogyna. Stylus 3partitus, stigmatibus revolutis. Bacca 3locularis polysperma.
1267. *Philesia* Juss. Cor. 6petala, petalis interioribus longioribus. Stigma 3lobum. Bacca supera polysperma.
1268. *Callixene* Juss. Cor. 6petala, petalis alternis basi 2glandulosis. Filamenta basi dilatata. Bacca supera polysperma.
1269. *Xerophyta* Juss. Cor. 6partita, laciniis exterioribus angustioribus. Stigma clavatum. Caps. infera 3locularis polysperma.
1270. *Lapageria* R. et P. Cor. 6petala, petalis interioribus latioribus. Stigma clavatum. Bacca supera 1locularis polysperma. Semina 3serialia.
1271. *Ripogonum* Forst. Cor. 6partita bracteata. Stamina elongata. Stigma 3lobum. Bacca sub-1sperma.
1272. *Smilax.* Flores dioeci. Cor. 6partita persistens. Stylus brevissimus. Stigmata 3. Bacca sub-3sperma.
1273. *Oncus* Lour. Cor. campanulata 6fida bracteata. Stamina brevissima. Stylus 3partitus, stigmatibus 2fidis. Bacca 3locularis polysperma.
1274. *Peliosanthes* Andr. Cor. rotata supera 1petala 6loba, fauce fornicata antheras fovens. Antherae sessiles didymae. Baccae 3 clavatae 1spermae.

VIII. *Junceae.*

1275. *Juncus.* Perianth. glumaceum 6partitum 2bracteatum. Stamina hypogyna 3 vel 6. Stigmata 3 plumosa. Caps. 3locularis polysperma, vel 1locularis septis persistentibus columnam centralem constituentibus. Testa seminis vel conformis nucleo, vel utrinque alata.
1276. *Luzula* Cand. Perianth. Junci. Stam. et Stigm. eadem. Caps. 1locularis 3valvis 3sperma.
1277. *Aphyllanthes.* Perianth. 6phyllum squamis imbricatis suffultum. Antherae perianthii laminis insertae. Stigma 3lobum. Caps. polysperma.
1278. *Dasypogon* R. Br. Flores capitati. Perianth. duplex, ext. 3fidum, int. 3phyllum corollinum. Filamenta basi perianthii inserta, apice incrassata. Stigma simplex. Utriculus 1spermus superus.
1279. *Calectasia* R. Br. Perianth. tubulosum, limbo 6partito. Stamina fauci inserta. Antherae conniventes. Stigma simplex. Utriculus 1spermus tubo perianthii indurato inclusus.

IX. *Gramineae.*

1280. *Bambusa* Schreb. Spiculae paniculatae multiflorae. Cal. et cor. 2valvis, infer. ☿, super. ♂. Stylus 3partitus. Squamae 3 hypogynae.
1281. *Nastus* Juss. Spiculae paniculatae uni-multiflorae, flore terminali ☿ 2valvi, reliquis neutris 1valvibus. Stylus 2-3partitus. Squamae hypogynae 3.
1282. *Melocanna* Trin. Spiculae paniculatae superiores ☿, inf. steriles. Stylus 3partitus. Semen oblongum pericarpio carnoso maximo occultum.
1283. *Gahnia* Forst. Spiculae 1florae, squamis plurimis vacuis. Stylus 2fidus: stigmata 2fida. Squamae hypogynae 0. Nux ossea, nucleo transversim inciso aut laevi.
1284. *Pharus.* Flores monoeci. Spiculae 1florae 2valves. Squamae hypogynae 0. Stigmata 3. Semen elongatum valvis persistentibus cinctum.
1285. *Ehrharta* Thunb. Spiculae 1-3florae.. Cal. 2valvis cor. minor. Cor. duplex 1valvis, exterior basi excisa. Squamae hypogynae. Stigmata duo, vel styli duo. Semen corolla tectum.

X. *Museae.*

1286. *Urania* Schreb. Spathae distichae multiflorae. Cor. 2labiata 3petala. Nectar. 2phyllum foliolo altero 2fido. Caps. 3locularis polysperma. Semina strophiolo lanato.

XI. *Commelineae.*

1287. *Tradescantia.* Cal. et cor. profunde 6partita. Filamenta subvillosa. Caps. 3locularis.
1288. *Campelia* Rich. Cal. et cor. profunde 6partita. Filamenta villosa. Antherarum loculi discreti. Caps. baccata 3locularis 2sperma calyce corollaque incrassatis cincta.
1289. *Dichorisandra* Mik. Cal. 3sepalus. Cor. 3petala. Filamenta brevissima. Antherae duae divergentes elongatae. Caps. 3locularis polysperma, corolla incrassata cincta.

XII. *Aroideae.*

1290. *Orontium.* Spadix multiflorus. Cal. corollinus 6sepalus carnosus connivens. Filamenta brevissima plana. Antherae 2loculares, loculis discretis. Stylus 0. Stigma obtusum. Utriculus 1spermus.
1291. *Rhodea* Roth. Spadix multiflorus. Cal. corollinus 1sepalus ore 6dentato. Filamenta calyci adnata. Antherae didymae. Stigma 3fidum. Bacca 1sperma.
1292. *Tupistra* Ker. Spadix multiflorus. Cor. bracteata campanulata 6fida. Antherae sessiles corollae adnatae. Stylus crassus 3sulcus, stigmate 3lobo. Bacca 3locularis.
1293. *Acorus.* Spadix lateralis multiflorus. Cal. corollinus 6petalus. Filamenta subulata hypogyna. Antherae peltatae. Stylus 0. Caps. 6gona 3locularis.
1294. *Tacca* Forst. Involucrum multiflorum duplex utrumque 4phyllum. Flores pedicellati. Cal. corollinus superus 6partitus reflexus. Filamenta brevissima crassa fornicata, antheras intus foventia. Stigma 3lobum. Bacca 1locularis, semina valvis affixa. *Aristolochieae.*

XIII. *Berberideae.*

1295. *Berberis.* Cal. 6ſepalus baſi ſquamatus. Petala 6 intus 2glanduloſa. Stam. medio articulata aut 2dentata. Antherae 2loculares. Bacca 2-3ſperma.
1296. *Nandina* Thunb. Cal. 6ſepalus, baſi ſquamis imbricatis cinctus. Petala 6 intus eglanduloſa. Bacca exſucca ſtylo coronata 2ſperma.
1297. *Leontice.* Cal. 6ſepalus baſi nudus. Petala 6 baſi ſquamata. Capſ. ſubinflata oligoſperma.
1298. *Diphylleia* Mx. Cal. 3ſepalus baſi nudus. Petala 6 baſi nuda. Bacca 2-3ſperma.

1299. *Cleome.* Cal. 4ſepalus. Petala 4 ſubaſcendentia, baſi nectarifera. Stamina perigyna ſubmonadelpha ſubinaequalia. Siliqua ſtipitata vel ſeſſilis. *Capparideae.*
1300. *Peritoma* Cand. Cal. 1phyllus baſi circumſciſſus 5dentatus. Petala aequalia ſeſſilia. Glandulae nectariferae 0. Stamina monadelpha. Siliqua ſtipitata. *Capparideae.*
1301. *Canarium.* Flores dioeci. Cal. inferus urceolatus 3dentatus Cor. 3petala connivens. Filamenta baſi connata. Stigma ſubgloboſum. Drupa baccata, putamine 3loculari, loculis duobus abortientibus. *Terebinthaceae.*
1302. *Coſſinia* Commerſ. Cal. 5partitus perſiſtens. Petala 4-5 unguiculata Capſ. 3gona 3locularis, loculis 2ſpermis. *Sapindeae.*
1303. *Maba* Forſt. Flores dioeci. Cal. 3fidus. Cor. urceolata 3fida. Stamina hypogyna. Bacca calyce cincta ſub-3locularis. *Styraceae.*
1304. *Floſcopa* Lour. Cal. 3fidus inferus. Cor. 3petala. Capſ. 2valvis 1ſperma. *Familia?*
1305. *Lindera* Thunb. Cal. 0. Cor. 6petala infera. Filamenta epigyna corolla breviora. Stylus erectus. Stigmata 2. Capſ. 2locularis. *Familia?*
1306. *Amajoua* Aubl. Cal. ſuperus 6dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 6fido. Stam. incluſa. Stigma incraſſatum. Bacca 1locularis polyſperma. *Rubiaceae.*
1307. *Iſertia* Schreb. Cal. ſuperus 4dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 6fido. Stam. incluſa. Stigma ſub-6lobum. Drupa 6pyrena, pyrenis polyſpermis. *Rubiaceae.*
1308. *Caſſupa* Humb. Cal. ſuperus integer. Cor. tubuloſa, limbo 6partito. Stam. fauci impoſita exſerta. Stigma 2fidum. Bacca 2locularis, loculis polyſpermis. *Rubiaceae.*
1309. *Richardia.* Cal. ſuperus 6-8partitus. Cor. infundibuliformis. Stam. exſerta. Stylus ſub-3fidus. Capſ. 3cocca, coccis 1ſpermis, calyce coronata. *Rubiaceae.*
1310. *Stevenſia* Poit. Cal. ſuperus 2fidus. Cor. tubuloſa, limbo 6-7fido. Antherae ſeſſiles tubo inſertae. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2locularis polyſpermae apice 4valvis. *Rubiaceae.*
1311. *Coutarea* Aubl. Cal. 6partitus deciduus, bracteis ariſtatis ſuffultus. Cor. ventricoſa infundibuliformis. Stam. exſerta. Capſ. 2locularis. Sem. alata. *Rubiaceae.*
1312. *Hillia.* Cal. 6fidus bracteatus. Cor. tubuloſa longiſſima. Stam. incluſa. Capſ. ſiliquaeformis 2locularis, ſeminum alis fimbriatis. *Rubiaceae.*

1313. *Psathyra* Commers. Cal. 6dentatus superus. Cor. rotata 6loba. Filamenta brevissima fauci inserta. Antherae didymae. Stigma 3lobum. Bacca 6sperma. *Rubiaceae.*
1314. *Schradera* Vahl. Involucrum multiflorum 5fidum. Cal. urceolatus indivisus. Cor. campanulata 6fida. Staminum numerus valde incertus. Bacca infera polysperma. *Caprifolia.*
1315. *Loranthus.* Cal. obsolete dentatus superus. Cor. 4-8petala. Filamenta petalis basi adnata. Antherae 2loculares. Stigma obtusum. Bacca 1sperma. *Lorantheae.*
1316. *Achras.* Cal. 6partitus. Cor. 6fida. Stamina 6 sterilia cum fertilibus alternantia. Pomum 12spermum. *Sapoteae.*
1317. *Prinos.* Flores subdiclini. Cal. 6partitus. Cor. subrotata sub-6fida. Bacca 6sperma. *Sapoteae.*
1318. *Ehrenbergia* *. Cal. inferus truncatus 5-6dentatus. Cor. tubulosa, limbo 6fido. Antherae 6 intra tubum subsessiles. *Drupa? Sapoteae?*
1319. *Triphasia* Lour. Cal. 3dentatus inferus. Cor campanulata 3partita. Stamina libera. Bacca 3sperma, embryonibus pluribus in eodem semine. *Aurantia.*
1320. *Amoora* Roxb. Flores polygami. Cal. 3dentatus 2bracteatus. Petala 3 conniventia. Urceolus interne antheras gerens. Caps. 3locularis, semina arillata. *Melieae.*
1321. *Anopterus* Labill. Cal. 6fidus inferus. Cor. 6loba. Caps. supera 2valvis. Sem. apice alata. *Gentianeae? Ericeae?*
1322. *Frankenia.* Cal. tubulosus 5dentatus. Cor. 5petala. Stigma 3fidum. Caps. 3-4valvis, valvis seminiferis. *Frankenieae.*
1323. *Canarina.* Cal. 6partitus. Cor. campanulata 6fida. Filamenta fornicata. Stigmata 6. Caps 6locularis, placentis membranaceis binis in quovis loculo. *Campanuleae.*
1324. *Peplis.* Cal. campanulatus 12dentatus, dentibus alternis angustioribus. Cor. 6petala vel 0. Caps. 2locularis polysperma. *Salicariae.*
1325. *Flörkea* W. Cal. 3partitus. Petala 3 obtusa calyci inserta. Stamina basi glandulis cincta. Stylus 2fidus. Utriculi 2 1spermi.

DIGYNIA.

1326. *Nectris* Schreb. Cal. 6partitus, laciniis interioribus petaloideis basi 2glandulosis. Caps. carnosa stylis coronata 1-2sperma.
1327. *Oxyria* Hill. Perianthium 4sepalum post anthesin auctum. Styli reflexi. Caryopsis compressa. Embryo centralis. *Polygoneae.*
1328. *Atraphaxis.* Perianthium 4sepalum post anthesin auctum. Stigmata capitata. Caryopsis compressa. Embryo lateralis. *Polygoneae.*
1329. *Oryza.* Gramen paniculatum. Cal. 1florus minimus. Cor. basi callosa compressa coriacea 2valvis semini adnata. *Gramineae.*
1330. *Zizania.* Flores monoeci. Cal. 1florus 2valvis. Cor. 0. Semen corticatum. *Gramineae.*
1331. *Potamophila* R. Br. Flores polygami. Cal. 1florus minimus. Cor. 2valvis mutica nervosa. *Gramineae.*

TRIGYNIA.

I. *Palmae.*

1332. *Chamaedorea* W. Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma. Embryo lateralis.
1333. *Sabal* Adanſ. Flores ☿. Cal. 1ſepalus 3dentatus. Cor. 3petala. Stamina diſtincta. Styli connati. Bacca ſub-1ſperma. Embryo lateralis.
1334. *Morenia* R. et P. Flores dioeci. Cal. 3fidus. Cor. 3petala. Baccae tres. Embryo baſilaris.
1335. *Rhapis* L. fil. Flores polygami. Cal. 3fidus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma.
1336. *Chamaerops.* Flores polygami bracteati. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Filamenta baſi connata. Styl. 0. Stigmata 3. Baccae 3 1ſpermae. Embryo lateralis.
1337. *Liviſtonia* R. Br. Flores ☿. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Filamenta diſtincta. Styli connati. Bacca 1ſperma. Embryo dorſalis.
1338. *Corypha.* Flores ☿. Cal. 3fidus. Cor. 3fida. Stamina corollae inſerta. Styli connati. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.
1339. *Phoenix.* Flores dioeci. Cal. 3dentatus. Cor. 3petala. Stigmata uncinata. Drupa 1ſperma. Embryo dorſalis.
1340. *Lepidocaryon* Mart. Flores polygami. Cal. campanulatus 3dentatus. Cor. 3partita. Antherae dorſo filamentorum adnatae. Bacca teſſellato-corticata 1ſperma. Embryo lateralis.
1341. *Metroxylon* Rottb. Flores androgyni. Cal. campanulatus ſub-3dentatus. Cor. 3partita. Bacca teſſellato-corticata 1ſperma. Embryo lateralis.
1342. *Hyphaene* Gärtn. Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Drupa 1ſperma, putamine coriaceo apice pervio. Embryo verticalis.
1343. *Leopoldinia* Mart. Flores androgyni. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Bacca reticulato-fibroſa 1ſperma. Embryo ſubbaſilaris.
1344. *Hyoſpathe* Mart. Flores androgyni ebracteati. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.
1345. *Areca.* Flores androgyni. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Drupa fibroſa 1ſperma. Embryo baſilaris.
1346. *Oenocarpus* Mart. Flores androgyni in ſcrobiculis ſeſſiles ebracteati. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca fibroſa 1ſperma. Embryo baſilaris.
1347. *Euterpe* Gärtn. Flores androgyni in ſcrobiculis ſeſſiles bracteati. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Bacca fibroſa 1ſperma. Embryo lateralis.
1348. *Wallichia* Roxb. Flores androgyni. Cal. ♂ 3dentatus, ♀ 3partitus 2bracteatus. Cor. 3petala. Bacca 2ſperma. Embryo lateralis.
1349. *Gulielma* Mart. Flores androgyni. Cal. 1ſepalus. Cor. 1petala 3dentata ſ. 3fida Drupa 1ſperma, putamine apice 3poro. Embryo verticalis intra porum.
1350. *Elaeis* Jacqu. Flores monoeci, foveolis immerſi. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Filamenta baſi connata. Drupa oleoſa, putamine apice 3poro. Embryo intra porum.
1351. *Syagrus* Mart. Flores androgyni ſpatha duplici. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa fibroſa, putamine baſi pervio. Embryo baſilaris.

1352. *Elate.* Flores androgyni ſpatha duplici. Cal. 3dentatus. Cor. 3petala. Antherae ſeſſiles. Drupa putamine baſi ſulcato 3poro. Embryo baſilaris.
1353. *Cocos.* Flores androgyni ſpatha ſimplici. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa fibroſa, putamine baſi 3poro. Embryo baſilaris intra porum.
1354. *Maximiliana* Mart. Flores polygami. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa putamine baſi 3poro. Embryo baſilaris in albumine.
1355. *Martinezia* R. et P. Flores androgyni. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 1ſperma. Embryo?

II. *Aſphodeleae.*

1356. *Campynema* Labill. Cal. ſuperus corollinus 6partitus. Filamenta ſtylique recurvi. Capſ. 3locularis polyſperma. Semina teſta ſpongioſa.
1357. *Cymation* *. Cal. corollinus inferus 6ſepalus, ſepalis undulatis canaliculatis. Stamina incurva. Capſ. 3locularis. Semina globoſa ſtrophiolata.

III. *Coronariae.*

1358. *Colchicum.* Cor. 6fida tubo longiſſimo radicali. Styli filiformes. Antherae ſuberectae. Capſ. 3, ſeminibus globoſis.
1359. *Androcymbium* W. Petala 6 cucullata, unguibus filiformibus. Filamenta mediis petalis inſerta. Capſ. tres.

IV. *Junceae.*

1360. *Scheuchzeria.* Cal. corollinus 6ſepalus. Stamina receptaculo inſerta. Antherae elongatae. Capſ. 3 inflatae 2valves 1ſpermae.
1361. *Tofieldia* Hudſ. Cal. corollinus 6ſepalus calyculatus bracteatus. Stamina ſepalis oppoſita. Folliculi 3 polyſpermi.
1362. *Helonias.* Cal. corollinus 6ſepalus bracteatus. Capſ. 3locularis 3-6ſperma.
1363. *Xerophyllum* Mx. Cal. corollinus ſubrotatus. Filamenta baſi dilatata contigua. Stigmata revoluta. Capſ. 3locularis, ſuturis externe dehiſcens, 6ſperma.
1364. *Aſtelia* Banks. Flores polygami. Cal. corollinus 6partitus. Bacca 1-3locularis polyſperma.
† 1365. *Hydromyſtria* Meyer. Cal. 3ſepalus coloratus. Petala 3 lineari-lanceolata. Filamenta breviſſima. Antherae elongatae. Capſ. 1locularis.
1366. *Triglochin.* Perianthium duplex, utrumque 3ſepalum. Stamina epipetala. Antherae circulo dehiſcentes. Stigmata ſeſſilia plumoſa. Capſ. 3 ſ. 6 nexae.
1367. *Melanthium.* Cor. 6petala patens. Petala unguiculata ſtaminifera baſi 2glanduloſa. Capſ. 3locularis. Sem. alata.
1368. *Anguillaria* R. Br. Cor. 6petala patens. Petala unguiculata ſtaminifera. Capſ. 3locularis. Sem. ſubgloboſa.
1369. *Zigadenus* Mx. Cor. 6partita patens. Petala ſubunguiculata baſi 2glanduloſa. Stam. receptaculo inſerta. Capſ. 3locularis. Sem. ſolida.
1370. *Ornithogloſſum* Salisb. Cor. 6petala. Petala ſine unguiculis glandulisque. Stamina receptaculo inſerta. Capſ. 3locularis. Sem. ſolida.

1371. *Calochortus* Purſh. Cor. 6partita patens, laciniis tribus interioribus ſupra lanatis baſi maculatis. Filamenta breviſſima baſi corollae inſerta. Capſ. 3locularis.
1372. *Nolina* Mx. Cor. 6partita aequalis patens. Capſ. 3locularis 3ſperma.
1373. *Wurmbea* Thunb. Cor. tubuloſa 6fida. Stamina tubo inſerta. Capſ. 3locularis. Sem. globoſa.
1374. *Xerotes* R. Br. Flores dioeci capitati, ſpicati vel paniculati. Perianth. coloratum 6partitum bracteatum, baſi ſtaminiferum. Antherae peltatae membrana pellucida cinctae. Capſ. 3locularis. Sem. peltata.

V. *Sarmentaceae.*

1375. *Flagellaria.* Cal. corollinus ſuperus 6ſepalus. Stamina receptaculo inſerta. Drupa globoſa 1ſperma.
1376. *Trillium.* Cor. 6petala: petala ext. anguſtiora calycina. Bacca 3locularis.
1377. *Medeola.* Cal. corollinus 6ſepalus revolutus. Styli divaricati. Germen ſeſſile. Bacca 3locularis, 3-6ſperma.
1378. *Myrſiphyllum* W. Cal. corollinus 6ſepalus revolutus. Styli ſtricti contigui. Germen pedicellatum. Bacca 3locularis, loculis 2ſpermis.
1379. *Veratrum.* Flores polygami. Cal. corollinus 6ſepalus patens. Stamina receptaculo inſerta. Capſ. 3, feminibus alatis.
1380. *Dioſcorea.* Flores dioeci. Cal. 6partitus. Capſ. 3locularis. Semina alata.
1381. *Rajania.* Flores dioeci. Cal. 6partitus. Capſ. 3locularis, loculis duobus abortientibus, tertio in alam maximam producto 1ſpermo.

VI. *Meniſpermeae.*

1382. *Meniſpermum.* Flores dioeci. Cal. vel 3ſepalus bracteatus vel 6ſepalus. Cor. 3-6petala. Stamina petalis oppoſitis. Nectaria 6 glanduloſo-petaloidea. Drupae baccatae 1ſpermae.
1383. *Batſchia* Thunb. Flores dioeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Stam. 3 ſterilia in ♂, 6 in ♀. Drupae coriaceae 1ſpermae.
1384. *Lardizabala* R. et P. Flores polygami. Cal. 6ſepalus. Cor. 6petala. Stam. in ♂ monadelpha, in ☿ et ♀ diſtincta. Antherae apice in membranulam productae. Baccae 6loculares, loculis polyſpermis.

VII. *Polygoneae.*

1385. *Rumex.* Cal. 6ſepalus, ſepalis interioribus ſemen 3quetrum tegentibus. Stigmata penicillata. Embryo lateralis.
1386. *Emex* Neck. Cal. ♀ 1phyllus, valvis reflexis ſubſpinoſis ſemen oblongum tegentibus. Embryo periphericus.
1387. *Podopterus* Humb. Cal. duplex uterque 3partitus, laciniis exterioribus dorſo alatis. Stigmata capitata. Achenium calyce tectum.

1388. *Hydrogeton* Perſ. Cal. 0. Cor. 3petala. Filamenta baſi dilatata. Styli ſimplices. Capſ. 3 membranaceae 2ſpermae. Sem. parietibus affixa. *Aliſmeae.*

TETRAGYNIA.

1389. *Tetroncium* W. Flores dioeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Styli 4, ſtigmatibus ſimplicibus. Capſ. ſupera 4locularis ſtylis roſtrata, 4ſperma. *Junceae.*

HEXAGYNIA.

1390. *Damaſonium* Schreb. Spatha 1phylla 5alata. Cal. ſuperus 3partitus. Cor. 3petala. Glandulae 3 nectariferae. Bacca 6valvis polyſperma, valvis placentiferis. *Aliſmeae.*

POLYGYNIA.

1391. *Aliſma.* Cal. corollinus 6ſepalus. Capſ. plures ſtellatae 1-2ſpermae. *Aliſmeae.*

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

1156. CALAMUS.

petraeus Lour. 1. C. caudice craſſiſſimo, ſtipitibus foliolisque aculeatis, aculeis erectis, ſpadice terminali elongato. *Ind. or. Cochinchin. Inſ. Molucc.* (C. Rotang W.)

verus Lour. 2. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis inferioribus nervoſis glabris ſuperioribus hirtis, ſtipitibus longiſſimis apice productis radicantibus, ſpadicibus axillaribus paniculatis erectis. *Ind. or. Cochinchin. Inſ. Molucc.*

niger W. 3. C. caudice ſtipitibusque patulo-ſetoſis, foliolis glabris, ſtipitibus apice longiſſime productis radicantibus, ſpadicibus axillaribus pendulis. *Inſ. Molucc.*

rudentum Lour. 4. C. caudice ſtipitibusque retrorſum aculeatis, foliolis hirtis ciliatis, ſpadicibus axillaribus paniculatis divaricatis. *Ind. or. Cochinchina. Inſ. Molucc.* (Caudex 500 pedes altus Lour.)

viminalis W. 5. C. caudice foliolisque patulo-ſetoſis, ſpinis ſtipitum ſpadicisque reflexis, ſpadicis ramis flexuoſis nutantibus. *Inſ. Molucc.*

equeſtris W. 6. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis ſparſis elliptico-lanceolatis utrinque attenuatis, ſpadicibus ſimplicibus erectis flexuoſis. *Inſ. Molucc.*

Zalacca Gärtn. 7. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis linearibus glabris, ſpadice ſimplici radicali. *Inſ. Molucc.*

Draco W. 8. C. caudice ſtipitibusque patulo-aculeatis, foliolis ſetoſo-ciliatis, ſpadice erecto paniculato. *Ind. orient.*

ſcipionum Lour. 9. C. caudice glabro, frondibus ſpinoſis, ſpadice ramoſo paucifloro. *Inſ. Sund. Malacc.*

amarus Lour. 10. C. caudice laevi, frondibus conferte ſpinoſis, ſpadicibus terminalibus remotis ſpathaceis. *Cochinchina.*

dioecus Lour. 11. C. caudice gracili flexiliſſimo, frondibus ſpinisque abbreviatis, ſpadicibus dioecis. *Cochinchina.*

secundiflorus P. B. 12. C. frondium reflexarum spinis geminis latissimis utrinque scindentibus, foliolis margine spinosis. *Guinea.*

1157. LICUALA Thunb.

spinosa Thunb. *Ins. Molucc. Cochinchina.* Palma caudice subulnari, stipitibus 3orgyalibus spinosis, frondibus flabelliformibus digitatis, foliolis apice eroso-dentatis, spadice erecto ramoso. (Corypha Pilearia Lour.)

1158. TALIERA Mart.

bengalensis * *Bengal.* Palma caudice annulato procero, frondibus palmato-flabelliformibus suborbiculatis, stipitibus canaliculatis margine spinosis, spadice terminali erecto. (Corypha Taliera Roxb.)

1159. MAURITIA L. fil.

vinifera Mart. 1. M. caudice elato stricto, frondibus flabelliformi-pinnatifidis concoloribus, stipitibus semiteretibus canaliculatis, squamis baccarum ovatarum subaequaliter rhombeis. *Brasil.*

flexuosa L. fil. 2. M. caudice stricto inermi, frondibus flabelliformi-pinnatifidis subtus concoloribus, stipitibus semiteretibus canaliculatis, squamis baccarum orbicularibus. *Surinam.*

armata Mart. 3. M. caudice flexuoso spinoso, frondibus flabelliformi-pinnatifidis subtus glaucescentibus, stipitibus teretibus, spadicibus glabris, squamis baccarum obtusis. *Brasil.*

aculeata Humb. 4. M. caudice spinoso, frondibus flabelliformi-pinnatifidis ciliato-spinulosis subtus dense pruinosis, stipitibus teretibus, squamis baccarum rhombeis. *Nov. Granat.*

1160. GEONOMA W.

simplicifrons W. 1. G. caudice erecto, frondibus simplicibus cuneatis 2fidis, calycibus ♂ corollas aequantibus, antheris pendulis, baccis globosis. *Caracas. Brasil.*

macrostachys Mart. 2. G. acaulis, frondibus simplicibus lanceolatis basi attenuatis apice 2fidis, spadicibus radicalibus simplicibus cylindricis, corollis ♂ calyces excedentibus, baccis ovatis. *Ad fl. Amazonum.*

acaulis Mart. 3. G. acaulis, frondibus pinnato-fissis, pinnis lanceolatis, spadicibus radicalibus simplicibus cylindricis, calycibus ♂ corolla brevioribus. *Brasil. Guiana.* (Gynestum acaule Poit.)

arundinacea Mart. 4. G. caudice arundinaceo, frondibus lateralibus terminalibusque ovatis 2furcis tandem pinnato-fissis, spadicibus subsimplicibus, floribus remote verticillatis, calycibus ♂ corollas subaequantibus, baccis ovato-globosis. *Ad fl. Amazonum.* (Gynestum baculiferum Poit.)

pycnoſtachys Mart. 5. G. caudice arundinaceo, frondibus lateralibus terminalibusque lineari-oblongis breviter 2fidis, ſpadicibus ſimplicibus androgynis villoſis, floribus denſiſſime imbricatis, calycibus ♂ corollas ſubaequantibus barbatis, baccis ovatis. *Peru. Guiana.* (Gyneſtum ſtrictum Poit.)

pinnatifrons W. 6. G. caudice ſtricto, frondibus terminalibus interrupte pinnatis, pinnis falcatis praemorſis, ſpadicibus paniculato-multifidis, baccis ellipticis. *Peru. Caracas.* (Martinezia interrupta R. et P.)

Spixiana Mart. 7. G. caudice ſtricto, frondibus terminalibus indiviſis lanceolatis baſi attenuatis apice 2furcis, ſpadicibus paniculatis pubeſcentibus, floribus imbricatis, baccis ovato-globoſis. *Amer. auſtr.*

ſynanthera Mart. 8. G. frondibus terminalibus pinnato-fiſſis, pinnis lanceolatis acuminatis ſubfalcatis, ſpadicibus ramoſis, floribus imbricatis. *Peru.*

laxiflora Mart. 9. G. caudice tenui, frondibus pinnatis, pinnis furcato-2fidis, ſpadicibus ramoſis laxis, floribus ſparſis. *Ad fl. Amazonum.*

paniculigera Mart. 10. G. frondibus terminalibus pinnato-fiſſis abruptis, pinnis alternis anguſtis, ſpadicibus paniculato-ramoſiſſimis pubeſcentibus, floribus ſubverticillatis, baccis globoſis. *Braſil.* (G. pauciflora Mart. var.?)

acutiflora Mart. 11. G. frondibus terminalibus pinnato-fiſſis abruptis, ſpadicibus ramoſis pubeſcentibus, floribus imbricatis acutis, ſtaminibus longe exſertis, baccis ellipticis. *Ad fl. Amazonum.* (Gyneſtum maximum Poit.)

multiflora Mart. 12. G. frondibus terminalibus pinnatis, pinnis ſubfalcatis tortis, ſpadicibus paniculatis pubeſcentibus, floribus 4-5fariam laxiuscule imbricatis, urceolo antherifero in ♀ ſterili exſerto. *Amer. auſtr.* (Gyneſtum deverſum Poit.)

1161. KUNTHIA Humb.

montana Humb. *Nov. Granat.* Palma caudice gracili annulato, frondibus pinnatis.

1162. ACROCOMIA Mart.

ſclerocarpa Mart. *Ind. occid. Amer. auſtr.* Palma caudice elato baſi attenuato ſpinoſo, frondibus pinnatis, ſtipitibus ſpathisque aculeatis. (Cocos fuſiformis Sw., aculeata Jacq. Bactris minor Gärtn.)

1163. ASTROCARYON Meyer.

acaule Mart. 1. A. pinnis anguſto-lanceolatis acuminatis ſubtus pallidioribus, florum ♂ bracteis dorſo penicillatis, calycibus integerrimis, ♀ pedunculatorum calycibus corollisque ſubaequalibus glabriusculis, fructibus globoſis inermibus. *Braſil.*

campeſtre Mart. 2. A. acaule, pinnis linearibus ſubfalcatis ſubtus albis, florum ♂ bracteis ciliatis, calycibus fimbriatis, ♀ calycibus corollisque ſubaequalibus glabris, fructibus obovatis roſtratis inermibus. *Braſil.*

aculeatum Meyer. 3. A. caudice elato, pinnis linearibus praemorſis ſubtus pallidioribus extimis connatis, florum ♀ ſeſſilium calyce corollaque denſiſſime aculeatis, fructibus ſubgloboſis inermibus. *Guiana.*

Tucuma Mart. 4. A. caudice elato, pinnis lanceolatis acuminatis ſubtus argenteis, florum ♂ bracteis ciliatis, calycibus ſubintegerrimis, ♀ pedunculatorum calycibus urceolato-cylindricis pubeſcentibus corollas glabras ſuperantibus, fructibus globoſis inermibus. *Braſil.*

Jauari Mart. 5. A. caudice elato, pinnis linearibus acuminatis ſubtus albis, florum ♂ bracteis rufo-barbatis, calycibus ſerrato-ciliatis, ♀ pedunculatorum calycibus corollisque ciliatis, fructibus obovatis inermibus. *Braſil.*

vulgare Mart. 6. A. caudice elato, pinnis lanceolatis acuminatis ſubtus albis, florum ♂ bracteis dorſo ciliato-villoſis, calycibus ſubintegerrimis, ♀ pedunculatorum calycibus corollisque ſubaequalibus glabris, fructibus ovatis inermibus. *Braſil.*

Murumuru Mart. 7. A. caudice elato aculeatiſſimo, pinnis lanceolatis ſubfalcatis ſubtus argenteis, florum ♂ bracteis glabriusculis, ♀ ſubſeſſilium calycibus glabris corolla pubeſcente brevioribus, fructibus pyriformibus ſpinuloſis. *Braſil.*

Airi Mart. 8. A. caudice elato aculeatiſſimo, pinnis anguſte lanceolatis acuminatis ſubtus argenteis, florum ♂ bracteis hirtis, calycibus multifido-ciliatis, ♀ ſeſſilium calycibus corollisque longioribus fructibusque obovatis roſtratis ſetoſis. *Braſil.*

gynacanthum Mart. 9. A. caudice humili, pinnis lanceolatis ſubtus pallidis, florum ♂ bracteis ſubtomentoſis, calycibus integerrimis, ♀ ſeſſilium calycibus corollisque denſiſſime aculeatis, aculeis ſubtortis. *Braſil.*

Munbaca Mart. 10. A. caudice humili, pinnis lineari-lanceolatis acutis ſubtus albido-pubeſcentibus, extimis latioribus ſubconnatis, floribus ♀ ſeſſilibus denſe aculeatis, fructibus obovatis inermibus. *Braſil.*

1164. THRINAX L. fil.

parviflora Sw. *Jamaica. Hiſpaniola.* Palma 3orgyalis inermis, frondibus palmatis plicatis.

1165. BROMELIA.

* *Foliis dentato- ſ. ſerrato-ſpinoſis.*

† *Floribus ſpicatis.*

Ananas 1. Br. foliis glaucis dentato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Ind. occid.*

semiserrata W. 2. Br. foliis viridibus apice dentato-spinosis, spica comosa. *Ind. occid.*

lingulata 3. Br. foliis serrato-spinulosis obtusis erectis, spica composita, spiculis alternis. *Ind. occid.*

bracteata Sw. 4. Br. foliis serrato-spinosis acutis, spica decomposita, bracteis ovato-lanceolatis coloratis, calycibus uncinato-mucronatis. *Jamaica.*

fastuosa Lindl. 5. Br. foliis serrato-spinosis acuminatis, spica composita, bracteis linearibus coloratis, calycibus rectis inermibus. *Mexico.*

melanantha Ker. 6. Br. foliis glaucis obtusis mucronatis ciliato-spinulosis erectis, scapo simplici lanato, bracteis scariosis acuminatis integerrimis, spica indivisa, calycibus subglobosis carnosis lanatis. *Ins. Trinit.*

nudicaulis 7. Br. foliis viridibus acutis serrato-spinulosis, scapo bracteis oblongis acutis coloratis tecto, spica simplici laxiuscula, calycibus obtusiusculis. *Brasil.* (Br. pyramidalis Curt.)

lutea Meyer. 8. Br. foliis linguaeformibus spinoso-ciliatis, scapo sublanato bracteis tecto, spica composita nutante, bracteis ovatis calycibusque mucronatis. *Surinam.*

Mertensii Meyer. 9. Br. foliis linguaeformibus spinoso-ciliatis spina terminatis, scapo subvilloso bracteato, spica composita erecta, bracteis calycibusque obtusis mucronatis. *Surinam.*

incarnata R. et P. 10. Br. foliis linguaeformibus mucronatis serrato-spinosis, spica composita, bracteis obtusis, calycibus acuminatis. *Peru.*

sphacelata R. et P. 11. Br. foliis ensiformibus acutissimis ciliato-aculeatis, spicis axillaribus conico-truncatis, bracteis lanceolatis medio sphacelatis, calycibus acutis. *Chili.*

†† *Floribus sessilibus aggregatis.*

Karatas 12. Br. foliis dentato-spinosis mucronatis erectis, floribus acaulibus sessilibus aggregatis. *Ind. occ.*

humilis Jacq. 13. Br. foliis dentato-spinosis longissime acuminatis patentibus, axillis stoloniferis, floribus acaulibus spicato-aggregatis bracteatis, calycibus obtusis. *Ind. occid.*

bicolor R. et P. 14. Br. foliis ciliato-spinosis acuminatis patentibus subtomentosis, floribus aggregatis sessilibus, bracteis spathulatis, calycibus pulverulentis. *Chili.*

††† *Floribus pedunculatis, racemosis, paniculatis.*

pallida Ker. 15. Br. foliis remote ciliato-spinulosis acutis, pedunculis sparsis subracemosis glabris bracteatis, calycibus acutis. *Amer. austr.*

iridifolia Mart. 16. Br. foliis lanceolato-ensiformibus inferne spinuloso-serratis, floribus subspicatis remotis, spathis longitudine florum lanceolatis pedicello adnatis. *Brasil.*

Pinguin 17. Br. foliis dentato-spinulosis mucronatis, racemo laxo terminali. *Ind. occid.*

chrysantha Jacq. 18. Br. foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo compoſito foliis breviori. *Amer. auſtr.*

paniculigera Sw. 19. Br. foliis ſerrato-ſpinoſis, ſcapo bracteis lanceolatis veſtito, racemo compoſito ſubtomentoſo. *Ind. occid.*

ſylveſtris W. 20. Br. foliis ciliato-ſpinoſis longiſſime acuminatis, racemo compoſito, racemulis vix emergentibus, bracteis longe racemos ſuperantibus. *Braſil.*

Acanga 21. Br. foliis ciliato-ſpinoſis recurvis, panicula diffuſa. *Braſil.*

** *Foliis integerrimis.*

lucida W. 22. Br. foliis integerrimis, ſpica comoſa. *America auſtr.*

1166. GUZMANNIA R. et P.

tricolor R. et P. *Peru. Portorico.* Herba paraſitica, foliis enſiformibus, ſcapo ſpicato bracteato, floribus albis.

1167. AECHMEA R. et P.

paniculata R. et P. *Peru.* Herba paraſitica, foliis enſiformibus aculeatis, floribus paniculatis luteſcentibus.

1168. PITCARNIA Herit. Ait.

ſtaminea Sims. 1. P. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, pedunculis glabris, calycibus acuminatis, petalis revolutis, ſtaminibus longiſſimis. *Amer. auſtr.*

integrifolia Sims. 2. P. foliis linearibus integerrimis ſubtus candicantibus, pedunculis calycibusque villoſis. *Ind. occ.*

latifolia Ait. 3. P. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis baſi margine ſpinoſis, racemo conferto, bracteis pedicellos aequantibus. *Ind. occid.*

bracteata Ait. 4. P. foliis integerrimis baſi ſubſpinoſis, bracteis pedicellos ſuperantibus. *Inſ. S. Vincent.* (P. latifolia Red. ſulfurea Andr.)

paniculata R. et P. 5. P. foliis enſiformibus ſerrato-aculeatis pulverulentis, panicula decompoſita. *Peru.*

pulverulenta R. et P. 6. P. foliis enſiformibus margine ſpinuloſis ſubtus pulverulentis, inferioribus petiolatis, floribus paniculatis bracteatis. *Peru.*

lanuginoſa R. et P. 7. P. foliis lineari-lanceolatis inferne ſpinuloſis ſubtus lanatis, racemo ſimplici terminali. *Peru.*

bromelifolia Ait. 8. P. foliis enſiformibus longiſſimis ſerrato-ſpinuloſis glauceſcentibus, racemo ſimplici glabro. *Ind. occid.*

anguſtifolia Ait. 9. P. foliis lineari-lanceolatis ciliato-ſpinoſis ſubtus racemoque tomentoſis. *Ind. occid.* (P. pungens Kunth.)

furfuracea W. 10. P. foliis lanceolato-linearibus elongatis ciliato-ſpinuloſis ſubtus furfuraceis, racemis pani-

culatis villosis. *Amer. austr.* (Pourretia pyramidata R. et P.)

pruinosa Kunth. 11. P. foliis lanceolatis dentato-spinosis utrinque glauco-pruinosis, racemo glabro. *Amer. austr.*

1169. Pourretia R. et P.

lanuginosa R. et P. 1. P. foliis linearibus dentato-spinosis utrinque argenteo-lepidotis, racemo tomentoso. *America austr.* (Pitcarnia crystallina Pers.)

lanata Kunth. 2. P. foliis lanceolato-linearibus acuminatis dentato-spinosis utrinque glaucescentibus, floribus spicatis lanatis. *Peru.*

ferruginea * 3. P. foliis ensiformibus margine aculeatis, floribus paniculatis recurvo-falcatis. *Peru.* (Pitcarnia ferruginea R. et P.)

coarctata R. et P. 4. P. foliis linearibus margine aculeatis subobliquis glauco-pruinosis, floribus spicatis. *Chili.* (Pitcarnia coarctata Pers.)

1170. Tillandsia.

* *Floribus subsolitariis.*

usneoides 1. T. caule filiformi furfuraceo-squamoso flexuoso pendulo, floribus axillaribus sub-3andris. *Carolina. Ind. occid.*

trichoides Kunth. 2. T. caule capillaceo laevi ramoso flexuoso, floribus axillaribus. *Cumana.*

virescens R. et P. 3. T. caule stricto abbreviato, foliis distichis lineari-subulatis striatis subreflexis, pedunculis axillaribus 1floris folia aequantibus. *Peru.*

Bartramii Ell. 4. T. foliis lineari-subulatis canaliculatis pruinosis erectis, scapo sub-2floro foliis breviori. *Georgia. Mexico.* (T. uniflora Kunth.)

recurvata 5. T. foliis lineari-subulatis furfuraceo-lepidotis recurvis, scapo 2floro folia superante apice bracteato. *Amer. tropic.*

capillaris R. et P. 6. T. caule dichotomo, foliis lineari-subulatis striatis patulis, pedunculis axillaribus sub-1floris capillaribus glaberrimis. *Peru.*

xiphioides Ker. 7. T. foliis lanceolatis acutis glabris, scapo 1floro bracteis tecto, spathis calycibusque acuminatis, laciniis corollae spathulatis tortis, stigmate fila tenuissima producente. *Bonaria.*

** *Spicis simplicibus.*

serrata 8. T. foliis lato-lanceolatis obtusiusculis serrato-spinosis, spica densa bracteato-comosa. *Ind. occ.*

lingulata 9. T. foliis linguaeformibus obtusis integerrimis basi ventricosis, spica densa bracteato-comosa. *Ind. occid.*

sessiliflora R. et P. 10. T. foliis linguaeformibus retusis, spica gracili elongata, bracteis obtusis. *Peru.*

ſetacea Sw. 11. T. foliis lineari-filiformis ſetaceis recurvatis argenteo-lepidotis, ſpathis imbricatis diſtichis, floribus alternis. *Jamaica.*

ſtricta Sims. 12. T. foliis canaliculato-ſubulatis pruinoſo-caneſcentibus, ſpica multiflora terminali. *Braſil.*

pruinoſa Sw. 13. T. foliis lanceolato-linearibus reclinatis ſpathisque imbricatis ſquamuloſo-tomentoſis. *Jamaica.*

heptantha R. et P. 14. T. foliis enſiformi-ſubulatis argenteo-pruinoſis, ſpica 7flora diſticha bracteata. *Peru.*

coerulea Kunth. 15. T. foliis lineari-ſubulatis reflexis argenteo-furfuraceis, ſpica 7flora, floribus diſtantibus, bracteis elongatis acutis. *Mexico.*

incarnata Kunth. 16. T. foliis lineari-ſubulatis baſi dilatatis recurvavatis argenteo-furfuraceis, ſpica multiflora, floribus approximatis, bracteis elongatis. *Quito.*

heliconioides Kunth. 17. T. foliis lineari-lanceolatis apice ſubulatis glabris, ſpica elongata, floribus diſtantibus bractea brevioribus. *Nov. Granat.*

clavata Lam. 18. T. foliis lineari-lanceolatis ſubulatis glabris, ſpica ovato-conica compacta, bracteis ſerratis. *Hiſpaniola.*

**** Spicis compoſitis.*

utriculata 19. T. foliis lato-lanceolatis baſi utriculatis, ſpica compoſita ſubpaniculata. *Ind. occid.*

tenuifolia 20. T. foliis lineari-filiformibus ſetaceis erectis, ſpicis alternis ſubdiſtichis imbricatis, bracteis obtuſis. *Ind. occid.*

flexuoſa Sw. 21. T. foliis lanceolato-linearibus reclinatis ſubtus argenteo-lepidotis, ſpicis aggregatis laxis flexuoſis, bracteis abbreviatis appreſſis. *Ind. occid.*

nutans Sw. 22. T. foliis ovato-lanceolatis baſi ventricoſis ſtriatis glabris, ſpicis diviſis nutantibus, bracteis obtuſis flores ovatos approximatos includentibus. *Ind. occid.*

faſciculata Sw. 23. T. foliis lanceolato-ſubulatis ſtrictis ſubtus pubeſcentibus, ſpicis diſtichis imbricatis lateralibus. *Jamaica.*

polyſtachya 24. T. foliis lanceolato-ſubulatis reclinatis ſubtus lepidotis, ſpicis ſparſis gracilibus lateralibus. *Ind. occid.*

caneſcens Sw. 25. T. foliis linearibus erectis incanis rigidis, ſpicis terminalibus aggregatis, floribus diſtichis bracteatis. *Jamaica.*

anguſtifolia Sw. 26. T. foliis longiſſimis lineari-lanceolatis erectiuſculis ſtrictis glabris, ſpicis faſciculatis multifloris vaginatis. *Ind. occid.*

floribunda Kunth. 27. T. foliis longiſſimis lineari-ſubulatis argenteo-lepidotis, ſpicis congeſtis oblongis, floribus diſtichis bracteas aequantibus. *Peru.*

diſticha Humb. 28. T. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis argenteo-lepidotis, ſpicis congeſtis alternis linearibus, bracteis imbricatis acutis flores ſubaequantibus. *Peru.*

elongata Humb. 29. T. foliis longiſſimis lineari-ſubulatis glabris reflexis, ſpicis congeſtis alternis linearibus elongatis, bracteis imbricatis acutis calyce longioribus. *Nov. Granat.*

ſecunda Kunth. 30. T. foliis lineari-lanceolatis planis ſublepidotis, ſpicis numeroſis alternis patentibus, floribus ſecundis, bracteis bifariam imbricatis glabris. *Quito.*

paniculata 31. T. foliis radicalibus lanceolatis acutis abbreviatis pruinoſis, panicula ramoſiſſima nudiuscula, floribus ſpicatis bracteas acutas excedentibus. *Ind. occid.*

maculata R. et P. 32. T. foliis radicalibus lanceolato-enſiformibus ſplendentibus maculatis apice revolutis, ſpicis paniculatis coloratis. *Peru.*

rubra R. et P. 33. T. foliis enſiformibus acutis ſupra lucidis ſubtus argenteo-pruinoſis, ſpicis paniculatis alternis, bracteis calyces aequantibus. *Peru.*

parviflora R. et P. 34. T. foliis e baſi ampliſſima ſubulatis divergentibus farinoſo-lepidotis, ſpicis paniculatis alternis, bracteis calyce brevioribus. *Peru.*

purpurea R. et P. 35. T. foliis lanceolato-ſubulatis recurvis argenteo-lepidotis, ſpicis paniculatis diſtichis, bracteis calycibusque aequalibus roſeis. *Peru. Hiſpaniola.*

ſtraminea Kunth. 36. T. foliis linearibus ſubulatis canaliculatis argenteo-lepidotis, ſpicis paniculato-coarctatis, bracteis glabris calycem aequantibus. *Peru.*

amoena Link. 37. T. foliis lanceolatis canaliculatis ſerrato-aculeatis glabris, exterioribus acutis, interioribus retuſis, ſpicis racemoſo-paniculatis. *Braſil.*

**** *Floribus pedicellatis.*

biflora R. et P. 38. T. foliis enſiformibus acutis ſtriatis, ſpicis racemoſis, floribus geminis pedicellatis. *Peru.*

tetrantha R. et P. 39. T. foliis lanceolatis reflexis maculatis, ſcapo racemoſo, pedicellis 4floris. *Peru.*

1171. CARTONEMA. R. Br.

ſpicatum R. Br. *Nov. Holl.* Herba piloſa, foliis linearibus, floribus ſpicatis flavis 2bracteatis.

1172. ACANTHOSPORA*.

*juncea** 1. A. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis elongatis, ſpica compoſita thyrſoidea, bracteis elongatis ſcarioſis. *Peru.* (Bonapartea R. et P. Tillandſia Poir.)

*conantha** 2. A. foliis enſiformibus ſubtus pulverulento-lepidotis abbreviatis, ſpica ſtrobiliformi compacta, bracteis acuminatis. *Peru.* (Bonapartea ſtrobilantha R. et P. Tillandſia Poir.)

1173. BARBACENIA Vand.

bicolor Mart. 1. B. caule craſſo erecto dichotomo, foliis linearibus acuminatis ciliatis, pedunculis apice glandu-

losis folia aequantibus, antheris filamentorum longitudine. *Brasil.*

tomentosa Mart. 2. B. caule erecto subramoso, foliis lineari-lanceolatis tomentoso-incanis, pedunculo foliis breviori pubescente, laciniis calycis erectis, filamentis brevissimis. *Brasil.*

rubro-virens Mart. 3. B. caule crasso subramoso, foliis linearibus subulatis strictis glabris, pedunculis folia superantibus pubescentibus, calycis tomentosi laciniis reflexis, filamentis brevissimis. *Brasil.*

tricolor Mart. 4. B. caule radicante abbreviato, foliis linearibus acuminatis hirsutis, pedunculo foliis breviori, calycis glanduloso-pubescentis laciniis patulis, antheris filamenta aequantibus. *Brasil.*

longiflora Mart. 5. B. caule simplici brevissimo, foliis lineari-lanceolatis rigidis ciliatis, pedunculo foliis breviori, calycis elongati glanduloso-pilosi laciniis erectis, antheris filamenta duplo superantibus. *Brasil.*

exscapa Mart. 6. B. caule subnullo, foliis lanceolatis recurvatis ciliato-serratis, floribus sessilibus, filamentis latissimis. *Brasil.*

1174. CONOSTYLIS R. Br.

aculeata R. Br. 1. C. foliis glabris margine aculeatis, scapo diviso corymboso, calycibus intus glabris. *Nov. Holl.*

serrulata R. Br. 2. C. foliis nervoso-striatis margine setoso-denticulatis, scapo simplici bracteato abbreviato corymboso, calycibus intus glabris. *Nov. Holl.*

setigera R. Br. 3. C. foliis margine setoso-ciliatis, scapo simplici elongato, floribus capitatis intus lanatis, filamentis alternis longioribus. *Nov. Holl.*

brevíscapa R. Br. 4. C. foliis tomentosis margine scabris, scapo simplici abbreviato, floribus capitatis intus tomentosis, filamentis aequalibus. *Nov. Holl.*

1175. SCHWÄGRICHENIA*.

*flavida** 1. Schw. caule foliisque glaberrimis, ramorum tomento deciduo, antherarum apiculis reflexis. *Nov. Holl.* (Anigozanthus flavida Red. R. Br.)

*rufa** 2. Schw. caule tomento persistente tecto, antheris muticis. *Nov. Holl.* (Anigozanthos rufa Labill.)

1176. LANARIA Ait.

plumosa Ait. *C. B. S.* Caulis ramosus plumoso-lanatus, folia ensiformia glabra serrata, flores paniculati extus plumoso-lanati intus purpurei. (Hyacinthus lanatus L. Argolasia lanata Juss. Lam. Dilatris hexandra Lam.)

1177. LOPHIOLA Ker.

aurea Ker. *Nov. Caesar.* Caulis ſimplex glaber foliatus, foliis gramineis, floribus paniculato-corymboſis extus denſe lanatis intus luteis. (Conoſtylis americana Pursh.)

1178. PHLEBOCARYA R. Br.

ciliata R. Br. *Nov. Holl.* Herba ſubacaulis, foliis diſtichis linearibus ciliatis, floribus paniculatis.

1179. MNASIUM Schreb.

paludoſum W. *Guiana.* Herba foliis lineari-lanceolatis infra medium anguſtatis baſi dilatatis, ſcapo foliis breviori, ſpatha ingente flores flavos occultante. (Rapatea paludoſa Aubl.)

1180. POLLIA Thunb.

japonica Thunb. *Japonia. Java.* Caulis ramoſus villoſus, foliis enſiformibus glabriuſculis ſubtus albidis, floribus albis corymboſis.

1181. TULBAGHIA.

alliacea 1. T. foliis enſiformi-filiformibus, floribus cernuis, limbo tubum aequante, perianthio interno 6lobo fuſco. *Afric. auſtr.*

affinis Link. 2. T. foliis linearibus, floribus cernuis, tubo limbum longe ſuperante, perianthio interno 6dentato virente. *C. B. S.*

cepacea 3. T. foliis linearibus, floribus erectis, tubo limbum aequante, perianthio interno 3phyllo flavo. *Afric. auſtr.*

1182. ALBUCA.

* *Staminibus tribus fertilibus: pedunculis racemoſis patentibus, floribus nutantibus.*

altiſſima Jacqu. 1. A. foliis lanceolatis canaliculatis flaccidis glaucis. *C. B. S.*

major Dryand. 2. A. foliis lineari-lanceolatis planiuſculis reclinatis. *C. B. S.* (Ornithogalum canadenſe L.)

flaccida Jacqu. 3. A. foliis lanceolato-linearibus oblique flexis flaccidis. *C. B. S.*

minor 4. A. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis flaccidis. *C. B. S.*

viridiflora Jacqu. 5. A. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis ſubtus ſcapoque hirſutis. *C. B. S.*

coarctata Dryand. 6. A. foliis lineari-ſubulatis glabris, racemo coarctato, bracteis elongatis. *C. B. S.*

*** Staminibus omnibus fertilibus.*

† Floribus erectis.

fastigiata Dryand. 7. A. foliis lanceolatis serrulatis flaccidis, racemo corymboso foliis breviori. *C. B. S.*

caudata Jacq. 8. A. foliis lineari-lanceolatis canaliculatis strictis racemo patentissimo brevioribus. *C. B. S.*

setosa Jacqu. 9. A. foliis lineari-lanceolatis planiusculis flaccidis, pedunculis corymbosis patentissimis. *C. B. S.*

aurea Jacqu. 10. A. foliis lineari-lanceolatis planis, pedunculis erectis corymbosis. *C. B. S.*

vittata Ker. 11. A. foliis linearibus canaliculatis, scapo paucifloro, perianthio interno apice barbato. *C. B. S.*

†† Floribus cernuis.

abyssinica Jacqu. 12. A. foliis longissimis linearibus strictis erectis, bracteis flores superantibus, pedicellis brevissimis. *Afric. austr.* et *med.*

fragrans Jacqu. 13. A. foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, bracteis brevissimis, pedicellis flores aequantibus. *C. B. S.*

viscosa 14. A. foliis lineari-subulatis canaliculatis viscoso-pilosis, pedunculis patentibus flore longioribus. *C. B. S.*

spiralis 15. A. foliis lineari-subulatis convolutis apice spiratim tortis villosis scapo longioribus. *C. B. S.*

1183. MASSONIA.

** Genuinae: corymbis coarctato-congestis sessilibus: foliis radicalibus binis.*

longifolia Jacqu. 1. M. foliis subrotundo-oblongis obtusis nervosis glaberrimis, laciniis corollae patulo-reflexis. *C. B. S.* (M. obovata et lanceaefolia Jacqu. varr.)

latifolia 2. M. foliis subrotundo-ovatis acutis enerviis glabris, laciniis corollae patentibus. *C. B. S.* (M. coronata Jacqu.)

cordata Jacqu. 3. M. foliis cordato-subrotundis acutis nervosis, laciniis corollae patulis. *C. B. S.* (M. sanguinea Jacqu.)

muricata Ker. 4. M. foliis subrotundis glabris versus apicem muricatis. *C. B. S.*

scabra Andr. 5. M. foliis subrotundis venosis tuberculato-scabris. *C. B. S.* (M. pustulata Ker.)

echinata 6. M. foliis ovato-oblongis tuberculatis pilosis, laciniis corollae filiformibus. *C. B. S.*

pauciflora Dryand. 7. M. foliis oblongis eveniis tuberculatis glabris, laciniis corollae ovatis. *C. B. S.*

*** Desciscentes.*

angustifolia 8. M. foliis oblongo-lanceolatis acutis erectis, corymbo patulo, laciniis corollae lanceolatis reflexis. *C. B. S.* (M. lanceolata Thunb.)

undulata Thunb. 9. M. foliis lanceolatis undulatis glabris, scapo umbellato. *C. B. S.*

enfifolia Ker. 10. M. foliis oblongis acutis erectiusculis, racemo elongato folia fuperante, tubo corollae limbum patentem excedente. *C. B. S.* (M. violacea Andr. Agapanthus enfifolius W. Mauhlia Thunb. Polianthes pygmaea Jacqu. Hyacinthus 2folius Cav.)

1184. AGAPANTHUS Herit.

umbellatus Herit. *C. B. S.* Herba foliis linearibus fesquipedalibus, fcapo cubitali et altiori, floribus coeruleis umbellatis. (Ag. praecox W. var. Crinum africanum L. Mauhlia linearis Thunb.)

1185. ORNITHOGALUM.

** Caule unifloro.*

uniflorum 1. O. caule unifloro 2folio glabro, foliis oppofitis, petalis oblongis obtufiusculis internis latioribus. *Sibir.*

ftriatum W. 2. O. caule 1floro foliofo, foliis radicalibus lineari-filiformibus caulem aequantibus, foliis caulinis lanceolatis abbreviatis, petalis obtufis nervofo-ftriatis. *Alp. Europ. med. Sibir. Inf. Aleut.* (Anthericum ferotinum L.)

bulbiferum Pall. 3. O. caule 1floro pubefcente, foliis alternis lineari-filiformibus bafi bulbiferis, petalis aequalibus acutis. *Ad Volgam. Caucaf. Sibir.*

fibrofum Desf. 4. O. radicibus fibrofis intertextis, foliis radicalibus canaliculatis, fcapo breviffimo 1floro, petalis acutis. *Afric. bor.*

pygmaeum W. 5. O. foliis radicalibus geminis lineari-filiformibus canaliculatis, floralibus alternis fubciliatis, pedunculis fubvillofis, petalis obtufis. *Hifpania. Creta.* (O. pedunculare Presl.)

bohemicum Schmidt. 6. O. caule foliofo fub-1floro, foliis radicalibus filiformi-canaliculatis, caulinis alternis lanceolatis, petalis fpathulatis ftriatis. *Saxon. Bohem.* (O. fiftulofum Cand.)

*** Floribus paucis fubumbellatis.*

† Petalis obtufiusculis.

luteum 7. O. bulbo folitario folido, folio radicali unico lineari-lanceolato glaucefcente, floralibus fubternis, pedunculis teretibus glabris, ftylo tereti glabro ftaminibus breviori. *Europ. Caucaf.* (O. pratenfe β. W., fylvaticum Perf., foliofum Presl.)

pratenfe Perf. 8. O. radice tuberofa, folio radicali unico canaliculato, floralibus fubfenis, pedunculis 3gonis glabris, ftylo 3gono glabro ftamina fuperante. *Europ.* (O. luteum W.)

arvenfe Perf. 9. O. bulbo nidulante, foliis pubefcentibus radicalibus binis floralibus fubfenis, pedunculis teretibus villofiusculis, ftylo 3gono ftamina fuperante.

Europ. Caucaſ. (O. villoſum M. B., minimum Roth. W.)

† *tunicatum* Presl. 10. O. bulbo ſolitario oblongo ſubhorizontali, folio radicali ſolitario canaliculato caulem longe excedente, floralibus oppoſitis villoſis, pedunculis ſubumbellatis. *Bohem. Moravia.*

chloranthum M. B. 11. O. bulbo reticulato-fibrilloſo, folio radicali ſolitario filiformi, caulinis alternis lineari-lanceolatis margine ſubvilloſis, pedunculis glabris, petalis obtuſis inaequalibus. *Caucaſ. Sibir.* !(O. 8florum Ledeb. ?)

Liotardi Sternb. 12. O. bulbo ſolitario, foliis radicalibus binis lineari-lanceolatis elongatis, floralibus oppoſitis ovato-oblongis nervoſis, pedunculis ſubternis villoſis, petalis obtuſiuſculis ſtriatis. *Delphinat. Alp. carn. rhaet.*

†† *Petalis acutiuſculis.*

minimum 13. O. bulbo nidulante, folio radicali ſolitario planiuſculo, floralibus alternis, imo maximo ſpathaeformi, pedunculis ramoſis glabris corymboſis, petalis acutiuſculis. *Europ. Aſia med. et bor.* (O. ſpathaceum Hayn. Haynii Roth. Sternbergii Hopp.)

puſillum Schmidt. 14. O. bulbo grumoſo, folio radicali ſolitario canaliculato triquetro, floralibus oppoſitis, pedunculis ſimplicibus ſubumbellatis, petalis acutis. *Bohem. Transſylvan. Caucaſ.*

circinatum 15. O. bulbo fibrilloſo cavo, folio radicali lineari-filiformi elongato floralibusque ſimilibus recurvatis cauleque paucifloro incanis, petalis acuminato-cuſpidatis. *Tauria. Caucaſ. Ad Volgam.* (O. reticulatum Pall.)

gramineum Sims. 16. O. ſcapo angulato foliis linearibus altiori, umbella erecta, ſpathis ovatis obtuſiuſculis, petalis acutis venoſo-ſtriatis. *Chili.*

bonarienſe Perſ. 17. O. foliis radicalibus filiformibus elongatis, bracteis ſquamaeformibus breviſſimis, pedunculis umbellato-corymboſis, petalis ſtriato-venoſis. *Bonar.* (O. ſpathaceum Poir.)

*** *Floribus corymboſo-racemoſis.*

umbellatum 18. O. foliis linearibus elongatis, pedunculis corymboſis bracteas multo ſuperantibus, petalis marginatis lanceolatis. *Europ. med.* (O. montanum Tenor. var.)

refractum W. 19. O. foliis linearibus canaliculatis, pedunculis corymboſis fructiferis reflexis, petalis ovato-oblongis. *Hungar. Neapol.* (O. exſcapum Tenor.)

fimbriatum W. 20. O. foliis linearibus planis hirſutis, racemo ſubcorymboſo paucifloro radicali, pedunculis fructiferis elongatis patentiſſimis. *Tauria.*

comoſum 21. O. foliis linearibus, racemo breviſſimo, bracteis lanceolatis flores aequantibus, petalis obtuſis. *Auſtria. Transſylvan.*

conicum Jacqu. 22. O. foliis lanceolatis margine membranaceis ciliatis, racemo conico, bracteis membranaceis pedunculos aequantibus. *C. B. S.*

niveum Soland. 23. O. foliis lineari-filiformibus canaliculatis elongatis, racemo paucifloro, pedunculis abbreviatis, petalis oblongis obtufiusculis. *Afric. auſtr.*

ſeſſiliflorum Desf. 24. O. foliis lineari-canaliculatis, pedunculis breviſſimis, bracteis ſubulatis flores aequantibus, petalis ellipticis obtuſis. *Atlas.*

ovatum Thunb. 25. O. foliis radicalibus ovatis, ſcapo racemoſo, pedunculis breviſſimis approximatis, bracteis ſetaceis. *C. B. S.*

ciliatum Thunb. 26. O. foliis radicalibus ovatis acutis ciliatis, ſcapo racemoſo, pedunculis capillaribus nutantibus. *C. B. S.*

crenulatum Thunb. 27. O. foliis radicalibus oblongis obtuſis crenulato-ciliatis, ſcapo paucifloro, bracteis lanceolatis pedunculos ſuperantibus. *C. B. S.*

maculatum Thunb. 28. O. foliis radicalibus lineari-lanceolatis ciliatis, ſcapo racemoſo paucifloro, floribus ſecundis obtuſis, petalis exterioribus brevioribus maculatis. *C. B. S.* (O. ſecundum Jacqu.)

tenellum Jacqu. 29. O. foliis linearibus acuminatis canaliculatis, racemo brevi, bracteis abbreviatis, petalis lanceolatis acutis. *C. B. S.* (O. graminifolium Thunb.)

piloſum Thunb. 30. O. foliis lineari-enſiformibus ciliatis, pedunculis racemoſis incurvis bracteas lanceolatas ſuperantibus. *Afric. auſtr.*

revolutum Jacqu. 31. O. foliis lanceolato-linearibus ſubcarnoſis margine ſubcartilagineo-ciliatis, pedunculis racemoſis erectis bracteas ſuperantibus, petalis oblongis oblique flexis revolutis. *C. B. S.*

croceum Ell. 32. O. foliis linearibus ſcapo longioribus, pedunculis racemoſis bracteas obtuſas multo excedentibus, petalis oblongis obtuſis. *Georgia.* (Phalangium croceum Mx.)

lanceolatum Labill. 33. O. foliis lanceolatis ſcapo longioribus, pedunculis corymboſis bracteas ſubaequantibus, petalis alternis majoribus. *Syria.*

corymboſum R. et P. 34. O. foliis enſiformibus acuminatis carinatis, ſpathis elongatis pedunculos corymboſos involventibus, petalis alternis latiſſimis. *Peru.*

tenuifolium Red. 35. O. foliis linearibus canaliculatis ſcapum aequantibus, pedunculis racemoſis erectis, petalis ovatis apice glanduloſo-calloſis. *C. B. S.* (O. rupeſtre Rudolph. Rudolphii Jacqu.)

praſinum Ker. 36. O. foliis loriformibus canaliculatis ſcapoque folia ſuperante glaucis, pedunculis corymboſis patentiſſimis bracteas longe ſuperantibus, petalis obtuſis patentibus. *C. B. S.*

ſuaveolens Jacqu. 37. O. foliis linearibus canaliculatis, racemo paucifloro, pedunculis cernuis flores aequantibus, petalis obtuſis. *C. B. S.* (O. albucoides Thunb.?)

barbatum Jacqu. 38. O. foliis filiformibus, racemo paucifloro, petalis linearibus obtuſis, exterioribus apice barbatis, interioribus mucronatis. *C. B. S.*

polyphyllum Jacq. 39. O. foliis lineari-ſubulatis ſemiteretibus, racemo paucifloro, petalis linearibus obtuſis apice calloſo-inflexis. *C. B. S.*

rupeſtre 40. O. foliis filiformibus carnoſis ſcapo longioribus, racemo paucifloro, bracteis ovatis pedunculos aequantibus, petalis obtuſis. *C. B. S.*

juncifolium Jacqu. 41. O. foliis filiformi-ſubulatis, racemo elongato multifloro, petalis lanceolatis acutis. *C. B. S.*

fuſcatum Jacqu. 42. O. foliis lineari-enſiformibus cuſpidatis ſcapo triplo brevioribus, racemo multifloro, petalis linearibus obtuſis. *C. B. S.*

odoratum Jacqu. 43. O. foliis linearibus depreſſis, racemo elongato, petalis lanceolatis obtuſis apice calloſo-inflexis. *C. B. S.*

albucoides Thunb. 44. O. foliis linearibus canaliculatis ſcapo brevioribus, racemo paucifloro erecto, petalis apice incraſſatis. *Afric. auſtr.* (Anthericum albucoides Ait.)

pyramidale 45. O. foliis enſiformibus, racemo conico multifloro, pedunculis erectis elongatis, petalis oblongis planis. *Hiſpan. Luſitan.*

japonicum Thunb. 46. O. foliis linearibus erectis ſcapo brevioribus, racemo cylindrico longiſſimo, pedunculis erectis elongatis, petalis lanceolatis. *China. Japon.* (O. chinenſe Lour.)

longebracteatum Jacq. 47. O. foliis enſiformibus acuminatis, racemo longiſſimo, bracteis pedunculos duplo ſuperantibus. *C. B. S.* (O. bracteatum Thunb.)

ſcilloides Jacqu. 48. O. foliis lineari-loriformibus, racemo longiſſimo, bracteis pedunculos aequantibus. *C. B. S.*

latifolium 49. O. foliis lanceolatis, racemo longiſſimo, pedunculis flore longioribus bracteas aequantibus, petalis lanceolatis patulis. *Aegypt. Arab. Italia.*

narbonenſe 50. O. foliis lanceolatis, racemo oblongo, pedunculis patentibus, filamentis latis membranaceis. *Europ. auſtr.*

pyrenaicum. 51. O. foliis linearibus canaliculatis ſuberectis, racemo elongato, pedunculis erectis bracteas ſubulatas ſubaequantibus, petalis linearibus obtuſiusculis, filamentis aequalibus obovato-mucronatis. *Anglia. Europ. auſtr.*

ſtachyoides Ait. 52. O. foliis linearibus loriformibus ſcapum ſubaequantibus, racemo longiſſimo, pedunculis patulis bracteas ſuperantibus, petalis oblongis, filamentis dilatatis, alternis brevioribus. *Europ. auſtr.* (O. pyrenaicum Gouan)

lacteum Jacqu. 53. O. foliis lanceolatis ciliatis, racemo elongato, pedunculis patulis bracteas oblongas ſuperantibus, petalis oblongis acutis. *C. B. S.*

caudatum Ait. 54. O. foliis lanceolato-linearibus loriformibus elongatis, racemo longiſſimo, petalis oblongis acutis, filamentis alternis cuneiformibus. *C. B. S.*

**** *Filamentis alternis emarginatis: Tulbaghioides.*

nutans 55. O. foliis linearibus canaliculatis, racemo elongato, pedunculis nutantibus, petalis oblongis reflexis, fila-

filamentis dilatatis conniventibus alternis 2fidis. *Europ.*

coarctatum Jacqu. 56. O. foliis linearibus canaliculatis, racemo multifloro coarctato, filamentis alternis emarginatis. *C. B. S.*

aureum Curt. 57. O. foliis lanceolatis cartilagineo-denticulatis, racemo coarctato, bracteis pedunculo brevioribus, filamentis alternis emarginatis. *C. B. S.* (O. miniatum, flavefcens, flaviffimum Jacqu.)

thyrfoides Jacqu. 58. O. foliis lanceolatis lucidis ciliatis, racemo corymbofo, pedunculis erectis, petalis oblongis obtufis, filamentis alternis 2dentatis. *C. B. S.*

arabicum 59. O. foliis lanceolatis, racemo corymbofo, bracteis cordatis, corolla fubcampanulata, filamentis conniventibus alternis fubemarginatis. *Lufitan. Afric. bor.*

ixioides Ait. 60. O. floribus umbellatis, filamentis omnibus 2furcatis. *California.*

hifpidum Horn. 61. O. foliis ovato-lanceolatis pilofis, racemo elongato, filamentis dilatatis alternis 3cufpidatis. *C. B. S.* (Anthericum pilofum Jacq.)

virens Lindl. 62. O. foliis loriformibus glabris, racemo elongato, bracteis linearibus marcidis, filamentis alternis 3cufpidatis corolla brevioribus. *Afric. auftr.*

1186. ALLIUM.

*Staminibus alternis trifidis.

† *Umbella bulbifera.*

α. *Foliis planis.*

fativum 1. A. caule graminifolio, vaginis teretibus, fpatha acuminata umbellam duplo fuperante. *Patria?*

arenarium 2. A. caule graminifolio, foliis margine carinaque ciliatis, vaginis teretibus, umbella pauciflora fpatham ovato-oblongam fuperante. *Rupes* et *montes Europ. med.*

Scorodoprafum 3. A. caule graminifolio, ante anthefin convoluto, foliis margine glabris, vaginis ancipitibus, floribus plerisque abortientibus. *Dumeta et nemora Europ.*

Ophiofcorodon Link. 4. A. caule graminifolio fub anthefi convoluto, foliis margine glabris, vaginis teretibus, floribus omnibus mafculis, fpatha longiffime cufpidata. *Hungar.* (A. controverfum Schrad.)

litoreum Bertol. 5. A. caule planifolio recto, foliis fubtus convexis, fpatha elongata, umbellae radiis laxis, ftaminibus corollam aequantibus. *Gallia provinc.* et *narbon. Italia.* (A. monfpeffulanum W.)

β. *Foliis teretiusculis.*

vineale 6. A. caule foliisque teretibus fcabris, fpatha decidua, ftaminibus corollam fuperantibus. *Europ. med.* (A. compactum Thuill. Perf.)

proliferum Schrad. 7. A. caule ſubnudo tortuoſo fiſtuloſo, umbella prolifera, ſtaminibus corollam ſuperantibus. *Patria?*

†† *Umbella capſulifera.*

α. Foliis planis.

Porrum 8. A. caule tereti, foliis lanceolatis carinatis acutis, umbella globoſa compacta, genitalibus corolla longioribus. *Patria?*

rotundum 9. A. caule tereti, foliis linearibus carinatis acutis, umbella ſubgloboſa, ſtaminibus corolla brevioribus. *Europ. Aſia media.*

Ampeloprasum 10. A. caule tereti, foliis lineari-lanceolatis elongatis, umbella patente ſubgloboſa, ſpatha lanceolata, genitalibus corollam aequantibus. *Anglia. Helvetia. Italia.*

nutans 11. A. caule nudiuſculo ancipiti ante antheſin nutante, foliis linearibus, umbella globoſa, ſtaminibus corollam ſubexcedentibus. *Sibir.*

ſtrictum Schrad. 12. A. caule tereti ſtricto, foliis linearibus obtuſis ſubtus convexis, umbella globoſa, ſtaminibus corollam ſubaequantibus. *Volhynia. Aſia med.* (A. deflexum W., volhynicum Beſſ.)

lineare 13. A. caule tereti, foliis linearibus obtuſis ſubtus convexis, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Aſia med.*

albidum Fiſch. 14. A. bulbis radici transverſali adnatis, caule angulato apice ante antheſin nutante, foliis linearibus ſubtus convexis, umbella patente, ſtaminibus corollam ſubaequantibus. *Tauria. Caucaſ.*

acutiflorum Loiſ. 15. A. caule tereti apice nudo, foliis linearibus, umbella multiflora ſubgloboſa ſpatham acutam ſubaequante, petalis lanceolatis acuminatis ſtamina ſubciliata ſuperantibus. *Alp. Galliae auſtr.*

multiflorum Desf. 16. A. caule tereti, foliis linearibus, umbella multiflora ſubgloboſa, ſpatha caduca, petalis lanceolatis acutis, ſtaminibus glaberrimis exſertis. *Gallia auſtr. Africa bor.*

β. Foliis teretibus ſ. teretiuſculis.

Cepa 17. A. caule foliisque fiſtuloſis ventricoſis, umbella capitata, ſtaminibus exſertis. *Patria?*

aſcalonicum 18. A. caule nudiuſculo tereti, foliis fiſtuloſis, umbella globoſo-capitata, petalis lanceolatis ſtamina aequantibus. *Syria. Aſia minor.*

ſphaerocephalum 19. A. caule folioſo tereti, foliis fiſtuloſis canaliculatis, umbella ovata capitato-compacta, ſtaminibus exſertis. *Italia. Helvetia. Sibiria.* (A. deſcendens L.)

guttatum Stev. 20. A. caule folioſo tereti, foliis teretibus glaucis ſcabris, umbella capitata, ſpatha multifida, petalis exiguis linearibus acutis maculatis, ſtaminibus exſertis. *Podolia. Tauria. Inſ. Scyrus maris aegei.* d'Urville.

margaritaceum Sibth. 21. A. caule folioſo tereti, foliis canaliculatis glaucis, petalis obovatis obtuſis, ſtaminibus exſertis. *Inſ. maris aegei. Aſia minor.*

pruinatum Link. 22. A. caule folioſo tereti, foliis tereti-filiformibus, umbella erecta, petalis oblongis obtuſis ſtamina excedentibus, ſtylo exſerto. *Luſitan.*

junceum Sm. 23. A. caule folioſo tereti, foliis ſubfiliformibus elongatis, umbella capitata, filamentis alternis 5fidis. *Cyprus.*

carneum W. 24. A. caule folioſo, foliis fiſtuloſis, umbella ſubcapitata, petalis oblongis acutis ſtamina ſuperantibus. *Patria?*

** *Staminibus ſimplicibus.*

† *Umbella bulbifera.*

α. *Foliis planis.*

carinatum 25. A. caule folioſo tereti, foliis linearibus ſubtus convexis, ſpatha longiſſima, umbellae radiis laxis, petalis oblongis acutiusculis ſtamina ſuperantibus. *Europ.*

canadenſe 26. A. caule baſi folioſo, foliis linearibus laevibus, ſpatha ovata mucronata, umbella faſtigiata, petalis ovalibus ſtamina aequantibus. *Amer. bor.*

flexum Kit. 27. A. caule folioſo flexuoſo, foliis linearibus anguſtis canaliculatis flaccidis, ſpatha lineari elongata, umbella faſtigiata, petalis oblongis obtuſis conniventibus, genitalibus exſertis. *Hungaria.* (A. violaceum W. ſuppl.)

Tenorii * 28. A. caule baſi folioſo, foliis linearibus, umbella pauciflora patula, ſpatha ovata cuſpidata, petalis obtuſiſſimis campanulatis, ſtaminibus incluſis. *Italia. Sicilia.* (A. carneum Tenor.)

incarnatum Horn. 29. A. caule baſi folioſo, foliis linearibus apice canaliculato-ſetaceis caule longioribus, umbella faſtigiata, petalis acutis apice crenatis, ſtaminibus incluſis. *Gallia.* (A. intermedium Cand.)

ſcorzoneraefolium Deſf. 30. A. caule baſi folioſo, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, umbella pauciflora, petalis oblongis obtuſis campanulatis, ſtaminibus incluſis, ovario 6ptero. *Patria?*

β. *Foliis teretibus.*

oleraceum 31. A. caule folioſo tereti, foliis lineari-filiformibus canaliculatis ſcabris, ſpatha umbellam laxam ſuperante, ſtaminibus baſi petalis cohaerentibus longitudine aequalibus. *Europ.* (A. foetidum Link.)

ambiguum Sm. 32. A. caule baſi folioſo, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Italia.*

†† *Umbella capſulifera.*

a. Foliis planis.

1. *latioribus.*

Victorialis. 33. A. caule baſi folioſo, foliis oblongis, umbella faſtigiata, ſtaminibus exſertis. *German. auſtr. Helvet.*

urſinum 34. A. caule baſi foliato 3quetro, foliis oblongis in petiolum decurrentibus, umbella faſtigiata, petalis lineari-lanceolatis patulis ſtamina ſuperantibus, capſulis 3ſpermis. *Europ.*

Moly 35. A. caule baſi foliato teretiuſculo, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus, umbella faſtigiata, petalis oblongis acutis ſtamina ſuperantibus. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

magicum 36. A. caule baſi foliato tereti, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis ſtrictis, umbella ſubhemiſphaerica, ſtaminibus baſi connatis corolla patentiſſima brevioribus. *Europ. auſtr.* (A. monspeſſulanum Gouan., nigrum W., ſpecioſum Cyrill., multibulboſum Jacq.)

Cowani Ker. 37. A. caule baſi foliato ſemitereti, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis flaccidis ciliatis, umbella faſtigiata, petalis obtuſis patentibus ſtamina ſuperantibus. *Peru.*

atropurpureum Kit. 38. A. caule baſi foliato, foliis enſiformibus acuminatis, ſpatha appreſſa abbreviata, umbellae faſtigiatae radiis ſtrictis, petalis linearibus patentibus ſtamina monadelpha ſuperantibus. *Hungar.*

maiale Tenor. 39. A. caule foliato, foliis lato-lanceolatis canaliculatis, umbella compacta, petalis ovalibus, ſtaminibus exſertis. *Neapol.*

caſpium M. B. 40. A. caule baſi foliato tereti, foliis lanceolatis undulatis, umbellae hemiſphaericae radiis longiſſimis, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Deſerta ad mare caſpium.* (Crinum caſpium Pall., Amaryllis W.)

ſiculum Ucr. 41. A. caule elato tereti baſi foliato, foliis lanceolato-loriformibus longiſſimis, ſpatha ſubnulla, umbellae radiis inaequalibus erectis, corollae campanulatae petalis exterioribus latioribus acutis, ſtaminibus incluſis. *Sicil.*

neapolitanum Cyrill. 42. A. caule baſi foliato ancipiti, foliis lanceolato-loriformibus flaccidis, umbella patente, ſpatha ovata acuta, petalis obtuſis patulis ſtamina ſuperantibus. *Neapol.*

ſubhirſutum 43. A. caule baſi foliato ſubangulato, foliis lineari-lanceolatis ſtriatis ciliatis, umbellae faſtigiatae ramis erectis, petalis obtuſiuſculis patulis ſtamina ſuperantibus. *Italia. Graecia. Africa bor.* (A. ciliatum Cyrill., niveum Roth., Cluſianum Retz.)

graecum Urvill. 44. A. caule baſi foliato, foliis lineari-lanceolatis elongatis hirſutis, umbellae faſtigiatae radiis gracilibus, petalis acutis ſtamina ſuperantibus. *Inſ. Melos maris aegei.*

tricoccum Ait. 45. A. caule baſi foliato ſemitereti, foliis lanceolatis glabris, umbella globoſa, capſulis 3ſpermis. *Amer. bor.*

obliquum 46. A. caule ad apicem folioſo, foliis lanceolatis obliquis, umbella globoſa, petalis acutis, ſtaminibus longe exſertis. *Sibir.* (A. ramoſum Jacq.)

2. *Foliis anguſtis.*

Chamaemoly 47. A. foliis radicalibus linearibus acuminatis hirſutis, umbella radicali, petalis ſtamina ſuperantibus, capſulis cernuis. *Calabria. Afric. bor.*

anguloſum 48. A. caule baſi foliato angulato, foliis linearibus ſubtus carinatis, umbella faſtigiata, ſtaminibus corollam aequantibus aut ſuperantibus. *Europa. Aſia med.* (A. inodorum et acutangulum W. danubiale *.)

ſeneſcens 49. A. caule acutangulo baſi foliato, foliis linearibus ſubtus convexis glaucis ſubtortis, umbella faſtigiata erecta, ſtaminibus exſertis. *Europa.* (A. glaucum Schrad., baicalenſe W., montanum Schmidt.)

narciſſiflorum Vill. 50. A. caule baſi foliato ancipiti, foliis linearibus obtuſis carinatis, umbella nutante compacta, petalis oblongis obtuſiuſculis ſtamina ſuperantibus. *Gallia occid. et auſtr. Italia ſuper.* (A. pedemontanum W., nigrum All., grandiflorum Cand.)

cernuum Roth. 51. A. caule baſi foliato 4gono, foliis linearibus carinatis, umbella faſtigiata laxa cernua, petalis obtuſis conniventibus, ſtaminibus exſertis. *Amer. bor.* (A. tricorne Poir.)

ſuaveolens Jacq. 52. A. caule teretiuſculo baſi foliato, foliis linearibus obtuſis carinatis, umbella globoſa, petalis obtuſis, ſtaminibus longe exſertis. *Gallia. Italia.* (A. ambiguum Cand., ericetorum Thor. Bertol.)

fragrans Vent. 53. A. caule baſi foliato tereti, foliis linearibus flaccidis, umbellae erectae radiis elongatis, ſpatha abbreviata, petalis oblongis obtuſiuſculis ſtamina connata ſuperantibus. *Amer. bor.* (A. gracile et inodorum Ait. hyemale Rafin.)

† *mutabile* Mx. 54. A. caule baſi foliato tereti, foliis lineari-ſetaceis, umbella multiflora, ſpatha 3phylla, petalis lanceolatis acutis ſtamina ſuperantibus, capſula 3ſperma. *Carolina.*

carolinianum Cand. 55. A. caule baſi foliato tereti, foliis linearibus obtuſis ſubtus planis, umbella globoſa, petalis obtuſis, ſtaminibus longe exſertis alternis latioribus, capſula polyſperma. *Carolina.*

ſpirale W. 56. A. caule baſi foliato tereti, foliis linearibus planis ſpiratim tortis, umbella ſubgloboſa laxa, genitalibus petala obtuſiuſcula ſuperantibus. *Ruſſia?*

fuſcum Kit. 57. A. caule foliato tereti, foliis linearibus anguſtis crenulatis ſubtus angulatis, ſpatha longiſſima reflexa foliacea, umbellae radiis elongatis flaccidis, petalis acutiuſculis ſtamina ſubaequantibus *Bannatus.*

ochroleucum Kit. 58. A. caule basi foliato tereti, foliis linearibus subtus planis, umbella globosa, petalis obtusis, staminibus exsertis. *Croat. Transsylvan.*

roseum 59. A. caule tereti foliato, foliis linearibus elongatis, spatha 4phylla, umbella fastigiata, petalis obtusis emarginatis, staminibus brevissimis. *Ital. Austria. Dalmatia.* (A. illyricum Jacq.)

microcephalum Tausch. 60. A. caule tereti basi foliato, foliis linearibus subtus planis rigidis enerviis, umbella globosa compacta, petalis acutiusculis, staminibus subexsertis. *Bohemia.*

Tinei Presl. 61. A. caule sulcato basi foliato, foliis linearibus erectis, umbella pauciflora, petalis obtusis stamina superantibus. *Sicil.*

tuberosum Rottl. 62. A. caule tereti basi foliato, foliis linearibus flaccidis caulem aequantibus, umbella fastigiata erecta spatham superante, petalis oblongis obtusiusculis stamina aequantibus. *Malabar.*

longifolium Humb. 63. A. caule striato basi foliato, foliis lineari-loriformibus obtusis longissimis, umbella pauciflora, spatha reflexa, petalis lanceolatis stamina superantibus. *Mexico.*

album Sav. 64. A. caule 3gono basi foliato, foliis linearibus carinatis, umbellae pauciflorae radiis elongatis patentibus, petalis obtusis stamina superantibus. *Ital. Graecia.* (A. pendulinum Tenor., lacteum Sm.)

β. *Foliis triquetris, teretibus, filiformibus.*

triquetrum 65. A. caule basi foliato foliisque 3quetris, umbella pauciflora spatham subaequante, petalis lanceolatis stamina superantibus. *Italia. Gallia narbon. Hispan.*

† *palustre* Lag. 66. A. caule basi foliato foliisque filiformibus sub-3gonis, umbella multiflora, spatha 1phylla, petalis acuminatis stamina superantibus. *Hispan.*

stellatum Sims. 67. A. caule tereti basi foliato, foliis sub-3quetris, umbella fastigiata, staminibus inclusis. *Ad fl. Missuri.* (A. angulosum Pursh.)

flexuosum Urv. 68. A. caule folioso flexuoso, foliis semiteretibus, umbella subglobosa spatham aequante, petalis obtusis stamina aequantibus, capsulis 3spermis. *Ins. maris aegei.*

† *bisulcum* Red. 69. A. caule folioso, foliis distichis semiteretibus acutis, staminibus corollam aequantibus. *Patria?*

odorum 70. A. caule subcompresso basi foliato, foliis distichis canaliculato-3quetris, umbella fastigiata patente multiflora, petalis lanceolatis acutis stamina duplo superantibus. *Sibir.* (A. tataricum L. suppl., umbellatum Hall.)

paniculatum 71. A. caule tereti folioso, foliis semiteretibus carinatis, spatha subulata elongata, umbellae radiis pendulis, petalis obtusis stamina aequantibus. *Europ. austr.* (A. pallens Gouan., longispathum Red.)

coloratum * 72. A. caule tereti foliato, foliis semiteretibus flaccidis, spatha acuminata elongata, umbellae ra-

diis pendulis coloratis, petalis obtusis, staminibus longe exsertis. *Patria?*

parviflorum 73. A. caule tereti inferne folioso, foliis semiteretibus subulatis caule brevioribus, umbella capitata, petalis subulatis stamina aequantibus. *Afric. bor.*

foliosum Cand. 74. A. caule tereti folioso, foliis teretibus fistulosis subulatis, spatha oblonga acuta, umbella fastigiata erecta, petalis oblongis acuminatis stamina superantibus. *Gallia.* (A. acutum *.)

striatum Jacq. 75. A. caule subangulato inferne foliato, foliis semiteretibus subtus striatis, umbella fastigiata pauciflora, petalis obtusis stamina superantibus. *Amer. bor.* (A. ornithogaloides Bosc., canadense Mx.)

prostratum Trev. 76. A. caule basi foliato declinato subcompresso, foliis semiteretibus subtus 2angulatis, umbella subfastigiata multiflora, petalis obtusis crenatis, staminibus exsertis. *Sibir.*

pusillum Cyr. 77. A. caule tereti foliato, foliis semiteretibus filiformibus, umbellae radiis fructiferis pendulis, petalis obtusis integerrimis stamina aequantibus. *Sicil.* (A. obtusiflorum Poir.)

flavescens Bess. 78. A. caule basi foliato subangulato, foliis semiteretibus strictis, umbella subfastigiata, staminibus exsertis. *Podolia. Tauria.* (A. albidum M. B.)

montanum Sm. 79. A. caule foliato, foliis semiteretibus canaliculatis caulem aequantibus, umbella laxa, spatha deflexa. *Olymp. Asiae min.*

staticiforme Sm. 80. A. caule basi foliato, foliis subteretibus recurvis caule brevioribus, umbella capitata multiflora, petalis obovatis. *Ins. mar. aegei.*

fistulosum 81. A. caule folioso ventricoso foliisque fistulosis, umbella subglobosa, petalis acutis, staminibus exsertis. *Asia media?*

sibiricum 82. A. caule tereti folioso, foliis semiteretibus caulem aequantibus, umbella globosa, petalis lanceolatis acuminatis elongatis, staminibus inclusis. *Sudetes. Sibir.*

Schoenoprasum 83. A. caule tereti basi foliato, foliis teretibus fistulosis, umbella compacta, petalis acutis stamina superantibus. *Anglia. Suecia. Sibir.*

flavum 84. A. caule folioso foliisque teretibus, umbellae radiis flaccidis, spatha elongata, petalis ovatis, staminibus exsertis. *Austr. Transsylvan. Tauria.*

globosum M. B. 85. A. caule basi foliato foliisque teretibus, umbella subglobosa, spatha acuminata elongata, petalis acutis, staminibus exsertis. *Caucas.* (A. caucasicum Sims.)

saxatile M. B. 86. A. caule basi foliato tereti, foliis semicylindricis, spatha acuminata elongata, staminibus petala patentia superantibus. *Tauria. Caucas.*

rubellum M. B. 87. A. caule tereti basi foliato, foliis semiteretibus canaliculatis, spatha abbreviata, umbella convexa multiflora, petalis acutis, staminibus inclusis. *Caucas.*

rupestre M. B. 88. A. caule foliato foliisque teretibus, umbella fastigiata, spathae valva altera elongata, petalis conniventibus stamina aequantibus. *Caucas.*

odoratissimum Desf. 89. A. caule basi foliato, foliis teretiusculis subulatis, spatha 4valvi, umbella pauciflora fastigiata, petalis obtusis stamina superantibus. *Afr. bor.*

Pallasii Murr. 90. A. caule tereti foliato, foliis semiteretibus subulatis, umbella multiflora spatham superante, petalis lanceolatis stamina aequantibus. *Sibir.*

tenuissimum W. 91. A. caule tereti basi foliato, foliis subulatis filiformibus, umbella pauciflora, petalis subrotundo-ovatis obtusis stamina superantibus. *Sibir.*

Stellerianum W. 92. A. caule basi foliato, foliis semiteretibus erectis, umbella subglobosa, staminibus corolla longioribus. *Sibir.*

moschatum 93. A. caule tereti basi foliato, foliis filiformibus, umbella pauciflora, petalis lanceolatis stamina superantibus. *Europ. austr. Tauria.* (A. setaceum Kit., capillare Cav., tenuiflorum Tenor.)

pilosum Sm. 94. A. caule foliato humili, foliis teretibus elongatis vaginisque pilosissimis, spatha acuta umbellam aequante, petalis obtusis stamina aequantibus. *Ins. maris aegei.*

circinatum Sieb. 95. A. caule basi foliato foliisque filiformibus spiratim tortis pilosissimis, umbella 3flora, petalis acutis stamina superantibus. *Creta.*

Cupani Rafin. 96. A. bulbo reticulato-fibrilloso, caule filiformi foliato, foliis capillaribus tortis, umbella sub-3flora erecta, spatha 1valvi, petalis lanceolatis acutis stamina superantibus. *Sicil.*

1187. SOWERBAEA Sm.

juncea Sm. *Nov. Holl.* Herba foliis radicalibus gramineis, floribus umbellato-capitatis roseis.

1188. BULBOCODIUM.

vernum 1. B. foliis linearibus strictis, laciniis corollae lanceolatis obtusis. *Europ. austr.*

versicolor * 2. B. foliis lanceolatis glaucis demum spiralibus, laciniis corollae linearibus strictis, stigmate subsimplici. *Russia austr.* (Colchicum versicolor Ker.)

1189. BLANDFORDIA Sm.

nobilis Sm. 1. Bl. foliis linearibus, pedunculis bracteas excedentibus. *Nov. Holl.*

grandiflora R. Br. 2. Bl. foliis rigidis linearibus margine cartilagineo-crenulatis, pedunculis bracteas subaequantibus. *Nov. Holl.* (Aletris punicea Labill.)

1190. FUNKIA *.

ovata * 1. F. foliis ovatis, floribus pendulis. *Japon.* (Hemerocallis coerulea Andr. japonica β. W.)

ſubcordata * 2. F. foliis ſubcordatis, floribus cernuis. *Japon.* (Hemerocallis alba Andr. japonica Thunb. W.)

lancifolia * 3. F. foliis ovato-lanceolatis, floribus cernuis. *Japon.* (Hemerocallis lancifolia et japonica Thunb. Aletris japonica Ej.)

1191. YUCCA.

* *Foliis integerrimis.*

Glorioſa 1. Y. arboreſcens, foliis lineari-lanceolatis rigidis erectis, floribus campanulatis. *Carolina.* (Y. ſuperba Haw.)

obliqua Haw. 2. Y. arboreſcens ſubramoſa, foliis lanceolato-linearibus obliquis glaucis. *Patria?*

rufo-cincta Haw. 3. Y. ſubacaulis, foliis lanceolato-linearibus marginatis flaccidis glauceſcentibus, floribus ſubcampanulatis. *Patria?*

ſtricta Ker. 4. Y. acaulis, foliis lanceolato-linearibus acuminatis ſtrictiſſimis, ſcapo baſi ramoſo, floribus globoſo-campanulatis. *Carolina.*

** *Foliis margine filamentoſis.*

filamentoſa 5. Y. acaulis, foliis lanceolatis acutis patulis concavis marginatis, ſcapo ramoſo. *Virginia.*

concava Haw. 6. Y. acaulis, foliis oblongo-lanceolatis obtuſis ſubmucronatis ſcabris nervoſo-ſtriatis. *Patria?* (Y. flaccida Haw.?)

anguſtifolia Nutt. 7. Y. acaulis, foliis linearibus erectis rigidis glaucis, ſcapo ſimplici. *Ad fl. Miſſuri.* (Y. glauceſcens Haw.?)

recurva Saliſb. 8. Y. arboreſcens, foliis lineari-lanceolatis rigidis reflexis, laciniis corollae interioribus latioribus. *Graecia.*

*** *Foliis margine ſerrulatis; arboreſcentes.*

Draconis 9. Y. foliis imbricatis lanceolato-linearibus margine aſperis reflexis. *Carolina.*

aloifolia 10. Y. foliis imbricatis lanceolato-linearibus margine ſerrulato-aſperis ſtrictis. *Nov. Hiſpan.*

ſerrulata Haw. 11. Y. foliis arcte imbricatis linearibus margine aſperrimo ſtrictis. *Georgia.*

conſpicua Haw. 12. Y. foliis ſparſis lato-lanceolatis margine ſerrulato-aſperis. *Patria?*

crenulata Haw. 13. Y. foliis lineari-lanceolatis obliquis ſubrecurvis glaucis margine carinaque aſperis. *Patria?*

arcuata Haw. 14. Y. foliis lanceolato-linearibus flaccidis recurvo-arcuatis margine aſperiuſculis. *Patria?*

tenuifolia Haw. 15. Y. foliis linearibus anguſtiſſimis carinato-ſub-3quetris ſerrulatis rigidis. *Patria?*

**** *Foliis margine ſpinoſis.*

ſpinoſa Kunth. 16. Y. arboreſcens, foliis linearibus margine ſimpliciter ſpinoſis. *Nov. Hiſpan.*

acaulis Kunth. 17. Y. acaulis, foliis lanceolato-enſiformibus margine ſpinoſis, ſpinis 2fidis reflexis. *Caracas.*

1192. PONTEDERIA.

cordata 1. P. foliis cordatis, floribus ſpicatis, pedunculo villoſo. *Virginia.*

azurea Sw. 2. P. foliis ſubrotundo-ellipticis, petiolis elongatis incraſſatis ſuberoſis, floribus ſpicatis, pedunculo glabro. *Jamaica.*

lanceolata Nutt. 3. P. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis, petiolis ſpicisque abbreviatis. *Georgia. Carolina.* (P. lancifolia Mühlb. Ell.)

anguſtifolia Purſh. 4. P. foliis ſubcordato-3angularibus acutis, floribus ſpicatis. *Nov. Caeſar.*

rotundifolia 5. P. foliis orbiculato-cordatis obtuſis, racemo ſpicato ovato hiſpidiuſculo. *Surinam.*

craſſipes Mart. 6. P. foliis rhombeo-ovatis, petiolis incraſſati ſpongioſo-celluloſis, ſcapo ſub-3floro. *Braſil.*

vaginalis 7. P. foliis ſubcordato-oblongis acutis, petiolis elongatis vaginantibus, floribus axillaribus racemoſis cernuis. *Ind. or.*

dilatata Buchan. 8. P. foliis cordatis, floribus umbellato-corymboſis. *Ind. extra Gangem.*

haſtata 9. P. foliis haſtatis, floribus faſciculato-umbellatis, filamentis inferioribus connatis ſ. furcatis. *Ind. or.*

paniculata * 10. P. foliis cordato-ovatis acutis, panicula erecta, laciniis corollae longe unguiculatis. *Braſil.*

1193. NARCISSUS.

* *Hermione* Saliſb. Corona laciniis corollae brevior. Spatha 3-multiflora.

ſerotinus 1. N. foliis ſubulatis, ſcapo gracili, ſpatha 1-pauciflora, laciniis corollae anguſtis acutis, corona ſubcrenulata breviſſima. *Sicilia. Sardinia. Hiſp. auſtr. Numidia.* (N. Brouſſoneti Lag.?)

viridiflorus Schousb. 2. N. foliis teretibus fiſtuloſis, ſpatha multiflora, laciniis corollae linearibus diſtantibus alternis apice uncinatis, corona campanulata breviſſima. *Hiſpan. auſtr. Mauritania. Numidia.*

Jonquilla 3. N. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo compreſſo, ſpatha multiflora, tubo corollae elongato, laciniis ovatis alternis latioribus coronam cyathiformem plicato-crenulatam triplo ſuperante. *Gallia auſtr.* (N. tenuior Curt., gracilis Sabin., anguſtifolius W., ochroleucus Loiſ. varr.)

Tazzetta 4. N. foliis planis obtuſiuſculis glauceſcentibus, ſcapo teretiuſculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae ſubdiſcoloribus coronam campanulatam truncatam integerrimam triplo ſuperante. *Europ. auſtr. Afric. bor. Aſia minor. Japon.* (N. intermedius Red., chryſanthus Cand., flavus Lag. varr.)

primulinus Haw. 5. N. foliis linearibus canaliculatis viridibus, ſcapo ſubcompreſſo, ſpatha multiflora, tubo corollae longiſſimo, laciniis ovato-ſubrotundis coronam

6lobam patulam ſuperantibus. *Hiſpania.* (N. bifrons Sims., compreſſus Haw.)

longiflorus W. 6. N. foliis linearibus planis virentibus, ſcapo teretiusculo, laciniis corollae oblongis mucronatis tubo duplo brevioribus, corona breviſſima 6partita. *Neapol. Graecia. Aſia minor.* (N. praecox Tenor., tereticaulis Haw.)

patulus Loiſ. 7. N. foliis canaliculatis glauceſcentibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae discoloribus alternis latioribus coronam cyathiformem obſolete lobatam 4plo ſuperantibus. *Inſ. Stoechades.* (N. radiatus Red., orientalis Sims.)

polyanthes Loiſ. 8. N. foliis lato-linearibus viridibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae ovatis alternis latioribus coronam cyathiformem ſubintegerrimam triplo ſuperantibus. *Hiſpan. Gall. auſtr. Ital.* (N. Tazzetta All.)

niveus Loiſ. 9. N. foliis planiusculis viridibus, ſcapo depreſſo ancipiti, laciniis corollae lanceolatis concoloribus coronam campanulatam crenatam 4plo ſuperantibus. *Gallia auſtr. Hiſpan.* (N. ſtellatus Cand., anceps Ej.?, papyraceus *α.* Sims.)

unicolor Tenor. 10. N. foliis planis glauceſcentibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha multiflora, laciniis corollae oblongis concoloribus coronam campanulatam plicatam laceram 6plo ſuperantibus. *Inſ. Caprea.*

orientalis 11. N. foliis latiusculis, ſcapo ancipiti, ſpatha ſubbiflora, laciniis corollae oblongis coronam campanulatam 3fidam emarginatam 3plo ſuperantibus. *Italia. Aſia minor.* (N. italicus Gawl.?)

dubius Gouan. 12. N. foliis planiusculis glauceſcentibus, ſcapo obtuſe compreſſo, ſpatha multiflora, laciniis corollae ovalibus coronam cyathiformem denticulatam duplo ſuperantibus. *Ad Monspel.* (N. Trewianus Ker., crenulatus Haw.)

** *Narciſſus* Salisb. Corona brevis patellaris ſubintegra laciniis brevior. Tubus laciniis brevior. Spatha ſubuniflora.

poëticus 13. N. foliis linearibus planis, ſcapo ancipiti, laciniis corollae baſi ſibi incumbentibus, corona breviſſima ſcarioſa crenulata marginata. *Anglia et Europ. auſtr.* (N. recurvus Haw. var.)

majalis Curt. 14. N. foliis canaliculatis glaucis, ſcapo ancipiti, laciniis corollae contiguis margine deflexis, corona breviſſima ſcarioſa crenulata. *Alp. auſtr.? Ad Monspel.* (N. patellaris Salisb.)

radiiflorus Salisb. 15. N. foliis linearibus ſubcontortis glaucis, ſcapo gracili compreſſo, tubo corollae elongato, laciniis corollae diſtantibus ſpathulato-mucronatis, corona abbreviata ſcarioſa marginata. *Gallia auſtr. Helvetia.* (N. anguſtifolius Curt.)

biflorus Curt. 16. N. foliis linearibus acute carinatis margine inflexis, ſcapo ante antheſin geniculato 2floro, laciniis corollae oblongis patulis, corona breviſſi-

ma ſcarioſa marginata. *Anglia. Ager romanus.* (N. poëticus Hudſ., cothurnalis Salisb.)

*** *Queltia* Salisb. Corona repanda lobata laciniis corollae dimidio brevior. Tubus lacinias aequans. Spatha uni-pauciflora.

incomparabilis Curt. 17. N. foliis glaucis, ſcapo ancipiti, ſpatha 1flora ſcarioſa, tubo corollae cernuae elongato, laciniis oblongis discoloribus coronam cyathiformem undulatam erectam duplo ſuperantibus. *Italia. Gallia auſtr.*

odorus 18. N. foliis linearibus canaliculatis tortis viridibus, ſcapo teretiusculo, ſpatha ſub-1flora tubuloſa elongata colorata, laciniis ovato-oblongis patentibus coronam campanulatam 6lobam dimidio ſuperantibus. *Europ. auſtr.* (N. Gouani Roth, lobatus Poir., laetus Cand., major γ. Gawl., Sibthorpii Haw., obvallaris Salisb., calathinus L., Infundibulum Poir., elatior Haw., conſpicuus Salisb. varr.)

trilobus 19. N. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo ancipiti, ſpatha ſubmultiflora, laciniis corollae coronam campanulatam 3lobam discolorem dimidio ſuperantibus. *Hiſpan.* (N. 3partitus Horn.)

triandrus 20. N. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo teretiusculo, ſpatha ſub-3flora, laciniis corollae cernuae reflexis lanceolatis coronam campanulatam crenulatam dimidio ſuperantibus, ſtaminibus alternis prominulis, ſtylo ſubexſerto. *Pyrenaei. Hiſpan. cantabr.* (N. calathinus et pumilus Red., concolor Haw., cernuus Salisb., nutans Haw., 3lobus Sims.)

**** *Aiax.* Corona ſubrepanda lacinias corollae aequans vel ſuperans. Stamina aequalia. Spatha 1flora.

Pſeudonarciſſus 21. N. foliis planis glaucis lanceolato-linearibus, ſcapo compreſſo ſtriato, ſpatha 1flora ſcarioſa, coronae campanulatae limbo patulo undulato inciſo lacinias corollae concoloris planas oblongas patentes aequante. *German. med. Anglia. Europ. auſtr. Tauria.* (N. hiſpanicus Gouan., major Curt., grandiflorus Salisb., glaucus Horn., ſerratus Haw.)

minor 22. N. foliis linearibus ſcapum ancipitem glaberrimum ſuperantibus, ſpatha 1flora virente, corona obconica erecta 6fida criſpa lacinias corollae nutantis lanceolatas discretas aequante. *Hiſpania.* (N. exiguus Salisb. N. bicolor L. eſt varietas foliis latioribus, corona discolore crenulato-lobata. N. reflexus Brot.?)

moſchatus 23. N. foliis lineari-lanceolatis glaucis ſubtortis, ſcapo compreſſo, ſpatha 1flora ſcarioſa, corona cylindrica ſulcata, limbo erecto repando-cre-

nato lacinias corollae cernuae ſubconcoloris oblongas tortas ſubaequante. *Hiſpan. Gall. auſtr.* (N. tortuoſus, albus, abſciſſus Haw.; montanus Sabini, Macleai Ker.; tubaeflorus, poculiformis Salisb., cernuus Roth., candidiſſimus Red. varr.)

Bulbocodium 24. N. foliis ſubulatis ſtrictis ſcapum aequantibus, ſpatha 1flora, corona turbinata truncata integerrima laciniis corollae ſubcernuae linearibus patentibus longiore, ſtaminibus declinatis, ſtylo exſerto. *Hiſpan. Luſitan.* (N. juncifolius Lag.?, tenuifolius Red.)

albicans Haw. 25. N. foliis obtuſiusculis flaccidis, ſpatha 1flora, corona turbinata integerrima lacinias corollae concoloris anguſtas appreſſas aequante, ſtylo exſerto. *Hiſpania cantabric.* (N. inflatus Haw., obeſus Salisb.)

1194. CALOSTEMMA R. Br.

album R. Br. 1. C. foliis oblongo-ellipticis ſubſolitariis, coronae dentibus ſterilibus linearibus emarginatis. *Nov. Holl.*

purpureum R. Br. 2. C. foliis linearibus flaccidis ſerotinis, laciniis coronae 3dentatis, dente medio ſtaminifero. *Nov. Holl.*

luteum Ker. 3. C. foliis linearibus flaccidis coaetaneis, corona inter ſtamina 2dentata. *Nov. Holl.*

1195. PANCRATIUM.

* *Coronae pagina interiore ſtaminifera.*

† *Corona lobata.*

calathinum Ker. 1. P. foliis acutis, ſcapo ancipiti paucifloro, ſpatha herbacea, corona 6loba cyathiformi crenata laciniis corollae ſubbreviore, ſtaminibus introrſum verſis. *Braſil.* (Iſmene Herb.)

nutans Ker. 2. P. foliis obtuſis, ſcapo ancipiti paucifloro, ſpatha ſcarioſa, corona 6loba campanulata plicata dentata laciniis corollae breviore, antheris filamenta conniventia ſuperantibus. *Braſil.* (Iſmene Herb.)

Amancaës Ker. 3. P. foliis canaliculatis acutis, ſcapo ancipiti paucifloro, ſpatha ſcarioſa, floribus nutantibus, corona ſtellata 12loba crenata laciniis breviore, ſtaminibus introrſum verſis. *Peru.* (Narciſſus Amancaës R. et P. Iſmene Herb.)

†† *Corona 12dentata, aut 6dentata, dentibus fiſſis.*

maritimum 4. P. foliis ſublinearibus ſcapoque compreſſo glaucis, ſpatha ſcarioſa, floribus erectis, coronae campanulatae dentibus brevibus obtuſiusculis, ſtaminibus introrſum verſis. *Europ. auſtr. Afric. bor. Carolina. Ind. or.* (P. carolinianum L.)

canarienfe Ker. 5. P. foliis lanceolatis obtufis fcapoque compreffo glaucis, floribus pedunculatis, tubo corollae abbreviato, coronae dentibus ovatis, ftaminibus conniventibus. *Inf. Canar.*

zeylanicum 6. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis, fpatha herbacea 1flora, laciniis corollae elongatis revolutis, dentibus coronae reflexis acutis. *Ind. or.*

longiflorum Roxb. 7. P. foliis angufte lanceolatis, fcapo humili, fpatha 1flora, laciniis corollae tubo brevioribus, dentibus coronae ftamina conniventia aequantibus. *Inf. Molucc.*

verecundum Soland. 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, fpatha fubtriflora, tubo corollae longiffimo, coronae dentibus acutis ftaminibusque exfertis erectis. *Ind. or.*

illyricum 9. P. foliis lanceolatis obtufis glaucis, fcapo ancipiti, fpatha multiflora, floribus fubpedunculatis, laciniis corollae reflexis, dentibus coronae fubulatis, ftaminibus divergentibus longe exfertis. *Europ. auftr.*

parviflorum Red. 10. P. foliis ligulatis canaliculatis, fpatha fub-6flora, laciniis corollae reflexis, filamentis bafi dilatatis utrinque dentatis, coronae dentibus acutis. *Patria?*

amboinenfe 11. P. foliis petiolatis oblongis coftatis, fpatha multiflora, laciniis corollae linearibus revolutis tubum longe fuperantibus, coronae dentibus lanceolatis acutis, ftaminibus longiffime exfertis. *Amboina.* (Proiphys Herb.)

ringens R. et P. 12. P. foliis loriformibus canaliculatis, fpatha fub-5flora, limbi laciniis fubringentibus, coronae dentibus reflexis, ftaminibus declinatis. *Peru.* (Liriope Herb.)

undulatum Kunth. 13. P. foliis petiolatis ellipticis, fcapo compreffo multifloro, floribus feffilibus, ftaminibus limbo brevioribus. *Caracas.* (Hymenocallis Herb.)

** *Corona e dentibus ftaminifera.*

anguftum Ker. 14. P. foliis lanceolatis acuminatis, fcapo ancipiti, fpatha multiflora, floribus feffilibus, laciniis corollae linearibus longiffimis pendulis, coronae dentibus fubintegerrimis acutiusculis, ftaminibus erectis longiffime exfertis. *Amer. auftr.?*

expanfum Sims. 15. P. foliis lineari-lanceolatis ftriatis, laciniis corollae patentiffimis tubo longioribus, filamentis flexuofis. *Patria?*

guianenfe Ker. 16. P. foliis longe petiolatis elliptico-oblongis acutis, fpatha multiflora, floribus feffilibus, tubo corollae gracili elongato, laciniis linearibus pendulis, interftitiis ftaminum integerrimis, filamentis longiffime exfertis. *Guiana.* (Hymenocallis Herb.)

litorale Jacq. 17. P. foliis lineari-lanceolatis loriformibus, fpatha multiflora, interftitiis ftaminum irregulariter denticulatis, laciniis corollae revolutis tu-

bum aequantibus. *Amer. auſtr.* (P. diſtichum Bot. mag.)

Dryandri Ker. 18. P. foliis lanceolatis loriformibus, ſpatha multiflora, interſtitiis ſtaminum ſubrepandis, laciniis corollae tubum aequantibus. *Patria?* (Hymenocallis Herb.)

rotatum Ker. 19. P. foliis linearibus obtuſiusculis loriformibus, ſpatha ſubmultiflora, interſtitiis ſtaminum inciſo-dentatis, laciniis corollae tubum aequantibus. *Carolina.* (P. mexicanum Walt. diſciforme Red.)

mexicanum 20. P. foliis lineari-lanceolatis acuminatis, ſpatha 2flora, interſtitiis ſtaminum ſubrepandis, laciniis corollae linearibus patentibus tubum aequantibus. *Mexico.*

caribaeum 21. P. foliis oblongis acutis, ſcapo multifloro, floribus ſeſſilibus, interſtitiis ſtaminum 1dentatis, laciniis corollae revolutis tubum ſuperantibus, ſtaminibus longiſſimis. *Ind. occ.* (P. declinatum Jacq.)

patens Red. 22. P. foliis lanceolato-linearibus, floribus ſeſſilibus, interſtitiis ſtaminum repandis, laciniis corollae linearibus rectiusculis tubo longioribus. *Ind. occ.* (P. declinatum Red. fragrans Salisb.)

amoenum Salisb. 23. P. foliis oblongis petiolatis, floribus ſeſſilibus divaricatis, interſtitiis ſtaminum 2dentatis, laciniis corollae revolutis tubo longioribus. *Guiana.*

ovatum Mill. 24. P. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis, ſpatha multiflora, floribus ſeſſilibus, interſtitiis ſtaminum 1dentatis, laciniis corollae linearibus undulatis elongatis. *Ind. occid.* (P. amoenum Andr.)

ſpecioſum Salisb. 25. P. foliis oblongis acutis petiolatis, ſpatha multiflora, floribus pedunculatis, interſtitiis ſtaminum ſubulato-dentatis, laciniis corollae revolutis linearibus tubum ſuperantibus. *Ind. occid.* (Hymenocallis Herb.)

biflorum Roxb. 26. P. foliis ſpathulato-linearibus, ſpatha 2flora, interſtitiis ſtaminum eroſis, laciniis corollae revolutis tubum 3gonum aequantibus, ſtaminibus divaricatis. *Ind. or.*

viridiflorum R. et P. 27. P. foliis enſiformibus ſuberectis, ſcapo elato ſub-4floro, corona limbum corollae aequante, ſtaminibus exſertis. *Peru.*

*** *Corona breviſſima, vel e filamentis baſi dilatatis conflata; Chryſiphiálae* Lamb.

auſtrale * 28. P. foliis petiolatis cordato-ſubrotundis coſtatis, ſpatha multiflora, floribus pedunculatis, filamentis baſi dilatatis, alternis 2dentatis in urceolum coalitis limbo corollae brevioribus, antheris erectis. *Nov. Holland.* (P. auſtralaſicum Ker.)

flavum R. et P. 29. P. foliis linearibus canaliculatis, ſcapo tereti multifloro, floribus pedunculatis, limbi campanulati laciniis erectis oblongis, corona latente,

antheris incumbentibus limbum aequantibus, ſtylo clavato. *Peru.* (Stenomeſſon Herb.)

luteum Poir. 30. P. foliis linearibus obtuſis, ſcapo compreſſo ſub-3floro, limbi laciniis oblongis mucronatis patentibus tubo brevioribus, filamentis alternis 2dentatis in urceolum coalitis, antheris erectis, ſtigmate 3fido. *Chili.* (Chlidanthus fragrans Lindl.)

coccineum R. et P. 31. P. foliis linearibus acutis, ſcapo torto ſub-6floro, floribus pedunculatis, limbi laciniis erectis oblongis, tubo baſi conſtricto, filamentis baſi in cyathum dentatum connatis corollam aequantibus. *Peru.* (P. croceum Red. aurantiacum Kunth. Stenomeſſon Herb.)

recurvatum R. et P. 32. P. foliis enſiformibus, ſcapo ancipiti ſub-3floro, floribus pedunculatis, tubo corollae cernuae incurvo, coronae breviſſimae dentibus ſubulatis filamenta aequantibus, ſtaminibus alternis brevioribus corollam aequantibus. *Peru.* (Carpodetes Herb.)

latifolium R. et P. 33. P. foliis oblongo-lanceolatis petiolatis, ſcapo tereti, floribus pendulis, laciniis limbi conniventibus, corona breviſſima 6partita dentata, ſtaminibus exſertis. *Peru.* (Leperiza Herb.)

variegatum R. et P. 34. P. foliis enſiformibus, ſcapo ancipiti, floribus pedunculatis, tubo corollae longiſſimo, laciniis limbi erecto-patulis ovatis acuminatis, coronae dentibus furcatis reflexis. *Peru.*

incarnatum Kunth. 35. P. foliis linearibus obtuſis, ſcapo ancipiti ſub-4floro, laciniis limbi patulis obtuſis, corona breviſſima 12dentata, ſtaminibus corolla brevioribus. *Quito.*

† *humile* Cav. 36. P. foliis lineari-ſubulatis flaccidis ſcapo 2floro longioribus, floribus pedunculatis erectis, laciniis limbi tubo longioribus patentiſſimis obtuſis, corona crenulata breviſſima. *Hiſpan. auſtr.*

1196. GALANTHUS.

nivalis 1. G. foliis linearibus obtuſis planis. *Europ.*

plicatus M. B. 2. G. foliis oblongis margine utrinque plicatis. *Caucaſ. Aſia media.*

1197. LEUCOÏUM.

vernum 1. L. ſpatha 1flora, ſtylo clavato, foliis lineari-lanceolatis obtuſis. *Europ.*

trichophyllum Brot. 2. L. ſpatha 1flora, ſtylo filiformi, foliis lineari-filiformibus canaliculatis elongatis. *Luſitan. Numidia.* (L. grandiflorum Red.)

† *roſeum* Mart. 3. L. ſpatha 1flora, ſtylo foliisque filiformibus. *Corſica.*

† *capitulatum* Lour. 4. L. ſpatha 1flora, foliis oblongis plicatis, petiolis triquetris. *Cochinchina.*

5.

autumnale 5. L. ſpatha ſubmultiflora, ſtylo foliisque filiformibus. *Europ. auſtr.*

aeſtivum 6. L. ſpatha multiflora, ſtylo clavato, foliis lineari-lanceolatis. *Europ. auſtr.*

1198. AMARYLLIS.

* *Uniflorae.*

† *Corollae faux nuda.*

pumila Spin. 1. A. foliis linearibus canaliculatis, ſpatha 2fida acuta tubum corollae regularis ſuperante, ſtaminibus incluſis. *Patria?*

Atamaſco 2. A. foliis ligulatis, ſpatha 2fida acuta tubum ſubaequante, laciniis corollae campanulatae acutis, ſtaminibus erectis. *Carolin. Virgin.* (Zephyranthes Herb.)

tubiſpatha Herit. 3. A. foliis linearibus glaucis ſubtus convexis, ſpatha 2fida tubuloſa, tubo corollae ſubnullo, laciniis internis minoribus, ſtaminibus aequalibus. *Amer. auſtr.* (Zephyranthes Herb.)

candida Ker. 4. A. foliis linearibus carnoſis ſcapum ſuperantibus, ſpatha hinc fiſſa, laciniis corollae erectis obtuſis ſtamina aequalia ſuperantibus. *Peru.*

Berterii * 5. A. foliis lato-lanceolatis ſubloriformibus, ſpatha 2fida lanceolata, tubo longiſſimo, laciniis corollae campanulatae erectis acutis, ſtaminibus declinatis. *Amer. auſtr.* Bertero.

pudica Ker. 6. A. ſcapo abbreviato, ſpatha diphylla, tubo corollae abbreviato, laciniis corollae acuminatis conniventibus, infima ſtaminibusque declinatis. *C. B. S.*

Pumilio Ait. 7. A. folio ſolitario lineari, ſpatha diphylla, tubo corollae ventricoſo, laciniis oblongis acutis reflexis, ſtaminibus inclinatis alternis brevioribus. *Afric. auſtr.* (Gaſtronema Sims.)

†† *Corollae faux ſquamis coronata.*

minuta Humb. 8. A. foliis anguſtiſſimis linearibus, ſpatha inflata acuminata, limbo corollae campanulatae regulari, ſtaminibus aequalibus. *Nov. Hiſpan.*

nervoſa Humb. 9. A. foliis anguſtiſſimis linearibus, ſpatha lanceolata elongata, laciniis corollae campanulatae oblongis acutis nervoſis aequalibus, ſtaminibus aequalibus alternis brevioribus. *Mexico.*

tubiflora Herit. 10. A. foliis binis linearibus, ſpatha diphylla, tubo longiſſimo, corolla infundibuliformi, laciniis patentiſſimis lanceolatis acuminatis elongatis, ſtaminibus aequalibus. *Lima.*

flammea R. et P. 11. A. foliis linearibus acuminatis abbreviatis, corollae campanulatae laciniis ſubconvolutis reflexis tubum ſuperantibus, ſtaminibus erectis abbreviatis. *Lima.*

peruviana Ker. 12. A. foliis linearibus carinatis, corolla campanulata patentiuscula, ſtaminibus erectis, ſtylo declinato. *Peru.* (A. aurea R. et P.)

maculata Herit. 13. A. ſcapo maculato, ſpatha diphylla lineari, corolla campanulata, genitalibus declinatis. *Chili.*

formoſiſſima 14. A. foliis ſublinearibus canaliculatis elongatis, corolla bilabiata nutante, genitalibus declinatis. *Amer. auſtr.* (Sprekelia Herb.)

** *Subbiflorae.*

† *Corollae faux coronata.*

Reginae 15. A. foliis ſubloriformibus carinatis, pedicellis divaricatis, corollae cernuae ſubringentis fauce fimbriata, laciniis oblongis undulatis, ſtaminibus declinatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (A. braſilienſis Andr.)

miniata R. et P. 16. A. foliis loriformibus ſcapoque glaucis, corolla ringente cernua, lacinia ſuprema reflexa, tubo breviſſimo fimbriato, ſtaminibus declinatis. *Peru.*

equeſtris Jacq. 17. A. foliis lato-lanceolatis, ſcapo glauco, pedicellis erectis ſpatha brevioribus, tubo corollae horizontali fimbriato filiformi, limbo patulo, genitalibus declinatis corolla brevioribus. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (A. dubia L.)

maranenſis Ker. 18. A. foliis lato-lanceolatis nitidis baſi purpuraſcentibus, pedicellis erectis, tubo cernuo fimbriato, limbo patulo ſubringente, genitalibus declinatis corollam ſuperantibus. *Braſil.* (Hippeaſtrum ſtyloſum Sims.)

chilenſis Herit. 19. A. foliis linearibus compreſſis carnoſis, ſcapo purpuraſcente, ſpatha colorata, tubo brevi intus ſquamis 3-4fidis coronato, laciniis lanceolatis patulis, filamentis declinatis corolla brevioribus. *Chili. Peru.*

calyptrata Ker. 20. A. foliis lato-lanceolatis loriformibus ſcapo longioribus, laciniis corollae ſubringentis oblongis undulatis tubo longioribus, faucis corona contracta triangulari, genitalibus declinatis exſertis. *Braſil.*

aulica Ker. 21. A. foliis lanceolatis loriformibus, pedicellis erectis, tubo ſubnullo, faucis corona contracta 3angulari, limbo ringente, laciniis oblongis acutis, genitalibus declinatis corolla brevioribus. *Braſil.*

pſittacina Ker. 22. A. foliis lanceolatis ſcapoque glaucis, pedicellis erectis, corona faucis membranacea denticulata, limbi campanulati laciniis oblongis, genitalibus declinatis corollam ſubaequantibus. *Braſil.*

†† *Corollae faux nuda.*

chloroleuca Ker. 23. A. folio ſolitario lineari, ſpatha acuta erecta, corollae campanulatae tubo ſubnullo, laciniis

conniventibus, ſtaminibus erectis alternis brevioribus. *Patria?* (Zephyranthes Herb.)

ſolandraeflora Lindl. 24. A. foliis lanceolatis obtuſiusculis erectis ſcapo multo brevioribus, tubo corollae longiſſimo, limbo intus ſtriato glabro. *Cayenn.*

fulgida Ker. 25. A. foliis oblongo-lanceolatis, ſcapo glauco, pedicellis erectis tuboque elongatis, corollae cernuae ſubringentis lacinia ſuprema latiſſima, genitalibus declinatis corolla ſubbrevioribus. *Braſil.*

rutila Ker. 26. A. foliis lanceolatis ſubloriformibus, ſcapo glauco, pedicellis erectis, tubo corollae abbreviato, limbo bilabiato, lacinia infima anguſtiore, genitalibus declinatis corolla brevioribus. *Braſil.*

Principis Salm. 27. A. foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis ſubtus purpuraſcentibus ſcapo multo brevioribus, ſpatha ſubtriflora, tubo corollae limbum ſuperante. *Braſil.*

** *Multiflorae.*

† *Corolla ſubregularis.*

bicolor R. et P. 28. A. foliis ſubloriformibus, ſcapo ancipiti, corollae campanulatae tubo ſquamato, ſtaminibus erectis. *Peru.*

tatarica Pall. 29. A. foliis linearibus anguſtiſſimis, floribus longe pedicellatis, corollae campanulatae laciniis ſubinaequalibus, genitalibus incluſis. *Montes Aſiae.* (A. montana Labill.)

blanda Ker. 30. A. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis loriformibus, pedicellis divaricatis, corollae nutantis tubo turbinato abbreviato, laciniis undulatis patentiſſimis, ſtaminibus declinatis. *C. B. S.*

cyrtanthoides Sims. 31. A. foliis loriformibus obtuſis, pedicellis cernuis, corolla campanulata, genitalibus rectis exſertis. *Chili.*

ignea Lindl. 32. A. foliis lineari-lanceolatis obtuſis, umbella 6flora, pedunculis corollas aequantibus, laciniis corollae conniventibus ſtigmate ſimplici brevioribus. *Chili.*

Belladonna 33. A. foliis loriformibus ſcapo compreſſo brevioribus, corollae nutantis campanulatae laciniis oblongis baſi connatis. *Ind. occ. C. B. S.* (A. pallida Red. variabilis Jacq.)

vittata Ait. 34. A. foliis loriformibus ſcapo tereti brevioribus, corollae campanulatae laciniis ſubconnatis margine criſpis. *C. B. S.?*

purpurea Ait. 35. A. foliis lanceolatis obtuſis ſcapum ſubcompreſſum aequantibus, corollae infundibuliformis tubo elongato, fauce coronata, laciniis ovalibus ſubaequalibus, ſtaminibus rectis. *C. B. S.* (A. elata Jacq. ſpecioſa Herit. Crinum ſpecioſum Th. L. ſuppl. Vallota Herb.)

coranica Burch. 36. A. foliis ſubfalcatis ſerrulatis ſcapoque ancipiti glaucis, floribus numeroſis ſubſeſſilibus, laciniis limbi linearibus revolutis tubo longioribus, ſtaminibus erectis. *Afr. auſtr.* (Ammocharis Herb.)

marginata Jacq. 37. A. foliis lingulatis proſtratis cartilagineo-marginatis, pedunculis clavatis, corolla ſub-6petala revoluta, ſtaminibus rectis longe exſertis. *C. B. S.* (Brunsvigia Ker. Imhofia Herb.)

falcata Ait. 38. A. foliis ſubfalcatis ſerrulatis, ſcapo compreſſo umbellam aequante, pedunculis angulatis clavatis, corolla ſub-6petala erecta. *C. B. S.* (Crinum Jacqu. Haemanthus Th. Brunsvigia Ker. Ammocharis Herb.)

diſticha 39. A. foliis lanceolatis loriformibus margine laevibus ſcapoque ſubcompreſſo glaucis, pedunculis numeroſis confertis clavatis, corollae infundibuliformis laciniis revolutis, ſtaminibus longiſſime exſertis. *C. B. S.* (Haemanthus toxicarius Ait. Brunsvigia Ker. Boophane Herb.)

curvifolia Jacq. 40. A. foliis linearibus ſubfalcatis ſcapoque glaucis, pedicellis erectis, laciniis corollae ſubrotatis revolutis undulatis, ſtaminibus rectis exſertis. *C. B. S.* (A. Fothergillia Andr., humilis et coruſca Ker. Nerine Herb.)

ſarnienſis 41. A. foliis erectis lanceolatis obtuſis, ſcapo compreſſis, pedicellis ſpatha ſubbrevioribus, corolla ſub-6petala patente revoluta, ſtaminibus rectis. *Japon. C. B. S.* (A. venuſta Ker. Nerine Ker.)

auſtralis * 42. A. foliis lineari-loriformibus, pedicellis rectis craſſis, corollae nutantis tubo ſtriato lacinias oblongas obtuſas patulas ſubaequante, genitalibus declinatis. *Nov. Holl. occ.* (A. auſtralaſica Ker.)

longifolia Ait. 43. A. foliis lato-lanceolatis margine ſcabris loriformibus, pedicellis breviſſimis, tubo corollae elongato, limbo campanulato ſtamina ſubaſcendentia ſuperante. *Afric. auſtr.* (A. capenſis Mill. Crinum capenſe Herb.)

revoluta Ait. 44. A. foliis linearibus canaliculatis loriformibus, pedicellis tuboque corollae abbreviatis, limbo campanulato revoluto, ſtaminibus ſuberectis. *C. B. S.* (A. linearis L. ſuppl. Crinum lineare Thunb.)

zeylanica 45. A. foliis loriformibus undulatis margine laevibus, floribus ſeſſilibus, tubo elongato gracili, limbo campanulato, laciniis apice recurvis. *Ind. orient.* (A. ornata Ker. Crinum latifolium Andr. inſignis Ker. var.)

gigantea Ait. 46. A. foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis margine ſcabris, floribus ſeſſilibus, corollae infundibuliformis tubo limbum patentem ſuperante. *Sierra Leona.* (Crinum giganteum Andr.)

latifolia Herit. 47. A. foliis oblongo-lanceolatis margine ſcabris, floribus pedicellatis, tubo corollae limbum aequante. *Ind. or.* (Crinum latifolium L.)

moluccana Ker. 48. A. foliis lanceolatis loriformibus margine cartilagineis ſcabris baſi undulatis, floribus ſeſſilibus,

tubo corollae campanulatae limbum aequante. *Inf. Molucc.* (Crinum moluccanum Roxb. Sims.)

†† *Corolla ringens: femina bulbofa.*

advena Ker. 49. A. foliis canaliculatis obtufis, floribus pedunculatis, tubo corollae abbreviato, fauce fimbriata, limbo 2labiato divaricato, ftaminibus declinatis. *Chili.*

reticulata Ait. 50. A. foliis oblongis bafi attenuatis, fcapo fubcompreffo, floribus pedicellatis, corollae cernuae laciniis oblongis reticulatis tubum fubaequantibus. *Brafil.* (Coburgia Herb.)

acuminata Ker. 51. A. foliis lanceolatis loriformibus fupra incano-pruinofis, fcapo tereti, floribus pedicellatis, laciniis inaequalibus patentiffimis tubum ftaminaque fuperantibus. *Bonaria.* (Hippeaftrum pulverulentum Sims.)

crocata Ker. 52. A. foliis oblongis obtufis fcapo tereti glauco brevioribus, pedicellis erectis, corollae nutantis laciniis obliquis inaequalibus, ftaminibus alternis brevioribus. *Brafil.*

pulchella * 53. A. foliis lanceolatis glaucis, fcapo tereti elato, floribus pedicellatis, corollis fub-6petalis, laciniis lanceolato-linearibus mucronatis undulatis. *Afric. auftr.* (Nerine pulchella Sims.)

laticoma Ker. 54. A. foliis lanceolatis obtufis loriformibus lucidis, fcapo complanato fcabro, pedicellis numerofis 3quetris hifpidis, corolla fub-6petala, laciniis linearibus planis revolutis, infima cum genitalibus deflexa. *C. B. S.*

flexuofa Jacq. 55. A. foliis anguftis loriformibus puftulato-punctatis, pedunculis patentibus, corolla fub-6petala, laciniis undulatis reflexis, infima divaricata. *C. B. S.*

undulata Jacq. 56. A. foliis linearibus canaliculatis laevibus, corolla fub-6petala, laciniis undulatis reflexis, infima divaricata. *C. B. S.* (A. humilis Jacq.)

radiata Ait. 57. A. foliis lineari-lingulatis glaucis, fcapo compreffo, pedunculis abbreviatis, corollae tubo fubnullo, laciniis linearibus undulato-crifpis radiato-reflexis, infima divaricata, genitalibus longiffimis. *China.* (Lycoris Herb.)

hyacinthina Ker. 58. A. foliis elliptico-oblongis reticulato-coftatis, fcapo tereti, floribus pedicellatis nutantibus, tubo corollae abbreviato, laciniis lanceolatis ringentibus, inferioribus undulatis, ftaminibus divaricatis. *Brafil.* (Griffinia Herb.)

aurea Ait. 59. A. foliis linearibus carinatis, fcapo teretiusculo, pedicellis tuboque corollae breviffimis, fauce coronata, laciniis patentibus undulatis, infima deflexa, genitalibus corollam fuperantibus. *China.* (Lycoris Herb.)

orientalis 60. A. foliis obovato-oblongis proftratis, fcapo pedunculos 3gonos clavatos aequante, corollae fuburceolatae refupinatae tubo nullo, ftaminibus ex-

ſertis, capſula alata. *C. B. S.* (Brunſvigia multiflora Heiſt. Sims.)

Joſephinae Red. 61. A. foliis lanceolatis elongatis erecto-patentibus glaucis, ſcapo ſubcompreſſo pedunculos teretes clavatos longe ſuperante, corollae infundibuliformis incurvae tubo abbreviato, ſtaminibus declinatis ſubexſertis, capſula oblonga 3loba. *Afric. auſtr.* (Brunſvigia Ker.)

ſtriata Jacq. 62. A. foliis elliptico-ovatis erectis marginatis dorſo ſtriatis, pedunculis clavatis, corollae campanulatae laciniis reflexis inaequalibus. *C. B. S.*

Radula Jacqu. 63. A. foliis ellipticis proſtratis puſtulato-aſperis, pedunculis clavatis, corollae ſub-6petalae lacinia infima divaricata. *C. B. S.*

1199. CRINUM.

* *Umbella ſeſſili.*

† *Foliis loriformibus.*

americanum 1. Cr. foliis margine glaberrimis, tubo corollae ſulcato limbum aequante, ſtaminibus inclinatis. *Amer. auſtr.* (Cr. Commelini Red.)

erubeſcens Ait. 2. Cr. foliis margine cartilagineo-aſperis, tubo limbum ſuperante, ſtylo ſtaminibus longiori. *Amer. auſtr.*

Commelini Jacqu. 3. Cr. foliis margine integerrimis linearibus canaliculatis, umbella pauciflora, tubo limbum ſuperante, ſtaminibus inclinatis. *Amer. auſtr.*

defixum Ker. 4. Cr. bulbo oblongo ſubfuſiformi, foliis erectis canaliculatis margine glabris, umbella multiflora, ſtylo ſtamina patentia aequante, capſula pedicellata. *Ind. or.*

enſifolium Roxb. 5. Cr. bulbo ovato, foliis ſuberectis anguſte lanceolatis elongatis, umbella ſeſſili pauciflora, tubo limbum aequante, laciniis anguſtiſſimis flaccidis. *Ind. orient.*

amoenum Roxb. 6. Cr. bulbo globoſo, foliis rectis canaliculatis margine ſcabris, tubo limbum aequante, laciniis lineari-lanceolatis, ſtaminibus inclinatis. *Ind. or.*

ſumatranum Roxb. 7. Cr. bulbo ovali, foliis rigidis erectis margine cartilagineo-aſperis, umbella multiflora, tubo limbum aequante, ſtylo ſtaminibus breviori, capſula grandi. *Sumatra.*

longifolium Roxb. 8. Cr. bulbo globoſo, foliis laxis longiſſimis margine aſperis, umbella multiflora, laciniis tubo ſubbrevioribus. *Bengal.*

†† *Foliis lanceolatis, linearibus.*

cruentum Ker. 9. Cr. bulbo pyramidato ſtolonifero, foliis lato-lanceolatis ſubcoriaceis obtuſiuſculis, umbella multiflora, tubo limbum duplo ſuperante. *Ind. or.*

† *anguſtifolium* R. Br. 10. Cr. foliis margine ſcabris, laciniis corollae lanceolatis genitalia ſuperantibus. *Nov. Holl.*

venosum R. Br. 11. Cr. laciniis corollae elliptico-lanceolatis venosis tubo brevioribus, antheris filamenta aequantibus, stylo incluso. *Nov. Holl.*

*** Umbella pedunculata.*

† Foliis loriformibus.

aquaticum Burch. 12. Cr. bulbo ovato, foliis canaliculatis margine scabris, umbellà pauciflora, tubo elongato, laciniis limbi subrotundo-oblongis obtusis. *Afric. austr.*

scabrum Sims. 13. Cr. foliis longissimis basi undulatis margine cartilagineo-asperrimis, umbella multiflora, tubo limbum patentissimum superante. *Brasil.*

flaccidum Herb. 14. Cr. foliis linearibus flaccidis glaberrimis, umbella multiflora, tubo sub 3gono lacinias obovato-oblongas aequante. *Nov. Holl.*

amabile Don. 15. Cr. bulbo elongato conico, foliis lato-lanceolatis margine glaberrimis glaucescentibus, umbella multiflora, tubo limbum aequante, laciniis lato-lanceolatis revolutis stamina superantibus. *Bengal.*

augustum Roxb. 16. Cr. bulbo columnari caulem aemulante, foliis canaliculatis margine glabris, umbella multiflora, laciniis limbi tubum superantis lanceolatis, staminibus declinatis. *Ins. Mascaren.*

lorifolium Roxb. 17. Cr. bulbo subconico, foliis longissimis sublinearibus, umbella multiflora. *Pegu.*

canaliculatum Roxb. 18. Cr. bulbo cylindrico, foliis canaliculatis longissimis margine laevibus, umbella multiflora, laciniis linearibus obtusis tubo longioribus. *Ind. or.*

†† Foliis lanceolatis.

asiaticum 19. Cr. bulbo cylindrico, foliis lato-lanceolatis erectiusculis scapo longioribus, umbella multiflora, laciniis linearibus revolutis tubum aequantibus. *China.* (Cr. americanum Red., toxicarium Roxb., declinatum Ker.)

pedunculatum R. Br. 20. Cr. bulbo cylindrico, foliis lato-lanceolatis obtusiusculis scapo brevioribus, umbella multiflora, laciniis linearibus patentissimis tubo brevioribus. *Nov. Holl.*

arenarium Sims. 21. Cr. bulbo ovato, foliis lanceolatis margine asperis, umbella multiflora, tubo longissimo, laciniis lanceolatis acutis. *Nov. Holl.*

Broussoneti Herb. 22. Cr. foliis lanceolatis undulatis serratis, umbella pauciflora, laciniis corollae patentissimis obtusis. *Sierra Leone.* (Amaryllis spectabilis Andr.)

bracteatum W. 23. Cr. bulbo cylindrico, foliis oblongis margine cartilagineis laevissimis, umbella multiflora bracteata, tubo laciniis limbi bracteisque breviori. *Ind. or.*

brachyandrum Carey. 24. Cr. bulbo oblongo, foliis linearibus erectis, umbella multiflora, laciniis limbi linearibus, staminibus abbreviatis. *Nov. Holl.*

quitense * 25. Cr. foliis lanceolatis acutiusculis glaberrimis, umbella multiflora, floribus pendulis bracteatis,

laciniis linearibus tubum ſuperantibus. *Quito.* (Haemanthus dubius Bonpl. Kunth.)

† *urceolatum* R. et P. 26. Cr. foliis longe petiolatis oblongo-lanceolatis, umbella multiflora, limbo urceolato tubum ſuperante. *Peru.* (Urceolaria Herb.)

† *Martinezii** 27. Cr. foliis linearibus obtuſis diſco discoloribus, umbella 8flora, floribus erectis, antheris ſagittatis. *Hiſpan. auſtr.* (Lapiedra Martinezii Lag.)

1200. EUCROSIA Ker.

bicolor Ker. *Amer. auſtr.* Herba foliis petiolatis oblongis, ſcapo teretiusculo, floribus rubro-luteo-viridibus.

1201. HAEMANTHUS.

* *Involucro umbellam excedente: foliis bifariis linguaeformibus.*

coccineus 1. H. foliis laevibus humi appreſſis, umbella faſtigiata coarctata, involucro colorato, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

coarctatus Jacqu. 2. H. foliis laevibus erectis apice calloſis, umbella coarctata, involucro colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

tigrinus Jacqu. 3. H. foliis glabris depreſſis ſubtus maculatis ciliatis, umbella coarctata, involucro colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

quadrivalvis Jacqu. 4. H. foliis baſi anguſtatis glabris patulis ciliatis verſus apicem villoſis, involucro 4phyllo colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.* (H. pubeſcens Thunb.)

craſſipes Jacqu. 5. H. foliis obovatis ciliatis ſubtus maculatis, involucro 5phyllo colorato, limbo corollae obtuſo patulo. *C. B. S.*

hyalocarpus Jacqu. 6. H. foliis glaberrimis immaculatis, involucro 7phyllo colorato, limbo corollae erecto, baccis ſemi-pellucidis. *C. B. S.*

** *Involucro umbellam aequante.*

puniceus Jacqu. 7. H. foliis oblongis undulatis retuſis, involucro ſubcolorato, limbo corollae erecto. *Guinea. C. B. S.*

rotundifolius Sims. 8. H. foliis orbiculatis ſcabris cartilagineo-marginatis, involucro 4phyllo. *C. B. S.*

humilis Jacqu. 9. H. foliis ellipticis glabris ciliatis erectis, involucro 6phyllo colorato, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

Pumilio Jacqu. 10. H. foliis lineari-lanceolatis glabris erecto-falcatis, ſcapo gracili, umbella pauciflora, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

*** *Umbella involucrum ſuperante.*

ciliaris 11. H. foliis linguaeformibus glabris ciliatis, involucro ovato, limbo corollae reflexo. *C. B. S.* (Amaryllis ciliaris L. Brunſvigia Ker.)

pubescens 12. H. foliis linguaeformibus villosis ciliatis, involucro viridi 4phyllo ciliato, limbo corollae patulo. *C. B. S.* (H albiflos Jacqu.)

multiflorus 13. H. foliis oblongo-lanceolatis concavis erectis, involucro 4phyllo patentissimo, limbo corollae patulo, staminibus longissime exsertis. *Sierra Leone.*

sanguineus 14. H. foliis linguaeformibus laevibus, involucro 7phyllo subcolorato, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

moschatus Jacqu. 15. H. foliis ellipticis acutis pubescentibus revolutis ciliatis subtus fasciato-maculatis, involucro polyphyllo acuto, limbo corollae erecto. *C. B. S.*

amarylloides Jacqu. 16. H. foliis lineari-linguaeformibus glabris, involucro 4phyllo, limbo corollae patulo. *C. B. S.*

lanceaefolius Jacqu. 17. H. foliis elliptico-lanceolatis ciliatis, involucro 4phyllo, pedicellis elongatis, limbo patente. *C. B. S.*

carneus Ker. 18. H. foliis rotundato-ovatis abbreviatis scapoque hirsutis, involucro scarioso laxo, pedicellis elongatis, limbo corollae patulo stamina superante. *Afric. austr.*

1202. STERNBERGIA Kit.

colchiciflora Kit. 1. St. foliis linearibus obtusis lucidis obliquis, laciniis limbi sublinearibus erectis stamina superantibus. *Hungar. Taur.*

Clusiana Ker. 2 St. foliis lineari-lanceolatis glaucis spiraliter tortis, laciniis limbi erectis inaequalibus apice uncinatis. *Thracia?* (Amaryllis Clusiana bot. mag.)

exigua Ker. 3. St. foliis filiformibus, laciniis limbi aequalibus obtusis stamina aequantibus. *Afric. bor.* (Amaryllis exigua Schousb.)

citrina Ker. 4. St. spatha indivisa obtusa, laciniis limbi linearibus emarginatis. *Peloponnes.* (Amaryllis citrina Sm.)

lutea Ker. 5. St. foliis linearibus canaliculatis obtusis, spatha indivisa obtusa, laciniis oblongis obtusis stamina superantibus. *Sicil. Graec. Caucas.* (Amaryllis lutea L.)

americana Hofmannsegg. 6. St. foliis filiformibus, spatha 2fida, staminibus alternis longioribus, stigmate 3fido. *Buenos Ayres.*

1203. STRUMARIA Jacqu.

filifolia Jacqu. 1. Str. foliis filiformibus, umbella multiflora, laciniis corollae stellatis acutis, styli struma basi inflata anguloso-plicata. *C. B. S.* (Crinum tenellum L. suppl. Leucoium strumosum Thunb. Ait.)

spiralis Ker. 2. Str. foliis setaceis, scapo basi spirali flexuoso, umbella pauciflora. *C. B. S.* (Crinum tenellum Jacqu. spirale Andr. Haemanthus spiralis Ait. W.)

crispa Ker. 3. Str. foliis lineari-filiformibus laxis, umbella pauciflora, laciniis corollae patentissimis oblongis obtusis undulatis. *C. B. S.* (Amaryllis crispa Jacqu.)

ſtellaris Ker. 4. Str. foliis linearibus erectis, umbella multiflora, corolla patentiſſima. *C. B. S.* (Amaryllis ſtellaris Jacqu.)

anguſtifolia Jacqu. 5. Str. foliis linearibus planis, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata, germine 3glanduloſo. *C. B. S.*

undulata Jacqu. 6. Str. foliis linearibus oblique flexis, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma libera, laciniis corollae undulatis. *C. B. S.*

rubella Jacqu. 7. Str. foliis linearibus oblique flexis, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque acuta, laciniis corollae planis. *C. B. S.*

truncata Jacqu. 8. Str. foliis lineari-enſiformibus obtuſis, ſcapo compreſſo, umbella multiflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata apice truncata, ſtaminibus corolla longioribus. *C. B. S.*

linguaefolia Jacqu. 9. Str. foliis linguaeformibus obtuſis, ſcapo inferne tereti, umbella pauciflora, ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque acuta, ſtaminibus corollam aequantibus. *C. B. S.*

gemmata Sims. 10. Str. foliis oblongis ſubfalcatis ciliatis, umbella laxa, laciniis corollae patentibus criſpis, ſtyli ſtruma gibboſa cum filamentis connata. *C. B. S.*

1204. CYRTANTHUS Ait.

uniflorus Ker. 1. C. folio ſolitario lineari glauco, ſpatha 1flora, tubo recto, limbo faucem aequante. *Afric. auſtr.* (Amaryllis clavata Herit.)

vittatus Desf. 2. C. foliis linearibus canaliculatis, floribus umbellatis erectis, tubo cylindrico gracili. *C. B. S.?*

obliquus Ait. 3. C. foliis lanceolatis obtuſis oblique flexis, umbella reclinata multiflora, floribus pendulis obverſe conicis. *C. B. S.* (Crinum obliquum L. ſuppl. Amaryllis Umbella Herit.)

anguſtifolius 4. C. foliis linearibus canaliculatis laxis, floribus cylindricis cernuis ſubumbellatis, limbi dentibus acutis. *C. B. S.* (Crinum anguſtifolium L. ſuppl. Amaryllis cylindracea Herit.)

collinus Burch. 5. C. foliis linearibus canaliculatis flaccidis glaucis, umbella multiflora, floribus pendulis ſubcylindrico-angulatis, lobis limbi rotundatis, ſtaminibus incluſis. *Afric. auſtr.*

ſpiralis Burch. 6. C. foliis lineari-loriformibus ſpiratim tortis glaucis, umbella ſubmultiflora, floribus pendulis clavato-cylindricis, lobis limbi obtuſis patulis, ſtaminibus limbum ſubaequantibus. *Afric. auſtr.* (C. anguſtifolius Jacqu., ventricoſus W.)

odorus Ker. 7. C. foliis linearibus anguſtiſſimis, umbella pauciflora, floribus cernuis longe tubuloſis, limbi lobis obtuſis patulis diſtantibus, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Afric. auſtr.*

1205. EUSTEPHIA Cav.

coccinea Cav. *Patria*? Herba foliis radicalibus linearibus obtufis, floribus umbellatis nutantibus, ftaminibus exfertis.

1206. HYPOXIS.

** Uniflorae.*

† Pilofae.

juncea Sm. 1. H. foliis linearibus canaliculatis, fcapo unifloro. *Carolinae turfeta.*

aurea Lour. 2. H. foliis fubulatis canaliculatis reflexis fcapum 1florum aequantibus. *Cochinchina.*

marginata R. Br. 3. H. foliis linearibus longiffimis margine incraffatis, fcapo 2bracteato, capfulis cylindricis villofis. *Nov. Holl.*

hygrometrica Labill. 4. H. foliis lineari-fubulatis hirfutis, (pilis hygrometrice tortis), fcapo gracili folia aequante, capfula turbinata glabra. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

†† Glabrae.

alba 5. H. foliis tereti-filiformibus fcapum bracteatum fubdivifum fuperantibus. *C. B. S.*

glabella R. Br. 6. H. foliis lineari-fubulatis canaliculatis fcapo 2bracteato longioribus, ftylo breviffimo. *Nov. Holl.*

linearis Andr. 7. H. foliis lanceolato-linearibus canaliculatis fcapo 1floro longioribus. *C. B. S.*

ftellata 8. H. foliis lineari-lanceolatis carinatis laxis fcapo 1floro longioribus, corolla bafi maculata. *C. B. S.* (H. elegans Andr., Amaryllis capenfis L.)

ferrata 9. H. foliis linearibus carinatis ciliato-ferratis fcapo 1floro longioribus, corollis defloratis reflexis. *C. B. S.*

brevifcapa Kunth. 10. H. foliis lineari-lanceolatis integerrimis fcapum fubvillofum fuperantibus, capfula clavata pilofa. *Guiana.*

ovata Thunb. 11. H. foliis ovato-lanceolatis integerrimis fcapo 1floro brevioribus. *C. B. S.*

veratrifolia W. 12. H. foliis ovali-oblongis plicato-nervofis fcapo filiformi 1floro longioribus. *C. B. S.* (H. plicata Jacqu.)

*** Pauciflorae.*

† Pilofae.

carolinenfis Mx. 13. H. foliis fubtriquetro-filiformibus pilofis, fcapo fub-2floro. *Carolina. Georgia.* (H. filifolia Ell.)

decumbens 14. H. foliis lineari-lanceolatis fcapo decumbente fub-2floro longioribus. *Jamaica.*

ftellipilis Ker. 15. H. foliis lanceolatis canaliculatis nervofis fubtus ftellulato-tomentofis, fcapo hirfuto 2floro foliis breviori. *C. B. S.*

humilis Kunth. 16. H. foliis linearibus canaliculatis recurvatis ſcapoque 2floro piloſis. *Cumana.* (H. puſilla Kunth.)

elongata Kunth. 17. H. foliis linearibus canaliculatis 3nerviis longiſſimis ſcapoque 3floro piloſis, capſula cylindrica. *Nov. Granat.*

obliqua Jacqu. 18. H. foliis lanceolatis oblique flexis margine medioque lanatis ſcapum ſub-triflorum piloſum aequantibus, pedunculis flore triplo longioribus. *C. B. S.*

pratenſis R.Br. 19. H. foliis linearibus elongatis margine ſcapoque 3floro piloſis, capſula globoſo-turbinata. *Nov. Holl.*

erecta 20 H. foliis lineari-lanceolatis hirſutis ſcapo ſub-4floro longioribus, pedunculis florem excedentibus, laciniis corollae acutiusculis. *Amer. bor.* (H. ſeſſilis L.)

ſobolifera Jacqu. 21. H. foliis lineari-lanceolatis hirſutis ſcapum ſub-4florum aequantibus, pedunculis flore longioribus, laciniis corollae obtuſiusculis. *C. B. S.*

villoſa 22. H. foliis lineari-lanceolatis villoſis ſcapo ſub-4floro longioribus, pedunculis flore brevioribus, capſulis cylindricis. *C. B. S.*

obtuſa Burch. 23. H. foliis lanceolatis erectis ſubtortis marginatis ſcapum ſub-4florum ſuperantibus, floribus racemoſis, laciniis corollae obtuſis. *Afric. auſtr.*

†† *Glabra.*

aquatica 24. H. foliis linearibus laxis, floribus polygamis, ☿ ſolitariis ♂ umbellatis. *C. B. S.*

1207. CURCULIGO.

plicata Dryand. 1. C. foliis lanceolatis ſubulatis ſubplicatis ſubpubeſcentibus, floribus radicalibus paucis ſeſſilibus. *C. B. S.* (Hypoxis plicata Thunb. Gethyllis Jacqu. W.)

faſcicularis * 2. C. foliis lineari-canaliculatis glabris, floribus radicalibus pedicellatis faſciculatis longiſſime tubuloſis. *Syria.* (Hypoxis faſcicularis L.)

orchioides Roxb. 3. C. foliis lineari-ſubulatis 3nerviis, ſcapo racemoſo. *Ora Coromandel.*

brevifolia Dryand. 4. C. foliis lanceolatis, ſcapo racemoſo, tubo floris longiſſimo. *Ind. or.*

latifolia Dryand. 5. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis petiolatis, capitulo ſeſſili radicali, tubo limbum aequante. *Amboina.*

recurvata Dryand. 6. C. foliis oblongis utrinque attenuatis nervoſis longe petiolatis, ſcapo hirſuto, floribus capitatis bracteatis nutantibus, tubo floris breviſſimo. *Bengal.*

enſifolia R. Br. 7. C. foliis lanceolato-enſiformibus piloſiusculis petiolatis marginatis, tubo corollae hirſuto fructum excedente. *Nov. Holl.*

1208. LILIUM.

** Floribus erectis.*

† Foliis ſparſis.

candidum 1. L. caule multifloro, foliis lanceolatis lucidis baſi attenuatis, corollis intus glabris, ſulcis nectariferis obſoletis. *Helvetia. Europ. auſtr. Aſia minor.*

bulbiferum 2. L. caule multifloro, foliis lineari-lanceolatis, corollis intus papilloſis. *Italia. Auſtria. Amer. bor.* (L. penſylvanicum Ker.)

lancifolium Thunb. 3. L. caule hirſuto paucifloro, foliis lanceolatis glabris, axillis ſuperioribus bulbiferis, laciniis corollae baſi anguſtatis discretis. *Japon.* (L. bulbiferum Thunb.)

concolor Salisb. 4. L. caule multifloro, foliis oblongo-lanceolatis, corolla intus papilloſa extus glabra. *China.*

Catesbaei Curt. 5. C. caule ſub-1floro, foliis lineari-lanceolatis, corolla intus punctata, laciniis longe unguiculatis discretis margine undulatis apice reflexis. *Carolina.* (L. carolinianum Lam. ſpectabile Salisb.)

†† Foliis verticillatis.

philadelphicum 6. L. caule ſub-1floro, foliis lanceolatis 3nerviis, corolla genitalia ſuperante, laciniis unguiculatis discretis maculatis. *Amer. bor.* (L. andinum Nuttall., umbellatum Pursh. eſt var. floribus 3-5.)

dauricum Ker. 7. L. caule ſub-1floro 5gono alato, foliis lineari-lanceolatis, ſummis verticillatis florem aequantibus, pedunculo corollaque turbinato-patente extus lanatis, laciniis infimis ovali-lanceolatis. *Dauria.* (L. penſylvanicum Pursh. Nutt., ſpectabile Link., bulbiferum *β*. Dryand.)

*** Floribus cernuis aut reflexis.*

† Foliis ſparſis.

longiflorum Thunb. 8. L. caule ſub-1floro, foliis lanceolatis utrinque attenuatis nervoſis, corollae cernuae tubo elongato, ſtaminibus declinatis corolla brevioribus. *Japon.*

japonicum Thunb. 9. L. caule 1floro, foliis lanceolatis acuminatis petiolatis nervoſis, corolla cernua ſubcampanulata. *Japon.*

pumilum Red. 10. L. caule paucifloro, foliis lineari-ſubulatis, corollis ſubrotatis reflexis revolutis intus glabris. *Dauria.* (L. linifolium Hornem.)

pyrenaicum Gouan. 11. L. caule multifloro, foliis confertis linearibus ciliolatis, corollis ſubracemoſis reflexis revolutis intus papilloſo-punctatis. *Gallia auſtr.*

pomponium 12. L. caule ſub-2floro, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis glaberrimis, corollis reflexis revolutis intus papilloſis. *Hiſpania. Sibiria.* (L. pyrenaicum Red.)

chalcedonicum 13. L. caule multifloro ad apicem folioſo, foliis lineari-lanceolatis, corollis reflexis revolutis intus punctatis. *Europ. auſtr. Aſia minor.*

monadelphum M. B. 14. L. caule multifloro, foliis lanceolatis nervosis subtus pubescentibus, corollis subaggregatis cernuo-reflexis, filamentis basi connatis. *Caucas.*

tigrinum Ker. 15. L. caule multifloro, foliis lanceolatis 5nerviis, floralibus cordato-ovatis, axillis bulbiferis, corollis reflexis revolutis intus papillosis. *China.* (L. speciosum Andr.)

speciosum Th. 16. L. caule ramoso multifloro, foliis ovato-oblongis nervosis petiolatis, corollis reflexis revolutis intus papilloso-dentatis, sulco nectarifero barbato. *Japon.* (L. superbum Th. fl. jap.)

†† *Foliis verticillatis.*

carolinianum Mx. 17. L. caule sub-1floro, foliis spathulatis acutis enerviis, corolla cernua revoluta intus glabra punctata, staminibus exsertis. *Carolina.* (L. Michauxii Poir.)

nepalense Wall. 18. L. caule 1floro scabro, foliis summis verticillatis lanceolatis, corollae cernuae laciniis unguiculatis. *Nepal.*

canadense 19. L. caule sub-1floro, foliis lanceolatis utrinque acuminatis nervosis margine scabris, corollae nutantis laciniis lanceolatis acuminatis reflexis intus punctatis. *Amer. boreal.* (L. penduliflorum Red.)

maculatum Th. 20. L. caule multifloro, foliis sparso-verticillatis ovato-lanceolatis nervosis, corollis subumbellatis nutantibus subrevolutis intus maculatis. *Japon.*

Martagon 21. L. caule multifloro pubescente, foliis ovato-lanceolatis, corollis racemosis reflexis revolutis intus hirsutis. *Europ.*

glabrum * 22. L. caule multifloro scabro, foliis oblongis acutis nervosis, corollis racemosis reflexis revolutis intus glaberrimis. *Patria?*

superbum Lam. 23. L. caule multifloro, foliis sparso-verticillatis lineari-lanceolatis nervosis, corollis racemoso-pyramidatis reflexis revolutis punctatis. *Amer. boreal.*

1209. TULIPA.

(Caulis omnium subuniflorus, flos erectus.)

biflora Pall. 1. T. foliis binis linearibus glaucis, petalis acutis patulis filamentisque basi barbatis, capsula globosa mucronata. *Montes Ural. Ad Volgam et mare casp.*

Celsiana Red. 2. T. foliis lineari-lanceolatis elongatis, petalis lanceolatis acutis patentibus glabris, filamentis subulatis barbatis, alternis brevioribus. *Gallia. Lusitania. Tauria. Ad Volgam.* (T. transtagana Brot.)

sylvestris 3. T. foliis caulinis lanceolatis, flore nubili nutante, petalis acutis, interioribus filamentisque basi pubescentibus. *Europ. et Asia med.*

acuminata Vahl. 4. T. foliis caulinis lanceolatis acutis undulatis glaucis, petalis patentibus longiſſime acuminatis apice convolutis, alternis anguſtioribus, ſtaminibus ſtigmate brevioribus. *Thracia. Aſia minor.* (T. cornuta Red., turcica Roth. W. ſuppl.)

altaica Pall. 5. T. foliis caulinis oblongo-lanceolatis undulatis cartilagineo-marginatis florem ſubaequantibus, pedunculo ſcabro, petalis glaberrimis, alternis lanceolatis, alternis ſpathulato-oblongis, ovario antheris breviori filamenta ſuperante. *Mons Imaus.*

praecox Tenor. 6. T. foliis caulinis ovato-lanceolatis ciliatis, bulbo lanato, petalis ovato-lanceolatis acuminatis apice barbatis, filamentis baſi dilatatis. *Neapol.*

Cluſiana Red. 7. T. foliis caulinis oblongis acutis glaucis florem ſubaequantibus, petalis oblongis acutis glabris, ovario ſtamina ſuperante. *Perſia.*

Oculus Solis S. Amand. 8. T. foliis caulinis oblongis acutis ſubciliatis, petalis exterioribus acutis, omnibus baſi maculatis, ſtaminibus ovarium excedentibus, ſtigmatibus villoſo-fimbriatis. *Gallia.*

pubeſcens W. 9. T. foliis oblongo-lanceolatis florem ſuperantibus pubeſcentibus, petalis exterioribus acutis, interioribus obtuſis mucronatis. *Aſia minor.*

ſuaveolens Roth. 10. T. caule ſuperne nudo pubeſcente, foliis ovato-lanceolatis, petalis obtuſis glabris. *Europ. auſtr.*

Geſneriana 11. T. caule ſuperne nudo glabro, foliis ovato-oblongis acutis, petalis obtuſis glabris. *Thracia. Aſia minor.*

ſaxatilis Sieb. 12. T. caule ſubbifloro flexuoſo folioſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis, petalis erectis obtuſis apice ſubbarbatis, ovario antheras ſuperante. *Creta.*

1210. FRITILLARIA.

(Flores omnium nutantes.)

* *Caule unifloro.*

Meleagris 1. Fr. foliis alternis linearibus canaliculatis, flore teſſellato. *German. Europ. auſtr.*

tenella M. B. 2. Fr. foliis lineari-lanceolatis acuminatis paucis, flore teſſellato. *Caucaſ.*

nervoſa W. 3. Fr. foliis alternis linearibus nervoſis, flore teſſellato. *Europ. auſtr.*

lutea M. B. 4. Fr. caule baſi nudo, foliis abbreviatis lanceolatis ſtriatis glaucis, flore teſſellato. *Caucaſ.* (Fr. collina Adam.)

ruthenica Wikſtr. 5. Fr. foliis oppoſitis erectis lineari-lanceolatis cirrhoſis, flore teſſellato, capſula alata. *Tauria. Caucaſ.* (Fr. verticillata M. B., pyrenaica Pall., perſica S. G. Gmel.)

verticillata W. 6. Fr. foliis inferioribus oppoſitis lanceolatis, ſuperioribus quaternis linearibus cirrhoſis, flore nervoſo-venoſo. *Sibir. Japon.* (Uvularia cirrhoſa Thunb.)

latifolia W. 7. Fr. foliis inferioribus alternis oblongo-lanceolatis, ſummis oppoſitis, flore teſſellato. *Caucaſ.*

meſſanenſis Rafin. 8. Fr. foliis radicalibus ovalibus petiolatis, caulinis lanceolatis, ſummis florem ſuperantibus, flore concolore marginato. *Sicil.* (Fr. plantaginifolia Lam.?)

pudica * 9. Fr. foliis alternis lineari-lanceolatis nervoſis, flore concolore. *Amer. bor.* (Lilium pudicum Purſh.)

luſitanica Wikſtr. 10. Fr. foliis alternis lanceolatis acuminatis, flore diſcolore ſtriato. *Luſitania.*

tulipifolia M. B. 11. Fr. foliis alternis oblongo-lanceolatis obtuſiuſculis nervoſis, flore cernuo ſtriato. *Caucaſ.* (Fr. caucaſica Adam.)

purpurea Kunth. 12. Fr. foliis ſparſis linearibus acuminatis canaliculatis, flore ſtriato, petalis exterioribus acutis, interioribus oblongis fimbriatis. *Nov. Hiſpan.*

lanceolata Purſh. 13. Fr. foliis verticillatis lanceolatis obtuſiuſculis nervoſis, flore ſtriato, petalis lanceolatis. *Camtſchatca. Amer. bor.* (Lilium camtſchatcenſe L.)

** *Caule multifloro.*

cantonienſis Lour. 14. Fr. floribus geminis axillaribus concoloribus, foliis lanceolatis 3nerviis. *China auſtr.*

Imperialis 15. Fr. floribus verticillatis pendulis concoloribus baſi maculatis ſuperne folioſis, foliis confertis oblongo-lanceolatis lucidis. *Perſia.*

barbata Kunth. 16. Fr. floribus axillaribus ſtriatis, petalis exterioribus cuſpidatis, interioribus obovatis crenulatis barbatis, foliis linearibus acuminatis ſparſis. *Mexico.*

pyrenaica 17. Fr. floribus axillaribus pendulis teſſellatis, foliis lineari-lanceolatis obliquis nervoſis, imis oppoſitis. *Pyrenaei. Ruſſia.*

alba Nuttall. 18. Fr. floribus ſubracemoſis concoloribus, foliis lineari-oblongis obtuſis obliquis ſubſtriatis. *Amer. bor.*

perſica 19. Fr. floribus pendulis racemoſo-pyramidatis, foliis verticillatis lanceolatis patentibus obliquis. *Perſia.*

1211. ERYTHRONIUM.

Dens Canis 1. E. petalis lanceolatis acuminatis, ſtigmate 3fido, foliis ovato-oblongis. *Europ. auſtr.*

lanceolatum Purſh. 2. E. petalis lanceolatis obtuſiuſculis baſi dilatatis, ſtigmate integro, foliis lanceolatis aſpero-punctatis. *Amer. bor.* (E. americanum Ker.)

albidum Nutt. 3. E. petalis lanceolatis obtuſiuſculis, interioribus ſubunguiculatis baſi ecalloſis, ſtigmate 3fido, foliis lanceolatis impunctatis. *Louiſiana.*

grandiflorum Purſh. 4. E. petalis lanceolatis acutis ſubunguiculatis, germine oblongo, foliis lineari-lanceolatis. *Amer. bor. occid.*

1212. ADAMSIA W.

ſcilloides W. *Caucaſ. Creta.* Sieber. Herba Scillae forma, foliis radicalibus geminis, floribus racemoſis coeruleis. (Puſchkinia ſcilloides Adam. M. B.)

1213. GLORIOSA.

ſuperba 1. Gl. foliis cirrhiferis. *Malabar.*
ſimplex 2. Gl. foliis acuminatis. *Senegal.*

1214. HEMEROCALLIS.

flava 1. H. foliis linearibus carinatis, laciniis corollae acutis nervisque indiviſis. *Europ. auſtr.*
fulva 2. H. foliis linearibus carinatis, laciniis corollae interioribus obtuſis undulatis, nervis exteriorum ramoſis. *Europ. auſtr.*

1215. HYACINTHUS.

orientalis 1. H. foliis lanceolatis obtuſis, corollis infundibuliformibus baſi ventricoſis. *Aſia minor. et media.*
amethyſtinus 2. H. foliis linearibus canaliculatis flaccidis, corollis campanulatis, genitalibus tubo brevioribus. *Hiſpan.* (H. hiſpanicus Lam.)
revolutus 3. H. foliis oblongis undulatis, corollis campanulatis revolutis. *C. B. S.*
convallarioides 4. H. foliis ſubulatis, corollis campanulato-ovatis pendulis. *C. B. S.*
flexuoſus Th. 5. H. foliis linearibus ſcapo flexuoſo longioribus, racemo erecto, corollis campanulatis. *C. B. S.*
romanus 6. H. foliis lineari-lanceolatis ſcapo recto longioribus, corollis erectis campanulatis angulatis. *Ital. Sicil.* (H. dubius Guſſon.)
†*ſpicatus* Sm. 7. H. foliis lineari-lanceolatis ſcapum ſubexcedentibus, floribus ſpicatis, filamentis dilatatis. *Zacynth. inſ. et Peloponneſ.*
ſulfureus Poir. 8. H. foliis linearibus ſcapo brevioribus, racemo ſpicato, corollis clavato-campanulatis, filamentis tubum ſuperantibus. *Afric. auſtr.*

1216. MUSCARI Deſf.

moſchatum W. 1. M. foliis lineari-lanceolatis glaucis, racemo ſpicato, corollis horizontalibus ventricoſo-ovatis fauce clauſis, limbo crenato. *Aſia minor.* (Hyacinthus Muſcari L.)
comoſum W. 2. M. foliis linearibus elongatis flaccidis, racemo elongato, corollis cylindricis angulatis fauce ſubclauſis, ſummis ſterilibus coloratis longius pedicellatis. *Europ. et Aſia med.*

maritimum Desf. 3. M. foliis ſubulatis, racemo tereti, corollis cylindricis, ſummis ſterilibus coloratis ſeſſilibus. *Numidia.* (Hyacinthus maritimus Perſ.)

ciliatum Ker. 4. M. foliis lanceolatis marginato-ciliatis, racemo laxo, corollis cylindricis ore aperto, pedunculis fructiferis horizontalibus longiſſimis. *Italia. Podolia. Tauria. Aſia minor.* (Hyacinthus ciliatus Cyr.)

pallens Beſſ. 5. M. foliis lanceolatis glaberrimis, racemo ſtricto, corollis cylindricis, fauce aperta. *Podolia. Tauria. Caucaſ.* (H. amethyſtinus Pall. pallens MB.)

racemoſum W. 6. M. foliis linearibus laxis pendulis, racemo ſtricto, corollis ovatis confertis, ſummis ſeſſilibus. *Europ. auſtr.*

botryoides W. 7. M. foliis linearibus canaliculatis ſtrictis, corollis globoſis, inferioribus remotioribus. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (M. parviflorum Desf.)

ſeſſiliflorum * 8. M. floribus omnibus ſeſſilibus fertilibus, corollis cylindricis, laciniis ſubpatulis. *Ad Syrtim mai. Afric. bor.* (Hyacinthus ſeſſiliflorus Viv.)

1217. SCILLA.

* *Hyacinthoides: corollae campanulatae.*

nutans Sm. 1. Sc. foliis lanceolatis, racemo elongato, corollis cernuis apice revolutis, ſtaminibus tubum aequantibus. *Anglia. Europ. auſtr.* (Hyacinthus non ſcriptus et cernuus L., pratenſis et amethyſtinus Lam.)

campanulata Ait. 2. Sc. foliis lanceolatis flaccidis, racemo multifloro oblongo, bracteis 2partitis pedunculo longioribus, corollis nutantibus apice revolutis. *Hiſpan. Luſitan.* (Sc. hyacinthoides Jacq.)

corymboſa Sims. 3. Sc. foliis linearibus ſcapo longioribus, racemo corymboſo, corollis infundibuliformibus erectis, ſtaminibus alternis brevioribus. *C. B. S.* (Hyacinthus corymboſus L. Maſſonia Sims.)

brevifolia Ker. 4. Sc. foliis lineari-lanceolatis ſcapo brevioribus, racemo ovato cernuo, corollis cylindricis. *C. B. S.* (Hyacinthus brevifolius Th.)

mauritanica Schousb. 5. Sc. foliis linearibus planis apice involutis, racemo erecto, bracteis binis pedunculum aequantibus. *Mauritania.*

tingitana Schousb. 6. Sc. foliis lanceolatis apice involutis, racemo erecto, bracteis ſolitariis pedunculo brevioribus. *Mauritania.*

cernua Red. 7. Sc. foliis oblongis, ſcapo compreſſo paucifloro, bracteis minimis pedicellisque coloratis, corollis nutantibus.. *Ruſſia media.* (Sc. amoena MB., amoenula Hornem., ſibirica Andr., azurea Goldb.)

ſibirica Sims. 8. Sc. foliis obovato-oblongis apice incurvis, racemo multifloro, corollis nutantibus. *Sibir.*

unifolia 9. Sc. folio ſolitario lineari-lanceolato canaliculato ſcapum pauciflorum vaginante, corollis ſpicatis

erectis ſubcampanulatis, bracteis ovato-lanceolatis. *Luſitan.* (Ornithogalum nanum Brot. Sc. paradoxa MB.?)

** *Anthericoides: corollae planae.*

pumila Brot. 10. Sc. folio ſolitario lanceolato vaginante, racemo erecto, bracteis pedunculo multo brevioribus. *Luſitan.*

bifolia 11. Sc. foliis ſubbinis lanceolatis erectis, racemo ſubelongato, pedunculis ebracteatis, bulbo ſolido. *Europ. med.* (Sc. praecox W.?)

Lilio-hyacinthus 12. Sc. foliis ſubternis lanceolatis humo appreſſis, racemo paucifloro, pedunculis ebracteatis, bulbo ſquamato. *Hiſpan. Gall. auſtr.*

verna 13. Sc. foliis numeroſis linearibus canaliculatis erectis, racemo corymboſo paucifloro, bracteis lanceolatis obtuſis, bulbo ſolido. *Anglia. Hiſpania.*

umbellata Ram. 14. Sc. foliis linearibus, ſcapo tereti, corymbo paucifloro ſubumbellato, bracteis filiformibus pedunculos ſubaequantibus. *Pyren.*

amoena 15. Sc. foliis lanceolatis obtuſis, ſcapo angulato, bracteis obtuſis breviſſimis, pedunculis alternis flore brevioribus. *Europ. med.*

italica 16. Sc. foliis linearibus erectis, racemo conico conferto, bracteis linearibus pedunculos aequantibus, corollis erectis. *Italia. Gallia auſtr.* (Sc. odorata Brot.?)

autumnalis 17. Sc. foliis linearibus obtuſis abbreviatis, ſcapo tereti, racemo ſubcorymboſo, pedunculis ebracteatis ſuberectis flore longioribus. *Anglia. Alſatia. Italia ſuper.*

parviflora Desf. 18. Sc. foliis lineari-lanceolatis acutis erectis ſcapo brevioribus, racemo cylindrico ſubconferto, bracteis minutis, pedunculis flores ſubaequantibus. *Numidia.* (Sc. numidica Poir.)

undulata Desf. 19. Sc. foliis lanceolatis undulatis ſcapo tereti brevioribus, racemo erecto multifloro, bracteis breviſſimis. *Numidia.*

obtuſifolia Poir. 20. Sc. foliis linguaeformibus undulatis ſcapo laterali tereti brevioribus, floribus racemoſis ebracteatis. *Numidia.*

villoſa Desf. 21. Sc. foliis lanceolatis laxis villoſis, racemis corymboſis, bracteis lanceolatis pedunculos aequantibus. *Numidia.*

lingulata Poir. 22. Sc. foliis lanceolatis glabris erectis ſcapo brevioribus, racemo conferto, bracteis linearibus pedunculos aequantibus. *Numidia.*

byzantina Poir. 23. Sc. foliis linearibus obtuſis ſcapum teretem ſubaequantibus, racemo conico multifloro, bracteis lineari-ſubulatis pedunculo longioribus. *Thracia.*

anthericoides Poir. 24. Sc. ſcapo tereti fiſtuloſo baſi ſquamato, racemo elongato, pedunculis bracteas ſubulatas corollasque ſubaequantibus. *Numidia.*

biflora R. et P. 25. Sc. foliis enſiformibus ſtriatis reflexis ſcapo tereti brevioribus, racemo laxo, pedunculis geminis bracteatis. *Peru.*

maritima 26. Sc. foliis oblongis obtuſis glaberrimis, racemo conferto, pedunculis elongatis, bracteis ſubulatis ſubtus calcaratis. *Ad litora maris mediterran.* (Ornithogalum maritimum Brot.)

peruviana 27. Sc. foliis lanceolatis undulatis ciliatis, corymbo conico conferto, bracteis lanceolatis elongatis. *Luſitania. Afric. bor.*

luſitanica 28. Sc. foliis linearibus obtuſis, ſcapo tereti, racemo oblongo multifloro, petalis lineatis. *Luſitan.*

hyacinthoides 29. Sc. foliis lanceolatis canaliculatis, ſcapo elato, corymbi multiflori pedunculis ſubverticillatis coloratis, bulbo tomentoſo. *Madera.*

orientalis Th. 30. Sc. foliis elliptico-enſiformibus, floribus racemoſis, bracteis elongatis. *Japon.*

japonica Th. 31. Sc. ſcapo erecto baſi aphyllo, floribus umbellatis, bracteis lanceolatis elongatis. *Japon.*

tetraphylla L. ſuppl. 32. Sc. acaulis, foliis quaternis ovato-lanceolatis, pedunculis radicalibus filiformibus faſciculatis. *Africa.*

1218. ALOË.

I. *Parviflorae.*

A. *Apicra* W. *Cor. 2labiata.*

a. *Acaules.*

* *Foliis integerrimis.*

retuſa 1. A. foliis 5fariis apice retuſo-deltoideis ſupra lineatis viridibus. *Afric. auſtr.* (Haworthia turgida Haw.)

albicans Haw. 2. A. foliis reflexo-patentibus ovatis 3quetris carinatis acutis glabris albicantibus margine carinaque cartilagineis. *C. B. S.*

cymbaeformis Curt. 3. A. foliis ovatis concavis glauceſcentibus apice carinatis obtuſis mucronatis ſubreticulato-lineatis. *C. B. S.*

** *Foliis dentatis vel ciliatis.*

reticulata Haw. 4. A. foliis 3quetris patulis obtuſiuſculis glauceſcentibus ſubreticulatis margine carinaque denticulatis. *C. B. S.* (A. Pumilio Jacq.)

translucens Haw. 5. A. foliis patentibus lanceolatis teretiuſculis ciliatis apice pellucido-maculatis. *C. B. S.* (Haworthia cuſpidata et limpida Haw.)

arachnoides Th. 6. A. foliis aſcendentibus lanceolatis ſtriatis apice 3gonis margine carinaque dentatis, dentibus cartilagineo-ſetaceis. *C. B. S.* (A. herbacea Cand. Haworthia ſetata et ariſtata Haw.)

venoſa Lam. 7. A. foliis reflexo-patentibus ovato-oblongis acutis glabris apice obtuſe 3quetris margine denti-

culatis ſupra lineatis. *C. B. S.* (A. tricolor Haw. W.)

mirabilis Haw. 8. A. foliis 5fariis 3quetris apice horizontaliter depreſſo-truncatis margine carinaque ciliato-ſpinoſis ſupra glabriusculis ſubtus ſubtuberculatis obſolete reticulatis. *C. B. S.*

laetevirens Link. 9. A. foliis lineari-lanceolatis ſupra concavis lineato-ſubreticulatis margine carinaque ſerrulato-ciliatis. *C. B. S.* (Haworthia Haw.)

*** *Foliis tuberculatis.*

atrovirens Cand. 10. A. foliis patulis lanceolatis 3gonis margine carinaque dentatis, dentibus breviſſimis ſubulatis, tuberculis confertis. *Afric. auſtr.* (A. pumila Haw.)

recurva Haw. 11. A. foliis ſubulatis craſſis erecto-recurvis ſupra concavis ſubtus margineque calloſo-tuberculatis. *Afric. auſtr.*

Radula Jacq. 12. A. foliis patulis oblongo-lanceolatis acuminatis apice ſub-3gonis ſupra planiusculis utrinque tenuiſſime calloſo-tuberculatis. *Afric. auſtr.*

attenuata Haw. 13. A. foliis patulis lanceolatis acuminatis ſupra planiusculis minutiſſime ſubtus groſſe papilloſis. *C. B. S.*

faſciata Salm. 14. A. foliis erectis lanceolatis acuminatis ſupra planis glabris ſubtus convexis groſſe papilloſis, papillis faſcias transverſales formantibus. *C. B. S.*

margaritifera 15. A. foliis erectiusculis ovatis acuminatis apice 3gonis mucronatis ſupra planiusculis utrinque calloſo-tuberculatis. *Afr. auſtr.* (Apicra Granata W.)

ſemimargaritifera Salm. 16. A. foliis erectiusculis, ſenioribus horizontalibus ovatis apice carinatis 3quetris mucronatis ſupra convexiusculis glabris ſubtus margineque calloſo-tuberculatis. *Afric. auſtr.* (Haworthia maxima Haw.)

hybrida Salm. 17. A. foliis ſpiraliter multifariis ovato-lanceolatis, junioribus patulis, ſupra convexiusculis rugoſis ſubtus viridi-tuberculatis. *Afric. auſtr.* (Haworthia ſemiglabrata Haw.)

b. *Cauleſcentes.*

papilloſa Salm. 18. A. foliis ovato-lanceolatis erectis undique ſeriatim depreſſo-papilloſis. *C. B. S.* (Haworthia erecta Haw.)

aſpera Haw. 19. A. caule ſtricto, foliis 3fariis patulis ovato-orbiculatis acutis concavis ſubtus denſe papilloſis. *C. B. S.*

anomala Haw. 20. A. ſubcauleſcens, foliis 3fariam imbricatis patentibus ovatis 3quetris margine carinaque incraſſatis maculatis. *C. B. S.*

curta * 21. A. ſubcauleſcens, foliis ſpiratim 3fariis 3angularibus patulis ſupra concavis granuloſo-aſperrimis. *C. B. S.* (Haworthia Haw.)

viſcoſa 22. A. foliis 3fariis erecto-patentibus ovatis 3gono-carinatis acutis glabris. *C. B. S.* (Haworthia concinna Haw.)

rigida Cand. 23. A. foliis ſub-3fariis patentibus lanceolatis rigide cuſpidatis utrinque convexiuſculis aſpero-ruguloſis margine incraſſatis. *C. B. S.* (Apicra patula et expanſa W.)

tortuoſa Haw. 24. A. foliis ſub-3fariis erecto-patulis ſupra concaviuſculis apice triquetris aſpero-tuberculoſis, caule tortuoſo. *C. B. S.* (A. pſeudo-tortuoſa Salm. Haworthia tortella Haw.)

B. *Haworthia* Salm. *Corollae limbus regularis.*

folioloſa Haw. 25. A. foliis multifariis breviſſimis confertiſſimis orbiculato-ovatis laevigatis horizontalibus carinatis apice acuto recurvis margine carinaque incraſſatis. *C. B. S.*

imbricata Haw. 26. A. foliis multifariis erectis imbricatis ovatis acutis apice triquetris glabris, corolla transverſim rugoſa. *C. B. S.* (A. ſpiralis Cand.)

ſpiralis 27. A. cauleſcens tortuoſa, foliis 5fariis patentibus ſpiralibus glabris ſubtus obſolete maculatis. *C. B. S.* (A. 5gona Jacqu. Haw., ſpirella Haw.)

bullulata Jacqu. 28. A. cauleſcens, foliis 5fariis imbricato-patulis ovatis 3gonis acutis ſupra glabris ſubtus groſſe papilloſis. *C. B. S.*

*bicarinata** 29. A. cauleſcens, foliis ſubmultifariis cordatis rigidis 2carinatis ſupra laevibus ſubtus tuberculatis margine carinaque aſperrimis. *C. B. S.* (Apicra Haw.)

II. *Curviflorae* Salm. *Gaſteriae* Haw.

**Foliis diſtichis.*

obliqua Haw. 30. A. cauleſcens, foliis ſubdiſtichis linearibus inaequilateri-3gonis integerrimis obtuſis mucronatis maculatis, maculis confluentibus. *C. B. S.* (A. maculata W.)

pulcra Jacqu. 31. A. caule ſubdichotomo, foliis ſubdiſtichis linearibus inaequilateri-3gonis glabris integerrimis acuminatis cuſpidatis diſtincte maculatis. *C. B. S.* (A. obliqua Cand.)

excavata W. 32. A. acaulis, foliis diſtichis acinaciformibus margine interrupte cartilagineis acutis maculatis. *C. B. S.* (A. acinacifolia Jacqu.)

obſcura W. 33. A. acaulis, foliis diſtichis patentibus linguaeformibus obtuſis mucronatis utrinque planis margine acutis cartilagineo-denticulatis obſolete maculatis. *C. B. S.*

angulata W. 34. A. acaulis, foliis diſtichis patentibus linguaeformibus baſi convexiuſculis albo-maculatis glabris obtuſis mucronatis margine truncatis verrucoſo-cartilagineis denticulatis. *C. B. S.* (A. pſeudo-angulata Salm.)

laevis Salm. 35. A. foliis linguaeformibus patulis hinc truncatis, angulis laevibus basi apiceque incurvis obsoletissime maculatis. *C. B. S.*

nigricans Haw. 36. A. caule simplicissimo, foliis exacte distichis linguaeformibus abbreviatis margine cartilagineis integerrimis obsolete maculatis. *C. B. S.* (A. obliqua Jacqu.)

*subnigricans** 37. A. caule stricto, foliis distichis linguaeformibus acutiusculis margine verrucoso-denticulatis. *C. B. S.* (A. pseudo-nigricans Salm.)

Lingua W. 38. A. acaulis, foliis distichis linguaeformibus atroviridibus albo-maculatis obtusis mucronatis margine acutis verrucoso-denticulatis. *C. B. S.* (Gasteria denticulata Haw.)

conspurcata Salm. 39. A. foliis patentibus linguaeformibus viridissimis albo-maculatis apice densissime papillosis margine truncatis verrucoso-denticulatis. *C. B. S.*

subverrucosa Salm. 40. A. foliis distichis linguaeformibus obtusiusculis mucronatis supra planiusculis, papillis serialibus magnis maculaeformibus, marginibus truncatis verrucoso-denticulatis. *C. B. S.*

intermedia Haw. 41. A. foliis distichis patentibus linguae-ensiformibus obtusis mucronatis, verrucis utrinque numerosissimis albidis exiguis. *C. B. S.*

verrucosa 42 A. foliis distichis lineari-ensiformibus acutis margine truncatis utrinque densissime albo-verrucosis. *C. B. S.* (A. carinata Cand.)

* *Foliis spiratim multifariis.*

nitida Salm. 43. A. foliis lato-lanceolatis canaliculato-carinatis acutis obsolete albido-maculatis nitidis margine cartilagineo integerrimis. *C. B. S.*

glabra Salm. 44. A. foliis linguaeformibus acuminatis canaliculato-carinatis maculatis rugosiusculis margine carinaque cartilagineis. *C. B. S.* (Gasteria nitens Haw.)

subcarinata Salm. 45. A. foliis patulis lanceolatis inaequilateri-triquetris albo-papillosis, angulis dense cartilagineo-serratis supra concaviusculis subtus convexis apice oblique flexis obtusis mucronatis. *C. B. S.*

carinata 46. A. foliis patulis oblongo-lanceolatis inaequilateri-triquetris canaliculato-carinatis utrinque papillosis, marginibus tuberculato-scabris. *C. B. S.*

III. *Grandiflorae* Salm.

* *Acaules.*

micracantha Sims. 47. A. foliis linearibus canaliculatis cuspidatis maculatis margine spinuloso-ciliatis. *C. B. S.*

acuminata Haw. 48. A. foliis lineari-lanceolatis acuminatis glaucescentibus supra planis laevibus parce spinosis subtus conferte tuberculatis. *C. B. S.* (A. humilis Sims.)

tuberculata Haw. 49. A. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis supra concaviusculis conferte tuberculatis echinato-spinosis. *C. B. S.*

echinata W. 50. A. foliis oblongo-lanceolatis ſpinoſo-dentatis ſubtus albo-verrucoſis, laciniis corollae inaequalibus. *C. B. S.*

humilis Thunb. 51. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubulatis ſupra turgidis inerme ſpinoſis ſubtus tuberculatis, laciniis corollae aequalibus. *C. B. S.*

virens Haw. 52. A. ſubacaulis, foliis oblongo-lanceolatis viridibus parce maculatis, marginibus remote ſpinoſis, ſpinis viridibus uncinatis, floribus thyrſo-ſpicatis. *C. B. S.*

** *Caulescentes.*

† *Foliis emaculatis.*

prolifera Haw. 53. A foliis lanceolatis acutis glaucis, marginibus carinaque apice ſpinoſis ſubtus ſubtuberculatis. *C. B. S.* (A. brevifolia W.)

depreſſa Haw. 54. A. foliis oblongo-ovatis acutis glaucis ſubtus tuberculatis, marginibus carinaque apice cartilagineis albo-dentatis. *C. B. S.* (A. Serra W.)

Serra Cand. 55. A. foliis caeſpitoſis patulis margine ſpinoſis, ſpinis inferioribus approximatis coalitis ſuperioribus remotis medio ſubſpinoſis. *C. B. S.*

† *lineata* Haw. 56. A. foliis viridibus lineatis rubro-ſpinoſis. *C. B. S.*

glauca Haw. 57. A. foliis oblongo-lanceolatis glaucis ſtriatis margine rubro-ſpinoſis. *C. B. S.* (A. rhodacantha Cand. W.)

paniculata Jacqu. 58. A. foliis ovato-oblongis planis glaucis ſtriatis cartilagineo-marginatis obſolete denticulatis. *C. B. S.* (A. ſtriata Haw.)

rubeſcens Cand. 59. A. foliis enſiformibus glauco-rubentibus apice recurvis albido-ſerratis obſolete maculatis. *C. B. S.* (A. vera Lam.)

vulgaris Cand. 60. A. foliis lanceolatis patulis glaucis apice ſubrecurvis ſinuato-ſerrato-ſpinuloſis. *Graecia. Inſ. maris aegei. Syria. Ind. occid.* (A. barbadenſis Haw.)

abyſſinica Lam. 61. A. foliis lanceolatis patulis viridibus ſuperne concaviuſculis ſinuato-rubro-dentatis. *Afric.* (A. vulgaris Red. ic.)

†† *Foliis maculatis.*

variegata 62. A. foliis imbricato-patulis trifariis ovatis canaliculato-3gonis faſciato-maculatis margine carinaque cartilagineo-crenatis. *C. B. S.*

ſerrulata Sims. 63. A. foliis ovato-lanceolatis apice ſubtriquetris ſeriatim maculatis margine carinaque apice ſerrulatis. *C. B. S.*

tenuifolia Lam. 64. A. foliis lanceolatis patulis tenuibus laete viridibus glabris ſupra lineatis obſolete maculatis tenuiſſime denticulatis. *C. B. S.*

arabica Lam. 65. A. foliis lanceolatis acuminatis recurvis ſupra planis ſubtus convexis maculatis, ſpinis marginalibus fuſcis recurvo-uncinatis. *Arabia.*

umbellata Cand. 66. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubglauceſcentibus faſciatim maculatis, ſpinis marginalibus rufeſcen-

tibus, floribus thyrſoideo-capitatis. C. B. S. (A. ſaponaria Haw.)

picta Cand. 67. A. foliis oblongo-lanceolatis glaucescentibus, maculis ſubrotundo-oblongis ſparſis, ſpinis marginalibus ruberrimis. C. B. S. (A. obſcura Haw.)

latifolia Haw. 68. A. foliis ovato-lanceolatis virentibus, maculis ſparſis faſciatisque ſubobſoletis, ſpinis marginalibus rufeſcentibus, floribus thyrſoideo-capitatis. C. B. S.

*** *Fruticoſae.*

ſocotrina Cand. 69. A. caule dichotomo, foliis enſiformi-lanceolatis erectis ſubglauceſcentibus margine confertim ſerrulatis albo-ſpinoſis. *Inſ. Socotra. Arabia.* C. B. S.

rufo-cincta Haw. 70. A. foliis loriformibus acuminatis viridibus canaliculatis margine roſeis albo-cartilagineo-denticulatis. *Ind. or.*

macra Haw. 71. A. foliis loriformibus concavo-canaliculatis patulo-recurvis ſerrulato-ſpinuloſis viridibus emaculatis. *Inſ. Maſcaren.*

ſpicata L. ſuppl. 72. A. foliis enſiformibus planis maculatis dentatis, floribus ſpicatis horizontalibus. C. B. S.

caeſia Salm. 73. A. foliis lanceolatis elongatis apice ſubrecurvis glaucis emaculatis margine et apice ſubtus rubro-ſpinoſis. C. B. S.

dichotoma L. ſuppl. 74. A. caule dichotomo, foliis lanceolato-enſiformibus acutiuſculis patulis glaucis dentatis, ſpica paniculata, ſtaminibus corolla longioribus. *Afric. auſtr.* (Rhipidodendron W.)

plicatilis Ait. 75. A. caule dichotomo, foliis diſtichis linguaeformibus obtuſis laeviſſimis ſubintegerrimis apice obſolete ſerratis, racemo ſimplici, ſtaminibus corollam aequantibus. *Africa auſtr.* (Rhipidodendron diſtichum W.)

fruteſcens Salm. 76. A. caule humili, propaginibus numeroſis, foliis remotis lineari-lanceolatis recurvato-patulis glauceſcentibus, ſpinis marginalibus viridibus. *Patria?*

arboreſcens Cand. 77. A. caule elato, foliis aggregatis lanceolatis patulis apice recurvis glauceſcentibus, dentibus marginalibus viridibus, inferioribus confertis. C. B. S. (A. perfoliata β. L.)

africana Haw. 78. A. caule fruticoſo ſimplici foliis enſiformibus glaucis apice reflexis margine apiceque ſubtus rubro-ſpinoſis. *Afric. auſtr.*

ferox Cand. 79. A. caule fruticoſo ſimplici, foliis ovato-enſiformibus rigidiuſculis glaucis deflexis utrinque ſpinoſiſſimis. C. B. S. (A. perfoliata L.)

*ſubferox** 80. A. foliis lanceolatis patulis pruinoſo-glaucis ſupra glabris ſubtus rubro-ſpinoſiſſimis. C. B. S. (A. pſeudo-ferox Salm.)

ſupralaevis Haw. 81. A. foliis oblongo-enſiformibus rigidis incurvis glauceſcentibus ſupra laevibus ſubtus irregulariter ſpinoſis. C. B. S. (A. perfoliata ε. L.)

flavifpina Haw. 82. A. foliis oblongis acuminatis glaucis patulis, lateribus dorfoque fpinis interruptis latiffimis fulvis. *C. B. S.*

albifpina Haw. 83. A. foliis ovato-acuminatis virefcentibus apice fubflavicantibus marginibus carinaque longe conferteque fpinofis. *C. B. S.*

Commelini W. 84. A. foliis ovato-oblongis attenuatis patulis glaucefcentibus fupra laevibus margine carinaque fubtus fpinofo-dentatis, fpinis albicantibus. *C. B. S.* (A. mitraeformis Cand.)

xanthacantha W. 85. A. foliis ovato-acuminatis glaucis patentibus margine dorfoque fpinofis, fpinis flavicantibus. *C. B. S.*

mitraeformis 86. A. foliis ovatis acutis imbricato-erectis fubglaucefcentibus margine carinaque fubtus fpinofis. *C. B. S.* (A. nobilis Haw.)

brevifolia Haw. 87. A. foliis diftantibus erecto-patulis ovato-acutis fubtus maculatis margine carinaque fubtus fpinofis, fpinis demum flavicantibus. *C. B. S.* (A. diftans Haw.)

1219. LOMATOPHYLLUM W.

borbonicum W. 1. L. foliis lanceolato-linearibus nutantibus fpinofo-ferratis rubro-marginatis, racemis fub-paniculatis. *Iaf. Mafcaren.* (Dracaena marginata Ait. Aloë purpurea Lam., marginalis Cand. Phylloma aloiflorum bot. mag. Haw.)

*Jacquini** 2. L. foliis lanceolatis acuminatis glaucefcentibus patulis recurvis, fpinis marginalibus minutis albicantibus, floribus fpicatis. *Patria?* (Aloë 6petala (Salm.)

1220. TRITOMA Ker.

Uvaria Ker. 1. Tr. foliis margine carinaque fcabris, corollis clavato-cylindricis. *C. B. S.* (Aloë L., Veltheimia W.)

media Ker. 2. Tr. foliis margine carinaque laevibus, corollis clavato-cylindricis. *C. B. S.* (Aletris farmentofa Andr. Veltheimia W.)

pumila Ker. 3. Tr. foliis margine carinaque fcabris, corollis inferne cylindricis fuperne fubglobofis. *C. B. S.* (Aletris Ait. Veltheimia W.)

1221. ALETRIS.

alba Mx. 1. A. floribus pedicellatis oblongo-tubulofis, fructiferis laeviusculis, foliis lato-lanceolatis mucronatis *Amer. bor.* (A. farinofa L.)

aurea Mx. 2. A. floribus fubfeffilibus fubcampanulatis fructiferis rugofis fcaberrimis, foliis lanceolato-enfiformibus acutis. *Amer. bor.* (Wurmbea bullata W.)

1222. VELTHEIMIA Gled.

viridifolia Jacqu. 1. V. foliis oblongis obtufis undulatis, dentibus limbi corollae rotundatis rectis. *C. B. S.* (Aletris capenfis L.)

glauca Jacqu. 2. V. foliis lanceolatis glaucis mucronatis crifpo-undulatis, dentibus limbi corollae elongatis patentibus. *C. B. S.* (Aletris glauca Ait.)

1223. DRIMIA Jacqu.

pufilla Jacqu. 1. Dr. foliis lanceolato-linearibus glabris fcapum aequantibus, floribus erectis extus virentibus. *C. B. S.*

lanceaefoliae Ker. 2. Dr. foliis oblongis fcapo brevioribus, racemi pedunculis elongatis nutantibus, floribus extus rubentibus. *C. B. S.*

undulata Jacqu. 3. Dr. foliis lineari-lanceolatis undulatis fcapum aequantibus, racemi pedunculis horizontalibus, floribus extus virentibus. *C. B. S.*

purpurafcens Jacqu. 4. Dr. foliis linearibus undulatis marginatis fcapo brevioribus, racemi pedunculis abbreviatis erectis, floribus rubentibus. *C. B. S.*

media Jacqu. 5. Dr. foliis lineari-fubulatis femiteretibus fcapo brevioribus, floribus albis. *C. B. S.*

ciliaris Jacqu. 6 Dr. foliis linearibus carinatis ciliatis fcapo brevioribus, floribus albis nutantibus. *C. B. S.*

elata Jacqu. 7. Dr. foliis lineari-lanceolatis oblique flexis glabris, floribus extus virentibus nutantibus. *C. B. S.*

altiffima Ker. 8. Dr. foliis oblongis apice convoluto-cufpidatis, racemo longiffimo, floribus albis. *C. B. S.* (Ornithogalum altiffimum L. fuppl. giganteum Jacqu.)

1224. MILLEA Cav.

biflora Cav. *Mexico.* Herba fcapo 2furco 2floro, floribus magnis candidis, foliis linearibus canaliculatis.

1225. POLIANTHES.

tuberofa 1. P. foliis lanceolato-linearibus, floribus fpicatis fubaggregatis, limbi laciniis ovato-oblongis. *Mexico.*

gracilis Link. 2. P. foliis linearibus, floribus racemofis, limbi laciniis linearibus. *Brafil.*

1226. EUCOMIS Herit.

nana Ait. 1. E. fcapo clavato, floribus nutantibus, foliis 2fariis lato-lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Fritillaria L. Ornithogalum Thunb. Bafilaea Poir.)

bifolia Jacqu. 2. E. fcapo clavato, floribus erectis, foliis geminis oblongis acutis humo appreffis. *C. B. S.* (Bafilaea Poir.)

purpureo-caulis Dryand. 3. E. ſcapo clavato colorato, foliis multifariis expanſis orbiculato-ſpathulatis. *C. B. S.*

regia Ait. 4. E. ſcapo cylindrico apice comoſo, floribus nutantibus, foliis linguaeformibus humo appreſſis crenulatis. *C. B. S.* (Fritillaria L., Baſilaea coronata Lam.)

undulata Ait. 5. E. ſcapo cylindrico apice longe comoſo, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus. *C. B. S.* (E. regia Red., Ornithogalum undulatum Thunb.)

punctata Herit. 6. E. ſcapo cylindrico apice breviter ramoſo, racemis longiſſimis, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus. *C. B. S.* (Ornithogalum punctatum Thunb. Aſphodelus comoſus Houtt. Baſilaea Poir.)

1227. ERIOSPERMUM Jacqu.

parvifolium Jacqu. 1. E. foliis ellipticis planis, ſcapo gracili, pedunculis patentiſſimis elongatis. *C. B. S.*

latifolium Jacqu. 2. E. foliis cordato-ſubrotundis acutis cucullatis petiolatis, ſcapo elato, pedunculis elongatis. *C. B. S.* (Ornithogalum capenſe L.)

lanceaefolium Jacqu. 3. E. foliis ovato-lanceolatis undulatis involutis petiolatis, racemo elongato, pedunculis patentibus. *C. B. S.*

pubeſcens Jacqu. 4. E. foliis ovatis acutis ſubcucullatis pubeſcentibus petiolatis, racemi elongati pedunculis erectis. *C. B. S.*

lanuginoſum Jacqu. 5. E. foliis cordatis acutis utrinque lanatis, racemi elongati pedunculis patentibus. *C. B. S.*

foliiliferum Ker. 6. E. ſterile cauleſcens, folio foliolifero, ſcapo racemoſo paucifloro, floribus erectis ſubſeſſilibus campanulatis obtuſis. *C. B. S.* (Ornithogalum paradoxum Jacqu.)

1228. PHORMIUM.

tenax Forſt. *Nov. Zeeland.* Herba foliis lanceolatis rigidis fulvo-marginatis, ſcapo elato, floribus flavis paniculatis ſecundis. (Lachenalia ramoſa L.)

1229. LACHENALIA Jacqu.

* *Floribus cylindricis.*

pendula Ait. 1. L. floribus pedunculatis pendulis, petalis interioribus bracteisque obtuſis, foliis oblongo-lanceolatis. *C. B. S.* (L. 4color Jacqu. var.)

punctata Jacqu. 2. L. floribus pedunculatis nutantibus, petalis interioribus inaequalibus obtuſis, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſtrictis. *C. B. S.*

rubida Jacqu. 3. L. floribus breviſſime pedunculatis pendulis, ſtylo ſtaminibus longiori, foliis oblongis ſcapoque maculatis. *C. B. S.* (L. tigrina Jacqu.)

tricolor Jacqu. 4. L. floribus pedunculatis pendulis, petalis interioribus emarginatis, bracteis acutis, foliis lanceo-

latis. *C. B. S.* (L. luteola Jacqu. Phormium aloides L. ſuppl.)

iſopetala Jacqu. 5. L. floribus pedunculatis erectis, petalis ſubaequalibus linearibus obtuſis, ſcapo apice angulato, foliis lanceolatis deflexis. *C. B. S.*

unifolia Jacqu. 6. L. floribus pedunculatis erectiusculis, petalis interioribus inaequalibus obtuſis, folio ſolitario lineari-lanceolato canaliculato. *C. B. S.*

puſilla Jacqu. 7. L. floribus pedunculatis erecto-appreſſis, racemo axillari breviſſimo ſeſſili, petalis interioribus obtuſiusculis erectis, foliis ſpathulatis patulis. *C. B. S.*

bifolia Ker. 8. L. floribus pedunculatis diſtantibus ſub-2labiatis, foliis geminis lanceolatis cartilagineo-marginatis. *C. B. S.*

contaminata Ait. 9. L. floribus pedunculatis ſubcylindricis erectis, petalis interioribus obtuſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. *C. B. S.* (Phormium orchioides Thunb.)

** *Floribus campanulatis.*

hirta Thunb. 10. L. floribus pedunculatis cernuis, folio ſolitario lineari hirſuto. *C. B. S.* (Phormium hirtum Thunb.)

lanceaefolia Jacqu. 11. L. floribus longe pedunculatis ſubcernuis patentibus, ſcapo axillari aſcendente, foliis oblongis acutis. *C. B. S.*

purpurea Jacqu. 12. L. floribus pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus obtuſis erectis, ſtaminibus longe exſertis, foliis lanceolatis cartilagineo-crenatis. *C. B. S.*

violacea Jacqu. 13. L. floribus breviter pedunculatis horizontalibus baſi planis, ſtaminibus exſertis, ſcapo ſuperne angulato, foliis oblongis obtuſiusculis. *C. B. S.*

lucida Ker. 14. L. floribus erectiusculis, petalis ſubaequalibus, foliis binis oblongis obtuſis. *C. B. S.*

fragrans Jacq. 15. L. floribus pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus obtuſis, ſtaminibus exſertis, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſcabris. *C. B. S.* (L. 1color Jacqu.)

purpureo-coerulea Jacqu. 16. L. floribus pedunculatis patentiſſimis, petalis interioribus ſpathulatis, ſtaminibus exſertis, ſcapo ſuperne angulato, foliis lanceolatis puſtulatis. *C. B. S.* (L. racemoſa Sims.)

puſtulata Jacqu. 17. L. floribus breviſſime pedunculatis, ſcapo triquetro reclinato, foliis lanceolatis puſtulatis ſcapum aequantibus. *C. B. S.*

liliiflora Jacqu. 18. L. floribus pedunculatis patentibus, petalis linearibus, interioribus ſubretuſis, foliis lanceolatis puſtulatis. *C. B. S.*

patula Jacqu. 19. L. floribus pedunculatis patulis, petalis interioribus obovatis, foliis lanceolatis canaliculatis ſcapo tereti brevioribus. *C. B. S.*

nervoſa Ker. 20. L. floribus pedunculatis baſi gibbis, petalis ſubaequalibus, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis ovatis nervoſis margine cartilagineis. *C. B. S.*

angustifolia Jacqu. 21. L. floribus breviſſime pedunculatis, petalis interioribus obovatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. *C. B. S.*

hyacinthoides Jacqu. 22. L. floribus breviſſime pedunculatis, petalis interioribus emarginatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. *C. B. S.* (L. orthopetala et orchioides Jacqu.)

pallida Ait. 23. L. floribus breviſſime pedunculatis ſuberectis, petalis interioribus obtuſiſſimis, foliis lineari-oblongis laxis ſcapo longioribus. *C. B. S.* (L. mediana Jacqu.)

orchioides Ait. 24. L. floribus ſeſſilibus, petalis interioribus patulis obtuſis, ſtylo ſtamina aequante, foliis oblongo-lanceolatis cartilagineo-crenatis. *C. B. S.* (Hyacinthus orchioides L., Phormium hyacinthoides L. ſuppl.)

glaucina Jacqu. 25. L. floribus ſeſſilibus paucis erectis, petalis interioribus obtuſiſſimis, ſtylo ſtamina ſuperante, foliis lanceolatis glabris. *C. B. S.*

1230. UROPETALUM Ker.

ſerotinum Ker. 1. U. floribus racemoſis ſecundis nutantibus, foliis linearibus canaliculatis ſcapo brevioribus. *Hiſpan. Afric. bor.* (Hyacinthus ſerotinus L., Lachenalia L., Scilla Curt.)

viride Ker. 2. U. floribus breviter pedunculatis erectiusculis racemoſis, petalis exterioribus longe ſubulatis, foliis linearibus ſcapo longioribus. *C. B. S.* (Hyacinthus viridis L. Lachenalia Thunb. Ait. Zuccagnia Thunb.)

glaucum Burch. 3. U. floribus longiſſime pedunculatis nutantibus racemoſis, foliis oblongo-lanceolatis glaucis ſcapo brevioribus. *Afric. auſtr.*

1231. CYANELLA.

alba Thunb. 1. C. foliis lineari-filiformibus ſcapo 1floro brevioribus. *C. B. S.*

lutea Thunb. 2. C. foliis lineari-lanceolatis planis ſcapo ramoſo brevioribus. *C. B. S.*

orchidiformis Jacqu. 3. C. caule folioſo ramoſo, foliis glaucis cartilagineo-denticulatis, radicalibus ovatis, caulinis enſiformibus ſtrictis, racemis erectis. *C. B. S.*

capenſis 4. C. caule folioſo paniculato, foliis lanceolatis undulatis, racemis divaricatis. *C. B. S.*

1232. AGAVE.

* *Staminibus exſertis.*

† *Limbo corollae erecto: acaules.*

americana 1. A. foliis glaucis rigidis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo, ſtylo ſtamina ſuperante. *Amer. trop.*

Milleri Haw. 2. A. foliis glaucis rigidis dentato-ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo, ſtylo ſtamina aequante. *Carolin. bor.*

flaccida Haw. 3. A. foliis glaucis anguſte lanceolatis flaccidis recurvis, ſpinis marginalibus minutis. *Amer. trop.*

yuccaefolia W. 4. A. foliis glaucis loriformibus canaliculatis erecto-recurvis, ſerrulis marginalibus minutiſſimis albis denſis. *Nov. Hiſpan.*

† *mexicana* Haw. 5. A. foliis glaucis lanceolatis erecto-patulis, ſpinulis marginalibus parvis ſubdiſtantibus pallidis, ſuperne atro-purpureis. *Mexico.*

vivipara 6. A. foliis viridibus lanceolatis dentatis, ſcapo ramoſo, ſtaminibus corollam aequantibus. *Patria?*

virginica 7. A. foliis viridibus lanceolatis cartilagineo-ſerrulatis, ſcapo ſimpliciſſimo, ſtaminibus corollam duplo ſuperantibus. *Virgin. Carolina bor.*

Keratto Haw. 8. A. foliis erectis laete virentibus, marginibus fuſcis integerrimis. *Amer. trop.*

†† *Limbo corollae erecto: caulefcentes.*

lurida Ait. 9. A. foliis oblongis margine nigricantibus ſpinoſo-dentatis, ſcapo ramoſo, ſtylo ſtaminibus breviori. *Nov. Hiſpan.* (A. Veraecrucis Haw.)

anguſtifolia Haw. 10. A. foliis lineari-lanceolatis glaucis dentato-ſerratis. *Patria?*

††† *Limbo corollae revoluto.*

ſpicata Cand. 11. A. foliis linearibus canaliculatis rigidis acutis integerrimis, ſcapo ſimpliciſſimo, floribus congeſtis ſeſſilibus, ſtaminibus longe exſertis. *Amer. trop.*

geminiflora Ker.? 12. A. foliis linearibus utrinque convexis ancipitibus patentiſſimis apice ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo, floribus ſeſſilibus geminis, ſtaminibus longe exſertis. *Amer. auſtr.* (Littaea geminiflora Brignol.)

** *Staminibus incluſis, baſi incraſſatis.* *Fourcroya* Vent.

cubenſis Jacqu. 13. A. acaulis, foliis lanceolatis ciliato-ſpinoſis, corollis 6petalis. *Cuba.*

tuberoſa Mill. 14. A. cauleſcens, foliis lanceolatis dentato-ſpinoſis, radice tuberoſa. *Amer. trop.*

rigida Mill. 15. A. caulefcens, foliis lineari-lanceolatis baſi ſerrato-ſpinoſis apice integerrimis. *Amer. trop.*

foetida 16. A. caulefcens, foliis lanceolatis patentiſſimis rigidis integerrimis, ſcapo ramoſo, corollis 6petalis. *Amer. trop.* (Fourcroya gigantea Vent.)

† *madagaſcarenſis** 17. A. foliis lanceolatis viridibus canaliculatis elongatis patulis, ſpinis marginalibus minutis albis. *Madagaſcar.* (Fourcroea Haw.)

Cantala Wall. 18. A. foliis lanceolatis glaucis planiuſculis patentibus, ſpinis marginalibus minutis confertis albis. *China auſtr.*

1233. DORYANTHES Corr.

excelsa Corr. *Nov. Holl.* Planta excelsa (3orgyalis) foliosa, foliis ensiformibus, floribus spicato-capitatis puniceis, bracteis coloratis.

1234. ALSTRÖMERIA.

** Caule erecto.*

Pelegrina 1. A. foliis lineari-lanceolatis lucidis obliquis, corollis patentibus, laciniis exterioribus 3dentatis interioribus mucronatis. *Peru. Chili.*

pulchella 2. A. foliis lineari-lanceolatis obtusiusculis striatis, pedunculis umbellatis involucro brevioribus, laciniis corollae acutis striatis. *Chili.*

Ligtu 3. A. foliis spathulato-oblongis lucidis, perdunculis umbellatis involucro longioribus, laciniis corollae superioribus maculatis, inferioribus subulatis. *Lima.*

caryophyllea Jacqu. 4. A. foliis spathulato-lanceolatis 3nerviis opacis, caule florifero subaphyllo, involucro foliaceo pedunculos aequante, laciniis corollae patentissimis. *Patria?*

*Simsii** 5. A. foliis spathulatis glaucis subtortis ciliatis, umbella multiflora erecta, pedunculis geminis, laciniis corollae subspathulatis apiculatis, lateralibus subserratis, superioribus maculatis. *Chili.* (A. pulchella Sims)

tricolor Hook. 6. A. foliis linearibus, pedunculis geminis, laciniis corollae subconformibus acutiusculis serratis. *Chili.*

Flos Martini Ker. 7. A. foliis lineari-lanceolatis, pedunculis sub-3floris flexuosis, laciniis corollae obovatis apiculatis serratis. *Chili.* (A. pulcra Sims)

revoluta R. et P. 8. A. foliis lanceolatis, pedunculis umbellatis 2floris, laciniis corollae revolutis, interioribus minoribus. *Chili.*

versicolor R. et P. 9. A. foliis lanceolato-linearibus, pedunculis subternis, laciniis corollae lateralibus angustioribus, infimo ovato. *Chili.*

haemantha R. et P. 10 A. foliis lineari-lanceolatis ciliatis, pedunculis 2floris umbellatis, laciniis corollae exterioribus apice denticulatis, summo subrotundo. *Chili.*

lineatiflora R. et P. 11. A. foliis lanceolatis lucidis nervosis, pedunculis 2floris umbellatis, laciniis corollae cuneiformibus serratis lineatis. *Peru.*

distichophylla R. et P. 12. A. caule ascendente, foliis distichis oblongo-lanceolatis petiolatis, pedunculis umbellatis 1floris, laciniis corollae subconformibus, interioribus planis latioribus. *Peru.*

secundifolia R. et P. 13. A. caule declinato, foliis secundis lanceolatis acuminatis subtus subtomentosis albidis, umbella 5flora, floribus extus lanatis. *Peru.*

glaucescens Humb. 14. A. caule apice nutante, foliis lanceolatis rigidis striatis subtus glauco-pubescentibus, pedunculis umbellatis, laciniis corollae obtusis striatis. *Quito.*

15.

linifolia Humb. 15. A. caule aſcendente pubeſcente, foliis lanceolatis obtuſis revolutis glabris, pedunculis umbellatis, floribus extus villoſiuſculis, laciniis corollae acutiuſculis nervoſis. *Peru.*

*braſilienſis** 16. A. caule ſtricto, foliis lanceolatis acutis nervoſis glaberrimis, pedunculis umbellatis 1floris, laciniis corollae lanceolatis acutis integerrimis ſtriatis. *Braſil.* Sello.

** *Caule ſcandente.*

tomentoſa R. et P. 17. A. caule angulato glabro, foliis lanceolatis revolutis ſubtus ſtriatis tomentoſis, pedunculis 2floris umbellatis, laciniis corollae interioribus ſpathulatis. *Peru.*

ſetacea R. et P. 18. A. caule teretiuſculo glabro, foliis lanceolatis ſtriatis ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, pedunculis pubeſcentibus bracteatis, laciniis corollae conniventibus mucronatis. *Peru.*

denticulata R. et P. 19. A. caule teretiuſculo glabro, foliis oblongis acuminatis repando-denticulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis umbellato-corymboſis bracteatis, laciniis corollae mucronatis. *Peru.*

purpurea R. et P. 20. A. caule pubeſcente, foliis lanceolatis acutis ſtriatis ſubtus villoſiuſculis, pedunculis ſubcorymboſis lanatis, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

macrocarpa R. et P. 21. A. caule glabro tereti, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, pedunculis bifloris, laciniis corollae conformibus, capſula turbinata. *Peru.*

cordifolia R. et P. 22. A. caule glabro, foliis cordatis acuminatis lucidis ſubtus ſubpubeſcentibus, pedunculis umbellatis 2floris, laciniis corollae exterioribus elongatis. *Peru.*

formoſa R. et P. 23. A. foliis lanceolatis elongatis acutis, umbella multiflora hemiſphaerica. *Peru.*

*** *Caule volubili.*

Salſilla 24. A. foliis lanceolatis petiolatis acuminatis, pedunculis umbellatis 2floris bracteatis elongatis, laciniis corollae obovatis ſubconformibus. *Lima. Nov. Granat.* (A. edulis Andr.?)

multiflora 25. A. foliis lanceolatis acuminatis petiolatis, pedunculis umbellatis 1floris involucro brevioribus, laciniis corollae alternis truncatis. *Nov. Granat.*

ovata Cav. 26. A. foliis oblongis acuminatis petiolatis ſupra villoſis, pedunculis umbellatis 2floris bracteatis laxis, laciniis corollae conniventibus. *Peru.*

anceps R. et P. 27. A. caule ancipiti, foliis lanceolatis acutis petiolatis, umbella multiflora, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

roſea R. et P. 28. A. caule tereti, foliis ovato-lanceolatis acutis ſeſſilibus ſubtus pubeſcentibus, umbella multiflora, involucro amplo, laciniis corollae interioribus maculato-ſtriatis. *Peru.*

crocea R. et P. 29. A. caule tereti, foliis lineari-lanceolatis acuminatis sessilibus subtus pubescentibus, umbella multiflora, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

bracteata R. et P. 30. A. caule tereti superne foliisque lineari-lanceolatis subtus pubescentibus, pedunculis 2floris umbellatis, bracteis elongatis, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

fimbriata R. et P. 31. A. caule glaberrimo, foliis anguste lanceolatis petiolatis subtus pubescentibus, umbella multiflora, laciniis corollae interioribus fimbriatis. *Peru.*

latifolia R. et P. 32. A. foliis ovato-oblongis subtus pubescentibus, umbellae multiflorae pedunculis sub-3floris, laciniis corollae exterioribus striatis. *Peru.*

hirsuta Kunth. 33. A. caule foliisque oblongis acuminatis rigidiusculis subtus hirsutis, umbella multiflora, laciniis corollae exterioribus brevioribus. *Nov. Granat.*

grandifolia Kunth. 34. A. caule glabro, foliis ovatis acuminatis subtus pubescentibus, pedunculis umbellatis 1floris villosiusculis, laciniis corollae conformibus. *Peru.*

pauciflora Kunth. 35. A. caule foliisque ovato-lanceolatis rigidiusculis nervosis, pedunculis subumbellatis 2floris bracteatis, laciniis corollae exterioribus longioribus. *Nov. Granat.*

hirtella Kunth. 36. A. caule glabro, foliis oblongis acuminatis striatis petiolatis subtus pubescentibus, umbella multiflora, laciniis corollae exterioribus brevioribus. *Mexico.*

Caldasii Kunth. 37. A. caule foliisque ovato-lanceolatis rigidiusculis striatis utrinque glabris, umbella multiflora, pedunculis pubescentibus, laciniis corollae exterioribus brevioribus. *Quito. Nov. Granat.* (A. floribunda Kunth.)

torta Kunth. 38. A. caule foliisque lineari-lanceolatis revolutis sessilibus, umbella multiflora, laciniis corollae exterioribus longioribus. *Peru.*

1235. GETHYLLIS.

spiralis 1. G. foliis linearibus spiralibus glabris. *C. B. S.*

ciliaris 2. G. foliis linearibus spiralibus ciliatis. *C. B. S.*

villosa 3. G. foliis linearibus spiralibus villosis. *C. B. S.*

lanceolata 4. G. foliis lanceolatis planis. *C. B. S.*

1236. ASPHODELUS.

acaulis Desf. 1. A. foliis triquetro-subulatis glabris patulis, pedunculis radicalibus confertis abbreviatis, fructiferis reflexis, bracteis flore brevioribus. *Atlas.*

fistulosus 2. A. foliis radicalibus semiteretibus subulatis subfistulosis, scapo humili simplici. *Europ. austr.*

albus W. 3. A. foliis radicalibus linearibus carinatis laevibus, scapo simplici, pedunculis confertis bracteas aequantibus. *Italia super.* (A. ramosus β. L.)

aestivus Brot. 4. A. foliis radicalibus linearibus carinatis glaucis laevibus, scapo ramoso, pedunculis bracteas superantibus, capsula obovato-globosa. *Lusitania.*

ramoſus 5. A. foliis radicalibus enſiformibus carinatis laevibus, ſcapo ramoſo, pedunculis alternis bractea longioribus, capſula ſubgloboſa. *Europ. auſtr.*

tenuior M. B. 6. A. caule ſuperne nudo, foliis ſubulato-triquetris ſtriatis, racemo laxo, bracteis flore brevioribus. *Caucaſ.*

creticus Lam. 7. A. caule folioſo ſuperne nudo ramoſo, foliis filiformi-ſubtriquetris ſtriatis ſubdenticulato-ciliatis, bracteis pedunculo multo brevioribus. *Creta. Iſtria.* (A. liburnicus Scop.)

prolifer M. B. 8. A. caule folioſo apice ramoſo, foliis filiformibus longiſſimis ſtriatis laevibus, pedunculis ſubaggregatis bractea longioribus. *Armenia.* (Anthericum dendroides Stev.)

tauricus M. B. 9. A. caule toto foliis ſubulato-triquetris ſtriatis vaginato, bracteis lato-lanceolatis imbricatis flores ſuperantibus. *Tauria.*

luteus 10. A. caule toto foliis ſubulato-triquetris glaucis ſpiratim vaginato, bracteis lanceolatis imbricatis flore brevioribus. *Europ. auſtr. Tauria.*

1237. EREMURUS M. B.

ſpectabilis M. B. *Caucaſ. Taur.* Planta 3pedalis, foliis radicalibus linearibus carinatis, ſcapo racemoſo, floribus flavicantibus. (Aſphodelus altaicus Pall.)

1238. ANTHERICUM.

* *Foliis filiformibus.*

filifolium Jacqu. 1. A. radice bulboſa, foliis flexuoſis glabris ſcapo longioribus, racemo paucifloro, petalis obtuſis alternis anguſtioribus. *C. B. S.* (Albuca filifolia Ker.)

filiforme Ait. 2. A. radice faſciculata, foliis baſi piloſiuſculis ſtrictis ſcapum ſubramoſum aequantibus, racemis elongatis, petalis lanceolatis. *C. B. S.* (A. elongatum W.)

capillare * 3. A. radice faſciculata, foliis ſtriatis cuſpidatis glabris ſcapum ſubaequantibus, racemo abbreviato, petalis obtuſis. *Patria?* (Phalangium capillare Poir.)

ſpirale 4. A. radice bulboſa, foliis ſpiralibus ſtriatis ſcapo flexuoſo brevioribus, racemo paucifloro, pedunculis elongatis. *C. B. S.* (A. ſpiratum Thunb.)

fragrans Jacqu. 5. A. radice bulboſa, foliis ſubtrigono-filiformibus erectis ſtrictis ſcapo brevioribus, racemo multifloro, petalis obtuſis. *C. B. S.* (Albuca fugax Ker.)

exuviatum Jacqu. 6. A. radicis bulboſae ſquamis transverſim rugoſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis ſcapo ſimplici longioribus. *C. B. S.*

** *Foliis linearibus.*

flexifolium 7. A. radice faſciculata, foliis linearibus anguſtiſſimis baſi ciliatis flexuoſis ſcapum ramoſum aequantibus, racemo conferto. *C. B. S.*

*ciliatum** 8. A. radice faſciculata, foliis linearibus canaliculatis ciliatis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo paucifloro. *Caracas.* (Phalangium Kunth.)

villoſum Labill. 9. A. radice bulboſa, caule ſimplici folioſo, foliis linearibus floribusque paniculatis extus villoſis. *Aſia minor.*

hirſutum Thunb. 10. A. foliis linearibus hirſutis ſcapo ramoſo villoſiusculo brevioribus, racemis elongatis. *C. B. S.*

*niveum** 11. A. foliis linearibus baſi canaliculatis ſtriatis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ſpicato cylindrico, petalis obtuſis. *Ind. or.* (Phalangium Poir.)

revolutum 12. A. radice faſciculata, foliis linearibus canaliculatis ſcabris ſcapo ſimpliciusculo longioribus, racemis corymboſis, petalis obtuſis revolutis. *Afr. auſtr.*

*eſculentum** 13. A. radice bulboſa, foliis linearibus carinatis ſcapo brevioribus, racemis elongatis, bracteis linearibus pedunculos ſuperantibus, petalo infimo deflexo. *Amer. bor.* (Phalangium Quamash Pursh., eſculentum Nutt., Scilla eſculenta Sims.)

graecum 14. A. radice bulboſa, foliis linearibus nervoſis glabris erectis ſcapum ſimplicem aequantibus, floribus paucis ſubcorymboſis campanulatis ſtriatis. *Inſ. maris aegei.*

trinervium Viv. 15. A. foliis linearibus canaliculatis abbreviatis, caule ſub-3floro, petalis ſpathulatis 3nerviis. *Ager cyrenaic.* Cella.

graminifolium W. 16. A. radice faſciculata, foliis linearibus planis depreſſis ſcapo ramoſo brevioribus, petalis alternis undulatis. *C. B. S.* (A. undulatum Jacqu.)

divaricatum Jacqu. 17. A. foliis linearibus glabris decumbentibus, ſcapi paniculati ramis divaricatis. *C. B. S.*

ſquameum 18. A. radice tuberoſa, foliis radicalibus paucis gramineis, ſcapo ſquamis membranaceis tumidis imbricato, floribus racemoſis bracteatis infundibuliformibus. *C. B. S.*

longifolium Jacqu. 19. A. radice faſciculata, foliis linearibus carinatis ciliatis proſtratis ſcapo ramoſo flexuoſo longioribus. *C. B. S.* (A. fimbriatum Thunb.)

floribundum Ait. 20. A. foliis lineari-lanceolatis glabris ſcapo ſimplici brevioribus, racemo multifloro cylindrico compacto. *C. B. S.* (A. Lagopus Thunb.)

ramoſum 21, A. radice fibroſa, foliis linearibus glabris erectis ſcapo ramoſo brevioribus, petalis ſubreflexis obtuſiusculis, ſtylo recto. *Europ.*

Liliago 22. A. radice faſciculata, foliis linearibus erectis ſcapo ſimpliciſſimo brevioribus, petalis planis lanceolatis acutis, ſtylo declinato. *Europ.*

triflorum Ait. 23. A. radice faſciculata, foliis lineari-lanceolatis carinatis, ſcapo ſimplici racemoſo, bracteis remotis ſub-2floris. *C. B. S.* (A. 2pedunculatum Jacqu.)

****Foliis latioribus.*

sulfureum Kit. 24. A. radice bulbosa, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis subglaucescentibus, scapo simplici, stricto elato, petalis oblongis obtusiusculis. *Thermae Herculis ad fines Walachiae.*

tuberosum Roxb. 25. A. radice tuberosa, foliis ensiformibus complicatis, scapo tereti paniculato, stylo ascendente. *Ind. or.*

pomeridianum Ker. 26. A. radice bulbosa, foliis lanceolato-loriformibus canaliculatis glaucis, scapo ramoso, petalis subreflexis. *C. B. S.*? (Scilla pomeridiana Cand.)

glaucum R. et P. 27. A. radice fasciculata, foliis ensiformibus carinatis glaucis lucidis, racemo simplici multifloro longissimo, pedunculis fructiferis appressis. *Peru.*

eccremorrhizon R. et P. 28. A. radice tuberculosa, caule folioso, foliis ensiformibus carinatis striatis, floribus racemosis, bracteis 3floris. *Peru.*

coeruleum R. et P. 29. A. radice fibrosa, foliis radicalibus paucis ensiformibus erectis scapo ramoso brevioribus, petalis alternis angustioribus. *Chili.*

† *brevifolium* Thunb. 30. A. foliis radicalibus lanceolatis carnosis convolutis brevissimis, scapo filiformi simplicissimo, floribus racemosis remotis, cernuis. *C. B. S.*

falcatum Thunb. 31. A. foliis ensiformibus subcarnosis subfalcatis prostratis, scapo ramoso, floribus remotis. *C. B. S.*

contortum Thunb. 32. A. caule ancipiti folioso, foliis ensiformibus glabris, pedunculis capillaribus remotis. *C. B. S.*

vespertinum Jacqu. 33. A. foliis lineari-ensiformibus carinato-triquetris scapo tereti ramoso brevioribus. *C. B. S.*

japonicum Thunb. 34. A. foliis ensiformibus canaliculato-convolutis scapum angulatum flexuosum aequantibus, floribus racemosis cernuis. *Japon. China. Java.*

latifolium Kunth. 35. A. radice bulbosa, foliis lanceolatis planis, scapo simplici, floribus racemosis remotis. *Nov. Granat.*

1239. BULBINE W.

**Foliis teretibus carnosis.*

annua W. 1. B. foliis subulatis teretiusculis, scapo subracemoso. *Afric.* (Anthericum annuum L.)

longiscapa W. 2. B. foliis semiteretibus flexuosis glaucis scapo triplo brevioribus, racemi elongati pedunculis erectis. *C. B. S.* (Anthericum Jacqu. A. favosum Thunb.)

*asphodeloides** 3. B. foliis semiteretibus strictis asperiusculis, racemo spicato. *Afric. austr.* (Anthericum L.)

rostrata W. 4. B. foliis teretibus glaucis, caule fruticoso brevissimo radicante. *Afric. austr.* (Anthericum rostratum Jacqu.)

frutescens W. 5. B. foliis semiteretibus subulatis, caule inferne folioso fruticoso ramoso. *Afric. austr.* (Anthericum L.)

pugioniformis Link. 6. B. foliis semiteretibus canaliculatis acuminatis abbreviatis, scapo racemoso elato. *Afric. austr.* (Anthericum Jacqu.)

*auſtralis** 7. B. radice bulboſa, foliis ſemiteretibus canaliculatis, racemo laxo. *Nov. Holl.* (Anthericum bulboſum R. Br.)

*ſemibarbata** 8. B. radice fibroſa, foliis ſemiteretibus canaliculatis, filamentis exterioribus imberbibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.* (Anthericum ſemibarbatum R. Br.)

***Foliis ſubtrigonis.*

*triquetra** 9. B. radice faſciculata, foliis filiformibus triquetris glabris ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ovato. *C. B. S.* (Anthericum triquetrum Thunb.)

*ſcabra** 10. B. foliis triquetris ſerrulatis ſcapo ramoſo ſcabro longioribus, racemis ſpicatis, pedunculis fructiferis reflexis. *C. B. S.* (Anthericum ſcabrum Thunb.)

ciliata Link. 11. B. foliis ſubtriquetro-enſiformibus ciliatis elongatis, ſcapo ſimplici, racemo longiſſimo. *C. B. S.* (Anthericum ciliatum Thunb.)

*praemorſa** 12. B. radice tuberoſa praemorſa, foliis ſubtriquetris canaliculatis diſtichis erectis ſcapo brevioribus. *C. B. S.* (Anthericum praemorſum Jacqu.)

*incurva** 13 B. radice faſciculata, foliis abbreviatis 3gonis ſubulatis incurvis, ſcapo ſimplici, racemo oblongo cernuo. *C. B. S.* (Anthericum incurvum Thunb.)

*canaliculata** 14. B. foliis enſiformi-triquetris latere anguſtiori canaliculatis ſcapoque ſimplici piloſis, racemo multifloro. *C. B. S.* (Anthericum canaliculatum Ait.)

****Foliis planis.*

aloides W. 15. B. foliis linguaeformi-lanceolatis carnoſis ſcapo racemoſo ſubbrevioribus. *C. B. S.* (Anthericum aloides L.)

*nutans** 16. B. foliis lanceolatis carnoſis baſi concavis apice reflexis ſcapo brevioribus, racemo ovato apice nutante. *C. B. S.* (Anthericum nutans Thunb.)

*planifolia** 17. B. radice faſciculata, foliis linearibus carinatis membranaceis flaccidis ſcapo ramoſo brevioribus, floribus paniculatis, filamentis medio clavatis apice ſubulatis. *Luſitania. Numidia.* (Anthericum planifolium L., Mattiazzi Vand., bicolor Desf.)

*caudata** 18. B. foliis enſiformibus canaliculatis ſcapo ſimplici longioribus, racemo oblongo erecto. *C. B. S.* (Anthericum caudatum Thunb., Cauda felis L. ſuppl.)

*latifolia** 19. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis nervoſis ſubcarnoſis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo longiſſimo. *C. B. S.* (Anthericum latifolium Thunb.)

*undulata** 20. B. radice faſciculata, foliis enſiformibus undulatis ſcapo piloſo longioribus, racemo multifloro. *C. B. S.* (Anthericum undulatum Thunb.)

*criſpa** 21. B. foliis oblongis criſpis ciliatis erectis ſcapo glabro ramoſo brevioribus, floribus racemoſis remotis. *C. B. S.* (Anthericum criſpum Thunb.)

1240. ARTHROPODIUM R. Br.

** Petalis interioribus undulatis.*

paniculatum R. Br. 1. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis, pedicellis aggregatis, petalis interioribus crenulatis, capſulis pendulis, radice bulboſa, bulbis pedicellatis. *Nov. Holl.* (Anthericum paniculatum Andr., milleflorum Red.)

pendulum * 2. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus laxe racemoſis pendulis, pedicellis aggregatis, petalis interioribus undulatis, radice ſubfibroſa. (Phalangium pendulum Red. Anthericum Horn. W.)

minus R. Br. 3. A. racemo ſimplici paucifloro, pedicellis ſolitariis, bulbis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

ſtrictum R. Br. 4. A. racemo ſubſimplici paucifloro, pedicellis ſolitariis, capſulis erectis. *Terra Diemen.*

cirrhatum R. Br. 5. A. foliis lato-lanceolatis enſiformibus, floribus paniculatis cernuis, pedicellis aggregatis, bracteis foliaceis, filamentis ſuperne barbatis 2appendiculatis. *Nov. Zeeland.* (Anthericum cirrhatum Forſt.)

*** Petalis interioribus fimbriatis.*

fimbriatum R. Br. 6. A. racemo ſimplici, pedicellis inferioribus geminis, filamentis apice ſtrumoſis ſtupoſis. *Nov. Holl.*

**** Petalis ſubaequalibus.*

imbricatum * 7. A. foliis imbricatis lineari-enſiformibus diſtichis, pedicellis corymboſis, floribus nutantibus. *Nov. Holl.* (Stypandra imbricata R. Br.)

glaucum * 8. A. foliis diſtinctis lineari-enſiformibus glaucis diſtichis, baſeos margine altero reflexo, pedicellis ſubumbellatis, floribus nutantibus. *Nov. Holl.* (Stypandra glauca R. Br.)

ſcabrum * 9. A. caule folioſo, foliis linearibus complicatis, floribus corymboſis, pedicellis bracteatis corollisque hiſpidulis. *Nov. Holl.* (Stypandra ſcabra R. Br.)

umbellatum * 10. A. caule folioſo, foliis linearibus margine laevibus, floribus corymboſis, pedicellis umbellatis corollisque glabris. *Nov. Holl.* (Stypandra umbellata R. Br.)

caeſpitoſum * 11. A. caule folioſo, foliis enſiformibus margine ſcabris, floribus corymboſis, pedicellis aggregatis corollisque laevibus. *Nov. Holl.* (Stypandra caeſpitoſa R. Br.)

muricatum * 12. A. foliis radicalibus linearibus concaviusculis carnoſis ſtriatis elongatis muricatis, ſcapo ramoſo inferne hiſpido, pedicellis ſolitariis. *C. B. S.* (Anthericum muricatum Thunb.)

hiſpidum * 13. A. foliis radicalibus lineari-enſiformibus canaliculatis hiſpidis ſcapo villoſo longioribus, floribus racemoſo-ſpicatis. *C. B. S.* (Anthericum hiſpidum L.)

1241. CHLOROPHYTUM Ker.

laxum R. Br. 1. Chl. acaule, foliis linearibus racemum elongatum ſubaequantibus, pedicellis ſubſolitariis. *Nov. Holl.*

inornatum Ker. 2. Chl. radice fibroſa, caule ſubramoſo hiſpidiuſculo, foliis lanceolatis acuminatis nervoſis, floribus paniculato-racemoſis breviſſime pedicellatis. *Sierra Leone.*

elatum R. Br. 3. Chl. radice faſciculata, foliis lanceolatis, ſcapo ramoſo, pedicellis aggregatis. *C. B. S.* (Anthericum elatum Ait.)

Orchidaſtrum Lindl. 4. Chl. radice fibroſa, foliis lanceolatis, panicula racemoſa ſtricta, pedunculis aggregatis bracteatis. *Sierra Leone.*

1242. CAESIA R. Br.

corymboſa R. Br. 1. C. foliis lineari-lanceolatis, ſcapo ſimplici, corymbo paucifloro. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

occidentalis R. Br. 2. C. foliis filiformi-canaliculatis, racemis ſubdiviſis, floribus erectis. *Nov. Holl.*

parviflora R. Br. 3 C. radice fibroſa, foliis lineari-lanceolatis, racemis paniculatis, floribus erectis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

vittata R. Br. 4. C. radice bulboſo-faſciculata, foliis lineari-lanceolatis, racemis ſubdiviſis, floribus nutantibus, filamentis vittatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

*puſilla** 5. C. radice bulboſa, foliis linearibus, ſcapo ſimplici, racemo corymboſo, floribus erectis. *C. B. S.* (Anthericum puſillum Jacqu., pauciflorum Thunb.)

*phyſodes** 6. C. radice bulboſa, foliis oblongis obtuſis lucidis erectis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo corymboſo, filamentis papilloſis. *C. B. S.* (Anthericum phyſodes Jacqu., marginatum Thunb.)

*comoſa** 7. C. foliis enſiformibus glabris, ſcapo angulato ramoſo apice comoſo, floribus racemoſis ciliatis, ſtaminibus inaequalibus. *Afric. auſtr.* (Anthericum comoſum Thunb.)

*coarctata** 8. C. radice faſciculata, foliis enſiformibus glaucis medio coarctatis, pedunculis 2fidis paniculatis, pedicellis umbellatis. *Peru.* (Anthericum coarctatum R. et P.)

† *lateriflora* R. Br. 9. C. caule ramoſiſſimo ſtipulato, floribus lateralibus ſubſolitariis nutantibus, capſulis clavatis pendulis ſub-1ſpermis *Nov. Holl.*

1243. TRICORYNE R. Br.

anceps R. Br. 1. Tr. caule ramoſiſſimo aphyllo ſtipulato angulato laevi, ramis ancipitibus, umbellis paucifloris. *Nov. Holl.*

tenella R. Br. 2. Tr. caule filiformi tereti aphyllo ſtipulato dichotomo laevi, umbellis 2-3floris. *Nov. Holl.*

ſcabra R. Br. 3. Tr. caule tereti hiſpido folioſo, ramis paniculatis angulato-ſtriatis ſcabris, foliis planis denticulatis, umbellis 5-7floris. *Nov. Holl.*

elatior R. Br. 4. Tr. caule tereti folioſo ramisque laevibus paniculatis angulato-ſtriatis, foliis planis, umbellis 5-7floris. *Nov. Holl.*

ſimplex R. Br. 5. Tr. caule ſimplici, foliis planis margine ſcabriusculis, umbella ſolitaria multiflora, pedicellis involucro longioribus. *Nov. Holl.*

1244. Thysanotus R. Br.

* *Hexandri.*

† *Tuberibus faſciculatis.*

Paterſonii R. Br. 1. Th. tuberibus ſeſſilibus, caule laevi baſi attenuato ſuperne volubili dichotomo, floribus ſolitariis, pedicello bracteis obtuſis duplo longiori. *Terra Diemen.*

iſantherus R. Br. 2. Th. tuberibus pedicellatis, foliis lineari-filiformibus canaliculatis erectis caulem laevem ſubſimplicem ſubaequantibus, pedunculis corymboſis 3floris, antheris aequalibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

tuberoſus R. Br. 3. Th. tuberibus pedicellatis, foliis linearibus canaliculatis laxis caulem teretem laevem paniculatum ſubaequantibus, pedunculis 3floris, antheris inaequalibus. *Nov. Holl.*

Bankſii R. Br. 4. Th. foliis linearibus canaliculatis caulem ſimplicem laevem aequantibus, pedunculis umbellatis, antheris inaequalibus. *Nov. Holl.*

Baueri R. Br. 5. Th. foliis laxis glabris caule tereti ſimplici brevioribus, umbellis alternis ſeſſilibus paucifloris. *Nov. Holl.*

elatior R. Br. 6. Th. foliis canaliculatis laxis caulem teretem laevem ramoſum ſubaequantibus, pedunculis ſub-3floris. *Nov. Holl.*

paniculatus R. Br. 7. Th. foliis canaliculatis laxis caulem teretem laevem paniculatum ſubaequantibus, pedicellis ſolitariis. *Nov. Holl.*

†† *Radicibus fibroſis.*

junceus R. Br. 8. Th. foliis linearibus canaliculatis ſtrictis abbreviatis, caule ramoſo diffuſo tereti, pedunculis ſubternis. *Nov. Holl.* (Chlamyſporum junceum Salisb.)

gracilis R. Br. 9. Th. caule ſubramoſo filiformi laevi ſtipulato, ramis ſtriato-angulatis, floribus ſubſolitariis, antheris aequalibus. *Nov. Holl.*

elongatus R. Br. 10. Th. caule ramoſiſſimo laevi ſtriato, ramulis 4gonis ſub-1floris, ſtipulis caulinis ſcarioſis, pedicellis flore brevioribus. *Nov. Holl.*

ſparteus R. Br. 11. Th. caule tereti ſtricto ſtriato ſuperne paniculato, ſtipulis appreſſis ſcarioſis, umbellis paucifloris. *Nov. Holl.*

deformis R. Br. 12. Th. caule tereti ſtriato laevi ramoſo, ramis falcato-flexuoſis, pedunculis ſub-3floris. *Nov. Holl.*

volubilis R. Br. 13. Th. caule volubili ſulcato, ramis ſimplicibus angulatis ſtrictis, umbellis paucifloris. *Nov. Holl.*

dichotomus R. Br. 14. Th. foliis radicalibus lineari-filiformibus ciliatis, caule dichotome ramoſo paniculato, ramis patentibus 1floris, antheris ſubaequalibus. *Nov. Holl. occid.* (Ornithogalum dichotomum Labill. Thyſ. divaricatus R. Br. var.)

flexuoſus R. Br. 15. Th. foliis radicalibus, filiformibus hiſpidulis, caule dichotome ramoſo, ramis divaricatis angulatis ſcabris, floribus ſolitariis, antheris inaequalibus. *Nov. Holl.*

Menzieſii R. Br. 16. Th. caule ſtriato baſi attenuato ſuperne volubili, ramis 4gonis, floribus ſolitariis, bracteis pedicellos ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

** *Triandri: radicibus fibroſis.*

triandrus R. Br. 17. Th. foliis radicalibus linearibus ſtriatis ciliatis ſcapum laevem ſimpliciſſimum aequantibus, umbella multiflora, pedunculorum articulo inferiori involucrum ſuperante. *Nov. Holl. occid.* (Ornithogalum triandrum Labill.)

multiflorus R. Br. 18. Th. foliis radicalibus linearibus margine apice ſcabris ſcapum laevem ſimpliciſſimum aequantibus, umbella multiflora, pedunculorum articulo inferiori involucrum ſubaequante. *Nov. Holl.*

pauciflorus R. Br. 19. Th. foliis radicalibus compreſſo-filiformibus laevibus ſcapum ſimpliciſſimum ſubaequantibus, involucro paucifloro. *Nov. Holl.*

hiſpidulus R. Br. 20. Th. foliis radicalibus compreſſo-filiformibus hiſpidulis ſcapo ſcabriuſculo ſimpliciſſimo longioribus, umbella pauciflora. *Nov. Holl.*

1245. NARTHECIUM Möhr.

oſſifragum Hudſ. 1. N. foliis radicalibus lineari-lanceolatis nervoſis, ſcapo bracteis veſtito, capſula acuta corollam ſubexcedente. *Europ. bor. paludes.* (Anthericum oſſifragum L. Abama anthericoides Cand.)

americanum Ker. 2. N. foliis linearibus nervoſis ſtrictis elongatis, ſcapo elato bracteis paucis, capſula ſubulata corollam duplo ſuperante. *Nov. Caeſar.*

1246. CZACKIA Andrz.

Liliaſtrum Andrz. *Helvet. Italia ſuper.* Planta pedalis cubitalis, radice faſciculata, foliis radicalibus linearibus nervoſis, ſcapo paucifloro, floribus erectis albis. (Anthericum et Hemerocallis L.)

1247. CONANTHERA R. et P.

bifolia R. et P. 1. C. radice bulboſa, foliis paucis linearibus canaliculatis, caule ſuperne ramoſo, floribus nutantibus, petalis ſubaequalibus. *Chili.*

Echeandia Perf. 2. C. foliis lato-lanceolatis vaginantibus, caule fimplici, floribus racemofis nutantibus, petalis exterioribus anguftiffimis. *Patria?* (Anthericum reflexum Cav. Echeandia terniflora Ort. Red.)

*Forfteri** 3. C. radice fibrofa, foliis linearibus canaliculato-triquetris, fcapo fuperne paniculato, floribus nutantibus, petalis inaequalibus. *Nov. Caledonia.* (Anthericum Adenanthera Forft.)

1248. LAXMANNIA R. Br.

minor R. Br. 1. L. foliis filiformibus, ftipulis 2partitis capillaribus, floribus capitatis, bracteis margine nudis, petalis interioribus brevioribus. *Nov. Holl.*

gracilis R. Br. 2. L. foliis filiformibus, ftipulis lanceolatis apice 2fidis, floribus capitatis, bracteis margine lanatis, petalis interioribus longioribus. *Nov. Holl.*

1249. BAUMGARTENIA*.

*nitida** 1. B. caule ramofiffimo radicante, foliis confertiffimis acerofis, floribus capitatis. *Nov. Holl.* (Borya R. Br.)

*fphaerocephala** 2. B. caule fimplici erectiusculo, foliis confertiffimis acerofis, floribus globofo-capitatis. *Nov. Holl.* (Borya R. Br.)

1250. XANTHORRHOEA Sm.

arborea R. Br. 1. X. arborefcens, foliis fubtriquetris, fpica longiffima, bracteis floribusque imberbibus. *Nov. Holl.*

auftralis R. Br. 2. X. arborefcens, foliis enfiformibus, fpica pedunculum excedente, bracteis elongatis. *Nov. Holl.*

Haftile R. Br. 3. X. caule abbreviato, foliis enfiformibus, pedunculis elongatis, bracteis floribusque apice tomentofis. *Nov. Holl.* (X. media R. Br.?)

minor R. Br. 4. X. acaulis, foliis triquetris, pedunculis elongatis, bracteis flores aequantibus imberbibus. *Nov. Holl.*

bracteata R. Br. 5. X. acaulis, foliis triquetris, pedunculis elongatis, bracteis lanceolatis divaricatis flores triplo fuperantibus imberbibus. *Nov. Holl.*

Pumilio R. Br. 6. X. acaulis, foliis inferne ancipitibus fuperne triquetris, pedunculis elongatis, bracteis floribusque imberbibus. *Nov. Holl.*

1251. HERRERIA R. et P.

ftellata R. et P. *Chili.* Herba radice fufiformi, caule flexuofo, foliis verticillatis octonis linearibus, floribus racemofis ochroleucis.

1252. Dianella Lam.

nemorosa Lam. 1. D. foliis lineari-lanceolatis margine subaculeato-serrulatis, carina glabra. *Ind. or.* (Dracaena ensifolia L.)

coerulea Sims. 2. D. foliis linearibus subtus glaucescentibus margine carinaque aculeato-serrulatis. *Nov. Holl.*

longifolia R. Br. 3. D. foliis linearibus elongatis margine carinaque laevibus, petalis patentibus. *Nov. Holl.*

revoluta R. Br. 4. D. foliis lineari-lanceolatis margine carinaque laevibus, petalis reflexis. *Nov. Holl.* (D. strumosa Ker.)

congesta R. Br. 5. D. foliis ensiformibus carina scabris, floribus alternatim congestis. *Nov. Holl.*

laevis R. Br. 6. D. foliis ensiformibus margine carinaque laevibus, paniculae simplicis pedunculis racemosis. *Nov. Holl.*

divaricata R. Br. 7. D. foliis lineari-ensiformibus margine carinaque laevibus, paniculae decompositae ramis divaricatis, pedicellis laxe racemosis flore longioribus. *Nov. Holl.*

rara R. Br. 8. D. foliis linearibus margine carinaque laevibus, paniculae diffusae ramis strictis, pedicellis laxe racemosis flore longioribus. *Nov. Holl.*

dubia Kunth. 9. D. foliis caulinis oblongo-lanceolatis, panicula diffusa. *Nov. Granat.*

1253. Dracaena.

* *Arboreae.*

Draco 1. Dr. dichotome ramosa, foliis ensiformibus apice spinosis confertis, panicula terminali, bracteis integerrimis abbreviatis. *Ind. or.*

ensifolia Haw. 2. Dr. foliis late ensiformibus subcarnosis, panicula terminali ramosissima, bracteis elongatis margine subaculeatis. *Nov. Hispan.* (Cordyline parviflora Kunth.)

indivisa Forst. 3. Dr. foliis ensiformibus acutis membranaceis, panicula laterali thyrsoidea. *Nov. Zeeland.*

† *australis* Forst. 4. Dr. foliis ensiformibus acutis, panicula terminali supradecomposita. *Nov. Zeeland.*

† *arborea* Link. 5. Dr. foliis lanceolatis patentibus. *Afric.* (Aletris arborea W.)

fragrans Ker. 6. Dr. cortice annulato laevi, foliis oblongo-lanceolatis reflexis undulatis, paniculae ramis capituliferis. *Africa.* (Aletris fragrans Jacqu. W.)

tessellata W. 7. Dr. cortice tessellato, foliis linearibus cuspidatis patentibus rubro-marginatis. *Madagascar.* (Dr. marginata Lam.)

cernua Jacqu. 8. Dr. foliis lanceolatis cuspidatis basi angustatis oblique flexis, panicula divaricata nutante. *Ins. Mascaren.*

reflexa Lam. 9. Dr. foliis ensiformibus acuminatis striatis inferne angustatis, inferioribus reflexis, racemi termina-

lis pedunculis abbreviatis. *Inſ. Maſcaren. Madagaſcar.*

ferrea 10. Dr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis rubentibus, paniculae ramis divaricatis racemoſis, floribus horizontalibus breviſſime pedicellatis. *Ind. occid.* et *or. China.* (Dr. terminalis Jacqu.)

umbraculifera Jacqu. 11. Dr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis, corymbo terminali breviſſimo multifloro. *Inſ. Maſcaren.*

ovata Sims. 12. Dr. foliis confertis oblongis undulatis nervoſis, racemo terminali compoſito. *Sierra Leone.*

** *Fruteſcentes.*

ſtriata L. ſuppl. 13. Dr. caule fruticoſo flexuoſo ramoſo, foliis lineari-lanceolatis falcatis ſtriatis. *C. B. S.* (Aſparagus ſtriatus Thunb.)

mauritiana Lam. 14. Dr. ſcapo ſarmentoſo alterne paniculato, foliis enſiformibus, pedicellis flores ſuperantibus. *Inſ. Maſcaren.*

*** *Herbaceae.*

undulata L. ſuppl. 15. Dr. caule angulato ramoſo, foliis ovatis acutis undulatis multinerviis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis. *C. B. S.* (Aſparagus undulatus Thunb.)

erecta L. ſuppl. 16. Dr. caule compreſſo ramoſo, foliis lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus 4floris cernuis. *C. B. S.* (Aſparagus erectus Thunb.)

graminifolia 17. Dr. foliis radicalibus linearibus ſtriatis, ſcapo angulato folia aequante, floribus faſciculato-racemoſis. *Ind. or.* (Aſparagus graminifolius L.)

1254. SANSEVIERA Thunb.

guineenſis W. 1. S. foliis 1formibus late-lanceolatis faſciatis rigidis, floribus ſeſſilibus, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, ſtylo ſtamina ſuperante. *Guinea.* (S. thyrſiflora Thunb. Aletris hyacinthoides β. guineenſis L.)

grandicuſpis Haw. 2. S. foliis uniformibus lanceolatis oblique flexis faſciatis ſubmarginatis apice convoluto-cuſpidatis coriaceis. *Patria?*

† *polyphylla* Haw. 3. S. foliis late lanceolato-enſiformibus glaucis rigidis ſuberectis obſolete faſciatis. *Patria?*

glauca Haw. 4. S. foliis late-lanceolatis glaucis ſubflaccidis obſolete faſciatis. *Patria?*

*cannaefolia** 5. S. foliis lanceolatis acuminatis petiolatis, floribus racemoſis, bractea duplici inaequali. *Nov. Holl.* (Cordyline cannaefolia R. Br.)

lanuginoſa W. 6. S. foliis enſiformibus nervoſis ſubtus lanatis, racemis compoſitis, bracteis pedicellos ſuperantibus. *Ind. or. Inſ. Maſcaren.* (Cordyline hemichryſa Commerſ. Dianella Lam.)

laete-virens Haw. 7. S. foliis lanceolatis utrinque attenuatis membranaceis glabris nervoſis reflexis, racemis terminalibus, bracteis minutis, ſtylo ſtamina ſuperante. *Cochinchina.* (Aletris cochinchinenſis Lour.)

fulvo-cincta Haw. 8. S. foliis lanceolatis rigidis glabris revolutis fulvo-marginatis, floribus fasciculato-racemosis, bracteis pedicellos superantibus, stylo staminibus sublongiori. *Brasil.*

spicata Haw. 9. S. foliis lanceolatis canaliculatis rigidis, floribus fasciculato-racemosis, bracteis obsoletis, stylo stamina subaequante. *Patria?* (Salmia spicata Cav.)

zeylanica W. 10. S. foliis fasciatis inferioribus oblongis acutis planis, superioribus linearibus canaliculatis, floribus racemosis, bracteis pedicellos aequantibus, stylo stamina superante. *Ceylon.* (Aloë et Aletris hyacinthoides L. S. pumila Haw. var.)

carnea Andr. 11. S. foliis lineari-lanceolatis membranaceis nervosis glaberrimis, spica axillari simplici foliis breviore, bracteis coloratis tubum corollae aequantibus, stylo stamina subaequante. *China.*

1255. LUZURIAGA R. et P.

radicans R. et P. 1. L. caule suffruticoso geniculato flexuoso scandente radicante, foliis alternis lanceolatis obliquis, pedunculis axillaribus divisis. *Chili.*

cymosa R. Br. 2. L. cymis terminalibus 2partitis, ramis teretibus, ramulis striatis laevibus. *Nov. Holl.*

montana R. Br. 3. L. umbellis axillaribus pedunculatis, ramis striatis ramulisque scabris. *Nov. Holl.*

1256. EUSTREPHUS R. Br.

latifolius R. Br. 1. E. caule volubili, foliis ovato-lanceolatis, pedicellis aggregatis, filamentis basi connatis, antheris effoetis apice tortilibus. *Nov. Holl.*

angustifolius R. Br. 2. E. caule volubili, foliis lineari-lanceolatis, pedicellis subsolitariis, filamentis distinctis, antheris effoetis apice strictis. *Nov. Holl.*

1257. ASPARAGUS.

* *Frutescentes armati.*

horridus 1. A. caule 5gono, aculeis solitariis alternis foliaceis elongatis rigidis compresso-4gonis patentibus, pedunculis aggregatis abbreviatis. *Sicilia. Hispan.*

aphyllus 2. A. caule angulato ramoso, aculeis foliaceis subternis divaricatis, pedunculis sub-1floris pendulis. *Europ. austr.* (A. phyllacanthus Lam.)

dependens Thunb. 3. A. caule flexuoso subangulato, ramis reflexo-pendulis, aculeis solitariis rectis, foliis fasciculatis subulatis. *C. B. S.*

albus 4. A. caule albido rigido ramoso, aculeis solitariis patenti-reflexis, foliis fasciculatis 3quetris muticis deciduis, pedunculis aggregatis floriferis erectis. *Europ. austr.*

ſtipularis Forsk. 5. A. caule tereti ſtriato, ramis divaricatis, aculeis ſtipularibus breviſſimis reverſis, foliis remotis ſubternatis angulatis glaucis rigidis pungentibus patentiſſimis, pedunculis ſubgeminis. *Aegypt.* (A. Brouſſoneti Jacq.)

ſtipulaceus Lam. 6. A. caule virgato hiſpidulo, ramis aggregatis abbreviatis, aculeis foliaceis faſciculatis, ſtipulis membranaceis obtuſis laceris. *C. B. S.*

aſiaticus 7. A. caule flexuoſo ramoſo, ramis nodoſis divaricatis, aculeis breviſſimis reverſis, foliis confertim faſciculatis ſubulatis falcatis. *Ind. or.*

africanus Lam. 8. A. caule angulato, ramis teretibus, aculeis ſolitariis ſubreflexis, foliis faſciculatis filiformibus mucronatis ſubincurvis. *C. B. S.*

aethiopicus 9. A. caule ramisque angulatis, aculeis ſtipularibus reverſis, foliis faſciculatis lineari-lanceolatis ſubfalcatis, pedunculis ſolitariis. *C. B. S.* (A. lanceus et ſcandens Thunb.)

capenſis 10. A. caule ramisque teretibus ſtrictis, aculeis ſubternis, medio forti rigido elongato ſubreflexo, foliis confertim faſciculatis filiformibus mucronatis abbreviatis pubeſcentibus, floribus ſolitariis terminalibus ſubſeſſilibus. *C. B. S.*

retrofractus 11. A. ramis tortuoſis reflexis, aculeis ſubternis, medio elongato reflexo, foliis terminalibus ſtellatim faſciculatis rigidis ſetaceis glabris. *Africa auſtr.*

falcatus 12. A. ramis teretibus, aculeis ſubaggregatis minutiſſimis, foliis ſubternis linearibus falcatis elongatis. *Ceylon.*

ſarmentoſus 13. A. caule flexuoſo, aculeis recurvis, foliis ſolitariis lineari-lanceolatis. *Ceylon.*

racemoſus W. 14. A. ramis ſtriatis, aculeis ſolitariis, foliis faſciculatis lineari-ſubulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. *Ceylon.*

faſciculatus R. Br. 15. A. caule decumbente ramoſiſſimo, aculeis ſolitariis divaricatis, foliis faſciculatis filiformibus, floribus racemoſis. *Nov. Holl.*

acutifolius 16. A. caule angulato, ramis divaricatis, foliis faſciculatis rigidis pungentibus patentiſſimis, pedunculis ſolitariis elongatis. *Europ. auſtr.*

** *Herbacei inermes.*

verticillaris 17. A. caule ſubſcandente, ramis divaricatis, foliis faſciculatis rigidis ſubulatis ſubarcuatis, floribus quaternis patulis dioecis. *Tauria. Caucaſ. Ad Volgam.*

maritimus Pall. 18. A. caule ramoſiſſimo ramisque horizontalibus flexuoſis, foliis faſciculatis ſetaceis patentiſſimis pungentibus, floribus campanulatis dioecis, pedunculis geminis reflexis. *Ad mare caſpium et Sibir.*

dauricus Fiſch. 19. A. caule ramoſo, ramis rectis, foliis faſciculatis ſetaceis elongatis, pedunculis ſolitariis nutantibus. *Dauria.*

† *flexuosus* Thunb. 20. A. caule scandente ramoso striato, ramis reflexis, foliis ternis lanceolatis acutis. *C. B. S.*

† *subulatus* Thunb. 21. A. caule flexuoso erecto, ramis reflexis, foliis ternis subulatis, floribus axillaribus sessilibus. *C. B. S.*

decumbens Jacq. 22. A. caule decumbente ramosissimo, ramis flexuosis, foliis setaceis, pedunculis solitariis terminalibus, limbo corollae reflexo. *C. B. S.*

declinatus 23. A. caule tereti, ramis declinatis, foliis subfasciculatis setaceis rigidis patentissimis. *C. B. S.*

sylvaticus Kit. 24. A. caule erecto tereti, foliis subverticillatis setaceis inermibus, stipulis solitariis. *Europ. austr.* (A. tenuifolius Lam.)

officinalis 25. A. caule erecto tereti, foliis fasciculatis setaceis, stipulis paribus basi mucronatis. *Europ.*

amarus Cand. 26. A. caule tereti scabro, foliis confertim fasciculatis setaceis, stipulis spinescentibus patulis subuncinatis, baccis magnis. *Gallia austr. et occid.*

crispus Lam. 27. A. caule tortuoso, ramis incurvis, foliis geminis linearibus, floribus solitariis. *Ins. Mascaren.*

1258. CONVALLARIA.

* *Corolla campanulata.*

maialis 1. C. scapo semitereti, foliis ovato-oblongis, floribus racemosis nutantibus. *Europa. Amer. bor.* (C. Mappi C. C. Gmel.)

** *Corolla infundibuliformi.*

verticillata 2. C. caule angulato, foliis lanceolatis verticillatis subtus glaucis, pedunculis axillaribus aggregatis sub-3floris nutantibus. *Prata alpestria. Saltus.*

cirrhifolia Wall. 3. C. caule scandente, foliis verticillatis linearibus revolutis apice subcirrhiferis, pedunculis axillaribus 3floris. *Nepal.*

oppositifolia Wall. 4. C. caule tereti, foliis petiolatis oppositis oblongis acutis glabris, pedunculis axillaribus multifloris nutantibus. *Nepal.*

Polygonatum 5. C. caule angulato, foliis alternis amplexicaulibus ovato-oblongis, pedunculis solitariis sub-1floris nutantibus. *Europ.*

pubescens W. 6. C. caule teretiusculo sulcato, foliis alternis amplexicaulibus ovatis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus sub-2floris. *Amer. bor.*

canaliculata W. 7. C. caule canaliculato, foliis alternis amplexicaulibus oblongis margine pubescentibus, pedunculis axillaribus 2floris. *Amer. bor.*

angustifolia * 8. C. caule tereti, foliis alternis sessilibus elliptico-lanceolatis acutis sub-3nerviis glabris, pedunculis axillaribus elongatis sub-2floris. *America bor.* (C. biflora Walt. Polygonatum angustifolium Pursh.)

hirta Lam. 9. C. caule angulato hispido, foliis alternis subamplexicaulibus ovatis obtusiusculis, pedunculis axillaribus 3floris. *Amer. bor.*

10.

parviflora Poir. 10. C. caule angulato, foliis alternis feffilibus ovato-oblongis glabris, pedunculis cernuis axillaribus 2floris. *Amer. bor.*

multiflora 11. C. caule tereti, foliis alternis ovato-oblongis amplexicaulibus glabris, pedunculis axillaribus nutantibus multifloris. *Europ. nemora.*

latifolia 12. C. caule angulato, foliis alternis ovato-oblongis acuminatis amplexicaulibus glabris, pedunculis axillaribus multifloris pubefcentibus. *Auftria. Hungar. Tauria. Amer. bor.*

polyanthema M. B. 13. C. caule tereti, foliis alternis elliptico-lanceolatis acutis fubtus pubefcentibus amplexicaulibus, pedunculis axillaribus multifloris. *Caucaf.*

orientalis Desf. 14. C. caule fubarcuato, foliis alternis fubpetiolatis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus multifloris, limbo corollae patente. *Afia minor.*

1259. SMILACINA Desf.

borealis Sims. 1. Sm. fubcaulefcens, foliis elliptico-obovatis ciliatis, fcapo pubefcente, umbella corymbofa, pedicellis nudis nutantibus. *Amer. bor.* (Dracaena borealis Ait.)

umbellata Desf. 2. Sm. fubcaulefcens, foliis oblongis ciliatis, fcapo pubefcente, umbella faftigiata, pedicellis bafi bracteatis. *Amer. bor.* (Convallaria umbellata Mx.)

trifolia Desf. 3. Sm. caule alterne 3foliato pubefcente, foliis oblongo-lanceolatis, racemo terminali laxo. *Sibir. orient. Amer. bor.* (Convallaria trifolia L.)

ftellata Desf. 4. Sm. caule foliofo, foliis alternis amplexicaulibus oblongo-lanceolatis, racemo fimplici terminali. *Amer. bor.* (Convallaria ftellata L.)

ciliata Desf. 5. Sm. caule foliofo arcuato, foliis feffilibus ovatis ciliatis, panicula terminali conferta, ftaminibus corollam fuperantibus. *Amer. bor.*

racemofa Desf. 6. Sm. caule foliofo, foliis feffilibus oblongis acuminatis pubefcentibus, panicula racemofa terminali, ftaminibus corollam aequantibus. *America bor.*

1260. OPHIOPOGON Ker.

japonicus Ker. 1. O. foliis linearibus fcapo ancipiti multo longioribus, floribus racemofis fecundis. *Japon.* (Convallaria japonica L. fuppl. Thunb.)

fpicatus Ker. 2. O. foliis linearibus carinatis fcapum fubangulatum aequantibus, floribus fafciculato-racemofis. *Japon. Nepal. China. Cochinchina.* (Convallaria fpicata Thunb. Liriope Lour.)

1261. LEDEBOURIA Roth.

hyacinthina Roth. *Ind. or.* Radix bulbofa, folia lanceolata glabra fcapum pubefcentem aequantia, flores racemofi coerulefcentes. (Erythronium indicum Rottl.)

1262. BURCHARDIA R. Br.

umbellata R. Br. *Nov. Holl.* Radix fasciculata, folia linearia, flores umbellati albi.

1263. SCHELHAMMERA R. Br.

undulata R. Br. 1. Sch. caule ramoso, foliis ovatis undulatis amplexicaulibus, floribus subsolitariis, petalorum unguibus foveolatis. *Nov. Holl.*

multiflora R. Br. 2. Sch. caule simplici flexuoso, foliis brevissime petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis aggregatis, fructiferis recurvis. *Nov. Holl.*

1264. UVULARIA.

perfoliata 1. U. foliis perfoliatis oblongis acutiusculis, corolla campanulata intus scabra, antheris cuspidatis. *Amer. bor.*

flava Sm. 2. U. foliis perfoliatis oblongis obtusis basi undulatis, corolla basi attenuata intus scabra, antheris cuspidatis. *Amer. bor.*

grandiflora Sm. 3. U. foliis perfoliatis oblongis acutis, corolla intus laevi, antheris obtusiusculis, nectariis subrotundis. *Amer. bor.* (U. lanceolata Ait.)

sessilifolia 4. U. caule glabriusculo superne diviso, foliis sessilibus lanceolatis subtus glaucescentibus, corollae laciniis intus laevibus, capsula stipitata. *America bor.*

puberula Mx. 5. U. caule pubescente, foliis subamplexicaulibus ovalibus utrinque concoloribus, corollae laciniis intus laevibus, capsula sessili. *Carolina.*

chinensis Ker. 6. U. caule angulato ramoso, foliis petiolatis ovato-lanceolatis, pedunculis subracemosis, corolla basi gibbosa, filamentis antheras superantibus. *China.*

parviflora Wall. 7. U. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis oppositifoliis elongatis apice bracteatis, floribus umbellatis. *Nepal.*

umbellata W. 8. U. foliis oblongis acutis subsessilibus, umbellis oppositifoliis pedunculatis bracteatis, pedicellis elongatis bracteatis. *Nepal.*

1265. STREPTOPUS Mx.

distortus Mx. 1. Str. foliis amplexicaulibus ovato-oblongis acuminatis glaberrimis, pedunculis solitariis medio geniculato-refractis. *Silesia. Helvetia. Hungar. Amer. bor. Grönland.* (Uvularia amplexifolia W.)

roseus Mx. 2. Str. foliis semiamplexicaulibus oblongis acuminato-cuspidatis ciliatis, pedunculis solitariis flexuosis. *Amer. bor.*

lanuginosus Mx. 3. Str. foliis sessilibus subcordatis acuminatis lanatis, pedunculis 2floris. *Amer. bor.*

1266. DRYMOPHILA R. Br.

cyanocarpa R. Br. *Terra Diemen.* Herba foliis diſtichis ſeſſilibus, floribus pedunculatis ſolitariis albis.

1267. PHILESIA Juſſ.

buxifolia W. *Ad fretum Magellan.* Frutex ramoſus foliis petiolatis ovatis, floribus pedunculatis bracteatis.

1268. CALLIXENE Juſſ.

marginata Lam. *Ad fretum Magellan.* Frutex ramoſus foliis ellipticis coriaceis ſeſſilibus, floribus terminalibus bracteatis. (Enargea Gärtn. W.)

1269. XEROPHYTA Juſſ.

pinifolia Lam. *Madagascar.* Frutex ramoſus ſquamatus, foliis faſciculatis linearibus acutis, floribus terminalibus pedunculatis.

1270. LAPAGERIA R. et P.

roſea R. et P. *Chili.* Frutex ſcandens, foliis oblongis coriaceis petiolatis, floribus roſeis ſolitariis pedunculatis.

1271. RIPOGONUM Forſt.

parviflorum R. Br. 1. R. caule inermi radicante, foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, racemis compoſitis, ſtaminibus corollam ſuperantibus. *Nov. Zeeland.* (Ripogonum ſcandens Forſt. gen. Smilax Ripogonum Forſt. flor.)

album R. Br. 2. R. caule aculeato, ramulis inermibus, foliis alternis oppoſitisve, racemis ſimplicibus, ſtaminibus corollam aequantibus. *Nov. Holl.*

1272. SMILAX.

** Caule aculeato,*

† angulato.

aſpera 1. Sm. foliis haſtato-cordatis lanceolatis 7-9nerviis aculeato-dentatis coriaceis, baccis rubris. *Europ. auſtr. Syria.*

nigra W. 2. Sm. caule ſubaculeato, foliis cordatis oblongis 7nerviis inermibus, baccis nigris. *Hiſpania. Luſitania.*

catalonica Poir. 3. Sm. foliis ample cordatis acutis 7nerviis coriaceis margine dentato-ſpinoſis, floribus racemoſis. *Catalonia.* (Sm. bermudenſis Duham.)

mauritanica Poir. 4. Sm. foliis cordato-lanceolatis lucidis coriaceis 7nerviis ſubinermibus, floribus racemoſis, baccis rubris. *Mauritania.* (Sm. excelſa Duham.)

excelſa 5. Sm. foliis late cordatis ſub-7nerviis obtuſiuſculis inermibus, baccis rubris. *Caucaſ. Aſia min.*

dentata Humb. 6. Sm. caule ſuperne aculeato, foliis inferioribus ovatis mucronatis 5nerviis ſubdentatis ſuperioribus oblongis mucronatis 3nerviis aculeato-dentatis. *Cuba.*

ſpinoſa Poir. 7. Sm. foliis lanceolatis margine ſinuatis dentato-ſpinoſis, floribus umbellatis. *Ind. or.*

horrida Desf. 8. Sm. aculeis caulinis confertis rectis inaequalibus, foliis ovato-oblongis ſub-3lobis 5nerviis inermibus, floribus umbellatis. *Amer. bor.*

papyracea Duham. 9. Sm. foliis ovato-lanceolatis 3nerviis venoſo-reticulatis inermibus membranaceis. *Cayenn.*

zeylanica 10. Sm. caule ſub-4gono, foliis cordato-oblongis 3-5nerviis inermibus coriaceis, petiolis 2dentatis, floribus faſciculato-umbellatis, baccis mucronatis flavis. *Ind. or. Ceylon. Inſ. Molucc.*

† *officinalis* Kunth. 11. Sm. foliis cordato-oblongis acutis coriaceis 5-7nerviis venoſo-reticulatis. *Nov. Granat.*

quadrangularis Mühl. W. 12. Sm. caule 4gono ſuperne inermi, foliis ovatis acutis 5nerviis reticulatis, baccis nigris. *Amer. bor.* (Sm. virginiana Mill.)

longifolia Rich. 13. Sm. caule 4gono, foliis ſubhaſtato-oblongis obtuſis mucronatis ſub-7nerviis. *Cayenn.*

Sarſaparila 14. Sm. caule ſub-4gono, aculeis incurvis, foliis ovato-lanceolatis cuſpidatis inermibus ſub-5nerviis ſubtus glaueſcentibus. *Virginia.*

obliquata Poir. 15. Sm. caule ſub-4gono, aculeis ſparſis recurvis, foliis oblique 3angularibus lanceolatis acuminatis 3-5nerviis inermibus. *Peru.*

maypurenſis Humb. 16. Sm. caule 4gono, aculeis ſparſis uncinatis, foliis ovato-lanceolatis recurvato-acuminatis ſub-5nerviis, nervo medio aculeato. *Ad Orinocum.*

oblongata Sw. 17. Sm. foliis oblongis acuminatis 3nerviis rigidis integerrimis, nervo medio ſubtus aculeato, baccis nigro-coeruleis. *Inſ. Carib.*

braſilienſis * 18. Sm. aculeis caulinis raris, foliis ſubellipticis baſi attenuatis mucronatis ſub-5nerviis, nervis tribus mediis ſubtus aculeatis, baccis nigris. *Braſil.* Sello.

cercidifolia Pursh. 19. Sm. foliis orbiculato-cordatis acuminatis 5nerviis reticulato-venoſis. *Carolin. auſtr.*

cordifolia Humb. 20. Sm. aculeis caulinis raris minutis, foliis ample et profunde cordatis acutis ſub-5nerviis nitidis integerrimis ſubſeſſilibus. *Nov. Hiſpan. Guadalupa.*

perfoliata Lour. 21. Sm. foliis ſubcordato-ovatis recurvato-acuminatis 5nerviis petiolatis, ſtipulis cordatis perfoliatis. *Cochinchina.*

pandurata Pursh. 22. Sm. foliis ovato-panduraeformibus acuminatis 3nerviis lucidis, pedunculis elongatis. *America bor.*

haſtata W. 23. Sm. aculeis caulinis raris, foliis auriculato-haſtatis lanceolatis 3nerviis margine aculeato-ciliatis. *Carolin. auſtr. Florida.* (Sm. Bona nox Mx.)

lanceolata Walt. 24. Sm. foliis angufte lanceolatis elongatis fub-3nerviis lucidis integerrimis, baccis rubris. *Amer. boreal.*

lappacea Humb. 25. Sm. aculeis caulinis validis fubuncinatis confertis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis 3nerviis margine nervoque medio fubtus aculeato-dentatis. *Caracas.*

†† *Caule tereti.*

China 26. Sm. caule teretiusculo, aculeis caulinis fparfis abbreviatis, foliis cordato-oblongis mucronatis 5nerviis coriaceis venofo-reticulatis, petiolis 2dentatis, baccis rubris. *China. Cochinchina. Japon.*

cordato-ovata Rich. 27. Sm. caule tereti, foliis cordato-ovatis 5nerviis, umbellis racemofis. *Cayenn.*

Walteri Pursh. 28. Sm. foliis cordato-ovatis 3nerviis laevibus, baccis acuminatis rubris. *Virgin. Carolina.*

acuminata W. 29. Sm. aculeis caulinis validiffimis dilatatis recurvis, foliis fubrotundo-cordatis acuminatis 7-9-nerviis. *Ind. occ.*

glauca Walt. 30. Sm. aculeis caulinis fparfis, foliis fubcordato-ovatis acutis fub-5nerviis fubtus glaucis, pedunculis fubumbellatis 2floris. *Carolina.*

auftralis R. Br. 31. Sm. foliis oblongis acutis 5nerviis glabris integerrimis, petiolis cirrhiferis. *Nov. Holl.*

fubfeffiliflora Mx. 32. Sm. aculeis caulinis validis, foliis amplis ovatis obtufis 3nerviis, umbellis feffilibus. *Brafil.*

rotundifolia 33. Sm. aculeis caulinis fparfis rectis, foliis fubcordato-ovatis acuminatis membranaceis 5nerviis, baccis fphaericis. *Amer. bor.*

cufpidata Mx. 34. Sm. aculeis caulinis abbreviatis recurvis, foliis oblongo-lanceolatis 5nerviis acutis integerrimis, baccis mucronatis. *Ind. occ. Amer. auftr.*

laurifolia 35. Sm. ramis inermibus, foliis craffe coriaceis elliptico-oblongis obtufis recurvato-mucronatis obfolete 3nerviis, baccis nigris. *Virgin. Carolin.*

ovata Pursh. 36. Sm. ramis inermibus, foliis ovatis acutis cufpidatis 3nerviis, umbellis breviter pedunculatis, baccis nigris. *Georgia.*

alba Pursh. 37. Sm. ramis inermibus, foliis lanceolatis elongatis coriaceis 3nerviis, umbellis breviffime pedunculatis, baccis albis. *Carolina.*

fyphilitica Humb. 38. Sm. aculeis caulinis raris validis, foliis oblongo-lanceolatis cufpidatis coriaceis 3nerviis. *Amer. auftr.*

tamnoides 39. Sm. caule herbaceo, foliis longe petiolatis fubcordato-3angularibus obtufis 5nerviis, baccis nigris. *Amer. bor.* (Sm. tamnifolia Mx.)

caduca 40. Sm. aculeis caulinis fparfis rectis, foliis ovatis mucronatis fub-5nerviis membranaceis, pedunculis paucifloris. *Amer. bor.*

havanenfis Jacq. 41. Sm. caule herbaceo, foliis fubrotundis emarginatis mucronatis 5nerviis margine dentato-fpinofis, petiolis aculeatis. *Cuba.*

ſubaculeata * 42. Sm. aculeis caulinis raris, ramis flexuoſis divaricatis, foliis ovato-oblongis obtuſis mucronatis 5nerviis membranaceis integerrimis, umbellis multifloris. *Jamaica.*

** *Caule inermi,*

† *angulato.*

Bona nox 43. Sm. foliis cordato-ovatis acutis 7nerviis aculeato-ciliatis. *Carolina.* (Sm. variegata Walt.)

† *tetragona* L. ſuppl. 44. Sm. caule 4gono, foliis cordatis 5nerviis acuminatis integerrimis. *Patria?*

anceps W. 45. Sm. caule ancipiti, foliis ſubcordato-ovatis acuminatis triplinerviis coriaceis, umbellis multifloris. *Inſ. Mascaren.*

Alpini W. 46. Sm. foliis baſi truncatis panduraeformibus cuſpidatis ſubcoriaceis nitidis 3nerviis ſubciliatis, umbellis paucifloris. *Graecia.*

latifolia R. Br. 47. Sm. foliis ſubcordato-ovatis obtuſis 5nerviis glabris. *Nov. Holl.*

domingenſis W. 48. Sm. foliis oblongis acutis baſi ſubattenuatis coriaceis opacis 3nerviis integerrimis, umbellis ſeſſilibus. *Hiſpaniola.*

cumanenſis Humb. 49. Sm. foliis oblongis acutis cuſpidatis membranaceo-ſubpellucidis 3nerviis reticulatis, baccis ſcabris acutis rufis. *Cumana. Jamaica.*

ſcabriuscula Humb. 50. Sm. caule ramisque ſcabris, foliis ovato-oblongis ſub-5nerviis acutis glabris. *Hiſpaniol. Amer. auſtr.* (Sm. viſcifolia Mx.)

decipiens * 51. Sm. foliis cordatis acuminatis 9nerviis ſubmembranaceis, floribus ſpicatis androgynis, baccis 6lobis. *Ind. or.*

herbacea 52. Sm. caule herbaceo, foliis ovatis acuminatis 7nerviis, pedunculis compreſſis elongatis, baccis depreſſo-globoſis. *Amer. bor.*

†† *Caule tereti.*

ariſtolochiaefolia W. 53. Sm. foliis auriculato-cordatis lanceolatis acuminatis 9nerviis. *Hiſpaniola.*

peduncularis Mühl. W. 54. Sm. caule herbaceo, foliis cordato-ſubrotundis acuminatis 9nerviis, umbellis longiſſime pedunculatis. *Amer. bor.* (Sm. humilis Mill., pulverulenta Mx.)

globifera Meyer. 55. Sm. caule fruticoſo, foliis oblongo-lanceolatis coriaceis triplinerviis, umbellis capitatis. *Surinam.*

Berterii * 56. Sm. foliis late ovatis oblique acuminatis ſubtriplinerviis venoſo-reticulatis, umbellis ſeſſilibus. *Hiſpaniola.* Bertero.

macrophylla W. 57. Sm. foliis profunde cordatis obtuſis ſub-5nerviis. *Ind. occ.* (Sm. megalophylla Mx.)

Pſeudochina 58. Sm. foliis membranaceis, caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis 5nerviis. *Virgin. Jamaic.* (Sm. canellaefolia Mill.)

glycyphylla Sw. 59. Sm. foliis oblongo-lanceolatis acutis 3nerviis glabris ſubtus glaucis. *Nov. Holl.*

canarienſis W. 60. Sm. foliis ovato-oblongis acuminatis 5nerviis, petiolis dilatatis canaliculatis. *Teneriffa.*

coriacea * 61. Sm. foliis ſubcordato-oblongis acutiuſculis coriaceis ſubtriplinerviis utrinque glabris. *Hiſpaniola.*

elliptica R. Br. 62. Sm. foliis elliptico-ovatis utrinque attenuatis 5nerviis. *Nov. Holl.*

purpurata Forſt. 63. Sm. foliis ovato-oblongis recurvato-acutis 3-5plinerviis ſubtus glaucis coriaceis. *Nov. Caledon.*

obliqua * 64. Sm. caule pubeſcente, foliis oblongis obliquis acutis 5nerviis, ſpicis compoſitis elongatis. *Ind. orient.*

triplinervia Humb. 65. Sm. caule pubeſcente, foliis cordato-lanceolatis acutis triplinerviis nitidis, nervis ſubtus pubeſcentibus. *Ad Orinocum.*

puber Mx. 66. Sm. caule foliisque cordato-oblongis acutis 5nerviis ſubtus pubeſcentibus, baccis oblongis acutis rubris. *Carolina. Georgia.*

mollis Humb. 67. Sm. caule foliisque ſubcordato-oblongis acuminatis 5nerviis ſubtus villoſiuſculis, baccis globoſis. *Mexico.*

tomentoſa Humb. 68. Sm. caule pubeſcente, foliis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis ſupra pubeſcentibus ſubtus ferrugineo-tomentoſis. *Nov. Granat.*

1273. ONCUS Lour.

eſculentus Lour. *Cochinchina.* Frutex ſcandens, foliis cordatis acuminatis, floribus ſpicatis terminalibus.

1274. PELIOSANTHES Andr.

Teta Andr. 1. P. foliis oblongis nervoſo-plicatis ſcapo racemoſo brevioribus, corollae laciniis ſubrotundis marginatis. *Ind. or.*

humilis Sims. 2. P. foliis elliptico-lanceolatis nervoſo-plicatis ſcapo longioribus, corollae laciniis ovato-lanceolatis margine hyalinis. *Peninſ. Malacca.*

1275. JUNCUS.

* *Culmo unifloro.*

magellanicus Lam. 1. J. radice fibroſa, foliis planiuſculis ſubcarinatis culmum angulatum ſuperantibus, flore laterali, capſula ſphaerica, placentis ſuturalibus. *Ad fretum Magellan.* (Roſtcovia ſphaerocarpa Desv.)

grandiflorus Forſt. 2. J. radice repente, culmo aphyllo baſi ſquamato tereti; flore terminali maximo, capſula 3angulari, ſeminibus utrinque appendiculatis. *Ad fre-*

tum Magellan. (Marſippoſpermum calyculatum Desv.)

** *Culmo 2-3floro: ſeminibus utrinque appendiculatis.*

trifidus 3. J. radice repente, culmo filiformi nudiusculo, foliis floralibus ternis canaliculatis elongatis, vaginis ciliato-laceris, floribus ſolitariis vel ternis pedunculatis. *Alp. Europ.*

ſtygius 4. J. culmo filiformi foliato, foliis ſetaceis laxis, floribus ternis bracteas ſubaequantibus, petalis inaequalibus, capſulis pyramidatis flore longioribus. *Scandinavia arctica. Islandia.*

biglumis 5. J. culmo tereti baſi foliato, foliis ſemiteretibus ſubulatis ſtrictis, bracteis binis ſcarioſis, altera flores ſubbinos ſecundos ſuperante, capſula pyramidata obtuſa florem excedente. *Scandinavia. Scotia.*

triglumis 6. J. culmo tereti baſi foliato, foliis ſemiteretibus ſtrictis, floribus ternis quinisve bracteas obtuſiusculas aequantibus, capſula obtuſa florem obtuſiusculum excedente. *Sudetes. Alp. Auſtr. Helvet. et boreal.*

ſubtilis Meyer. 7. J. culmo capillari nodoſo flexuoſo repente foliato, foliis capillaceis ſubnoduloſis vaginantibus, floribus terminalibus ſubternis nutantibus, ſepalis obtuſiusculis. *Fluvii Amer. bor.* (J. fluitans Mx.)

*** *Glomeruli capitati.*

† *Seminibus utrinque appendiculatis.*

caſtaneus Sm. 8. J. culmo tereti foliato, foliis ſtrictis canaliculatis, capitulis binis ſubmultifloris bracteas aequantibus, capſulis prismaticis obtuſis flore longioribus. *Alp. Europ. med. et bor. Sibir.* (J. triceps W. Roſtc.)

Jacquini 9. J. culmo tereti baſi vaginato ſuperne 1folio, folio canaliculato capitulum terminale multiflorum ſuperante, bracteis flore acuto brevioribus, capſula prismatica obtuſa. *Alp. Europ. med.* (J. atratus Lam. biglumis Jacq.)

†† *Seminibus exappendiculatis.*

a. Triandri.

capitatus Weig. 10. J. culmo aphyllo filiformi, foliis radicalibus lineari-ſetaceis, glomerulis paucis ſub-5floris, folio florali filiformi elongato, ſepalis acuminatis capſulam excedentibus. *Europ.* (J. ericetorum Pall., gracilis Roth., mutabilis Cav.)

pygmaeus Thuill. 11. J. culmo filiformi ſuperne diviſo, foliis ſubſetaceis, glomerulis ſub-4floris ternis ſubumbellatis, involucro diphyllo herbaceo elongato, floribus prismaticis capſulam pyramidatam ſuperantibus. *Gallia.* (J. mutabilis Lam.?)

repens Mx. 12. J. culmo repente foliato, foliis linearibus, glomerulis ſubternis ſeſſilibus pedunculatisque paucifloris, ſepalis linearibus elongatis ſubulatis capſula prismatica longioribus, placenta centrali 3alata. *Carolina.* (Cephaloxys flabellata Desv.)

prismatocarpus R. Br. 13. J. culmo compreſſo, foliis alternis verticalibus, glomerulis multifloris cymoſis nudis, capſula prismatica ſepalis ſubulatis longiore. *Nov. Holl.*

planifolius R. Br. 14. J. culmo ſubaphyllo, foliis radicalibus linearibus, glomerulis cymoſis involucratis, capſula triquetra mucronata florem acutum ſubaequante. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

valvatus Link. 15. J. culmo foliato aſcendente, foliis ſubcompreſſis noduloſis, glomerulis multifloris compactis, bracteis ariſtatis, ſepalis ſubulatis rigidis capſulam acutam aequantibus. *Luſitania.* (J. echinuloides Brot.)

polycephalus Mx. 16. J. culmo foliato tereti ſtricto, foliis teretiusculis noduloſis, glomerulis ſubternis pedunculatis 9floris, ſepalis ariſtatis capſulam mucronatam aequantibus. *Amer. bor.* (J. echinatus Mühl.)

uliginoſus Roth. 17. J. culmo filiformi foliato baſi radicante, foliis ſetaceis ſubnoduloſis, glomerulis paucifloris ſubcorymboſis, capſula obtuſa ſepala acuta excedente. *Europ. Amer. bor.* (J. bulboſus L., ſubverticillatus Wulff., verticillatus Perſ., ſtolonifer Wohll., ſupinus Mönch., fluitans Lam., ſetifolius Ehrh.)

marginatus W. Roſtc. 18. J. culmo compreſſo foliato, foliis planiusculis 3nerviis, glomerulis ſub-10floris ſubpaniculatis, ſepalis obtuſis capſulam obovatam aequantibus. *Penſylvan.*

β. Hexandri.

αα. Culmo aphyllo.

filiformis 19. J. culmo filiformi baſi vaginato, glomerulo laterali paucifloro, ſepalis acutis capſulam ſubgloboſam aequantibus. *Europ.*

arcticus W. 20. J. culmo rigido tereti, glomerulo laterali ſubmultifloro, ſepalis lanceolatis capſula obtuſa brevioribus. *Alp. pennin. cott. Lapponia. Island.* (J. Jacquini L. lapp.)

ββ. Foliis teretibus nodoſis.

punctorius Thb. 26. J. culmo elongato rigido foliato, folio florali revoluto, involucris bracteisque ſubſcarioſis, glomerulis ſubmultifloris ſubcorymboſis, ſepalis ſubulatis capſula globoſa longioribus. *C. B. S.*

Holoſchoenus R. Br. 22. J. culmo 1folio tereti, glomerulis multifloris cymoſis, ſepalis acutis capſulam prismaticam aequantibus. *Nov. Holl.*

nodoſus Mühl. 23. J. culmo tereti fiſtuloſo foliato, glomerulis paucis globoſo-capitatis multifloris, ſepalis ſubulatis rigidis capſulam triquetram acuminatam

aequantibus. *Penſylvan. Carolin. Nov. Hiſpan.* (J. Roſtcovii Meyer. ſcirpoides Lam.)

ſtriatus Schousb. 24. J. culmo foliato, vaginis ſtriatis, glomerulis capitatis ſubcymoſis, ſepalis acuminatis capſulam 3quetram acuminatam ſuperantibus. *Numidia.* (J. ſtellatus Desv. in W. herb.)

faſciculatus Schousb. 25. J. culmo ſtriato 1folio foliisque noduloſis compreſſis ſtrictis, glomerulis capitatis, ſepalis ſubulatis capſulam longe excedentibus. *Numidia.*

† *ebracteatus* Meyer. 26. J. culmo filiformi, glomerulis ebracteatis ſubcymoſis, ſepalis cuſpidatis capſula acuminata brevioribus. *Nov. Hiſpan.*

denſiflorus Humb. 27. J. culmo foliato, foliis teretibus noduloſis culmo brevioribus, glomerulis multifloris capitato-congeſtis involucratis, ſepalis acuminato-ſubulatis capſula obovata mucronata longioribus. *Amer. auſtr.* (J. cyperinus W. herb.)

γγ. Foliis planis.

cephalotes Thb. 28. J. culmo tereti aphyllo, foliis radicalibus ſubenſiformibus ſubmarginatis, glomerulis capitatis, bracteis ſepalisque cuſpidatis capſulam ovatam ſuperantibus. *C. B. S.* (J. lomatophyllus *.)

capenſis Thb. 29. J. culmo ſubangulato aphyllo, foliis linearibus canaliculatis, glomerulis ſubcymoſis, ſepalis cuſpidatis capſulam ovatam aequantibus. *C. B. S.* (J. cymoſus Lam.)

**** *Flores cymoſo-paniculati.*

† *Triandri.*

palleſcens Lam. 30. J. culmo foliato, foliis teretiuſculis nodoſis, panicula erecta elongata, pedunculis baſi bracteatis, floribus aggregatis ſeſſilibus, ſepalis acuminatis capſula acuta brevioribus. *Amer. bor.* (J. acuminatis Mx., ſylvaticus Mühl.)

Mühlenbergii * 31. J. culmo foliato foliisque lineari-compreſſis nodoſis, paniculae ramis divaricatis, floribus geminis ſeſſilibus, ſepalis lanceolatis obtuſiuſculis capſula triquetra mucronata brevioribus. *Nov. Caeſar.* (J. n. 16. Mühl.?)

† *biflorus* Ell. 32. J. radice ſubtuberoſa, caule tereti foliato, foliis linearibus planis rigidis, floribus geminis laxe paniculatis, capſula obovata ſepalis lanceolatis breviore. *Carolina auſtr.*

ariſtulatus Mx. 33. J. radice ſubtuberoſa, culmo compreſſo foliato, foliis linearibus ſuperioribus canaliculatis, floribus aggregatis paniculatis, ſepalis ariſtatis capſulam obtuſam aequantibus. *Amer. bor.* (J. ariſtatus Perſ. marginatus Mühl.)

†† *Hexandri.*

α. Culmo aphyllo.

effuſus 34. J. culmo tereti laevi viridi ſtricto farcto, panicula laterali patente, floribus ſub-3andris,

capſula obovata ſepalis acutis breviore. *Europ. Aſia. Amer. bor. et auſtr.* (J. conglomeratus L., glomeratus Thb., bogotenſis Humb. varr.)

glaucus Ehrh. 35. J. culmo tereti ſtriato glauco, disſepimentis medullae transverſis, panicula laterali patente, floribus 6andris, capſula obtuſa mucronata ſepala aequante. *Europ. Aſia. Amer.* (J. diaphramarius Brot.)

balticus Dethard. 36. J. culmo tereti ſtricto rigido, panicula laterali patula ſub-3fida, ſepalis lanceolatis acutis capſulam obtuſam mucronatam ſuperantibus. *Litora maris baltici.* (J. helodes Link.)

compreſſus Humb. 37. J. culmo compreſſo erecto, corymbo laterali, floribus breviter pedicellatis ſubſecundis, ſepalis acuminatis capſulam ſuperantibus. *Nov. Hiſpan.* (J. mexicanus W. herb.)

vaginatus R. Br. 38. J. culmo tereti baſi vaginato, panicula laterali ſubumbellata, umbellis compoſitis, floribus aggregatis, capſula obtuſa ſepala acuta aequantibus. *Nov. Holl.*

pallidus R. Br. 39. J. culmo tereti, panicula laterali, ramis inaequalibus diviſis, ramulis congeſtis, floribus alternis imbricatis, capſulis ovalibus ſepala acuta ſubſuperantibus. *Nov. Holl.*

canarienſis W. herb. 40. J. culmo tereti ſtricto, panicula laterali ſupradecompoſita corymboſa laxa, pedicellis capillaribus, ſepalis acuminatis capſula obovata longioribus. *Inſ. Canar.*

pauciflorus R. Br. 41. J. culmo filiformi baſi vaginato, panicula laterali pauciflora, capſulis obtuſis ſepala acuta excedentibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

† *rubens* Lam. 42. J. culmo tereti baſi vaginato, floribus geminis cymoſis involucratis terminalibus. *Monte Video.*

β. Foliis teretibus.

capillaceus Lam. 43. J. culmo ſtriato ſetaceo 1folio, cyma breviſſima, capſula truncata tuberculata ſepala acuta ſuperante. *Monte Video.*

ſetaceus W. 44. J. culmo filiformi nutante, foliis caulinis ſetaceis laevibus, cyma laterali ſimplici, bracteis ſubternis, ſepalis interioribus obtuſiusculis capſulam obovatam mucronatam ſuperantibus. *Amer. boreal.*

multiflorus Desf. 45. J. culmo tereti foliato ſtricto, foliis compreſſo-teretiusculis, panicula terminali erecta multiflora decompoſita, floribus ſolitariis ſecundis, ſepalis acutis patulis capſulam obtuſam aequantibus. *Afric. bor.*

acutiflorus Ehrh. 46. J. culmo foliato ſubaſcendente, foliis tereti-compreſſis noduloſis ſtrictis, panicula patente decompoſita, floribus ſubaggregatis, ſepalis acutis capſulam aequantibus. *Europ.* (J. articulatus α. L., aquaticus et ſylvaticus Roth., aſcendens Hoſt., atratus Beſſ.)

lampocarpus Ehrh. Dav. 47. J. culmo foliato foliisque noduloſis, panicula decompoſita erecta, floribus aggregatis, capſula

nitida mucronata ſepala interna obtuſiuſcula ſuperantibus. *Europ. prata.* (J. articulatus L.)

obtuſiflorus Ehrh. 48. J. culmo foliato foliisque nodulofis ſtrictis, paniculae decompoſitae ramis divaricatis, floribus aggregatis, ſepalis obtuſis capſulam acutam aequantibus. *Europ.* (J. articulatus *β.* L., retroflexus Rafin.)

fuſco-ater Schreb. 49. J. culmo foliato foliisque tereti-compreſſis nodulofis ſtrictis, panicula erecta patente, ſepalis obtuſis capſula obtuſa mucronata brevioribus. *German. Scotia?* (J. uſtulatus Hopp. polycephalus Hook. ?)

microcephalus Humb. 50. J. culmo foliato, foliis teretibus nodulofis, corymbo terminali involucrato, floribus aggregatis, ſepalis cuſpidatis capſula obtuſa longioribus. *Nov. Granat.* (J. floribundus Kunth. dichotomus W. herb.)

acutus 51. J. culmo foliato, foliis teretibus enodibus floralibus pungentibus, panicula compacta erecta, ſepalis obtuſiuſculis capſula ovata acuta dimidio brevioribus, ſeminibus utrinque appendiculatis. *Anglia. Europ. auſtr. Amer. bor.*

maritimus Lam. 52. J. culmo foliato, foliis teretibus enodibus, floralibus pungentibus, panicula ſupradecompoſita patente erecta, ſepalis acutis capſulam obtuſam mucronatam aequantibus, ſeminibus utrinque appendiculatis. *Anglia. Europ. auſtr. Afric. et Amer. bor.* (J. rigidus Desf.)

γ. Foliis canaliculatis aut planiusculis.

ſquarroſus 53. J. culmo ſtricto ſubangulato aphyllo, foliis radicalibus linearibus anguſtiſſimis ſtrictis, panicula erecta ſimplici, ſepalis acutis capſulam obtuſam aequantibus. *Europ.*

bulboſus 54. J. culmo foliato compreſſo, foliis linearibus canaliculatis, panicula erecta decompoſita, ſepalis obtuſiuſculis capſula oblonga obtuſa brevioribus. *Europ.* (J. compreſſus Jacq.)

botnicus Wahlb. 55. J. culmo foliato tereti, foliis linearibus canaliculatis, panicula erecta decompoſita, ſepalis obtuſiuſculis capſulam oblongam mucronatam aequantibus. *German. Europ. bor. ſalſa loca.* (J. coenoſus Bicheno.)

Tenageia Ehrh. 56. J. annuus, culmo ſubramoſo foliato gracili, foliis anguſtiſſimis planiuſculis abbreviatis, paniculae ramis elongatis, floribus remotis, ſepalis ovatis acutis capſulam ſubgloboſam aequantibus. *Europ. med. et bor.*

gracilis R. Br. 57. J. culmo repente gracili foliato, foliis ſubſetaceis, umbella ſimpliciuſcula terminali, floribus aggregatis. *Nov. Holl.*

revolutus R. Br. 58. J. radice repente, culmo compreſſiuſculo baſi foliato, foliis anguſtiſſimis margine revolutis, corymbo terminali paucifloro, ſepalis acutis capſulam depreſſam oblongam aequantibus. *Terra Diemen.*

bufonius 59. J. annuus, culmo fubramofo, foliis linearibus canaliculatis, panicula dichotoma decompofita, floribus folitariis, fepalis acuminatis capfulam obtufam fuperantibus. *Per omnem terrarum orbem.* (J. parviflorus Poir., prolifer Kunth., plebejus R. Br.)

foliofus Desf. 60. J. culmo ramofo foliofo, foliis linearibus canaliculatis, panicula erecta, floribus folitariis, fepalis fubulatis. *Numidia.*

tenuis W. 61. J. culmo teretiusculo foliofo, foliis linearibus canaliculatis, floralibus elongatis, corymbo terminali compofito, fepalis acuminatis 2nerviis capfulam obtufam fuperantibus. *Amer. bor. et auftr.* (J. 2cornis Mx. dichotomus Ell. ariftatus Link.)

Gesneri Sm. 62. J. culmo fuperne 3gono, foliis linearibus canaliculatis, panicula racemofa foliis floralibus breviore, fepalis lanceolatis 3nerviis capfulam ovalem excedentibus. *Scotia.* (J. gracilis Engl. bot. tenuis Hook.)

platycaulos Kunth. 63. J. culmo compreffo foliato, foliis canaliculatis, cyma terminali congefta involucrata, fepalis acuminatis capfulam obtufam fuperantibus. *Amer. auftr.* Humb. (J. coarctatus W. herb.)

xiphioides E. Meyer. 64. J. caule ancipiti foliato nodofo, foliis enfiformibus vaginantibus, panicula fupradecompofita, floribus aggregatis bracteatis, fepalis acuminatis capfulam acutam aequantibus. *Nov. Hifpan.* Hänke. *Inf. Aleut.* (J. enfifolius Wikftröm. iridifolius W. herb.)

ferratus Thb. 65. J. culmo 3gono craffo foliato, foliis enfiformibus ferratis, panicula fupradecompofita erecta, ampliffima, vaginis perfoliatis, capfulae 3quetro-depreffae fepalis multo brevioris disfepimentis verfus ambitum duplicatis. *C. B. S.* (Acorus Palmita Lichtenft.)

1276. LUZULA Cand.

* *Floribus corymbofis, pedunculis fubunifloris.*

vernalis Cand. 1. L. foliis lanceolatis pilofis, corymbo fubfimplici, pedunculis 1floris nutantibus, fepalis acutis capfula obtufa brevioribus. *Europ.* (Juncus pilofus L., luzulinus Vill., vernalis Hofm.)

flavefcens Gaud. 2. L. foliis lineari-lanceolatis fubpilofis, corymbo erecto fubcompofito, pedunculis lateralibus nutantibus, capfula acuminata fepala acuta aequante. *Europ. med. fubalpina.* (Juncus flavefcens Hoft. L. Hoftii Desv.)

Forfteri Cand. 3. L. foliis linearibus fubpilofis, corymbo compofito, pedunculis omnibus erectis, fepalis acuminatis capfula depreffa mucronata longioribus. *Anglia. Gallia. Helvetia.* (Juncus Forfteri Sm.)

parviflora Desv. 4. L. foliis lanceolatis culmoque glaberrimis, vaginarum oris pilofiusculis, paniculae cymofae

decompositae ramis capillaribus inaequalibus, capsulis oblongis sepala acuta aequantibus. *Suecia bor. Sibir.* (J. parviflorus Ehrh. Retz.)

glabrata Desv. 5. L. foliis lanceolatis submarginatis culmoque glaberrimis, corymbo composito divaricato, bracteis scariosis ciliatis, capsula inclusa. *Alp. noric. rhaet. et dinar.* (Juncus glabratus Hopp. intermedius Host.)

gigantea Desv. 6. L. foliis lanceolatis acuminatis margine scabris, paniculae secundae ramis dichotomis nutantibus, bracteis ciliatis, sepalis cuspidatis capsula mucronata longioribus. *Nov. Granat.*

melanocarpa Desv. 7. L. foliis lanceolatis glabris, corymbi decompositi pedunculis elongatis subtrifloris, sepalis ovatis capsula nitida obtusa brevioribus. *Canada.* (Juncus melanocarpus Mx.)

† *juncoides* Poir. 8. L. culmo rigido, foliis lanceolatis glabris basi subbulbosis, corymbo decomposito, pedunculis sub-1floris, floribus acutiusculis 3andris. *Carolina.* Bosc.

** *Corymbo paniculato, floribus congestis.*

albida Cand. 9. L. foliis lineari-lanceolatis margine vaginarumque oris pilosis, corymbo patulo foliis summis breviori, pedunculis sub-4floris, sepalis lanceolatis capsula longioribus. *Europ. sylvae.* (Juncus pilosus ε. L., albidus Hofm., niveus Leers, nemorosus Poll., leucophobus Ehrh., luzuloides Lam.)

lutea Cand. 10. L. foliis lanceolatis rigidis glabris, summis abbreviatis, corymbo conferto, pedunculis 4floris, bracteis glaberrimis, sepalis obtusis mucronatis capsula longioribus. *Alp. rhaet. pennin. Montes Gebennici et Pyren.* (Juncus luteus All. Vill. campestris ε. L.)

spadicea Cand. 11. L. foliis lineari-lanceolatis elongatis margine vaginarumque oris pilosiusculis, corymbi pedunculis divaricatis 4floris, bracteis ciliatis, sepalis mucronatis capsula obtusa subbrevioribus. *Alp. graj. pennin. cott. jul. rhaet. noric. et dinar.* (Juncus spadiceus All. Vill., pilosus β. L.)

brevifolia Desv. 12. L. foliis linearibus canaliculatis pilosis, summis abbreviatis, corymbo conferto, pedunculis sub-10floris, sepalis obtusiusculis. *Lusitan.* (Juncus brevifolius et lacteus Link., stoechadanthus Brot.)

nivea Cand. 13. L. foliis lineari-lanceolatis hirsutis, floralibus elongatis angustissimis, corymbo erecto, bracteis ciliatis, sepalis lanceolatis, internis longioribus capsulam mucronatam longe superantibus. *Alp. Europ. med.* (Juncus niveus L.)

maxima Cand. 14. L. foliis lato-lanceolatis margine pilosis, summis abbreviatis obtusiusculis, corymbi supradecompositi pedunculis flaccidis divaricatis 3floris, sepalis aristatis capsulam acutam aequantibus. *Europ. med. et bor. subalpina.* (Juncus maximus

Retz., ſylvaticus Curt., montanus α. Lam., piloſus δ. L.)

paniculata Desv. 15. L. foliis latiſſimis, panicula erecta elongata, bracteis foliaceis, pedunculis ſub-4floris. *Amer. auſtr.*

arcuata Sw. 16. L. foliis linearibus canaliculatis glabris, vaginis barbatis, corymbi ſimpliciusculi pedunculis recurvis ſub-4floris, bracteis fimbriatis, ſepalis acuminatis capſula oblonga longioribus. *Lappon. Scotia.* (Juncus arcuatus Wahlb.)

anguſtifolia Poir. 17. L. foliis anguſtiſſimis glaberrimis, corymbi ſimpliciusculi pedunculis erectis 3floris, bracteis ſetaceis, ſepalis obtuſis capſulam ſubaequantibus. *Carolin.* Boſc.

† *canarienſis* Poir. 18. L. foliis lato-lanceolatis glabris, vaginarum ore piloſo, corymbo glomerato, ſepalis acuminatis lucidis aequalibus. *Inſ. Canar.* Brouſſonet.

*** *Floribus ſubſpicato-glomeratis.*

ſpicata Cand. 19. L. foliis linearibus glabriusculis, vaginarum ore piloſo, ſpica glomerato-racemoſa baſi diviſa nutante, bracteis ariſtatis prominulis, capſula obtuſiſſima ſepala mucronata aequante. *Alp. Europ. med.* (Juncus ſpicatus All.)

pediformis Cand. 20. L. foliis linearibus carinatis ſupra piloſis, ſpica racemoſa flexuoſa cernua, bracteis acutis flores aequantibus, ſepalis acuminatis capſulam acutam ſuperantibus. *Alp. Vocontior. graj.* (Juncus pediformis Vill.)

congeſta Lejeun. 21. L. foliis linearibus piloſis, ſpicis glomerato-capitatis, ſepalis cuſpidatis capſulam obtuſam ſuperantibus. *Slesvic. Gallia.* (Juncus congeſtus Thuill.)

ſudetica Cand. 22. L. foliis linearibus margine piloſiusculis, glomerulis racemoſo-ſpicatis nutantibus, bracteis elongatis, ſepalis mucronatis capſulam aequantibus. *Sudet. Alp. noric.* (L. nigricans Desv. Juncus ſudeticus W.)

nivalis Laeſtad. 23. L. radice fibroſa, foliis linearibus glabris, ſpicis ſubracemoſo-glomeratis abbreviatis, bracteis fimbriato-ciliatis, capſula obtuſiſſima ſepala acuta ſubſuperante. *Lappon.*

triſtachya Desv. 24. L. foliis linearibus abbreviatis piloſis, ſpicis ſubternis congeſtis folium florale ſubaequantibus, capſulis obtuſis gibboſis ſepala acuta aequantibus. *Amer. auſtr.*

peruviana Desv. 25. L. foliis linearibus tomentoſis rigidis, ſpicis capitatis, ſepalis mucronatis capſula longioribus. *Peru.*

Alopecurus Desv. 26. L. foliis vaginisque margine lanatis, ſpicis glomeratis alternis remotiusculis, ſepalis cuſpidatis ciliatis capſula obtuſa longioribus. *Quito. Mexico.*

campeſtris Cand. 27. L. radice repente, foliis lineari-lanceolatis piloſis, ſpicis umbellatis pedunculatis, intermedia ſeſſili, ſepalis acuminatis capſula mucronata fuſca

longioribus. *Europ. omnis. Amer. bor.* (Juncus campeſtris L., erectus Perſ., nemoroſus Hoſt, intermedius Thuill. L. erecta Desv.)

multiflora Lejeun. 28. L. radice fibroſa, culmo foliato compreſſo, foliis linearibus piloſis, ſpicis umbellatis baſi foliatis, capſulis pallidis obtuſis ſepala cuſpidata ſuperantibus. *Gallia. German. Suecia.* (Juncus multiflorus Hofm., palleſcens Wahlb., campeſtris β. L.)

racemoſa Desv. 29. L. foliis linearibus piloſis elongatis, ſpicis compoſitis pedunculatis, ſepalis acutis capſula longioribus. *Amer. auſtr.*

interrupta Desv. 30. L. foliis lanceolatis piloſis, ſpicis compoſitis, media pedunculata, glomerulis remotiuſculis, bracteis ciliatis, ſepalis acutis capſula longioribus. *Amer. auſtr.*

1277. APHYLLANTHES.

monspelienſis *Gallia provinc. et narbon.* Planta facie Dianthi proliferi, caule aphyllo, floribus coeruleis bracteatis.

1278. DASYPOGON R. Br.

bromelifolius R. Br. *Nov. Holl.* Planta ſuffruticoſa ſimpliciſſima piloſa, foliis gramineis, floribus capitatis bracteatis.

1279. CALECTASIA R. Br.

cyanea R. Br. *Nov. Holl.* Fruticulus ramoſiſſimus foliis aceroſis confertis veſtitus, floribus ſolitariis terminalibus azureis.

1280. BAMBUSA Schreb.

arundinacea W. 1. B. culmo inermi glabro, foliis late lanceolatis, paniculae ramoſae ſpiculis ſeſſilibus alternis lanceolatis ſub-6floris, valvis intus lanato-ciliatis. *Ind. or.* (Arundo Bambos L. ſp.)

ſpinoſa Hamilt. 2. B. culmo ſpinoſo, vaginis petiolaribus hiſpidis, paniculae laxae ramis pendulis, ſpiculis confertis diſtichis. *Inſ. Molucc. Ceylon.* (Arundo Bambos Burm. ind., A. agreſtis Lour.)

ſtricta Roxb. 3. B. culmi articulis ſubſpinoſis, foliis lanceolatis ſcabris, paniculae ramoſae ſpiculis verticillatis ſub-5floris. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (Arundo multiplex Lour. B. verticillata W.)

1281. NASTUS Juſſ.

**Floribus hexandris.*

*Thouarſii** 1. N. culmo ramoſiſſimo, paniculae erectae ſpiculis ſeſſilibus ſubternis, valvis ſterilibus ovatis, ſtylo 2partito. *Madagaſcar.*

borbonica Kunth. 2. N. culmi ramis verticillatis, ſpiculis paniculatis, floſculo ſterili pedicellato, ſtylo 3partito. *Inſ. Maſcaren.* (Bambuſa alpina Bory. Stemmatoſpermum verticillatum P. B.)

*Guadua** 3. N. foliis linearibus margine ſubtusque ſcabris, ſpicis depauperatis longe pedunculatis, ſpiculis cylindricis ſubarcuatis multifloris, ſtylo 3partito. *Quito. Nov. Granat.* (Bambuſa Guadua Humb.)

*latifolia** 4. N. foliis oblongo-linearibus glaberrimis, ſpiculis ſubfaſciculatis cylindricis ſubarcuatis multifloris, ſtylo 3partito. *Ad Orinocum.* (Bambuſa latifolia Humb.)

***Floribus triandris.*

Chuſque Humb. Kunth. 5. N. culmo ſcandente altiſſimo, ramis faſciculatis, foliis lanceolatis cuſpidatis, ſpiculis paniculatis unifloris, ſtylo 2partito. *Quito. Nov. Granat.*

1282. MELOCANNA Trin.

humilis Trin. 1. M. foliis glaucis ſubtus lanatis, fructibus apice comoſis. *Amboina.* (Arundo Fax Lour.)

bambuſoides Trin. 2. M. culmo celſiſſimo ſimplici, foliis glabris, fructibus apice nudis. *Inſ. Molucc. Ind. trans Gangem.* (Bambuſa baccifera Roxb. Arundo maxima Lour.)

1283. GAHNIA Forſt.

procera Forſt. 1. G. culmo tereti, foliis linearibus ſubulatis, panicula erecta elongata, ſtigmatibus ternis 2fidis. *Nov. Zeeland.*

ſchoenoides Forſt. 2. G. culmo flexuoſo, panicula erecta, ſpiculis ſubſolitariis. *Inſ. ſociet.*

Pſittacorum Labill. 3. G. culmo tereti ſtricto, foliis linearibus ſubulatis elongatis margine ſcaberrimis, panicula decompoſita foliata, ſpiculis confertis baſi attenuatis, ſquamis vacuis acutis, nucibus nitidis mucronatis. *Terra Diemen. Nov. Holl.* (G. erythrocarpa R. Br.)

leucocarpa R. Br. 4. G. panicula decompoſita, ſpiculis baſi attenuatis, ſquamis obtuſiuſculis, nucibus opacis apice mucronatis ſphacelatis. *Nov. Holl.*

trifida Labill. 5. G. foliis linearibus ſubulatis elongatis, paniculae elongatae ramis appreſſis, ſpiculis capitato-congeſtis, ſquamis cuſpidatis, ſtigmatibus ſimplicibus. *Terra Diemen.* (Lampocarya hexandra R. Br.)

*aſpera** 6. G. ſpica compoſita foliata, ſpiculis congeſtis, floribus 4andris, ſquamis intimis obtuſis. *Nov. Holl.* (Lampocarya aſpera R. Br.)

melanocarpa R. Br. 7. G. panicula ſubcoarctata compoſita, floribus 3andris, ſtigmatibus indiviſis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

1284. PHARUS.

latifolius 1. Ph. foliis longiſſime petiolatis obovato-oblongis acutis glabris, panicula patula, valvis laevibus. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Ph. glaber Humb.)

*pubeſcens** 2. Ph. foliis petiolatis lanceolatis ſubtus ſcabris, paniculae ramis erectis, valvis ſtriatis, germine pubeſcente. *Braſil. Nov. Granat.* (Ph. ſcaber Kunth. lappulaceus Aubl.)

*Bankſii** 3. Ph. foliis lanceolato-enſiformibus, paniculae rarae ramis ſtrictis, rhachi valvisque ſtriatis pubeſcentibus inaequalibus. *Nov. Holl.* (Leptaſpis R. Br.)

1285. EHRHARTA Thunb.

* *Muticae.*

mnemateia Thunb. 1. E. culmo ſimplici, foliis enſiformibus margine cartilagineo-crenulatis, valvis corollae exterioris rugoſis obtuſis. *C. B. S.* (E. capenſis Th., cartilaginea Sm., nutans Lam.)

panicea Sm. 2. E. culmo ſubramoſo, foliis lanceolato-linearibus margine ſcabro-ciliatis, valvis corollae ext. obtuſis glabris, altera ruguloſa. *C. B. S.* (E. erecta Lam.)

ramoſa Sw. 3. E. culmo ramoſiſſimo ſuffruteſcente, foliis linearibus glabris, panicula coarctata, valvis cor. ext. retuſis ſcabris calyce vix longioribus. *Afric. auſtr.* (E. 2gyna et Melica ramoſa Thunb.)

melicoides Sw. 4. E. culmo ſimplici glabro, foliis linearibus margine ſcabris, panicula patentiſſima, valvis cor. ext. oblongis obtuſis glaberrimis. *C. B. S.* (Melica capenſis Thunb.)

calycina Sm. 5. E. culmo ſubramoſo glabro, foliis linearibus margine ſcabris, panicula coarctata ſimpliciuscula, valvis cor. ext. piloſiusculis retuſis mucronatis. *C. B. S.* (Aira capenſis L. ſuppl.)

diſtichophylla Labill. 6. E. culmo ramoſo foliisque diſtichis linearibus villoſiusculis, floribus racemoſo-ſpicatis 4andris, valvis cor. ext. ſtriatis piloſiusculis. *Terra Diemen.* (Tetrarrhena R. Br.)

*acuminata** 7. E. culmo ramoſo, foliis vaginisque glabris, floribus 4andris, valvis cor. ext. ſtriatis acutis. *Terra Diemen.* (Tetrarrhena R. Br.)

*juncea** 8. E. culmo ramoſo foliisque ſtrictis glabris, floribus imbricatis 4andris, valvis cor. ext. obtuſis laevibus. *Nov. Holl.* (Tetrarrhena R. Br.)

*laevis** 9. E. culmo ſimplici, foliis glabris laxis, floribus racemoſo-ſpicatis 4andris, valvis cor. ext. obtuſis laevibus. *Nov. Holl.* (Tetrarrhena R. Br.)

** *Ariſtatae.*

geniculata Sw. 10. E. culmo decumbente geniculato, foliis linearibus ſubundulatis, panicula coarctata, valvis cor. ext. hirſutis, altera breviter ariſtata. *C. B. S.* (Melica geniculata Thunb.)

longiflora Sm. 11. E. culmo erecto ſimplici glabro, foliis late lanceolatis margine ſcabris, panicula laxiuscula, valvis cor. ext. rugoſis hiſpidis ariſtatis. *C. B. S.* (E. ariſtata Thunb.)

gigantea Ehrh. 12. E. culmo ſublignoſo elato, foliis lineari-ſubulatis rigidis, panicula coarctata, valvis cor. ext. hirſutis ariſtatis. *C. B. S.* (Melica gigantea Thunb. Aira villoſa L. ſuppl.)

bulboſa Sm. 13. E. radice bulboſa, culmo erecto, foliis lanceolato-linearibus, panicula ſimplici laxa, floribus 3andris, valvis cor. ext. obovatis breviter ariſtatis rugoſis villoſis. *C. B. S.* (Trochera ſtriata Rich.)

ſtipoides Labill. 14. E. culmo ſimplici, foliis anguſtiſſimis glabris, panicula elongata ſubcontracta, floribus 4andris, calyce minuto, corollis pedicellatis, exteriore elongata longe ariſtata. *Terra Diemen. Nov. Holl.* (Microlaena R. Br.)

1286. URANIA Schreb.

ſpecioſa W. *Madagaſcar.* Arbor facie Muſae altiſſima, trunco ſimplici, foliis diſtichis longe petiolatis orgyalibus, ſpadice axillari foliis breviori. (Ravenala madagaſcarenſis Sonner.)

1287. TRADESCANTIA.

* *Pedunculis unifloris.*

fuſcata Ker. 1. Tr. acaulis ferrugineo-hirſuta, foliis ellipticis acutiusculis, pedunculo radicali ſub-1floro. *Braſil.*

malabarica 2. Tr. erecta laevis, pedunculis ſolitariis longiſſimis. *Malabar.*

** *Floribus ſubſeſſilibus glomeratis involucratis.*

tuberoſa Roxb. 3. Tr. caule procumbente radicante, foliis lanceolato-linearibus ciliatis, vaginis bulbi-floriferis, floribus glomeratis, ſolitario ſterili pedunculato. *Ind. or.*

axillaris 4. Tr. caule procumbente radicante, foliis lanceolato-linearibus, vaginis ſpathisque imbricatis ciliatis, floribus ſeſſilibus. *Ind. or.*

ſpecioſa L. ſuppl. 5. Tr. caule erecto flexuoſo, foliis lanceolatis abbreviatis margine carinaque villoſis, floribus axillaribus glomeratis. *C. B. S. Mexico.* (Tr. nodiflora Lam. Commelina Thunb.)

discolor Ait. 6. Tr. fubacaulis glaberrima, foliis lato-lanceolatis fubtus purpureis, bracteis fpathaceis equitantibus, floribus fubpedicellatis glomeratis. *Amer. tropic.*

papilionacea 7. Tr. caule radicante, foliis lineari-lanceolatis fubtus pilofis, fpathis 3phyllis imbricatis. *Ind. or.*

criftata 8. Tr. caule diffufo repente, foliis lanceolatis vaginisque laevibus, fpathis 2phyllis imbricatis. *Ind. or.*

vaga Lour. 9. Tr. caule procumbente hirfuto, foliis oblongis acutis pilofis, fpathis 2phyllis imbricatis. *China auftr.*

*villofa** 10. Tr. tota villofa, caule erecto, foliis lanceolatis mucronatis, pedunculis communibus aggregatis, fpathis imbricatis. *Patria?*

*** *Pedunculis racemofo-umbellatis.*

cordifolia Sw. 11. Tr. caule repente ramofo, foliis fubfeffilibus cordato-ovatis reticulato-venofis, pedunculis folitariis multifloris, filamentis glabris. *Jamaica.*

erecta Cav. 12. Tr. caule erecto glabro, foliis ovatis planis vaginisque laevibus, pedunculo terminali 2fido racemofo. *Mexico.* (Tr. bifida Roth.)

undata Humb. 13. Tr. caule erecto hinc pilofo, foliis ovatis undulatis fupra pilofo-fcabris, vaginis ciliatis, pedunculo terminali 2fido racemofo. *Cumana.*

diuretica Mart. 14. Tr. caule erecto glabro, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ferrulato-ciliatis fubtus pubefcentibus, vaginis ventricofis hirfutis longe ciliatis, pedunculis geminis terminalibus umbelliferis. *Brafil. Nov. Granat.* (Tr. hirfuta Kunth.)

fubafpera Ker. 15. Tr. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis recurvis undulatis villofiusculis, racemis feffilibus fubumbellatis. *Amer. bor.*

pulchella Humb. 16. Tr. caule procumbente ramofo foliisque ovato-oblongis acuminatis ferrulatis glabris, vaginis laxis, pedunculis geminis umbelliferis. *Mexico.*

debilis Humb. 17. Tr. caule fimpliciusculo glabro, foliis ovato-oblongis acutis nervofis vaginisque ciliatis, pedunculis glabris geminis umbelliferis, calyce apice pilofo. *Quito.*

gracilis Humb. 18. Tr. caule procumbente ramofo glabro, foliis ovatis acutis nervofis vaginisque ciliatis, pedunculis pubefcentibus fubquaternis umbelliferis, calyce colorato pilofiusculo. *Quito.*

craffifolia Cav. 19. Tr. caule erectiusculo ramofo, foliis ovato-oblongis acutis fubtus margineque lanatis, pedunculis geminis umbelliferis, calyce lanato. *Nov. Hifpan.*

elongata Meyer. 20. Tr. caule procumbente radicante, foliis lanceolatis glabris, umbellis terminalibus axillaribusque fubfeffilibus compofitis. *Guiana.*

virginica 21. Tr. caule erecto ramofo, foliis lanceolatis glabris, floribus umbellato-congeftis terminalibus, pedunculis calycibusque pilofiusculis. *Virgin. Carolina.*

roſea Mx. 22. Tr. caule erecto, foliis linearibus glabris, floribus umbellato-congeſtis terminalibus, pedunculis calycibusque glabris. *Carolina.*

monandra Sw. 23. Tr. caule radicante aſcendente, foliis ovatis acutis glaberrimis, pedunculis axillaribus laxis umbelliferis, floribus monandris. *Hiſpaniola.*

multiflora Sw. 24. Tr. caule erecto ramoſo, foliis cordato-ovatis acutis vaginisque ciliatis, pedunculis axillaribus umbelliferis hirſutis, floribus 3andris. *Jamaica.*

procumbens W. 25. Tr. caule procumbente radicante, foliis ovatis baſi ciliatis, pedunculis axillaribus cymoſis, floribus 6andris, filamentis inaequalibus, longioribus barbatis. *Caracas.* (Tr. multiflora Jacqu.)

parviflora R. et P. 26. Tr. caule erecto, foliis breviſſime petiolatis ovato-oblongis nitidis ciliatis, floralibus cordatis, pedunculis umbelliferis axillaribus. *Peru.*

latifolia R. et P. 27. Tr. caule ſimplici erecto hinc piloſo, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, pedunculis terminalibus umbelliferis villoſis, calycibus glanduloſo-viſcoſis. *Peru.*

**** *Floribus paniculatis.*

divaricata Vahl. 28. Tr. caule ramoſo, ramis divaricatis, foliis ovato-lanceolatis, vaginis barbatis, floribus terminalibus paniculatis, filamentis breviſſimis glabris. *Guiana. Inſ. Trinit.* (Commelina hexandra Aubl.)

geniculata 29. Tr. caule repente hirſuto, foliis ovatis acutis amplexicaulibus nervoſis villoſis, floribus paniculatis, petalis crenatis. *Amer. tropic.*

paniculata Roxb. 30. Tr. caule aſcendente, foliis lanceolatis, panicula terminali piloſa, petalo inferiori anguſtiori. *Ind. or.*

1288. CAMPELIA Rich.

Zanonia Rich. *Amer. tropic.* Herba erecta cubitalis, foliis lato-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis lateralibus multifloris bracteatis, floribus albis. (Commelina Zanonia L. Tradeſcantia Sw.)

1289. DICHORISANDRA Mik.

* *Floribus 6andris.*

thyrſiflora Mik. 1. D. racemi terminalis pyramidalis pedunculis glabris unifloris, foliis oblongis, vaginis glabris. *Braſil.*

gracilis Mart. 2. D. racemi terminalis pedunculis villoſis faſciculatis, foliis lineari-lanceolatis ciliatis, vaginis hirſutiusculis. *Braſil.*

** *Floribus 5andris.*

radicalis Mart. 3. D. racemis ſubradicalibus aphyllis hirſutis, foliis ellipticis acuminatis pubeſcentibus. *Braſil.*

puberula Mart. 4. D. racemo terminali pubescente, pedunculis abbreviatis, foliis lanceolatis acuminatis supra villosis. *Brasil.*

1290. ORONTIUM.

aquaticum *Amer. bor. aestuaria.* Planta foliis petiolatis ellipticis nervoso-plicatis, spadice nudo longe pedunculato, floribus summis 4fidis.

1291. ROHDEA Roth.

japonica Roth. *Japon. China. Cochinchina.* Planta foliis sessilibus ensiformibus carinatis nervosis, spadice breviter pedunculato basi spatha 2phylla subtento foliis breviori. (Orontium japonicum Thunb., cochinchinense Lour.)

1292. TUPISTRA Ker.

squalida Ker. *Amboina.* Herba foliis lanceolatis elongatis nervosis undulatis, scapo spicifero bracteato foliis breviori, floribus lurido-caesiis.

1293. ACORUS.

Calamus 1. A. foliis lanceolato-linearibus, scapi foliacei apice longissimo. *Europ. Asia.*

gramineus Ait. 2. A. foliis linearibus, scapi foliacei apice subelongato. *China.*

† *terrestris** 3. A. foliis ensiformibus abbreviatis, scapi foliacei apice vix elongato. *Cochinchina.* (A. Calamus Lour.)

1294. TACCA Forst.

pinnatifida Forst. 1. T. foliis ternato-decompositis, foliolis pinnatifidis inaequaliter sinuatis acutis. *Ins. Molucc.* et *oceani pacifici.* (Leontice Leontopetaloides L.)

integrifolia Ker. 2. T. foliis ovato-lanceolatis petiolatis nervosis. *Ind. or.*

1295. BERBERIS.

** Floribus racemosis.*

† Foliis simplicibus.

a. Spinis 3partitis.

vulgaris 1. B. racemis pendulis multifloris, petalis integerrimis, foliis obovatis serrato-ciliatis. *Europ. Asia med.*

emarginata W. 2. B. racemis cernuis paucifloris, petalis emarginatis, foliis lanceolato-obovatis ciliato-serratis. *Sibir.*

canadensis Mill. 3. B. racemis corymbosis recurvis, sepalis inaequalibus, petalis emarginato-2fidis, foliis obovatis remote serratis. *Amer. bor.*

Chitria Hamilt. 4. B. racemis compositis pendulis, petalis emarginatis, foliis oblongis mucronatis serrato-spinulosis. *Nepal.* (B. aristata Cand.)

cretica 5. B. pedunculis sub-3floris subracemosis abbreviatis, foliis obovatis integerrimis, spinis validis folia excedentibus. *Creta. Asia minor.*

Thunbergii Cand. 6. B. racemis paucifloris corymbosis folio brevioribus, spinis superioribus simplicibus, foliis obovatis mucronatis integerrimis. *Japon.* (B. cretica Thunb.)

glauca Cand. 7. B. racemis compositis multifloris erectis, foliis obovatis subintegerrimis subtus albido-glaucis. *Nov. Granat.* Humb.

monosperma R. et P. 8. B. racemis multifloris nutantibus, baccis 1spermis, foliis obovatis mucronatis, inferioribus dentato-spinosis. *Peru.*

latifolia R. et P. 9. B. pedunculis 3-6floris folio brevioribus, foliis obovatis mucronatis integerrimis subtus pallidis. *Peru.*

flexuosa R. et P. 10. B. racemis aggregatis inaequalibus paucifloris, foliis obovatis mucronatis glaucis integerrimis. *Peru.*

rigidifolia Kunth. 11. B. racemis paucifloris folia aequantibus, foliis oblongis spinoso-mucronatis subdentatis rigidis. *Amer. austr.*

ruscifolia Lam. 12. B. pedunculis brevibus 4-5floris, foliis oblongis basi attenuatis mucronatis subdentato-spinosis. *Buenos Ayres.*

paniculata Juss. 13. B. racemis compositis erectis, foliis lanceolatis mucronatis subdentato-spinulosis. *Peru.*

asiatica Roxb. 14. B. racemis brevibus multifloris corymbosis, baccis globosis, foliis ovalibus mucronatis subtus glaucis subdentato-spinosis. *Ind. or. Nepal.*

ilicifolia Forst. 15. B. racemis paucifloris corymbosis, baccis ovatis, foliis obovatis coriaceis spinoso-dentatis. *Terra ignis.* (B. lagenaria Poir.)

β. Spinis simplicibus aut subnullis.

crataegina Cand. 16. B. racemis multifloris confertis abbreviatis, spinis simplicibus, foliis oblongis mucronatis reticulato-venosis subserratis. *Asia minor.*

chinensis Desf. 17. B. racemis subsimplicibus multifloris nutantibus, spinis subsimplicibus, foliis oblongis obtusis subdentatis. *China bor.*

*japonica** 18. B. racemis terminalibus multifloris, spinis nullis, foliis ovatis acuminatis dentato-spinosis. *Japon.* (Ilex japonica Thunb. Mahonia Cand.)

quindiensis Kunth. 19. B. racemis erectis pubescentibus multifloris elongatis, spinis nullis, foliis oblongis mucronatis spinuloso-dentatis. *Amer. austr.*

†† *Foliis pinnatis: filamentis subbidentatis.*

fasciculata Sims. 20. B. racemis terminalibus aggregatis erectis, sepalis inaequalibus, internis coloratis petala superantibus, foliis sub-5jugis oblongis cuspidatis sinuato-spinosis. *Nov. Hispan.* (B. pinnata Lag. Mahonia fasciculatis Cand.)

Aquifolium Pursh. 21. B. racemis paniculato-congestis, petalis 2fidis, ramis sarmentosis procumbentibus, foliis 3jugis ovato-oblongis basi oblique truncatis repando-dentatis coriaceis venosis. *Amer. bor. occid.* (Mahonia Nutt.)

nervosa Pursh. 22. B. racemis paniculato-cymosis, petalis integerrimis, foliis 6jugis ovato-oblongis sub-5nerviis repando-serratis. *Amer. bor. occid.* (Mahonia Nutt.)

*glumacea** 23. B. racemis subsolitariis elongatis gracilibus, bracteis obtusis persistentibus, foliis sub-7jugis oblongo-lanceolatis repando-dentatis. *Amer. bor. occid.* (Mahonia Cand.)

*nepalensis** 24. B. racemis aggregatis elongatis gracilibus, bracteis pedicellos aequantibus, foliis 6jugis breviter petiolatis ovato-lanceolatis 5nerviis repando-dentatis. *Nepal.* (Mahonia napaulensis Cand.)

** *Pedunculis unifloris.*

† *Spinis tripartitis.*

sibirica Pall. 25. B. pedunculis folio brevioribus, foliis spathulatis ciliato-serratis. *Sibir.*

heterophylla Poir. 26. B. pedunculis folium aequantibus cernuis, foliis junioribus integerrimis, adultioribus 3cuspidatis, filamentis utrinque 2dentatis. *Ad fretum Magellan.* (B. cuneata Cand.)

empetrifolia Lam. 27. B. pedunculis cernuis elongatis, foliis linearibus mucronatis integerrimis revolutis. *Ad fretum Magellan.*

buxifolia Lam. 28. B. pedunculis subternis folio longioribus, foliis obovato-lanceolatis mucronatis subintegerrimis. *Patagonia. Magellan. Terra ignis.* (B. microphylla Forst.)

Wallichiana Cand. 29. B. pedunculis aggregatis, foliis oblongis utrinque attenuatis rigidis glaberrimis ciliato-serratis. *Nepal.*

†† *Spinis nullis.*

lutea R. et P. 30. B. pedunculis aggregatis folium aequantibus, ramulis pubescentibus, foliis obovatis mucronatis dentato-spinulosis. *Quito.* (B. conferta Kunth.)

inermis Pers. 31. B pedunculis solitariis elongatis, foliis ellipticis integerrimis glabris. *Ad fretum Magellan.*

virgata R. et P. 32. B. pedunculis solitariis folia subaequantibus, floribus 5andris, spinis obsoletis, foliis obovatis coriaceis subspinosis. *Peru.*

tomentosa R. et P. 33. B. pedunculis subgeminis nutantibus, ramis glabris, foliis ovalibus subtus tomentosis subintegerrimis. *Chili.*

1296. NANDINA Thunb.

domestica Thunb. *Japon. China.* Frutex suborgyalis, foliis decompositis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis glabris, floribus paniculatis albis.

1297. LEONTICE.

Chrysogonum 1. L. foliis radicalibus pinnatis, foliolis verticillatis cuneiformibus sub-3fidis, scapo paniculato. *Graecia. Asia minor.*

Leontopetalum 2. L. foliis sub-2ternatis, foliolis obovatis obtusis glaucis subconfluentibus, floribus racemosis, bracteis persistentibus. *Neapol. Graecia. Asia minor.*

vesicaria Pall. 3. L. foliis ternatis carnosis, foliolis lobatis obtusis, floribus racemosis, bracteis foliaceis. *Desert. Kirgis.*

altaica Pall. 4. L. folio caulino ternato, foliolis digitato-quinatis oblongis obtusis, floribus racemosis, bracteis ovatis nervosis. *Sibir. Bessarabia.*

thalictroides 5. L. folio caulino 2ternato membranaceo, foliolis late ovatis 3lobis, lobis inciso-dentatis, calyce parvo. *Amer. bor.* (Caulophyllum Mx.)

1298. DIPHYLLEIA Mx.

cymosa Mx. *Carolina.* Herba foliis caulinis subbinis peltatis reniformi-cordatis 2lobis angulato-serrulatis glabris, floribus cymosis candidis.

1299. CLEOME.

**Hexandrae.*

† Siliqua stipitata.

a. Filamentis stipiti insertis pseudo-monadelphis, = gynandris.

aa. Foliis ternatis.

triphylla 1. Cl. caule annuo subviscoso, foliis omnibus ternatis glabriusculis integerrimis infimis longe petiolatis floralibus sessilibus, siliqua lineari-oblonga elongata. *Ind. occid.*

brachycarpa Vahl. 2. Cl. caule viscoso-pubescente, foliis ternatis quinatisque integerrimis, siliqua ovali-oblonga stipite breviore. *Peru.* (Gynandropsis Cand.)

heterotricha Burch. 3. Cl. caule dupliciter piloso, pilis elongatis glanduliferisque, foliis ternatis quinatisque subintegerrimis. *C. B. S.*

brasiliensis Weinm. 4. Cl. caule fruticoso glanduloso-piloso, foliis ternatis quinatisque margine undulato-crispis, stipulis spinescentibus, foliis floralibus cordatis. *Brasil.* (Cl. psoraleaefolia Cand.)

latifolia Vahl. 5. Cl. caule herbaceo glabro inermi, foliis imis summisque simplicibus, mediis ternatis petiolatis acuminatis. *Guiana.*

longipes Cand. 6. Cl. caule herbaceo glabro, foliis ternatis, ſtipulis aculeatis, ſiliqua cylindrica gracili longiſſime ſtipitata. *Amer. auſtr.*

ββ. Foliis quinatis.

pentaphylla 7. Cl. caule herbaceo ramoſo inermi ſuperne glanduloſo-viſcoſo, foliis imis ſummisque ternatis, mediis quinatis ſubſerrulatis glabris, ſiliqua aſpera lineari-lanceolata ſtipitem ſuperante. *Aegyptus. Arabia. Ind. or.* et *occid.* (Gynandropſis Cand.)

pubeſcens Sims. 8. Cl. caule herbaceo glanduloſo-piloſo, foliis quinato-ſeptenatis, floralibus ſimplicibus cordato-oblongis. *Patria?*

hirſuta R. et P. 9. Cl. foliis quinatis hiſpidis integerrimis, ſiliqua aſpera longe ſtipitata. *Peru.* (Gynandropſis hiſpidula Cand.)

cardinalis Cand. 10. Cl. caule herbaceo glabro, foliis quinatis oblongo-lanceolatis, floralibus ſeſſilibus. *Mexico.*

ſpecioſa Kunth. 11. Cl. caule apice villoſo, foliis quinato-ſeptenatis oblongis acuminatis ſubſerrulatis. *Nov. Granat.*

roſea Vahl. 12 Cl. caule herbaceo inermi glabro, foliis ternatis quinatisque, ſummis ovatis ſeſſilibus, ſiliqua glabra ſtipitem aequante. *Braſil.*

*palmipes** 13. Cl. glabriuscula, foliis digitato-palmatis integerrimis. *Cayenna.* (Gynandropſis Cand.)

γγ. Foliis ſeptenatis.

heptaphylla 14. Cl. caule herbaceo aculeato viſcoſo-piloſo, foliis ſeptenatis, floralibus cordato-lunatis, ſiliqua longe ſtipitata. *Ind. or.* et *occid.*

gigantea 15. Cl. caule fruticoſo pubeſcente inermi, foliis longe petiolatis ſeptenatis, floribus racemoſis viridibus. *Amer. auſtr.* (Cl. arborea Kunth., viridiflora Schreb.)

glanduloſa R. et P. 16. Cl. arboreſcens glanduloſo-hiſpida, foliis ſubſeptenatis, ſummis ſimplicibus cordatis. *Peru.*

arborea Weinm. 17. Cl. caule fruticoſo ſimpliciſſimo aculeato, foliis ſeptenatis piloſis. *Braſil.*

anomala Kunth. 18. Cl. caule herbaceo inermi villoſo, foliis ſeptenatis, floralibus ſubrotundo-cordatis, ſiliqua oblonga muricata. *Amer. trop.* Humb.

chilenſis Cand. 19. Cl. caule herbaceo inermi glabro, foliis ſeptenatis, floralibus ternato-quinatis, ſepalis perſiſtentibus, ſiliqua pendula glabriuscula ſtipitem ſubaequante. *Chili.*

β. Filamentis calyci inſertis.

cuneifolia Mühlb. 20. Cl. glaberrima, foliis ſimplicibus cuneato-retuſis, petalis gracillime unguiculatis. *Georgia.*

caneſcens Stev. 21. Cl. herbacea glauceſcens ſubſtrigoſa, foliis ternatis oblongo-linearibus, ſiliquis pubeſcentibus toruloſis. *Tauria auſtr.*

diffuſa Banks. 22. Cl. herbacea glabriuscula, ramis diffuſis, ſtipulis ſpineſcentibus, foliis ternatis, floralibus ſimplicibus ovatis, ſiliqua lineari elongata. *Braſil.* (Cl. affinis Cand.)

rytidosperma Cand. 23. Cl. herbacea glabra, foliis omnibus ternatis ovali-oblongis, siliquis glabris elongatis. *Ins. Carib.*

Humboldtii Cand. 24. Cl. herbacea glabra, petiolis elongatis aculeatis, foliis ternato-quinatis, floralibus ovatis breviter petiolatis, siliquis glabris. *Amer. tropic.* (Cl. parviflora Kunth.)

angustifolia Forsk. 25. Cl. caule herbaceo ramoso superne punctato-scabro, foliis omnibus filiformibus, inferioribus septenatis superioribus ternatis, antheris inaequalibus, siliquis subulatis. *Arabia.* (Cl. filifolia Vahl.)

spinosa 26. Cl. caule herbaceo pubescente aculeato, foliis septenatis quinatisque glabris, floralibus ovato-cordatis breviter petiolatis, siliqua glabra stipitem excedente. *Ind. occid. Brasil.*

pungens W. 27. Cl. caule herbaceo viscoso aculeato, foliis septenatis quinatisque glabris, floralibus cordatis sessilibus, siliqua glabra stipite breviore. *Ind. occid.* (Cl. spinosa Sims.)

†† *Siliqua subsessili aut sessili: herbaceae omnes.*

α. *Foliis simplicibus.*

monophylla 28. Cl. viscoso-pubescens, caule erecto simplici, foliis ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis subsolitariis axillaribus. *Ceylon. Malabar. C. B. S.* (Cl. cordata Burch.)

procumbens 29. Cl. caule procumbente glabro diffuso, foliis lanceolato-linearibus, pedunculis solitariis axillaribus. *Jamaica. Hispaniola.*

guianensis Aubl. 30. Cl. caule erecto ramosissimo, foliis linearibus subulatis, pedunculis solitariis axillaribus, siliqua lanceolata. *Guiana.*

raphanoides Cand. 31. Cl. caule erecto ramoso hispido, foliis lanceolato-linearibus acuminatis basi pinnatifidis, pedunculis axillaribus racemosis, siliqua torulosa. *Guinea.* (Raphanus pilosus W.)

glauca Cand. 32. Cl. glabra glauca, foliis ovatis petiolatis, floralibus ellipticis, siliquis pendulis subsessilibus. *Arabia, Babylonia.* (Cl. glaucescens Cand.)

quinquenervia Cand. 33. Cl. subpubescens glauca, foliis cordatis 5nerviis petiolatis, floralibus minimis, siliquis sessilibus ovali-oblongis glanduloso-asperis. *Persia.*

β. *Foliis ternatis.*

tenella L. suppl. 34. Cl. ramosa glabra, foliolis lineari-filiformibus petiolo longioribus, pedunculis solitariis. *Ind. or.*

virgata Stev. 35. Cl. caule ramoso glanduloso-pubescente, foliis inferioribus ternatis superioribus simplicibus oblongo-linearibus obtusis, floribus solitariis racemosisque terminalibus, siliquis pendulis substipitatis torulosis pedunculum excedentibus. *Iberia. Persia bor.*

iberica Cand. 36. Cl. caule glanduloso-pubescente, foliis plerisque ternatis breviter petiolatis acutiusculis, flori-

bus ſubracemoſis, ſiliquis pendulis toruloſis ſubſtipitatis pedunculum aequantibus. *Iberia.* (Cl. ornithopodioides M. B.)

Dilleniana Cand. 37. Cl. caule aſpero glanduloſo, foliis omnibus ternatis petiolatis, foliolis oblongis obtuſis glaucis reflexis, ſiliquis ſolitariis ſubſeſſilibus deflexis. *Aſia minor*? (Cl. ornithopodioides L.?)

arabica 38. Cl. caule glanduloſo-viſcoſo, foliis ternatis lanceolatis obtuſis, ſiliquis ſubſeſſilibus fuſiformibus deflexis viſcoſis. *Arabia. Africa bor.*

violacea 39. Cl. caule glanduloſo-pubeſcente, foliis ternatis linearibus longe petiolatis, ſummis ſimplicibus, pedunculis ſolitariis axillaribus abbreviatis, ſiliquis deflexis linearibus apiculatis. *Luſitania. Amer. auſtr.* (Cl. deflexa Cand.?)

multicaulis Cand. 40. Cl. caule glabro, foliis omnibus ternatis oblongo-linearibus obtuſiuſculis, ſiliquis ſubſtipitatis. *Mexico.*

folioloſa 41. Cl. glabra glauca, foliis ſubſeſſilibus ternatis orbiculatis, ſiliquis oblongo-linearibus piloſo-glanduloſis. *Perſia.*

parviflora R. Br. 42. Cl. glanduloſo-pubeſcens, foliis ternatis ovato-oblongis, ſummis ſimplicibus, ſiliquis oblongis glanduloſo-pubeſcentibus ſtyliferis pedunculo ſubbrevioribus. *Abyſſinia.*

aſpera Kön. 43. Cl. hiſpida, foliis ternatis oblongis, ſiliquis teretibus glabris ſtylo coronatis. *Coromandel.*

flava Banks. 44. Cl. glanduloſo-pubeſcens ſubglauca, foliis inferioribus quinatis ſuperioribus ternatis oblongis, ſiliquis ſtriatis glanduloſo-pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

polygama 45. Cl. glabra, foliis petiolatis ternatis, inferioribus ſimplicibus ovato-lanceolatis acuminatis ſerrulatis, ſiliquis teretibus glabris. *Ind. occid.* (Cl. ſerrata L.)

aculeata 46. Cl. glabra, ſtipulis ſpineſcentibus, foliis ternatis ovatis integerrimis, ſiliquis teretibus toruloſis glabris. *Amer. tropic.*

Houſtoni R. Br. 47. Cl. glanduloſo-villoſa, ſtipulis petiolisque ſpineſcentibus, foliis ternato-quinatis ovali-oblongis, ſiliquis ſubſtipitatis glanduloſo-villoſis. *Jamaica.*

rubella Burch. 48. Cl. glanduloſo-pubeſcens, foliis ternato-quinatis, foliolis linearibus glabris glaucis, ſiliquis abbreviatis ſubpubeſcentibus. *Afric. auſtr.*

***Staminum numerus abortu vel coalitu alienus.*

diandra Burch. 49. Cl. caule herbaceo glabro aculeato, foliis 7natis lineari-filiformibus, ſtaminibus duobus fertilibus, ſex abortientibus, ſiliqua ſtipitata pendula. *Afric. auſtr.* (Polaniſia Rafin. Cand.)

tetrandra Banks. 50. Cl. herbacea glabra, foliis ternatis linearibus petiolos triplo ſuperantibus, floribus 4andris, ſiliquis ſeſſilibus gracilibus. *Nov. Holl.*

droſeraefolia Delil. 51. Cl. fruticuloſa glanduloſa ramoſa, foliis petiolatis orbiculatis 3nerviis, pedunculis axillaribus

solitariis, floribus 4andris, siliquis ovalibus. *Aegyptus.* (Roridula Forsk.)

scaposa Cand. 52. Cl. herbacea, foliis subradicalibus petiolatis rotundato-ovatis substrigosis, scapo aspero, bracteis minimis, floribus 4andris, siliquis erectis sessilibus glabris. *Aegyptus.*

juncea L. suppl. 53. Cl. caule fruticoso aphyllo squamoso, corymbis lateralibus, floribus 8andris, filamentis stipiti germinis insertis, siliqua tomentosa. *C. B. S.* (Schepperia Neck. Cand. Macromerum Burch.)

dodecandra 54. Cl. humilis pubescens, foliis ternatis glabris oblongis subintegerrimis, pedunculis solitariis axillaribus, floribus 12andris, siliquis compressis subinflatis. *Ind. or.*

viscosa 55. Cl. herbacea erecta glanduloso-viscosa, foliis quinatis ternatisque oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus 12andris, siliquis oblongis striatis asperis. *Ind. or. Amer. bor.* (Cl. graveolens Rafin. Cl. icosandra L.)

uniglandulosa Cav. 56. Cl. herbacea glanduloso-pubescens, foliis ternatis oblongo-lanceolatis, floribus sub-12andris, siliqua stylo elongato coronata. *Nov. Hispan.*

oxyphylla Burch. 57. Cl. glanduloso-pilosa, foliis ternato-7natis oblongis glaucis, floribus 12andris, siliqua pendula pubescente striata. *Afric. austr.*

Chelidonii L. suppl. 58. Cl. hirsuta, foliis septenato-quinatis obovatis, floribus polyandris, siliqua filiformi glaberrima. *Ind. or.*

felina L. suppl. 59. Cl. hispido-strigosa, foliis ternatis obovatis retusis, floribus solitariis axillaribus pedunculatis polyandris, siliqua lineari glabra. *Ind. or.*

1300. PERITOMA Cand.

serrulatum Cand. *Ad fl. Missuri.* Herba ramosa 3pedalis foliis ternatis glaucis, floribus racemosis violaceis. (Cleome Pursh. Atalanta Nuttall.)

1301. CANARIUM.

commune 1. C. stipulis amplexicaulibus ovatis fimbriatis, panicula divaricata. *Ins. Molucc.*

Pimela Kön. 2. C. stipulis nullis, racemis lateralibus. *Ins. Molucc. Cochinchina.* (C. sylvestre W. Pimela nigra Lour.)

1302. COSSINIA Commers.

borbonica Cand. *Ins. Mascaren.* Frutex foliis pinnatis ternatisque subtus tomentosis, floribus paniculatis albis. (C. triphylla et pinnata Lam.)

1303. MABA Forst.

buxifolia Pers. 1. M. fruticosa, ramis divaricatis, foliis obovato-oblongis coriaceis utrinque glabris, floribus soli-

tariis axillaribus ſeſſilibus, filamentis ſimplicibus. *Ind. or.* (Ferreola Roxb. Piſonia Rottb.)

obovata R. Br. 2. M. foliis obovatis ſubretuſis, junioribus calycibusque pubeſcentibus, filamentis alternis duplicatis. *Nov. Holl.*

humilis R. Br. 3. M. foliis obovatis ſubretuſis glaberrimis, calycibus ſolitariis glabriuſculis, baccis ovalibus dimidium folium aequantibus. *Nov. Holl.*

litorea R. Br. 4. M. foliis obovatis ſubretuſis nitidis, baccis ſolitariis ovali-oblongis calycem obſolete lobatum quater excedentibus folio quinquies brevioribus. *Nov. Holl.*

reticulata R. Br. 5. M. foliis obovatis retuſis reticulato-venoſis revolutis glabris, filamentis alternis duplicatis, baccis depreſſiuſculo-globoſis. *Nov. Holl.*

laurina R. Br. 6. M. foliis ovali-oblongis venoſis nitidis ramulisque glabris, floribus ſolitariis, filamentis alternis duplicatis. *Nov. Holl.*

geminata R. Br. 7. M. foliis obovatis marginatis ſubvenoſis ramulisque glaberrimis, calycibus geminis ſubpubeſcentibus, baccis ovalibus folio quater brevioribus. *Nov. Holl.*

Ebenus * 8. M. arborea, foliis oblongis acutis ſupra nitidis ſubtus flavidis, floribus terminalibus aggregatis, baccis ovatis. *Inſ. Molucc.* (Ebenus vulgaris Rumph.)

elliptica Forſt. 9. M. foliis obovato-oblongis coriaceis nitidis, floribus ſubaggregatis axillaribus villoſiſſimis 3andris, baccis 2ſpermis. *Inſ. amicorum.*

1304. FLOSCOPA Lour.

ſcandens Lour. *Cochinchina.* Frutex ſcandens, foliis lanceolatis, floribus faſciculato-ſpicatis violaceis.

1305. LINDERA Thunb.

umbellata Thunb. *Japon.* Frutex ramoſus, foliis terminalibus lanceolatis petiolatis, floribus umbellatis.

1306. AMAJOUA Aubl.

guianenſis Aubl. 1. A. foliis ternis oblongis utrinque attenuatis, floribus terminalibus capitato-congeſtis. *Guiana.* (Hamelia glabra Lam., ſeſſiliflora W.)

corymboſa Kunth. 2. A. foliis oppoſitis ovali-oblongis acutis, corymbis 3partitis. *Nov. Granat.* Humb.

africana * 3. A. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus ſub-1floris, fructibus oligoſpermis. *Afric. ora orient.* (Coffea Zanguebariae Lour.)

1307. ISERTIA Schreb.

coccinea Vahl. 1. I. foliis oppoſitis ternisve oblongis utrinque attenuatis ſubtus villoſis, paniculae terminalis ra-

mis verticillatis dichotomis. *Amer. auſtr.* (Guettarda coccinea Aubl.)

parviflora Vahl. 2. I. foliis oppoſitis oblongis acuminatis ſubtus glabriusculis, inferioribus ſubcordatis, racemo compacto. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.*

1308. CASSUPA Humb.

verrucoſa Humb. *Nov. Andaluſ.* Arbor foliis oppoſitis obovato-oblongis tomentoſis, floribus paniculatis bracteatis verrucoſis rubentibus.

1309. RICHARDIA.

ſcabra 1. R. ramis diffuſis hiſpidis, foliis ovali-oblongis ſcabris. *Nov. Hiſpan.*

piloſa R. et P. 2. R. ramis diffuſis hirtis, foliis oblongo-lanceolatis piloſis, corolla apice barbata. *Lima. Nov. Granat. Braſil.* (Richardſonia Kunth. Spermacoce hirſuta W. herb.)

1310. STEVENSIA Poit.

buxifolia Poit. *Hiſpaniola.* Frutex foliis oppoſitis oblongis nitidis ſubtus albidis reticulatis, floribus ſolitariis axillaribus albis.

1311. COUTAREA Aubl.

ſpecioſa Aubl. *Guiana.* Arbor foliis oppoſitis ovatis, floribus corymboſis purpureis magnis ſpecioſis. (Portlandia hexandra L. Jacq.)

1312. HILLIA.

longiflora Sw. 1. H. corollis 6fidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis. *Jamaica. Braſil.* (H. paraſitica L. Fereira Vand.)

tetrandra Sw. 2. H. corollis 4fidis, laciniis ovatis, foliis obovatis. *Jamaica.*

1313. PSATHYRA Commerſ.

borbonica Gmel. *Inſ. Maſcaren.* Frutex ramis fragilibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, floribus corymboſis ſubgloboſis.

1314. SCHRADERA Vahl.

capitata Vahl. 1. Schr. involucro lobato-dentato, calyce integerrimo, foliis ſubellipticis obtuſiusculis. *Inſ. Carib.*

cephalotes W. 2. Schr. involucro integerrimo, calyce dentato, foliis oblongis acuminatis. *Jamaica.* (Fuchſia involucrata Sw.)

1315. LORANTHUS.

* *Hexandri.*

† *Pedunculis axillaribus* 1–*3floris.*

montevidenſis * 1. L. ramis teretibus, foliis ſpathulato-linearibus mucronatis, floribus ſolitariis erectis. *Monte Video.* Sello.

nodoſus Lam. 2. L. ramis teretibus dichotomis nodoſis, foliis ovalibus patentiſſimis coriaceis 7nerviis, pedunculis 1floris aggregatis petiolos aequantibus. *Peru.*

biflorus Lam. 3. L. ramis teretibus, foliis petiolatis ſubrotundo-ovatis, pedunculis ſubſolitariis 2floris petiolum excedentibus. *Ind. or.*

parvifolius Sw. 4. L. ramis fragilibus, foliis ovatis enerviis membranaceis, pedunculis axillaribus 3floris folio brevioribus. *Jamaica.*

ſarmentoſus R. et P. 5. L. ramis ſarmentoſis tuberculoſis, foliis oblongo-lanceolatis carinatis, pedunculis axillaribus abbreviatis 3floris bracteatis. *Peru.*

eucalyptifolius Bonpl. 6. L. ramis teretibus laevibus, foliis ovato-ſubrotundis obtuſis coriaceis enerviis, pedunculis axillaribus 3floris ebracteatis folio brevioribus. *Caracas.*

cupulifer Kunth. 7. L. ramis nodoſis glabris, foliis oblique ovato-oblongis obtuſis reticulatis membranaceis, pedunculis axillaribus 3floris, bractea coriacea pedicellum aequante, bacca cupulata. *Peru.*

microphyllus Kunth. 8. L. ramis incano-hirſutis, foliis oblongis obtuſis mucronatis cano-pubeſcentibus, pedunculis breviſſimis 3floris, floribus ſeſſilibus. *Nov. Hiſpan.*

†† *Floribus cymoſis.*

nutans * 9. L. ramis teretibus dichotomis glabris, foliis oblongis utrinque attenuatis laevibus, pedunculis axillaribus geminis cymoſis paucifloris reflexis. *Braſil.* Sello.

phillyreoides Kunth. 10. L. ramis filiformibus ſubradicantibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis cymoſis multifloris folio brevioribus, floribus ſeſſilibus ſubternis. *Cumana.*

dichotomus R. et P. 11. L. foliis ſubquaternis oblongis venoſis, pedunculis axillaribus geminis dichotomis ſub-6floris. *Peru.*

venetus Kunth. 12. L. ramis glabris, foliis obovato-oblongis glaueſcentibus coriaceis, pedunculis cymoſis axillaribus, floribus ſeſſilibus ſubternis. *Mexico.*

divaricatus Kunth. 13. L. ramis glabris divaricatis, foliis oblongis obtuſis coriaceis glauceſcentibus, cymis terminalibus trichotomis, floribus ternis pedicellatis. *Amer. auſtr.*

Mutiſii Kunth. 14. L. ramis glabris rimoſis, foliis ternis ſubſeſſilibus obovato-oblongis coriaceis, cymis pedunculatis axillaribus ebracteatis paucifloris, corollis longiſſimis. *Nov. Granat.*

15.

americanus 15. L. foliis elliptico-oblongis coriaceis 3nerviis, cymis geminis pedunculatis axillaribus terminalibusque, corollis curvatis nutantibus. *Ind. occ.*

cochinchinensis Lour. 16. L. foliis ovato-lanceolatis acutis coriaceis, cymis pedunculatis axillaribus, floribus congestis. *Cochinchina.*

acutifolius R. et P. 17. L. foliis lanceolatis acuminatis, cymis axillaribus pedunculatis, floribus pedicellatis subternis bracteatis. *Peru.*

cucullaris Lam. 18. L. foliis ovato-lanceolatis subfalcatis nervosis, cymis pedunculatis axillaribus, bracteis cordatis cucullatis sub-3floris. *Cayenn.*

cuneifolius R. et P. 19. L. foliis subsessilibus obovatis mucronatis lucidis, pedunculis cymosis axillaribus nutantibus, bracteis cyathiformibus 3dentatis. *Peru.*

††† *Floribus racemosis,*

α. axillaribus.

uniflorus 20. L. foliis obovatis mucronatis, racemis axillaribus simplicibus corymbosis. *Hispaniola.* (L. parviflorus Lam.)

falcatus L. suppl. 21. L. foliis linearibus obtusis subfalcatis glaucis eveniis, racemis axillaribus paucifloris. *Ind. or.*

indicus Lam. 22. L. foliis ovato-oblongis obtusiusculis coriaceis, racemis axillaribus simplicibus, baccis ovato-cylindricis. *Ind. or.* (Lonicera zeylanica Gärtn.?)

marginatus Lam. 23. L. foliis ovatis subacuminatis margine scarioso-pellucidis, racemis axillaribus solitariis folio minoribus, pedicellis oppositis 3floris. *Brasil.*

orinocensis * 24. L. foliis ovato-oblongis acutis venosis, racemis axillaribus strictis elongatis, pedicellis alternis 3floris. *Ad Orinoc.* (L. marginatus Kunth.)

Stelis 25. L. foliis oblongis coriaceis, racemis axillaribus trichotomis, pedunculis 3gonis, floribus ternis sessilibus. *Amer. austr.*

occidentalis 26. L. ramis divaricatis, foliis ovatis, racemis axillaribus simpliciusculis, petalis basi cohaerentibus ascendentibus. *Amer. austr.*

bicolor Roxb. 27. L. foliis lanceolatis subeveniis, racemis axillaribus secundis, floribus bracteatis. *Ind. or.*

pauciflorus Sw. 28. L. foliis obovatis venosis, racemis axillaribus 3partitis folio brevioribus. *Ind. occid.* (L. pyrifolius Bonpl.)

pedunculatus Jacq. 29. L. foliis cordato-ovatis venosis, racemis axillaribus simplicibus, floribus ternis pedunculatis. *Amer. austr.*

sessilis Jacq. 30. L. foliis ovatis, racemis axillaribus sub-3partitis, pedicellis apice incrassatis, floribus ternis sessilibus. *Amer. austr.*

aduncus Meyer. 31. L. foliis oblongis apice acuto-aduncis, racemis axillaribus trichotomis, floribus subternis sessilibus. *Surinam.*

acuminatus R. et P. 32. L. foliis ovatis elongato-acuminatis, racemis axillaribus folio brevioribus, pedicellis 3floris. *Peru.*

lancifolius Poir. 33. L. foliis oblongo-lanceolatis, racemis axillaribus folio brevioribus, bracteis ovatis reflexis, pedicellis 3floris. *Peru.* (L. lanceolatus R. et P.)

retroflexus R. et P. 34. L. foliis ovatis acutis reflexis, racemis axillaribus compofitis folia fuperantibus, bracteis ovalibus concavis, pedicellis fub-3floris horizontalibus reflexisve. *Peru.*

orbicularis Kunth. 35. L. ramis 4gonis, foliis orbiculatis acutiusculis coriaceis, racemis axillaribus abbreviatis ebracteatis, floribus feffilibus. *Quito.*

fuaveolens Kunth. 36. L. ramis teretibus, foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis, racemis axillaribus geminis vel quaternis, ramulis abbreviatis confertis 3floris, floribus pedicellatis. *Peru.*

eugenioides Kunth. 37. L. arboreus, ramis teretibus, foliis ovato-oblongis acuminatis in petiolum decurrentibus, racemis axillaribus fubfolitariis, ramis abbreviatis ebracteatis 3floris. *Peru.*

interruptus Kunth. 38. L. ramis teretibus, foliis alternis oblongis acutis in petiolum decurrentibus, racemis axillaribus fubfolitariis, ramis breviffimis diftantibus 3floris oppofitis, floribus feffilibus. *Mexico.*

β. *Racemis terminalibus.*

europaeus 39. L. foliis oblongis obtufis in petiolum decurrentibus, racemis fimplicibus terminalibus, floribus dioecis. *Auftria. Transfylvan.*

brafilienfis Lam. 40. L. foliis ovato-lanceolatis nitidis, racemis terminalibus trichotomis bracteatis, pedicellis turbinatis. *Brafil.*

floribundus Labill. 41. L. arboreus, foliis linearibus obtufis, racemis fimplicibus terminalibus aggregatis elongatis, pedicellis alternis 3floris, floribus feffilibus bracteatis. *Nov. Holl. occid.*

punctatus R. et P. 42. L. ramis verticillatis, foliis obovatis punctatis, racemis fubterminalibus longiffimis, pedicellis fubverticillatis 3floris, floribus bracteatis. *Peru.*

heterophyllus R. et P. 43. L. ramis angulatis fcabris, foliis ovalibus acutis fubcordatisve, racemis fubterminalibus folitariis, pedicellis abbreviatis 3floris, floribus bracteatis. *Chili.*

deftructor Kunth. 44. L. ramis 4angulis, foliis oblongis acutis eveniis coriaceis, racemis terminalibus, ramulis approximatis fecundis 3floris ebracteatis, floribus pedicellatis. *Quito.*

†††† *Floribus paniculatis.*

conduplicatus Kunth. 45. L. ramis 4gonis laevibus, foliis ovatis acutis conduplicato-recurvis glabris, paniculis terminalibus ramofiffimis foliatis, ramis geminis 4angulo-ancipitibus, ramulis breviffimis 3floris. *Cumana. Brafil.*

paniculatus Kunth. 46. L. ramis teretibus, foliis oblongis utrinque attenuatis, paniculis terminalibus diffufis, ramis divaricatis, ramulis breviffimis 3floris. *Cumana.*

††††† *Floribus ſpicatis.*

ſpicatus 47. L. foliis ſubovatis obtuſis unctuoſis nervoſis, ſpicis axillaribus ſolitariis abbreviatis 4angulis. *Nov. Granat.*

emarginatus Sw. 48. L. foliis obcordatis enerviis coriaceis, ſpicis axillaribus 4gonis, floribus oppoſitis. *Hiſpaniola.*

ovalifolius R. et P. 49. L. foliis ovalibus ſubeveniis, ſpicis axillaribus ſubſolitariis abbreviatis, floribus confertis. *Peru.*

leptoſtachys Kunth. 50. L. ramis ſub-4gonis, foliis ovato-oblongis acuminatis reticulato-venoſis, ſpicis axillaribus ſubgeminis gracilibus, floribus diſtantibus minutis. *Nov. Granat.*

alveolatus Bonpl. 51. L. ramis teretibus, foliis ſubrotundis obtuſis ſubobliquis nervoſis, ſpicis axillaribus ſubgeminis 4angulis foveolatis. *Quito.*

amplexicaulis Kunth. 52. L. ramis teretibus, foliis amplexicaulibus reniformibus, ſpicis axillaribus geminis. *Caracas.*

** *Tetrandri.*

Scurrula 53. L. foliis ovatis ſubobliquis, pedunculis 1floris congeſtis, corollis hinc fiſſis 4fidis. *Ind. orient. China.*

tetrapetalus Forſt. 54. L. foliis oblongis obtuſis ſubſeſſilibus, floribus ſubſeſſilibus verticillatis regularibus 4fidis. *Nov. Zeeland.*

buddleoides Lam. 55. L. foliis ellipticis nervoſis ſubtus pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis congeſtis inaequaliter 4fidis. *Ind. or.*

lucarquenſis Kunth. 56. L. foliis ovato-ſubrotundis acutis ſubmembranaceis, racemis axillaribus terminalibusque paucifloris, floribus ſubſeſſilibus 4fidis. *Peru.*

*** *Pentandri.*

glaucus Thunb. 57. L. foliis ovatis obtuſis glaucis, pedunculis axillaribus 1floris, floribus 5fidis fructibusque farinoſis. *Afric. auſtr.*

elaſticus Lam. 58. L. foliis ſeſſilibus ovatis acutis nervoſis, floribus verticillatis ſubſeſſilibus 5fidis revolutis. *Malabar.*

clavatus Lam. 59. L. foliis ovatis obtuſis coriaceis, floribus faſciculato-verticillatis pedunculatis clavatis inaequaliter 5fidis. *Madagascar. Malabar.*

verticillatus R. et P. 60. L. foliis ternis lanceolatis glaucis heteromallis, floribus ſubcapitato-verticillatis 5fidis revolutis. *Chili.*

ſeſſilifolius P. B. 61. L. foliis ſeſſilibus cordatis obtuſis nervoſo-venoſis, floribus verticillatis pedunculatis 5fidis. *Guinea.*

lanceolatus P. B. 62. L. foliis petiolatis cordato-lanceolatis nervoſis acutiusculis, floribus ſubverticillatis pedunculatis pendulis 5fidis. *Guinea.*

loniceroides 63. L. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, floribus pedunculatis axillaribus capitato-congeſtis involucratis 5fidis. *Ind. or.* (L. coriaceus Lam.)

farinosus Lam. 64. L. foliis ovato-oblongis petiolatis, racemis axillaribus abbreviatis farinosis, corollis tubuloso-ventricosis 5fidis. *Java.*

pentandrus 65. L. foliis alternis oblongis obtusis petiolatis, racemis axillaribus abbreviatis glabris, corollis 5fidis. *Ind. or.*

longiflorus Lam. 66. L. foliis oblongis nitidis obsolete nervosis, racemis axillaribus, corolla tubuloso-clavata. *Malabar.*

grandiflorus R. et P. 67. L. foliis oblongis nitidis subvenosis, racemis corymbosis axillaribus pendulis, bracteis ovatis concavis, corolla tubulosa elongata. *Peru.*

caesius * 68. L. ramis granulosis, foliis ovato-lanceolatis obtusis mucronatis glaucis, racemis corymbosis erectis subterminalibus. *Peru.* (L. glaucus R. et P.)

longibracteatus Lam. 69. L. foliis lanceolatis subsessilibus enerviis, spicis terminalis bracteatis, corollis subclavatis 5fidis. *Peru.*

**** *Heptandri, octandri.*

ellipticus R. et P. 70. L. foliis oblongis acutis lucidis, racemis terminalibus compositis corymbosis, pedicellis 3floris, bracteis ovatis reflexis, corollis 7fidis. *Peru.*

Tagua Humb. 71. L. arboreus, foliis oblongis utrinque attenuatis subtus punctatis, racemis axillaribus oppositis, pedunculis ternis 3floris 3bracteatis approximatis, corollis 7fidis. *Nov. Granat.*

laurifolius Kunth. 72. L. foliis oblongis obtusiusculis in petiolum decurrentibus nitidis, racemis axillaribus terminalibusque compositis, pedunculis abbreviatis subternis 3floris 3bracteatis, floribus sessilibus 7-8fidis. *Nov. Granat.*

puracensis Kunth. 73. L. arboreus, foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis subtus punctatis, racemis terminalibus, pedunculis abbreviatis ternis 3floris 3bracteatis, floribus sessilibus 6-8petalis. *Quito.*

nitidus Bonpl. 74. L. arboreus, foliis ellipticis nitidis, corymbis terminalibus, ramis 3floris 3bracteatis, floribus sessilibus 8petalis. *Quito.*

1316. ACHRAS.

Sapota *Ind. occid. Amer. austr. Nov. Holl.* Arbor foliis elliptico-oblongis obtusiusculis nitidis, pedunculis solitariis 1floris. (A. australis R. Br.)

1317. PRINOS.

* *Foliis annuis.*

verticillatus 1. Pr. foliis obovato-oblongis utrinque attenuatis subduplicato-serratis subtus pubescentibus, floribus ♂ umbellato-pedunculatis petiolum subaequantibus, ♀ subsolitariis. *Amer. bor.* (Pr. padifolius W., ambiguus Pursh. Gronovii Mx.)

ambiguus Mx. 2. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus glabris, floribus ♂ pedicellatis congeſtis, ♀ ſolitariis longe pedunculatis. *Carolina.*

laevigatus Pursh. 3. Pr. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis appreſſe ſerratis ſupra nitidis, venis ſubtus ſubpubeſcentibus, floribus ♂ ſparſis, ♀ axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Amer. bor.*

nitidus Vahl. 4. Pr. foliis oblongo-ovatis ſerratis nitidis, floribus ☿ 4andris ſparſis pedunculatis. *Inſ. Carib.*

** *Foliis ſempervirentibus.*

ſideroxyloides Sw. 5. Pr. foliis ſubrotundis obtuſis integerrimis nervoſo-venoſis, floribus ☿ pedunculatis axillaribus 6andris. *Inſ. Carib.*

montanus Sw. 6. Pr. foliis ovatis acutis ſerratis utrinque nitidis rigidis, floribus ☿ pedunculatis axillaribus 6andris. *Jamaica. Hiſpaniola.*

dioecus Vahl. 7. Pr. foliis ovato-oblongis ſubſerratis nitidis, pedunculis axillaribus ſub-1floris, floribus dioecis 4andris. *Inſ. Carib.*

glaber 8. Pr. foliis lanceolatis apice ſubdentatis nitidis, pedunculis axillaribus ſolitariis 3floris. *Amer. bor.*

atomarius Nutt. 9. Pr. foliis obovatis acutis apice ſubſerratis glabris ſubtus punctatis, ramis junioribus viſcoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Carolin. auſtr. Georgia.*

coriaceus Pursh. 10. Pr. foliis ſpathulatis coriaceis nitidis integerrimis, corymbis axillaribus breviſſimis ſeſſilibus multifloris. *Georgia.*

1318. EHRENBERGIA *.

ciliata * *Braſil.* Frutex foliis oppoſitis oblongis, floribus aggregatis pedunculatis hirſutis.

1319. TRIPHASIA Lour.

monophylla Cand. 1. Tr. foliis ſimplicibus oblongis, floribus racemoſis. *Inſ. Timor.*

trifoliata Cand. 2. Tr. foliis ternatis, floribus ſolitariis. *Ind. orient. China. Cochinchina.* (Tr. aurantiola Lour. Limonia trifoliata L.)

1320. AMOORA Roxb.

cucullata Roxb. *Bengal.* Arbor foliis pinnatis glabris obtuſis, floribus paniculatis flavis.

1321. ANOPTERUS Labill.

glanduloſa Labill. *Terra Diemen.* Arbor foliis ſparſis oblongis baſi attenuatis glanduloſo-ſerratis, floribus racemoſis.

1322. FRANKENIA.

* *Foliis glabris.*

laevis 1. Fr. foliis verticillatis linearibus acutis revolutis bafi ciliatis, ramulis procumbentibus glabris, floribus terminalibus folitariis, petalis dentato-crenatis. *Litora maris mediterr.*

Nothria Thunb. 2. Fr. foliis fafciculatis linearibus obtufis revolutis bafi ciliatis, ramulis procumbentibus hifpidiusculis, floribus terminalibus aggregatis, petalis dentato-crenatis. *C. B. S.* (Nothria repens Berg.)

tetrapetala Labill. 3. Fr. foliis oppofitis teretiusculis bafi folutis punctatis, floribus terminalibus folitariis 4petalis, petalis fpathulatis integerrimis. *Terra Diemen.*

thymifolia Desf. 4. Fr. caule fruticofo erecto ramofiffimo, foliis confertis abbreviatis lineari-teretibus rigidulis cinereis, floribus axillaribus feffilibus. *Deferta Afric. bor. Hifpania.*

pauciflora Cand. 5. Fr. caule erectiusculo canefcente, foliis lineari-filiformibus revolutis bafi ciliatis, floribus fparfis. *Nov. Holl.*

fruticulofa Cand. 6. Fr. caule erecto glabro, foliis linearibus acutiusculis revolutis bafi laevibus. *Nov. Holl.*

hifpida Cand. 7. Fr. caule fruticofo fuberecto ramisque hifpidis, foliis verticillatis linearibus revolutis patentibus bafi fubciliatis, calycibus terminalibus folitariis hifpidis. *Afia minor. Ad Volgam. Sibir.* (Fr. hirfuta Sibth.)

hirfuta 8. Fr. caule fruticofo fuberecto ramisque denfe hirtis, foliis verticillatis lanceolatis revolutis incurvis bafi ciliatis, floribus aggregatis hifpidis terminalibus. *Afric. bor. Aegypt.* (Fr. intermedia Cand.)

revoluta Forsk. 9. Fr. caule fruticofo diffufo, ramis fcabris, foliis verticillatis oblongis abbreviatis revolutis craffis incanis, floribus terminalibus fubfolitariis, calycibus glabris. *Aegypt. infer.*

microphylla Cav. 10. Fr. caule proftrato ramofo fuffruticofo, foliis ovalibus minimis 4fariam imbricatis glabris, floribus fubfolitariis terminalibus glabris. *Amer. auftr.*

nodiflora Lam. 11. Fr. caule proftrato, foliis ovatis petiolatis bafi calycibusque laevibus, floribus axillaribus. *Afric. auftr.*

portulacaefolia * 12. Fr. caule fruticofo erecto, foliis fubrotundis carnofis glabris, ftigmate 2fido, capfula 2valvi. *Inf. S. Helen.* (Beatfonia Roxb.)

** *Foliis pubefcentibus.*

pulverulenta 13. Fr. caule herbaceo proftrato diffufo, ramis pubefcentibus, foliis obovatis retufis fubtus pulverulento-fubtomentofis, petiolis ciliatis, floribus axillaribus terminalibusque fubfolitariis. *Anglia. Europ. auftr. Afric. bor. Tauria.* (Fr. canefcens Presl.)

corymbosa Desf. 14. Fr. caule fruticoso erecto, ramis velutinis, foliis verticillatis linearibus revolutis pulverulentis, floribus terminalibus corymbosis. *Numidia. Ins. Canar.* (Fr. ericaefolia C. Smith.)

velutina Brouss. 15. Fr. caule fruticoso, foliis lineari-oblongis obtusis utrinque calycibusque villosis. *Mauritania.*

mollis M. B. 16. Fr. caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis acutis villosis, floribus racemoso-paniculatis. *Caucas.*

1323. CANARINA.

Campanula *Ins. Canar.* Herba e radice tuberosa brachialis ramosa, foliis petiolatis hastatis laevibus, floribus solitariis flammeis speciosis. (C. Zanguebar Lour.?)

1324. PEPLIS.

Portula 1. P. foliis oppositis obovatis, floribus pedunculatis axillaribus geminis corollatis. *Europ. inundata.*

borysthenica Bess. 2. P. foliis obverse lanceolatis obsoletissime serrulatis, floribus sessilibus solitariis, calycibus 8dentatis, dentibus subulatis. *Ad fl. Borysthenem.*

occidentalis * 3. P. foliis oppositis lanceolatis obtusis basi attenuatis, floribus sessilibus axillaribus geminis apetalis. *Portorico. Guadalupa.* Bertero.

alternifolia M. B. 4. P. foliis alternis petiolatis lineari-spathulatis, floribus pedunculatis solitariis axillaribus subcorollatis. *Ad Volgam.*

1325. FLÖRKEA W.

palustris Nutt. *Amer. bor. aestuaria.* Planta tenera subsucculenta, foliis pinnatifidis glabris, laciniis lineari-lanceolatis, floribus solitariis pedunculatis albidis. (Fl. uliginosa Mühl., proserpinacoides W. Nectris pinnata Pursh.)

DIGYNIA.

1326. NECTRIS Schreb.

aquatica W. *Guiana. Carolina austr.* Planta aquatica foliis submersis multifidis capillaceis, emersis peltatis ovalibus, floribus subsolitariis pedunculatis albidis. (Cabomba aquatica Aubl., Aubletii Mx., Nectris peltata Pursh.)

1327. OXYRIA Hill.

reniformis Hook. *Alp. Europ. Regio arctica Europ. Asiae et Amer. bor.* Herba humilis erecta Rumicis facie, foliis sub-

radicalibus reniformibus glabris, pedunculis aggregatis ſubverticillatis. (Rumex digynus L., Rheum Wahlb. Lapathum Lam.)

1328. ATRAPHAXIS.

ſpinoſa 1. A. ramis ſpineſcentibus, foliis ſubrotundis glaucis. *Aſia media et bor.*

undulata 2. A. ramis inermibus, foliis oblongis acutis undulatis. *C. B. S.* (Polygonum Atraphaxis Thunb.)

1329. ORYZA.

ſativa 1. O. foliis linearibus elongatis, paniculae contractae ramis ſparſis ſcabris, floribus 6andris. *Ind. orient.* (Varietates numeroſas exhibent Lour. et Desvaux.)

latifolia Desv. 2. O. foliis lanceolato-linearibus, paniculae laxae ramis verticillatis baſi barbatis, floribus 3andris. *Nov. Granat.* Humb.

1330. ZIZANIA.

aquatica Lamb. 1. Z. panicula pyramidata ſuperne ſpicata ♀, flosculis erectis, ramis inferioribus verticillatis horizontalibus ♂, flosculis pendulis, utrisque longe cuſpidato-ariſtatis. *Lacus Amer. bor.* (Z. paluſtris L., clavuloſa Mx.)

miliacea Mx. 2. Z. panicula effuſa, flosculis ♀ et ♂ mixtis breviter ariſtatis. *Carolin. auſtr. Jamaica.* (Z. aquatica L.)

Retzii * 3. Z. paniculae umbellatae ramis racemoſis, pedicellis incraſſatis, flosculis ♂ ſuperioribus, utrisque ariſtatis glabris. *Ind. or.* (Pharus ariſtatus Retz.)

ciliata * 4. Z. panicula ſubracemoſa, flosculis utrisque muticis ciliatis. *Ind. or.* (Pharus ciliatus Retz.)

fluitans Mx. 5. Z. ſpicis axillaribus ſolitariis ſetaceis ſub-4floris, ſuperioribus ♂, utrisque muticis, culmo gracili ramoſo. *Ad oras lacus Champlain Americae bor.*

1331. POTAMOPHILA R. Br.

parviflora R. Br. *In fluviis Nov. Holl.* Gramen altum ramoſum, foliis anguſtis, panicula effuſa erecta.

TRIGYNIA.

1332. CHAMAEDOREA W.

gracilis W. 1. Ch. frondibus pinnatis, pinnis lato-lanceolatis falcatis, ſpadicibus ramoſis, floribus ♂ nutantibus, fructibus ovatis obtuſis. *Amer. auſtr.* (Boraſſus pinnatifrons Jacq. Martinezia lanceolata R. et P.)

linearis Mart. 2. Ch. frondibus abrupte pinnatis, pinnis linearibus acutiſſimis, racemo compoſito, ſpicis recurvis. *Peru.* (Martinezia R. et P.)

fragrans Mart. 3. Ch. frondibus furcatis, laciniis enſiformibus extrorſum ſerratis, ſpadicibus ramoſis, ramis ♂ erectis, fructibus ellipticis. *Peru.* (Nunnezharia R. et P. Nunnezia W.)

1333. SABAL Adanſ.

minor Perſ. *Carolina. Georgia.* Palma acaulis, frondibus flabelliformi-palmatis plicatis, ſtipitibus inermibus, ſpadicibus radicalibus. (Corypha minor Jacqu., pumila Walt., Chamaerops acaulis Mx. Rhapis acaulis W.)

1334. MORENIA R. et P.

fragrans R. et P. *Peru.* Palma gracilis, frondibus pinnatis, ſpadicibus ♂ quaternis, ♀ ſolitariis.

1335. RHAPIS L. fil.

flabelliformis Ait. 1. Rh. frondibus palmatis plicatis, plicis marginibusque aculeato-denticulatis. *China. Japon. Afr. orient.?* (Chamaerops excelſa Thunb. Corypha africana Lour.?)

arundinacea Ait. 2. Rh. frondibus ſimplicibus 2partitis, lobis acutis plicatis, plicis ſcabriuſculis. *Carolina.*

1336. CHAMAEROPS.

humilis 1. Ch. acaulis, frondibus palmatis plicatis, ſtipitibus ſpinoſis. *Hiſpania. Afric. bor.* (Phoenix humilis Cav.)

ſerrulata Mx. 2. Ch. caudice repente, ſtipitibus aculeato-ſerratis, frondibus palmato-plicatis. *Georgia.*

Hyſtrix Fraſer. 3. Ch. caudice repente, aculeis ſtipitum longiſſimis rigidis, frondibus plicato-palmatis. *Georgia.*

Palmetto Mx. 4. Ch. caudice arboreo, ſtipitibus inermibus, frondibus palmato-plicatis, ſpathis duplicatis. *Carolina. Florida. Mexico.* (Corypha Palmetto Walt. Ch. Mocini Humb. Bonpl.)

1337. LIVISTONIA R. Br.

inermis R. Br. 1. L. ſtipitibus inermibus. *Nov. Holl.*

humilis R. Br. 2. L. ſtipitibus aculeatis. *Nov. Holl.*

1338. CORYPHA.

cerifera Mart. 1. C. caudice annulato, frondibus flabelliformi-multifidis glaucis, ſpadicis ramis floribusque ſericeo-tomentoſis, ſpathis glabris, fructibus obtuſis. *Braſil.*

auftralis R. Br. 2. C. frondibus flabelliformi-palmatis, ftipitibus fpinulofis, calycibus acutis. *Nov. Holl.*

rotundifolia Lam. 3. C. frondibus peltatis orbiculatis palmato-multifidis, filis intermediis deciduis. *Inf. Molucc. Cochinchina.* (C. Saribus Lour.)

umbraculifera 4. C. frondibus pinnato-palmatis, filo laciniis interjecto, fpadice erecto. *Ind. or.*

Utan Lam. 5. C. frondibus flabelliformi-palmatis bafi truncatis, filo laciniis interjecto, fpadice erecto paniculato. *Inf. Molucc.*

Licuala Lam. 6. C. caudice humili, ftipitibus bafi aculeato-ciliatis, frondibus palmato-multifidis, laciniis praemorfis, fpadice erecto. *Inf. Molucc.* (C. Pilearia Lour.)

dulcis Humb. 7. C. frondibus flabelliformi-multifidis plicatis, filo laciniis interjecto, ftipitibus aculeatis lanatis, fpadice ramofiffimo tomentofo. *Nov. Hifpan.*

tectorum Humb. 8. C. frondibus plicato-palmatis, ftipitibus fpinulofo-ferratis, fpadicibus tomentofis. *Nov. Granata.*

Pumos Humb. 9. C. frondibus plicato-palmatis multipartitis, filo laciniis 2fidis interjecto, ftipitibus inermibus, fpadicibus ramofis pendulis. *Mexico. Cuba.* (C. maritima Humb.)

Miraguama Humb. 10. C. frondibus plicato-palmatis multipartitis fubtus argenteis, ftipitibus compreffis inermibus. *Cuba.*

† *nana* Humb. 11. C. caudice extus daedaleo-venofo, frondibus digitato-multifidis fubtus albidis, ftipite inermi, fpatha externe tomentofa. *Mexico.*

1339. PHOENIX.

dactylifera 1. Ph. pinnis lineari-lanceolatis complicatis ftrictis. *Afia med. et trop. Afric. bor.*

reclinata Jacq. 2. Ph. pinnis lineari-3quetris laxe patentibus. *Afr. auftr.*

farinifera Roxb. 3. Ph. pinnis lineari-fubulatis complicatis, caudice humili. *Ind. orient. Cochinchina.* (Ph. pufilla Lour.)

acaulis Roxb. 4. Ph. pinnis lineari-enfiformibus complicatis, inferioribus fpinefcentibus. *Ind. or.*

1340. LEPIDOCARYON Mart.

gracile Mart. 1. L. fpadicibus tomentofis, fpathis laxis, fructibus obovatis, fquamis convexiusculis. *Brafil.*

tenue Mart. 2. L. fpadicibus glabriusculis, fpathis appreffis, fructibus ellipticis, fquamis planis. *Brafil.*

1341. METROXYLON Rottb.

Sagus Kön. 1. M. caudice foveolato, frondibus pinnatis, pinnis oblongo-linearibus fubtus hifpidis, amentis diftichis alternis. *Inf. Molucc.* (Sagus Rumphii W.)

viniferum * 2. M. pinnis ſpinuloſis, fructibus oblongis ſulcatis. *Guinea.* (Raphia P. B. Sagus Palma-Pinus Gärtn.)

Ruffia * 3. M. fructibus turbinatis mucronatis ſulcatis. *Madagasc.* (Sagus Ruffia Jacq. pedunculata Poir.)

taedigerum * 4. M. fructibus lineari-ellipticis mucronatis ſulcatis. *Braſil.* (Sagus Mart.)

1342. HYPHAENE Gärtn.

coriacea Gärtn. *Aegypt. ſuper.* Palma caudice annulato dichotome ramoſo, frondibus digitato-palmatis, ſtipitibus ſpinuloſis. (Cucifera thebaica Delil.)

1343. LEOPOLDINIA Mart.

pulcra Mart. 1. L. pinnis linearibus acuminatis ſubtus concoloribus, fructuum fibris exterioribus discretis. *Braſilia.*

inſignis Mart. 2. L. pinnis lanceolatis ariſtatis ſubtus glaucis, fructuum fibris denſiſſime compactis, exterioribus reticulatis ligneſcentibus. *Braſil.*

1344. HYOSPATHE Mart.

elegans Mart. *Braſil.* Palma orgyalis, frondibus pinnato-fiſſis, fructibus olivaeformibus.

1345. ARECA.

Catechu 1. A. pinnis plicatis terminalibus praemorſis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis laevibus, fructibus ſubrotundo-ovatis. *Ind. or.*

luteſcens Bory. 2. A. pinnis plicatis praemorſis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſiſſimis laevibus, fructibus ſubrotundis gibboſis. *Inſ. Mascaren.*

humilis W. 3. A. pinnis cuneiformibus truncatis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis laevibus, fructibus globoſo-ovatis acutis. *Amboina.*

ſpicata Lam. 4. A. pinnis lineari-lanceolatis acutis, ſtipitibus ſpadicibusque ſimpliciter racemoſis laevibus, fructibus globoſis umbonatis. *Inſ. Molucc.*

glandiformis Lam. 5. A. pinnis linearibus acutis, ſtipitibus ſpadicibusque ſimpliciter racemoſis laevibus, fructibus oblongo-cylindricis. *Inſ. Molucc.*

globulifera Lam. 6. A. pinnis linearibus acutis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis brevibus, fructibus globoſo-ovatis. *Inſ. Molucc.*

alba Bory. 7. A. pinnis apice ſubinciſis, ſtipitibus ſpadicibusque ramoſis laevibus, fructibus oblongis. *Inſ. Mascaren.*

rubra Bory. 8. A. pinnis ſubtus glaucis, ſtipitibus glabris ſubſpinoſis, ſpadicibus ramoſis recte ſpinoſis. *Inſ. Mascaren.*

crinita Bory. 9. A. ſtipitibus hirſutis, ſpadicibus ramoſis incurvo-ſpinoſis. *Inſ. Mascaren.*

1346. OENOCARPUS Mart.

minor Mart. 1. Oe. caudice nudo tenui, frondibus ſparſis, laciniis calycis ♂ lanceolatis corolla acuta brevioribus, fructibus ovato-ellipticis acutis. *Braſil.*

Bacaba Mart. 2. Oe. caudice nudo, frondibus ſparſis, pinnis lineari-lanceolatis, laciniis calycis ovato-lanceolatis corolla acuta brevioribus, fructibus utrinque attenuatis. *Guiana.*

Batäua Mart. 3. Oe. caudice nudo, frondibus ſparſis, laciniis calycis ♂ 3angularibus corolla acutiuscula brevioribus, fructibus ellipticis obtuſis. *Amer. auſtr.*

diſtichus Mart. 4. Oe. caudice nudo, frondibus diſtichis, laciniis calycis ♂ 3angularibus corolla obtuſa brevioribus, fructibus ellipticis obtuſis. *Amer. auſtr.*

Sancona * 5. Oe. caudice nudo altiſſimo, frondibus pinnatis, pinnis criſpis. *Amer. auſtr.* (Oreodoxa W.)

frigidus * 6. Oe. caudice nudo gracili, frondibus pinnatis, foliolis flexuoſis, laciniis calycis ♂ corolla acuta brevioribus, fructibus globoſis. *Amer. auſtr.* (Oreodoxa Kunth.)

† *regius* * 7. Oe. caudice nudo medio incraſſato, frondibus pinnatis, fructibus ovatis. *Cuba.* (Oreodoxa Kunth.)

circumtextus Mart. 8. Oe. caudice fibrillis obtexto, pinnis oblongo-lanceolatis abrupte acuminatis, laciniis calycis ♂ 3angularibus corolla obtuſiuscula brevioribus, fructibus cylindricis. *Amer. auſtr.*

1347. EUTERPE Gärtn.

oleracea Mart. 1. E. frondibus pectinato-pinnatis glabriusculis, floribus denſe ramos obtegentibus, ſepalis ovatis denticulatis corolla brevioribus, fructibus globoſis. *Braſil.*

enſiformis Mart. 2. E. frondibus pectinato-pinnatis, pinnis ſubenſiformibus acuminatis, floribus laxis, ſepalis corolla 4plo brevioribus, fructibus globoſis. *Peru.* (Martinezia R. et P.)

edulis Mart. 3. E. frondibus pectinato-pinnatis ſubtus lepidotis, floribus laxis, ſepalis orbiculatis corolla brevioribus, fructibus globoſis. *Braſil.*

caribaea * 4. E. frondibus pectinato-pinnatis glabris, floribus laxis, fructibus oblongis ſubincurvis. *Inſ. Carib.* (Areca oleracea Jacq.)

Praga * 5. E. frondibus pinnatis, foliolis multijugis, fructibus globoſis roſtratis. *Nov. Andaluſ.* (Aïphanes Humb.)

† *aculeata* * 6. E. frondibus pinnatis, foliolis 4jugis. *Amer. auſtr.* (Aïphanes W.)

1348. WALLICHIA Roxb.

caryotoides Roxb. *Ind. or.* Palma acaulis, frondibus pinnatis cuneatis, inferioribus faſciculatis, ſpadice pendulo.

1349. GULIELMA Mart.

ſpecioſa Mart. *Nov. Granat. Braſil.* Palma elata caudice ſtipitibusque ſpinoſiſſimis, frondibus pinnatis criſpis aculeatis. (Bactris Gaſipaës Humb.)

1350. ELAEIS Jacq.

guineenſis Jacq. 1. E. caudice erecto, ſtipitibus ſpinoſo-ſerratis, antheris linearibus, fructibus ovatis ſubangulatis. *Guinea. Ind. occ.*

melanococca Gärtn. 2. E. caudice aſcendente, ſtipitibus ſpinoſo-ſerratis, antheris fructibusque ovatis acutis. *Nov. Granat.* (Alphonſia oleifera Humb.)

1351. SYAGRUS Mart.

cocoides Mart. *Braſil.* Palma mediocris, frondibus laxe pinnatis, fructibus lagenaeformibus.

1352. ELATE.

ſylveſtris *Ind. or.* Palma mediocris, frondibus pinnatis aculeatis.

1353. COCOS.

nucifera 1. C. caudice proceriſſimo flexuoſo baſi incraſſato inaequaliter annulato, frondibus patentibus, floribus ♀ ſubgloboſis, fructibus maximis ovato-3gonis. *Intra tropicos.*

botryophora Mart. 2. C. caudice proceriſſimo gracili annulato, frondibus erectis patulis, pinnis approximatis ſubcriſpis, floribus ♀ globoſis, fructibus ovatis obtuſis. *Braſil.*

oleracea Mart. 3. C. caudice proceriſſimo annulato, frondibus erecto-patentibus, pinnis ſubcriſpis, floribus ♀ conicis, fructibus ovatis. *Braſil. Cuba?* (C. criſpa Kunth.)

capitata Mart. 4. C. caudice craſſo annulato, baſibus ſtipitum ſpinoſorum perſiſtentibus capitato, frondibus patentibus ſtrictis ſubtus glaucis, floribus ♀ ovato-globoſis. *Braſil.*

coronata Mart. 5. C. caudice elato annulato, baſibus ſtipitum ſpinoſorum craſſis imbricatis capitato, frondibus erectis ſubtus albis, pinnis ſubcriſpis, floribus ♀ ovato-globoſis, fructibus ſubellipticis. *Braſil.*

flexuoſa Mart. 6. C. caudice mediocri incurvo, baſibus ſtipitum ſquamato, frondibus patentibus, pinnis laxis criſpis, floribus ♀ oblongis angulatis, fructibus roſtratis. *Braſil.*

campeſtris Mart. 7. C. caudice interne annulato, frondibus patenti-recurvis, pinnis ſtrictis ſubtus glaucis, floribus ♀ oblongis angulatis. *Braſil.*

Romanzoviana Cham. 8. C. caudice fuſiformi, pinnis enſiformibus reduplicatis, ſpadicibus pluribus. *Inſ. S. Catharinae. Braſil.*

† *chilenſis* Molin. 9. C. caudice inermi, pinnis enſiformibus complicatis, ſpicis quaternis. *Chili.*

comoſa Mart. 10. C. caudice ſubhumili inferne annulato baſi ſtipitum ſquamoſo, frondibus patentibus abbreviatis, pinnis approximatis latiusculis obtuſis, floribus ♀ globoſis, fructibus obovato-ellipticis. *Braſil.*

ſchizophylla Mart. 11. C. caudice humili annulato baſibus ſtipitum ſerrato-ſpinoſorum capitato, frondibus patentibus, pinnis obtuſis mucronatis terminalibus connexis, floribus ♀ ſubgloboſis, fructibus ellipticis. *Braſil.*

1354. MAXIMILIANA Mart.

regia Mart. 1. M. ſtaminibus exſertis, petalis membranaceis. *Braſil.*

inſignis Mart. 2. M. ſtaminibus incluſis, petalis carnoſis. *Braſil.*

1355. MARTINEZIA R. et P.

caryotaefolia Humb. *Amer. auſtr.* Palma caudice ſtipitibus ſpathisque ſpinoſis, frondibus pinnatis cuneatis apice 3lobis, ſpadice ramoſo inermi.

1356. CAMPYNEMA Labill.

lineare Labill. *Terra Diemen.* Planta gracilis pauciflora, foliis paucis gramineis.

1357. CYMATION *.

undulatum * 1. C. foliis lanceolatis canaliculatis undulatis, pedunculis ſubracemoſis cernuis. *Afr. auſtr.* (Lichtenſteinia W.)

laevigatum * 2. C. foliis lanceolatis canaliculatis planis, pedunculis ſubracemoſis pendulis. *Afric. auſtr.* (Lichtenſteinia W.)

1358. COLCHICUM.

byzantinum Ker. 1. C. foliis oblongis plicatis, ſpatha multiflora, laciniis corollae oblongo-lanceolatis venoſis. *Thracia. Aſia minor.* (Flores autumnales.)

autumnale 2. C. foliis lanceolatis planis erectis, ſpatha ſub-1flora, laciniis corollae elliptico-lanceolatis. *Europ. prata.* (Flores autumnales.)

variegatum 3. C. foliis lanceolatis undulatis, ſpatha ſub-1flora, laciniis corollae lanceolatis acutis teſſellatis. *Sicil. Creta. Luſitan.* (Flores autumnales.)

arenarium Kit. 4. C. foliis lineari-lanceolatis obtufis canaliculatis, fpatha fub-1flora, laciniis corollae fublinearibus. *Hungar. Italia fup. Tauria.* (Flores autumnales.)

montanum 5. C. foliis linearibus patentiffimis, fpatha fub-1flora, laciniis corollae fublinearibus. *Europ. auftr.* (C. bulbocodioides Brot. Merendera Ram. Red.) (Flores autumnales.)

alpinum Cand. 6. C. foliis linearibus, fpatha 1flora, laciniis corollae oblongis obtufis, tribus exterioribus longioribus, ftylis longe exfertis. *Alp. pennin. cott. jul.* (Flores aeftivales.)

caucaficum * 7. C. foliis linearibus canaliculatis, fpatha fubmultiflora, antheris verfatilibus, laciniis corollae oblongis ftriatis. *Caucafus.* (Merendera M. B. Bulbocodium 3gynum Adam.) (Flores vernales.)

1359. ANDROCYMBIUM W.

melanthioides W. 1. A. foliis lineari-lanceolatis bafi dilatatis, bracteis coloratis flores fubcapitatos obvallantibus. *C. B. S.*

eucomoides W. 2. A. foliis oblongo-lanceolatis cucullatis, caule 3floro, floribus ebracteatis, petalis haftatis. *C. B. S.* (Melanthium eucomoides Jacq.)

1360. SCHEUCHZERIA.

paluftris *Europ. et Amer. bor. paludes.* Planta Junci fpeciem prae fe ferens, foliis femiteretibus vaginantibus apice foratis, floribus racemofis virentibus.

1361. TOFIELDIA Hudf.

alpina Sternb. 1. T. fcapo nudo, floribus fpicato-capitatis ebracteatis, calyculo minimo. *Alp. Europ. med. et bor. Afia et Amer. bor.* (T. paluftris Hudf. Sm., borealis Wahlenb., pufilla Pursh. Anthericum calyculatum L. Helonias borealis W.)

paluftris Cand. 2. T. fcapo fubfoliato, floribus racemofis bracteatis, calyculo petalisque obtufiusculis. *Europ. bor. paludes et colles calcarei.* (T. calyculata Wahlb., alpina Sm., rubra Braun., racemofa Hopp. Anthericum calyculatum *α.* L. Hebelia collina et allemannica C. C. Gmel.)

frigida Kunth. 3. T. fcapo nudiusculo, floribus racemofis bracteatis, calyculo petalisque ftriatis acutis. *Alp. Peru.*

ftenopetala Sm. 4. T. fcapo fubfoliato, floribus racemofis, bracteis pedicellos fuperantibus, petalis lanceolatis acutis. *Amer. bor.*

cernua Sm. 5. T. fcapo nudo, floribus racemofis cernuis, pedicellis horizontalibus elongatis, bracteis breviffimis. *Sibir. Carolin. bor.?* (T. glabra Nutt.)

glaberrima Macbr. 6. T. radice tuberosa, scapo foliato, floribus racemosis, pedicellis aggregatis subverticillatis, calyculo 3dentato, staminibus basi dilatatis petala ovalia superantibus. *Carolin. austr.*

pubens Dryand. 7. T. scapo scabro pulverulento, racemo cylindrico interrupto, pedicellis aggregatis subternis, bracteis minutis. *Amer. bor.* (Narthecium Mx.)

glutinosa Pursh. 8. T. scapo nudo glanduloso-pubescente, racemo ovato coarctato, pedicellis glutinosis, bracteis minutis, staminibus petala spathulata superantibus. *Amer. bor.* (Narthecium Mx. Melanthium aspericaule Poir.?)

1362. HELONIAS.

latifolia Mx. 1. H. scapo nudo, foliis lanceolato-ensiformibus nervosis, racemo ovato conferto, bracteis lineari-lanceolatis. *Amer. bor.* (H. bullata L.)

virescens Kunth. 2. H. foliis linearibus striatis caulem foliatum aequantibus, racemo subcomposito, pedicellis elongatis, bracteis ovato-lanceolatis abbreviatis. *Nov. Hispan.*

erythrosperma Mx. 3. H. caule folioso, foliis lanceolato-linearibus, racemo oblongo, seminibus arillatis. *Amer. bor.* (H. laeta Sims. Melanthium laetum Ait., phalangioides Lam. Anthericum sub-3gynum Jacq.)

angustifolia Mx. 4. H. caule inferne foliato, foliis linearibus elongatis, racemo oblongo laxo, bracteis abbreviatis, seminibus linearibus. *Carolina.*

1363. XEROPHYLLUM Mx.

gramineum Nutt. 1. X. caule foliato, foliis linearibus subtus glaucis, panicula diffusa, petalis lanceolatis, staminibus brevissimis. *Amer. bor.* (Helonias Ker.)

tenax Nutt. 2. X. caule foliato, foliis subulato-setaceis longissimis, racemo laxo, filamentis petala elliptica superantibus. *Amer. bor.* (Helonias Pursh.)

asphodeloides Nutt. 3. X. caule foliato, foliis subulato-setaceis, racemo oblongo conferto, bracteis setaceis, filamentis petala aequantibus. *Amer. bor.* (X. setifolium Mx. Helonias L.)

1364. ASTELIA Banks.

alpina R. Br. 1. A. foliis strictis utrinque sericeis, racemo composito, pedunculis paucifloris, baccis 1locularibus. *Terra Diemen.*

Menziesiana Sm. 2. A. foliis strictis subtus sericeis, scapo hirsuto, racemo paniculato, baccis 3locularibus. *Ins. Sandwich.*

pumila * 3. A. foliis lanceolatis rigidis utrinque glaberrimis apice subserrulatis subtus 3nerviis, axillis paleaceis, pedunculis 1floris brevissimis. *Terra ignis.* (Melanthium pumilum Forst. Funckia W.)

† 1365.

†1365. HYDROMYSTRIA Meyer.

ſtolonifera Meyer. *Surinam.* Herba aquatica ſtolonifera, foliis petiolatis ſuborbiculatis nitidis, floribus albis pedunculatis.

1366. TRIGLOCHIN.

* *Fructu 6partito, ſ. capſulis ſex.*

procerum R. Br. 1. Tr. ſcapo elongato, floribus racemoſis, fructu prismatico ſtylis linearibus perſiſtentibus coronato. *Nov. Holl. Nov. Hiſpan. Nov. Caeſar.* (Tr. elatum Nutt., mexicanum Kunth.)

maritimum 2. Tr. ſcapo folia ſubexcedente, floribus racemoſo-ſpicatis, fructu ovato angulato ſtylis perſiſtentibus recurvis coronato. *Europ. Amer. bor. ſalſa.*

** *Fructu 3partito, ſ. capſulis tribus.*

† *Radice fibroſa.*

paluſtre 3. Tr. ſcapo elongato, floribus racemoſis, fructu lineari angulato baſi attenuato apice nudo. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

† *dubium* R. Br. 4. Tr. ſcapo elongato, floribus racemoſo-ſpicatis, fructu lineari angulato, capſula una alterave ſubabortiente. *Nov. Holl.*

triandrum Mx. 5. Tr. ſcapo folia aequante, floribus racemoſis 1-4-andris, fructu baſi gibbo. *Carolina auſtr.*

ſtriatum R. et P. 6. Tr. ſcapo filiformi ſtriato folia linearia nervoſa aequante, ſpica ſimplici coarctata ſubracemoſa, fructu ſubrotundo. *Peru.*

montevidenſe * 7. Tr. radice ſtolonifera, ſcapo racemoſo foliis breviori, fructu globoſo 2-3partito. *Monte Video.* Sello.

decipiens R. Br. 8. Tr. fructu ſubrotundo apice nudo, capſulis ternis alternantibus disſepimentum formantibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

mucronatum R. Br. 9. Tr. ſpica pauciflora, fructu ſubturbinato ſtylis recurvis coronato, capſulis ternis alternis disſepimentum formantibus. *Nov. Holl.*

ciliatum R. et P. 10. Tr. caule foliato ſuperne torto, foliis alternis vaginantibus ciliatis, ſpica ſubramoſa, floribus bracteatis, fructu ovato. *Peru.*

†† *Radice bulboſa.*

Barrelieri Loiſ. 11. Tr. foliis ſcapum racemoſum aequantibus, fructu ſubprismatico. *Gallia auſtr. Corſica. Sicilia. Afric. bor.*

bulboſum 12. Tr. foliis ſcapum racemoſum aequantibus, fructu baſi gibbo apice attenuato. *C. B. S.*

1367. Melanthium.

uniflorum Jacq. 1. M. foliis lineari-lanceolatis ciliatis caulem pauciflorum ſuperantibus, petalis lanceolatis ſubunguiculatis. *C. B. S.* (M. gracile Desrouſſ.? Tulipa Breyniana L.)

punctatum Cav. 2. M. acaule, foliis lanceolatis carinatis imbricatis, floribus ſeſſilibus. *Mauritania.*

gramineum Cav. 3. M. acaule, foliis linearibus carinatis imbricatis, floribus ſeſſilibus, petalis lanceolatis ſubunguiculatis. *Mauritania.*

junceum Jacq. 4. M. foliis lineari-ſubulatis ſuperioribus baſi latioribus caulem ſuperantibus, ſpica flexuoſa. *C. B. S.* (M. 3quetrum Thunb.)

ſecundum Lam. 5. M. foliis linearibus elongatis punctato-tuberculatis, floribus ſpicatis ſecundis ebracteatis. *C. B. S.*

luteum Th. 6. M. foliis lanceolatis planis, floribus ſpicatis, petalis obtuſis. *Japon.*

ciliatum Th. 7. M. foliis enſiformibus cucullatis cartilagineo-ciliatis, floribus ſpicatis. *C. B. S.*

glaucum Nutt. 8. M. foliis gramineis glaucis marginatis, racemo ſimplici paucifloro. *Ad lacus magnos Amer. bor.*

ſibiricum 9. M. foliis radicalibus linearibus, caule nudiuſculo, racemo ſubcompoſito bracteato, petalis ſubexunguiculatis. *Sibir.*

hybridum Walt. 10. M. foliis oblongo-linearibus ſubplicatis, panicula racemoſa pubeſcente ſuperne feminea, petalis ſubrotundis undulatis, glandulis coalitis, ſtylis uncinatis. *Carolina.* (M. latifolium Lam. racemoſum Mx.)

monoecum Walt. 11. M. foliis lineari-lanceolatis, panicula racemoſa ſuperne feminea, petalis oblongis planis, ſtylis abbreviatis. *Carolin.* (M. polygamum Walt.)

virginicum 12. M. foliis lineari-lanceolatis, caule pubeſcente, panicula pyramidata, floribus omnibus ☿, petalis oblongis ſubhaſtatis planis. *Amer. bor.* (Helonias virginica Sims. Leimanthium W.)

1368. Anguillaria R. Br.

uniflora R. Br. 1. A. caule 1floro, foliis laxis baſi vaginantibus cucullatis. *Terra Diemen.*

indica R. Br. 2. A. caule ſub-1floro foliis linearibus multo brevioti, foliis floralibus latioribus. *Malabar.* (Melanthium indicum L.)

biglanduloſa R. Br. 3. A. ſpica pauciflora, floribus hermaphroditis, unguibus petalorum 2glanduloſis. *Nov. Holl.*

dioeca R. Br. 4. A. floribus ſpicatis dioecis, unguibus petalorum ſubvittatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

capenſis * 5. A. foliis lanceolatis baſi vaginantibus cucullatis, floribus racemoſis, petalis punctatis. *C. B. S.* (Melanthium capenſe L., aethiopicum Thunb. apud Desrouſſ.)

*cochinchinensis** 6. A. caule procumbente aculeato, foliis ternis triquetris, pedunculis axillaribus 1floris. *Cochinchina.* (Melanthium cochinchinense Lour.)

1369. ZIGADENUS Mx.

glaberrimus Mx. 1. Z. caule folioso, foliis linearibus canaliculatis elongatis, racemo composito, bracteis ovatis acuminatis. *Carolina austr.* (Melanthium virginicum Walt.? Helonias glaberrima Sims.)

elegans Pursh. 2. Z. caule subaphyllo folia radicalia linearia superante, racemo subcomposito, bracteis linearibus. *Amer. bor.*

1370. ORNITHOGLOSSUM Salisb.

viride Salisb. *C. B. S.* Herba caule subramoso foliato, foliis lanceolatis distichis, floribus pedunculatis cernuis viridi-purpureis. (Melanthium viride Th.)

1371. CALOCHORTUS Pursh.

elegans Pursh. *Louisiana.* Herba radice bulbosa, folio radicali solitario gramineo, scapo 3floro, floribus albis.

1372. NOLINA Mx.

georgiana Mx. *Carolina austr. Georgia.* Herba radice bulbosa, foliis linearibus rigidiusculis, scapo ramoso squamato, floribus racemosis albis. (Phalangium virgatum Lam.)

1373. WURMBEA Thunb.

longiflora W. 1. W. foliis lanceolatis acuminatis vaginantibus erectis spica flexuosa subbrevioribus, tubo corollae limbum superante, laciniis patulis oblongis obtusis. *C. B. S.* (Melanthium Wurmbeum Thunb.)

campanulata W. 2. W. foliis lineari-lanceolatis vaginantibus spicam cylindricam densam aequantibus, tubo corollae campanulato limbum patentem aequante. *C. B. S.* (Melanthium 1petalum L. suppl. Ker. W. pumila W. var.)

purpurea Dryand. 3. W. foliis linearibus basi cucullatis spicam strictam superantibus, corollae tubo brevissimo, laciniis limbi patentissimis acutis. *C. B. S.* (Melanthium spicatum Houtt. Ker.)

1374. XEROTES R. Br.

* *Flores ♀ capitati: folia apice integerrima.*

flexifolia R. Br. 1. X. foliis distichis acutis denticulatis flexuosis, spica mascula subramosa folia superante. *Nov. Holl.* (Dracaena obliqua Thunb.)

mucronata R. Br. 2. X. foliis diſtichis ſtrictis mucronatis denticulatis baſi dilatatis integris ſpica maſcula longioribus. *Nov. Holl.*

collina R. Br. 3. X. foliis linearibus ſtrictis denticulatis acutiſſimis baſi dilatatis laceris elongatis, capitulo ♀ ſeſſili. *Nov. Holl.*

glauca R. Br. 4. X. foliis linearibus ſtrictis elongatis obtuſiuſculis denticulatis baſi dilatatis laceris, ſpicae ♂ glomerulis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

leucocephala R. Br. 5. X. foliis anguſte linearibus margine laevibus caule multo longioribus, floribus utriſque capitatis, receptaculo lanato. *Nov. Holl.*

** *Flores utrique racemoſi, vel ♀ ſpicati ♂ paniculati.*

pauciflora R. Br. 6. X. foliis anguſtiſſime linearibus acutis laevibus baſi dilatata integra caule diviſo brevioribus, racemo ♂ paucifloro, verticillis diſtantibus. *Nov. Holl.*

filiformis R. Br. 7. X. foliis filiformi-ſemiteretibus elongatis margine ſcabris ſubtus ſtriatis caule longioribus, racemo ♂ ſubſimplici. *Nov. Holl.*

tenuifolia R. Br. 8. X. foliis filiformibus elongatis ſupra canaliculatis ſubtus ſulcato-ſtriatis, racemis ♂ ſubdiviſis, ramis alternis. *Nov. Holl.*

gracilis R. Br. 9. X. foliis longiſſimis anguſtiſſime linearibus apice planis integerrimis ſupra canaliculatis ſubtus ſtriatis, paniculis ♂ raris, ramis alternis. *Nov. Holl.*

denticulata R. Br. 10. X. foliis elongatis compreſſo-filiformibus canaliculatis apice 2-3dentatis, racemis ♂ ſubdiviſis. *Nov. Holl.*

laxa R. Br. 11. X. foliis elongatis linearibus planis apice integris, paniculis ♂ effuſis, ramis verticillatis, racemis raris, pedicellis ſolitariis perianthio ſubgloboſo brevioribus bracteola longioribus. *Nov. Holl.*

*** *Flores ſpicati ſ. paniculati, ramis oppoſitis verticillatisve. Perianthia ♂ ſeſſilia, bracteis imbricata. Capſula laevis. Folia apice denticulata. Acaules.*

rigida R. Br. 12. X. foliis diſtichis cartilagineis ſubtus convexis margine laevibus, apice 2dentato ſemitruncatis, ſcapo ſpicisque abbreviatis, antheris alternis difformibus. *Nov. Holl.* (Lomandra Labill.)

montana R. Br. 13. X. foliis elongatis linearibus planis membranaceis margine laevibus, apicis acuti denticulis lateralibus breviſſimis, ſpica ♀ indiviſa abbreviata. *Nov. Holl.*

fluviatilis R. Br. 14. X. foliis elongatis anguſte linearibus canaliculatis margine laevibus apice 2-3dentatis, ſinu acuto, ſpicis ♀ ſubdiviſis, bracteis elongatis rigidis. *Nov. Holl.*

longifolia R. Br. 15. X. foliis elongatis ſubfalcato-enſiformibus apice exciſis inaequaliter 3dentatis, ſcapo ancipiti, flo-

ribus verticillatis, bracteis rigidis elongatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.* (Lomandra Labill.)

Hystrix R. Br. 16. X. foliis elongatis linearibus laxis apice subdentatis, scapo utrinque convexiusculo, verticillis florum approximatis, bracteis foliaceis longissimis rigidis. *Nov. Holl.*

arenaria R. Br. 17. X. foliis elongatis linearibus margine laevibus apice eroso-dentatis, panicula ♂ simplici, ramis oppositis, glomerulis globosis, bracteis subulatis reflexis, perianthio obtuso. *Nov. Holl.*

**** *Panicula ♂ verticillata, floribus pedicellatis glomeratis nutantibus. Caps. rugosa. Folia apice integra. Acaules.*

distans R. Br. 18. X. foliis longissimis canaliculatis margine scaberrimis, paniculae ♂ ramis indivisis, glomerulis distantibus pedicellis perianthioque brevioribus. *Nov. Holl.*

media R. Br. 19. X. foliis longissimis canaliculatis margine laevibus, paniculae ♂ ramis indivisis, glomerulis sub-5floris, spica ♀ ramosa, capitulis pedunculatis. *Nov. Holl.*

decomposita R. Br. 20. X. foliis longissimis canaliculatis margine laevibus, paniculae ♂ decompositae glomerulis paucifloris. *Nov. Holl.*

multiflora R. Br. 21. X. foliis longissimis canaliculatis dorso margineque glabriusculis, paniculae ♂ ramis indivisis, glomerulis multifloris, pedicellis perianthio longioribus. *Nov. Holl.* (X. aemula R. Br.)

Bankſii R. Br. 22. X. caulescens, foliis distichis planis margine scabris, thyrso ♀ scapum ancipitem subaequante, ramis 4gonis brevissimis. *Nov. Holl.*

***** *Spica ♂ et ♀ cylindrica.*

hastilis R. Br. 23. X. acaulis, spica longissima, scapo tereti, foliis elongatis. *Nov. Holl.*

1375. FLAGELLARIA.

indica *Ind. or. Inf. Molucc.* Fruticulus scandens, foliis distichis lanceolatis acuminatis cirrho convoluto terminatis, floribus terminalibus paniculatis albis.

1376. TRILLIUM.

* *Floribus erectis.*

sessile 1. Tr. flore sessili, petalis lanceolatis erectis (fuscis) calyce duplo longioribus, foliis sessilibus ovato-oblongis acutis. *Amer. bor.*

petiolatum Pursh. 2. Tr. flore sessili, petalis lineari-lanceolatis erectis calyce sublongioribus, foliis longissime petiolatis ovali-lanceolatis acutis. *Ad fontes fl. Columbiae. Amer. bor. occid.*

ovatum Pursh. 3. Tr. flore pedunculato, petalis oblongis acutis patentibus (purpureis) calyce lineari ſublongioribus, foliis ovatis acutis ſeſſilibus. *Ad fl. Columbiam. Amer. bor. occid.*

puſillum Mx. 4. Tr. flore pedunculato, petalis (carneis) calycem aequantibus, foliis ovali-oblongis obtuſis ſeſſilibus. *Carolin. auſtr.* (Tr. pumilum Pursh.)

obovatum Pursh. 5. Tr. flore pedunculato, petalis obovatis obtuſiusculis calycem aequantibus (ſubroſeis), foliis ovato-rhombeis acuminatis ſeſſilibus. *Canada. Camtſchatca.*

undulatum W. 6. Tr. flore pedunculato erecto, petalis oblongis acutis undulatis calyce anguſto longioribus, foliis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Amer. bor.*

** *Floribus cernuis, nutantibus, pendulis.*

erythrocarpon Mx. 7. Tr. pedunculo cernuo, petalis ovali-lanceolatis calyce anguſto longioribus acuminatis (albis baſi purpureis), foliis ſubcordato-ovatis petiolatis. *Amer. bor.* (Tr. pictum Pursh.)

grandiflorum Salisb. 8. Tr. pedunculo inclinato, flore cernuo, petalis ſpathulato-lanceolatis patentibus calycem excedentibus baſi conniventibus (albis), foliis late rhombeo-ovatis acutis. *Amer. bor.*

rhomboideum Mx. 9. Tr. pedunculo inclinato, flore nutante, petalis ovatis acuminatis patentibus calycem aequantibus (fuſco-purpureis), foliis late rhombeis acuminatis ſeſſilibus. *Amer. bor.* (Tr. erectum L. purpureum Kin. apud Ell.)

cernuum 10. Tr. pedunculo recurvato, petalis lanceolatis acuminatis reflexis calycem aequantibus (albis), foliis late rhombeis acutis breviſſime petiolatis. *Amer. bor.*

Catesbaei Ell. 11. Tr. pedunculo recurvato, petalis lanceolatis acuminatis calycem ſuperantibus (roſeis), foliis obovatis acutis baſi attenuatis. *Carolin. auſtr.*

nervoſum Ell. 12. Tr. pedunculo recurvato, petalis oblongo-lanceolatis calycem ſuperantibus (roſeis), foliis lanceolatis 3nerviis. *Carolina. Georgia.*

ſtyloſum Nutt. 13. Tr. pedunculo recurvo abbreviato, petalis oblongis obtuſis undulatis calyce longioribus latioribusque (roſeis), ſtylis coalitis, foliis elliptico-lanceolatis ſubpetiolatis. *Carolina. Georgia.*

pendulum W. 14. Tr. pedunculo inclinato, flore pendulo, petalis ovatis acutis planis calycem aequantibus (ochroleucis venoſis), foliis ſubſeſſilibus ſubrotundo-rhombeis acuminatis. *Penſylvan.*

1377. MEDEOLA.

virginica *Amer. bor.* Herba e radice tuberoſa, foliis verticillatis oblongo-lanceolatis acuminatis, floribus pedunculatis aggregatis flavo-virentibus. (Gyromia Nutt.)

1378. MYRSIPHYLLUM W.

asparagoides W. 1. M. foliis ovatis basi subcordatis obliquis. *C. B. S.* (Medeola L.)

angustifolium W. 2. M. foliis ovato-lanceolatis. *C. B. S.* (Medeola L.)

1379. VERATRUM.

nigrum 1. V. panicula supradecomposita, bracteis elongatis, pedicellis tomentosis, petalis patentissimis subintegerrimis, foliis ovato-oblongis plicatis. *Hungar. Sibir.*

album 2. V. panicula decomposita, bracteis flores subaequantibus, pedicellis pubescentibus, petalis erectiusculis obtusiusculis serrulatis, foliis ovato-oblongis plicatis. *Europ. austr.* (V. Lobelianum Bernh. var.)

viride Ait. 3. V. panicula decomposita, bracteis ciliatis pedicellos tomentoso-floccosos aequantibus, petalis patulis acutiusculis serrulatis, foliis ovato-oblongis plicatis. *Amer. bor.* (V. album Mx.)

parviflorum Mx. 4. V. panicula composita, bracteis pedicellos villosos superantibus, petalis patentibus subdenticulatis basi staminiferis, foliis oblongo-lanceolatis planis subtus pubescentibus. *Amer. bor.* (Melanthium bracteolare Desrouss.)

† *Sabadilla* Retz. 5. V. racemo spicato, floribus secundis subnutantibus, petalis ovatis basi staminiferis, capsulis oligospermis. *Patria?*

angustifolium Pursh. 6. V. panicula simplici, petalis linearibus, foliis longissimis linearibus carinatis. *Virginia. Carolina.*

luteum 7. V. racemo elongato nutante, pedicellis aggregatis glabris, petalis linearibus, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis. *Amer. bor.* (Melanthium densum Lam. Helonias lutea Sims., dioeca Pursh., pumila Jacq. Chamaelirium W.)

1380. DIOSCOREA.

* *Foliis compositis.*

pentaphylla 1. D. foliis alternis quinato-ternatis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis cuspidatis venosis, caule aculeato bulbifero. *Ind. or. Ins. Molucc.*

triphylla 2. D. foliis alternis ternatis glabris, foliolis ovato-oblongis acuminatis 5nerviis, caule aculeato, racemis paniculatis. *Ind. or. Ins. Molucc.*

trifoliata Humb. 3. D. foliis alternis ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis 3nerviis, caule inermi, spicis ♂ aggregatis simplicibus. *Caracas.*

tomentosa * 4. D. foliis alternis ternatis subtus tomentosis, foliolis oblongis mucronatis, lateralibus obliquis altero latere 3nerviis, spicis masculis compositis,

femineis simplicibus capsulisque tomentosis. *Ind. orient.*

** *Foliis lobatis.*

septemloba Thunb. 5. D. foliis alternis cordatis 7lobis 7nerviis glabris, floribus axillaribus racemosis. *Japon.*

quinqueloba Thunb. 6. D. foliis alternis cordatis 5lobis 9nerviis acuminatis, racemis axillaribus simplicibus filiformibus subgeminis. *Japon.*

† *palmata* Pers. 7. D. foliis palmatis 4-5lobis acuminatis. *Amer. austr.*

trifida L. suppl. 8. D. foliis cordatis 3lobis, lobis lateralibus sinuato-lobatis nervosis glabris, caule 4angulo alato, paniculis axillaribus. *Surinam.*

triloba Lam. 9. D. foliis cordatis 3lobis acutis 5nerviis, petiolis cauleque ancipiti-alatis. *Patria?*

brasiliensis W. 10. D. foliis cordatis 3lobis acutis 7nerviis, caule tereti compresso, spicis axillaribus aggregatis abbreviatis. *Brasil.*

*** *Foliis cordatis.*

† *peltata* Pers. 11. D. foliis subpeltatis basi cordato-truncatis oblongis acuminatis. *Patria?*

angustifolia Lam. 12. D. foliis subcordato-lanceolatis 3nerviis cauleque laevibus, racemis simplicibus. *Peru.*

cayennensis Lam. 13. D. foliis cordato-hastatis basi subtruncatis 5nerviis, racemis axillaribus solitariis simplicibus. *Cayenna.*

verticillata Lam. 14. D. foliis ternis longe petiolatis subcordatis margine petiolisque aspero-denticulatis sub-5nerviis, caule sarmentoso muricato. *Java.*

nummularia Lam. 15. D. foliis oppositis cordato-oblongis cuspidatis 5nerviis, spicis compositis verticillatis filiformibus, fructibus suborbicularibus. *Ins. Molucc.*

punctata R. Br. 16. D. foliis oppositis alternisque cordatis acuminatis 5nerviis reticulatis puncticulatis, spicis ♂ fasciculatis, ♀ subsolitariis. *Nov. Holl.*

transversa R. Br. 17. D. foliis alternis truncato-cordatis nitidis puncticulatis acuminatis 5nerviis venosis. *Nov. Holl.*

pilosiuscula Berter. 18. D. foliis subcordato-oblongis cuspidatis 5nerviis subtus pilosiusculis, racemis elongatis simplicibus, capsulis hirsutis. *Hispaniola.*

perforata Bert. 19. D. foliis cordato-oblongis acuminatis 5nerviis foratis subtus ramisque hirsutis. *Guadalupa.*

lutea Meyer. 20. D. foliis cordato-ovatis acuminatis glabris 5nerviis, nervis extimis 2partitis, racemis geminis simplicissimis glaberrimis. *Surinam.*

aculeata 21. D. foliis profunde cordatis acuminatis 7nerviis, caule aculeato bulbifero. *Malabar. Ins. Molucc.*

alata 22. D. foliis oppositis sagittatis cuspidatis 7nerviis, nervis extimis 2partitis, caule alato bulbifero. *Ind. or. Ins. Molucc.*

bulbifera 23. D. foliis alternis profunde cordatis acuminatis 7nerviis, nervis extimis 2fidis, venis transversis

reticulatis, caule bulbifero, ſpicis ♂ faſciculatis. *Ind. or. Nov. Holl.*

altiſſima Lam. 24. D. foliis oppoſitis cordatis ſubrotundo-ovatis acutis 7nerviis, caule tereti laevi, racemis ſimplicibus pendulis. *Martinica.* (D. martinicenſis*).

eburnea Lour. 25. D. foliis cordatis acuminatis glabris 7nerviis, ramis 4gonis, racemis ſimplicibus elongatis, floribus hermaphroditis. *Cochinchina.*

trachycarpa Humb. 26. D. foliis cordato-lanceolatis cuſpidatis 7nerviis reticulato-venoſis, ſpicis ♀ ſimplicibus, capſulis papilloſo-aſperis. *Guiana.*

polygonoides Humb. 27. D. foliis alternis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis, lobis baſeos diſtantibus, caule laevi tereti. *Ad Orinocum.*

coriacea Humb. 28. D. foliis cordato-oblongis acuminatis coriaceis 7nerviis, ſpicis axillaribus elongatis aggregatis, caule tereti laevi. *Quito.*

cuſpidata Humb. 29. D. foliis alternis cordato-lanceolatis longiſſime acuminatis 7nerviis, racemis ſimplicibus longiſſimis, caule tereti. *Amer. auſtr.*

aſpera Humb. 30. D. foliis profunde cordatis ovatis acuminatis 7nerviis utrinque glabris ſubtus nitidis, ſpicis ♂ geminis ſimplicibus, caule ſcabro. *Ad Orinoc.*

ſcabra Humb. 31. D. foliis truncato-cordatis late ovatis 7nerviis utrinque glabris ſubtus nitidis, ſpicis ♂ ſolitariis 2fidis, caule aſpero. *Ad Orinoc.*

pubeſcens Poir. 32. D. foliis profunde cordatis ovatis acuminatis 7nerviis ſubtus pubeſcentibus, racemis axillaribus compoſitis villoſiuſculis. *Cayenn.*

rotundata Poir. 33. D. foliis oppoſitis cordato-ſubrotundis acuminatis 7nerviis glabris, ſpicis aggregatis filiformibus folio brevioribus. *Portorico.*

ſagittata Poir. 34. D. foliis alternis ſagittatis acuminatis 9nerviis reticulatis glabris, ſpicis ♀ elongatis pedunculatis, capſulis ellipticis. *Cayenn.*

villoſa 35. D. foliis alternis oppoſitis verticillatisque cordatis acuminatis 9nerviis ſubtus pubeſcentibus, nervis extimis ſimplicibus, racemis compoſitis glabris. *Amer. bor.* (D. quinata Walt., paniculata Mx.)

quaternata Walt. 36. D. foliis quaternis alternisve cordatis acuminatis 9nerviis utrinque glabris, nervis lateralibus 2fidis, racemis compoſitis. *Amer. bor.*

piperifolia Humb. 37. D. foliis alternis cordatis ovatis acuminatis 9nerviis, lobis baſeos approximatis, capſulis ellipticis. *Amer. auſtr.*

ſativa 38. D. foliis alternis cordatis ſubrotundo-ovatis cuſpidatis 9nerviis, lobis baſeos approximatis, capſulis obovatis, caule tereti laevi. *Ind. or. Inſ. Molucc.*

japonica Thunb. 39. D. foliis ſuboppoſitis cordatis oblongis acuminatis 9nerviis, petiolis 4gonis, caule angulato glabro. *Japon.*

lucida R. Br. 40. D. foliis alternis cordatis acuminatis 9nerviis nitidis, venulis parallelis ſubſimplicibus, ramulis angulato-ſtriatis. *Nov. Holl.*

****Foliis oblongis.*

oppositifolia 41. D. foliis oppositis ovato-oblongis acutis 5nerviis glabris, spicis paniculatis elongatis, caule tereti laevi. *Ind. or.*

cirrhosa Lour. 42. D. foliis oppositis alternisque oblongo-lanceolatis oblique acuminatis glaberrimis 3nerviis, spicis axillaribus compositis, floribus hermaphroditis 3andris, caule cirrhoso. *Ind. or. Cochinchina.*

1381. RAJANIA.

hexaphylla Thunb. 1. R. foliis digitatis senis glabris, foliolis oblongis acutis subtus reticulato-venosis, racemis axillaribus. *Japon.*

quinata Thunb. 2. R. foliis digitatis quinatis, foliolis obovatis emarginatis mucronatis, floribus corymbosis. *Japon.*

quinquefolia 3. R. foliis digitatis quinatis, foliolis oblongo-lanceolatis obtusis 3nerviis, racemis lateralibus simplicibus. *Ind. occid.*

cordata 4. R. foliis subcordato-ovatis acuminatis sub-7nerviis, racemis lateralibus. *Ind. occid. Amer. austr.*

flexuosa Poir. 5. R. foliis cordato-lanceolatis acuminatis reticulato-venosis, racemis flexuosis subcompositis. *Peru.*

lobata Poir. 6. R. foliis cordato-sagittatis acuminatis 3nerviis, lobis baseos sublobatis, racemis compositis elongatis. *Peru.*

hastata 7. R. foliis hastato-lanceolatis mucronatis 3nerviis, racemis axillaribus filiformibus. *Hispaniola.*

ovata Sw. 8. R. foliis ovatis acuminatis 3nerviis, racemis axillaribus subcompositis. *Hispaniola.*

mucronata W. 9. R. foliis oblongo-spathulatis obtusis mucronatis 3nerviis, racemis geminis axillaribus abbreviatis. *Hispaniola.*

angustifolia Sw. 10. R. foliis lineari-lanceolatis basi rotundatis 3nerviis, racemis geminis axillaribus. *Hispaniola.*

1382. MENISPERMUM.

**Hexandra.*

† *Cal. 3sepalus bracteatus; cor. 3petala.*

α. *Nectaria* 6. *Cocculus Colebr.*

palmatum Lam. 1. M. foliis cordato-orbiculatis 5fido-palmatis reticulatis rufo-pilosis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Afr. or. Ins. Mascaren.*

trilobum Thunb. 2. M. foliis 3lobis nervosis villosis, racemis axillaribus glabriusculis. *Japon. Bengal.* (M. tomentosum Roxb.)

japonicum Thunb. 3. M. foliis peltatis subrotundo-ovatis acuminatis subtus glaucis petiolum aequantibus, floribus umbellatis, fructibus binis. *Japon.*

*Roxburghii** 4. M. foliis peltatis ovatis hinc rotundatis illinc ſubacutis ſubtus glaucis nervoſis petiolum ſuperantibus, floribus ♀ umbellatis, fructibus ſubſenis. *Ind. or.* (M. japonicum Roxb.)

malabaricum W. 5. M. foliis cordatis ovatis acuminatis ſubtus villoſis, floribus racemoſis hermaphroditis (?) *Malabar.*

*Chondrodendron** 6. M. foliis cordatis ſubcrenatis acutis ſubtus tomentoſis. *Peru.* (Chondrodendron tomentoſum R. et P. Epibaterium Perſ.)

*diverſifolium** 7. M. foliis inferioribus cordatis, ſuperioribus ovato-oblongis apice truncatis mucronatis, pedunculis ſub-3floris folio brevioribus. *Mexico.* (Cocculus Cand.)

† *acutum* Thunb. 8. M. foliis cordato-haſtatis acuminatis ſubtus glaucis cauleque ſtriato glabris. *Japon.*

*ſagittatum** 9. M. foliis cordato-ſagittatis lanceolatis cuſpidato-mucronatis glabris, racemis compoſitis axillaribus. *Montevideo.* Sello.

polycarpon Roxb. 10. M. foliis cordatis acutis nitidis, racemis ♂ compoſitis, ♀ ſimplicibus, fructibus ſubduodenis. *Coromandel.* (Tiliacora racemoſa Colebr.)

hexagynum Roxb. 11. M. foliis cordatis paraboliciſque obtuſis mucronatis ſubtus ſubpubeſcentibus, paniculis axillaribus villoſis, bracteis lanatis, germinibus ſenis. *China auſtr.* (Cocculus Colebr.)

villoſum Roxb. 12. M. foliis cordatis mucronatis 5nerviis utrinque villoſis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Bengal. orient.* (Cocculus Colebr.)

hirſutum 13. M. foliis cordato-oblongis obtuſis mucronatis utrinque hirſutis, floribus ♂ racemoſis, ♀ ſolitariis. *Ind. or.* (Cocculus ſepium Colebr.)

criſpum 14. M. foliis cordato-ſubrotundis acuminato-cuſpidatis glabris, caule 4angulo verrucoſo, floribus ♂ faſciculato-racemoſis, ♀ ſimpliciter racemoſis. *Bengal.* (M. tuberculatum *α.* Lam.)

cordifolium W. 15. M. foliis late-cordatis ſubrotundis acuminatis 5nerviis glabris, racemis axillaribus elongatis, floribus ſolitariis. *Ind. or.*

acuminatum Lam. 16. M. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis glabris ſub-5nerviis, racemis axillaribus elongatis, floribus aggregatis. *Ind. or.*

laurifolium Roxb. 17. M. foliis lanceolatis lucidis 3nerviis, racemis axillaribus compoſitis abbreviatis. *Nepal.* (Cocculus Colebr.)

*oblongifolium** 18. M. foliis ovato-oblongis obtuſis mucronatis 3nerviis glabris, floribus ♂ racemoſis, ♀ ſolitariis *Mexico.* (Cocculus Cand.)

*Limacia** 19. M. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis glabris, floribus ♂ terminalibus congeſtis, ♀ axillaribus geminis. *Cochinchina.* (Limacia ſcandens Lour.)

Leaeba Delil. 20. M. foliis oblongis obtuſis mucronatis triplinerviis glaucis glabris, junioribus linearibus, racemis ♂ paucifloris folio brevioribus, floribus ♀ ſolitariis. *Aegypt. ſuper.*

*Epibaterium** 21. M. foliis oblongis, floribus monoecis. *Inf. maris pacifici.* (Epibaterium pendulum Forft.)

*reniforme** 27. M. foliis ovatis emarginatis, floribus monoecis, ♂ racemofis, ♀ ternis 6gynis, fructibus fenis reniformibus. *Cochinchina.* (Nephroia farmentofa Lour.)

β. Nectaria 0.

feneftratum Gärtn. 23. M. foliis cordatis acutiusculis fub-5nerviis fupra nitidis fubtus pilofiffimis, pedunculis umbellatis. *Ceylon.* (Cofcinium Colebr.)

*tinctorium** 24. M. foliis ovatis acutis nervofis, floribus racemofis. *China. Cochinchina.* (Fibraurea tinctoria Lour.)

†† *Cal.* 6*fepalus: cor.* 6*petala.*

peltatum Lam. 25. M. foliis peltatis triangulari-oblongis acuminatis bafi fubcordato-truncatis, paniculis lateralibus elongatis flaccidis. *Ind. or. Ceylon.*

*rotundifolium** 26. M. foliis fubpeltatis fubcordato-orbiculatis mucronatis glabris, pedunculis axillaribus racemofo-paniculatis folio brevioribus. *Patria?* (Cocculus Cand.)

*populifolium** 27. M. foliis cordatis acuminatis glabris, paniculis ♀ ramofiffimis multifloris. *Inf. Molucc.* (Cocculus Cand.)

orbiculatum 28. M. foliis fubcordato-orbiculatis obtufis mucronatis 5—7nerviis fubtus cinereo-pubefcentibus, pedunculis ♂ fubternis fubramofis petiolo brevioribus. *Ind. or. Japon?*

glaucum Lam. 29. M. foliis cordato-ovatis acutis fubtus pubefcentibus glaucis, pedunculis racemofo-corymbofis folio brevioribus. *Inf. Molucc.* (M. Cocculus W.)

lacunofum Lam. 30. M. foliis cordatis acutis fubtus glaucis fubfurfuraceis, racemis paniculatis pendulis, cortice lacunofo. *Ind. or. Inf. Molucc.* (M. Cocculus Gärtn.)

flavefcens Lam. 31. M. foliis fubcordatis ovatis obtufiuscule acuminatis, junioribus fubpubefcentibus orbiculatis, racemis ♀ paniculatis lateralibus folio longioribus. *Inf. Molucc.*

*tamoides** 32. M. foliis bafi truncato-cordatis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, racemis ♂ gracilibus folia excedentibus. *Cayenn.* (Cocculus Cand.)

carolinum 33. M. foliis cordatis ovatisque obtufiusculis fub-3lobis fubtus villofis, racemis ♂ folium aequantibus, ♀ 3fidis 3floris. *Carolina. Georgia.* (Androphylax fcandens Wendl., Wendlandia populifolia W. Pursh.)

† *haftatum* Lam. 34. M. foliis cordato-haftatis mucronatis fubtus villofis. *Ind. or.*

*Cotoneafter** 35. M. foliis oblongis venofis mucronatis fubtus tomentofis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Amer. auftr.?* (Cocculus Cand.)

ovalifolium Vahl. 36. M. foliis ovali-oblongis retufis bafi attenuatis trinerviis glabris, racemi terminalis pedicellis abbreviatis fub-4floris. *Java. China.*

ellipticum Poir. 37. M. foliis ellipticis glabris nervofo-venofis, racemis axillaribus geminis inaequalibus folio brevioribus. *Afric. occid.*

domingenfe * 38. M. foliis ovali-oblongis acutis fub-3nerviis glabris, petiolis apice incraffatis, paniculis ramofiffimis elongatis, pedunculis aggregatis. *Hifpaniola.* (Cocculus Cand.)

edule Vahl. 39. M. foliis ovali-oblongis mucronatis nitidis glabris, pedunculis ♂ cymofis, ♀ 1floris. *Arabia.* (Cebatha Forsk.)

radiatum Lam. 40. M. foliis ovato-oblongis acuminatis nervofis glabris, paniculis racemofis axillaribus elongatis. *Ind. or.*

*leptoftachyon** 41. M. foliis oblongis acuminatis trinerviis glabris, racemis axillaribus fimplicibus gracilibus folium aequantibus. *Inf. Molucc.* (Cocculus Cand.)

*brachyftachyon** 42. M. foliis ovatis acutis 3nerviis glabris, racemis ♀ axillaribus petiolo brevioribus. *Inf. Molucc.* (Cocculus Cand.)

*triflorum** 43. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis 3nerviis glabriusculis, pedunculis ♀ axillaribus 3fidis 3floris petiolum aequantibus. *Java.* (Cocculus Cand.)

*milleflorum** 44. M. foliis ovatis obtufis nervofis nitidis, paniculae ♂ terminalis multiflorae ramulis patentibus geminatis. *Madagafcar.* (Cocculus Cand.)

*gomphioides** 45. M. foliis oblongis acuminatis coriaceis 3nerviis nitidis, pedunculis ♀ axillaribus racemofis folio duplo longioribus. *Madagafcar.* (Cocculus Cand.)

Abuta Lam. 46. M. foliis ovatis acutis nervofis fubtus rufo-villofis, pedunculis axillaribus fubracemofis folio brevioribus. *Guiana.* (Abuta rufefcens Aubl.)

** *Staminum numerus alienus.*

triandrum Roxb. 47. M. foliis ovato-oblongis acutis glabris, floribus racemofis 3partitis 3andris. *Inf. Maldiv.*

canadenfe 48. M. foliis peltatis cordatis angulato-repandis, racemis compofitis, floribus fub-4fidis 12andris. *Amer. bor.* (M. virginicum L. var.)

davuricum Cand. 49. M. foliis peltatis cordatis angulatis acuminatis glaberrimis, racemis geminis capitellatis. *Davuria.*

Lyoni Pursh. 50. M. foliis cordatis palmato-lobatis longiffime petiolatis, racemis fimplicibus, floribus 6partitis 12andris. *Amer. bor.*

1383. BATSCHIA Thunb.

racemofa Thunb. 1. B. racemis axillaribus folitariis, floribus raris. *Nov. Granat.* (Trichoa Perf.)

conferta Thunb. 2. B. fpicis axillaribus folitariis, floribus confertis. *Nov. Granat.* (Trichoa Perf.)

1384. LARDIZABALA R. et P.

biternata R. et P. 1. L. foliis biternatis, foliolis oblongis acutis basi inaequalibus subdentatis coriaceis, pedunculis ♂ racemosis, ♀ solitariis, bracteis cordatis magnis ad basin pedunculorum. *Chili.*

triternata R. et P. 2. L. foliis 3ternatis, foliolis oblongis obtusiusculis, floribus ♂ subspicatis, ♀ solitariis, pedunculis basi 2bracteatis. *Chili.*

trifoliata Cand. 3. L. foliis simpliciter ternatis, foliolis oblongis obtusis subangulatis, pedunculis subcorymbosis, bracteis minimis. *Peru.*

1385. RUMEX.

1. *Flores hermaphroditi.*

* *Valvae granulo notatae,*

† *subintegerrimae.*

Hydrolapathum Hudf. 1. R. valvis ovato-triangularibus subcartilagineis obtusiusculis omnibus graniferis, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis in petiolum decurrentibus margine eroso-crispis. *Europ. fossae.* (R. aquaticus Sm. Lam. Cand., longifolius Cand.)

Britannica 2. R. valvis ovatis acutis omnibus graniferis, granis maximis elongatis, foliis omnibus lanceolatis elongatis utrinque attenuatis. *Virgin.*

maximus Schreb. 3. R. valvis cordatis submembranaceis omnibus graniferis, foliis inferioribus subcordato-oblongis, floralibus lanceolatis. *Europ. paludes.*

glomeratus Schreb. 4. R. valvis oblongis obtusis omnibus graniferis, floribus glomerato-verticillatis, foliis inferioribus ovato-oblongis undulatis. *Europ.* et *Chinae uda.* (R. paludosus Wither., acutus Sm., conglomeratus Roth. divaricatus Thuill.)

Nemolapathum Ehrh. 5. R. valvis lineari-oblongis obtusis, unica granifera, foliis inferioribus cordato-oblongis acutis, superioribus ovato-lanceolatis. *Europ. prata.* (R. nemorosus Schrad., condylodes M. B., sanguineus L. var., ferrugineus W. herb.)

crispus 6. R. valvis subcordato-ovatis omnibus graniferis, floribus verticillato-racemosis, foliis lanceolatis acutis undulato-crispis. *Europ. pascua, arva.*

Patientia 7. R. valvis cordato-orbiculatis obtusis venoso-reticulatis subdenticulatis, unica granifera, foliis cordato-ovatis undulatis. *Europ. austr.* (R. confertus W.)

litoralis Humb. 8. R. valvis ovato-oblongis acutis omnibus graniferis, foliis lanceolatis elongatis, radice annua. *Brasil. Peru.* (R. brasiliensis Link.)

verticillatus 9. R. valvis triangularibus acutis omnibus graniferis, foliis inferioribus cordato-oblongis obtusis undulatis, summis lanceolatis elongatis, vaginis cylindricis. *Amer. bor.*

cuneifolius Campd. 10. R. valvis ovato-lanceolatis acutis omnibus graniferis, foliis inferioribus obovatis obtufis, verticillis fuperioribus aphyllis. *Bonaria. C. B. S.* (R. fpathulatus Thunb.?)

linearis Campd. 11. R. valvis triangulari-ovatis obtufiusculis omnibus graniferis, foliis oblongo-linearibus ferrulatis. *C. B. S.*

anguftifolius Campd. 12. R. valvis inaequalibus, unica maxima orbiculari granifera, reliquis oblongis obtufis, foliis oblongo-linearibus. *Afia minor.*

falicifolius Weinm. 13. R. valvis aequalibus oblongis obtufis, unica granifera, glomerulis fpicatis fubaphyllis, foliis lanceolatis integerrimis fubundulatis, ramis decumbentibus. *California.*

†† *Valvae dentatae, ferratae.*

acutus 14. R. valvis inaequalibus, unica maxima triangulari incifo-dentata granifera, reliquis minoribus obfolete callofis dentatisque, foliis inferioribus fubcordato-oblongis acuminatis. *Europ. dumeta.* (R. pufillus Arbr.)

laevigatus W. herb. 15. R. valvis fubaequalibus ovato-oblongis obtufis reticulato-venofis bafi dentatis, unica granifera, grano globulofo laevi, reliquis obfoletis, foliis cordatis obtufiffimis. *Patria?*

fylveftris Wallr. 16. R. valvis aequalibus triangulari-oblongis dentatis omnibus graniferis, foliis cordato-oblongis obtufis crenulatis cauleque glaberrimis. *German. mediae nemora et ipfi pagi.* (R. heterophyllus Schultz.?)

obtufifolius 17. R. valvis triangulari-oblongis obtufiusculis bafi profunde dentatis omnibus graniferis, foliis radicalibus cordatis obtufiusculis, fummis lanceolatis fubtus cauleque ramofo hirfutis. *Europ. prata* et *pafcua.* (R. purpureus Poir. var.)

*nepalenfis** 18. R. valvis ovato-oblongis obtufis fimbriatis, unica granifera, foliis inferioribus cordatis obtufis, fummis oblongo-lanceolatis undulatis ramisque patentibus glabris. *Ind. or. Nepal.* (R. tuberofus Roxb. in W. herb.)

paluftris Sm. 19. R. valvis ovato-lanceolatis acutiusculis bafi fubulato-dentatis omnibus graniferis, foliis radicalibus lanceolato-linearibus acuminatis margine crifpo-undulatis. *Europ. med.* (R. limofus Thuill.)

maritimus 20. R. valvis ovato-lanceolatis omnibus graniferis fubulato-dentatis, fubulis longiffimis, verticillis denfis foliofis, foliis lanceolato-linearibus. *Europ. palud.* (R. aureus With.)

perficarioides 21. R. valvis ovato-oblongis acutiusculis omnibus graniferis fubulato-dentatis, fubulis valvas fubaequantibus, foliis ovato-lanceolatis undulatis, caule ramofo. *Amer. bor. China.* (R. chinenfis Campd., denticulatus Dun.)

aegyptiacus 22. R. valvis ovato-acuminatis fubulato-dentatis, fubulis longiffimis rigidis, valva unica in granum

maximum mutata, verticillis denſe confertis ſpicatis, foliis lineari-lanceolatis longiſſime petiolatis. *Aegypt. Ad Volgam.*

dentatus Murr. 23. R. valvis ovato-lanceolatis apice productis omnibus graniferis divaricato-dentatis, verticillis remotis laxis, foliis ovato-lanceolatis margine ſubcriſpis. *Aegypt. Ind. or. Amer. bor.* (R. criſpatulus Mx., ſtrictus Link., undulatus W. herb.)

ucranicus Hornem. 24. R. valvis oblongis acutis ſubulato-dentatis reticulatis omnibus graniferis, ſubulis rigidis divaricatis, verticillis laxis, foliis oblongis undulatis, infimis cordato-ſubhaſtatis. *Ad Tyram, Hypanim, Boryſthenem.* (R. reticulatus Beſſ.)

criſtatus Cand. 25. R. valvis cordatis apice contortis groſſe ſerratis omnibus graniferis, foliis ovato-oblongis. *Patria?*

pulcher 26. R. valvis triangulari-ovatis acutis ſerrato-dentatis inaequaliter graniferis, foliis radicalibus cordato-oblongis panduraeformibus ſubpubeſcentibus. *Anglia. Europ. auſtr. Afric. bor. Caucaſ.* (R. pauciflorus Campd., R. auratus Sm., varietas dioeca.)

divaricatus 27. R. valvis inaequalibus, unica oblonga reticulata obtuſa granifera, grano tuberculato, reliquis minoribus nudiusculis, foliis cordatis obtuſiſſimis. *Italia.*

** *Valvae nudae ſ. grano deſtitutae.*

† *integerrimae.*

aquaticus 28. R. valvis ſubcordato-ovatis reticulato-membranaceis, verticillis approximatis, foliis cordato-ovatis baſi cucullatis. *Europ. foſſae.*

ſcutatus 29. R. valvis ſuborbiculatis obtuſis reticulato-membranaceis, verticillis laxis remotis aphyllis, foliis haſtatis panduraeformibus oleraceis glaucis. *Europ. med.* et *auſtr.* (R. glaucus Jacqu. haſtifolius M. B. aetnenſis Presl., oxyotus Campd.)

veſicarius 30. R. valvis maximis ovalibus reticulato-membranaceis emarginatis, floribus racemoſis, pedicellis ſubgeminis, foliis cordatis oblongis undulatis. *Africa.*

tingitanus 31. R. valvis cordato-orbicularibus integerrimis venoſis, floribus ſubracemoſis, pedicellis nutantibus ſubverticillatis. *Ad litora maris mediterran.*

longifolius Kunth. 32. R. valvis oblongis obtuſis integerrimis, verticillis approximatis, foliis lanceolatis margine criſpo-undulatis. *Amer. auſtr. China.*

cordatus Desf. 33. R. valvis oblongis obtuſis integerrimis, verticillis paucifloris, pedicellis nutantibus, foliis cordatis acutiusculis craſſis, radice tuberoſa. *C. B. S.* (R. ſarcorrhizus Link.)

Burchellii Campd. 34. R. valvis cordato-orbiculatis reticulatis, verticillis paucifloris, pedicellis nutantibus, foliis cordato-ſubhaſtatis ſubſinuatis, caule ſuffruticoſo. *C. B. S.* (R. ſagittatus Thunb.?)

35.

venoſus Pursh. 35. R. valvis ſubreniformi-orbiculatis venoſis integerrimis, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule herbaceo. *Louiſiana.*

nervoſus Vahl. 36. R. valvis orbiculatis integerrimis, floribus paniculatis, foliis oblongis 3nerviis glaucis. *Arabia.* (R. perſicarioides Forsk.)

Lunaria. 37. R. valvis ſuborbiculatis integerrimis, verticillis paucifloris, foliis cordatis acutiuſculis craſſis, caule arboreſcente. *Inſ. Canar.*

†† *Valvae dentatae.*

domeſticus Hartm. 38. R. valvis ſubcordato-ovatis obſolete ſerrulatis, foliis lanceolatis undulato-criſpis, infimis cordatis. *Suecia.* (R. alpinus W. herb.)

roſeus 39. R. valvis ſubreniformibus emarginatis denticulatis reticulatis, foliis oblongo-ſubhaſtatis integerrimis. *Aegypt. Cyprus.*

lacerus Balb. 40. R. valvis oblongis ſubdenticulatis reticulatis, foliis haſtato-pinnatifidis obtuſis carnoſis, caule herbaceo ramoſo. *Aegypt.* (R. roſeus Delil. Sieber.)

bucephalophorus 41. R. valvis ovato-lanceolatis utrinque 3dentatis, floribus racemoſis, pedicellis reflexis incraſſatis, bracteis ſcarioſis, foliis ſpathulatis, caule ſimpliciuſculo. *Ad litora maris mediterr.*

fimbriatus Poir. 42. R. valvis triangularibus laciniato-fimbriatis, floribus verticillatis pendulis, foliis cordatis ſubſinuatis, radice tuberoſa. *C. B. S.*

Brownii Campd. 43. R. valvis ovato-acuminatis uncinato-fimbriatis reticulatis, floribus verticillatis, pedicellis reflexis incraſſatis, foliis ſubhaſtatis oblongo-acuminatis. *Nov. Holl.* (R. fimbriatus R. Br.)

2. *Flores diclini.*

* *Valvae integerrimae.*

Acetoſa 44. R. valvis cordato-ſubrotundis reticulatis! baſi ſquama reflexa munitis, calycibus reflexis, floribus paniculatis, foliis ſagittatis ovato-lanceolatis, radice fibroſa, fuſiformi vel tuberoſa. *Europ. Aſia med.* (R. intermedius Cand., tuberoſus L.)

Acetoſella 45. R. valvis ovatis acutiuſculis reticulatis, calycibus appreſſis, foliis haſtatis lanceolato-linearibus. *Europ. Aſia med. Amer. bor.* (R. pyrenaicus Lapeyr. R. multifidus L. var. auriculis palmatis.)

abyſſinicus Jacqu. 46. R. valvis cordato-orbiculatis integerrimis, verticillis paucifloris, foliis haſtato-triangularibus acutis ſubſinuatis nervoſis. *Europ. auſtr. Afric. bor. med.* (R. tuberoſus Poir., thyrſoides Deſf., triangularis Cand., arifolius Ait. All.)

arifolius L. ſuppl. 47. R. valvis ſubrotundo-ovatis integerrimis, verticillis paucifloris, foliis amplis cordato-ſubrotundis acutis 5nerviis, caule elato. *Patria?* (R. macrophyllus Campd.)

amplexicaulis Lapeyr. 48. R. valvis cordato-orbiculatis ſubgraniferis, paniculae diffuſae ramis ſubaggregatis, foliis cordato-ovatis obtuſis, ſuperioribus amplexicaulibus. *Pyren. Galliae auſtr.* (R. oblongus et rugoſus Campd.)

luxurians L. ſuppl. 49. R. valvis cordato-orbiculatis integerrimis, floribus paniculatis, foliis cordato-haſtatis ſubundulatis, caule herbaceo angulato, radice tuberoſa. *Italia. Gallia. Anglia.*

alpinus 50. R. valvis cordatis acutiuſculis, unica granifera, verticillis multifloris paniculatis, foliis cordato-ovatis obtuſis undulatis. *Alp. Europ. med. Tauria.*

flexuoſus Forſt. 51. R. valvis lanceolatis integerrimis, verticillis remotis, foliis oblongo-lanceolatis margine criſpis, caule herbaceo, ramis flexuoſis. *Nov. Zeeland.*

† *haſtulatus* Sm. 52. R. valvis obtuſis concavis, verticillis aphyllis, foliis haſtatis obtuſis integerrimis, caule fruticoſo. *Chili.*

bipinnatus L. ſuppl. 53. R. valvis obtuſis, verticillis aphyllis, foliis cordatis 2pinnatis, ſtipulis ſcarioſis patulis, caule herbaceo. *Mauritania.*

fruteſcens Thuar. 54. R. valvis ſubgraniferis, foliis obovato-oblongis retuſis, caule ſuffruticoſo. *Inſ. Triſtan d'Acunha.*

giganteus Ait. 55. R. valvis cordato-ſubrotundis acutis ſinuatis, foliis ovato-oblongis acutis, nervis ſubtus pubeſcentibus, caule arboreo. *Inſ. Sandwich.*

hoſtilis Lour. 56. R. valvis integerrimis, foliis lanceolatis, caule tereti aculeato. *Cochinchina.*

*** Valvae dentatae.*

Bidens R. Br. 57. R. valvis utrinque 1dentatis haſtatis, foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis. *Terra Diemen.*

graminifolius Lamb. 58. R. valvis crenulatis, floribus paniculatis, foliis lanceolato-linearibus ſubauriculatis. *Ruſſia orient. Camtſchatca. Inſ. Curil.* (R. anguſtiſſimus Ledeb.)

aculeatus 59. R. valvis uncinato-fimbriatis ſubgraniferis, foliis lanceolatis glaucis. *Hiſpania. Creta. Graecia.*

1386. EMEX Neck.

ſpinoſus Campd. *Sicilia. Luſitania. Graecia. Aegypt. C. B. S.* Herba humilis, caule aſcendente, floribus verticillatis polygamis. (Rumex ſpinoſus L.)

1387. PODOPTERUS Humb.

mexicanus Humb. *Mexico.* Frutex ramis ſpineſcentibus, foliis faſciculatis obovatis glabris, floribus faſciculato-racemoſis, pedunculis 3alatis.

1388. HYDROGETON Perſ.

feneſtralis Perſ. *Madagaſcar.* Planta aquatica, radice tuberoſa, foliis radicalibus oblongo-linearibus obtuſis feneſtratis, ſcapo polyſtachyo medio inflato, floribus roſeis. (Ouvirandra Thuar.)

TETRAGYNIA.

1389. TETRONCIUM W.

magellanicum W. *Ad fretum Magellan.* Planta 3pollicaris foliis radicalibus linearibus, ſcapo ſpicigero. (Triglochin reflexum Vahl.)

HEXAGYNIA.

1390. DAMASONIUM Schreb.

indicum W. *Ind. or. Aegypt.* Planta aquatica, foliis radicalibus reniformi-cordatis obtuſis integerrimis, ſcapo unifloro, flore albo. (Stratiotes aliſmoides L. Ottelia Perſ.

POLYGYNIA.

1391. ALISMA.

Damaſonium 1. A. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis 3nerviis, floribus 6gynis, capſulis ſenis baſi connatis 2ſpermis. *Anglia. Gallia.* (Damaſonium ſtellatum Perſ.)

*minus** 2. A. capſulis baſi connatis octonis, foliis 3nerviis. *Nov. Holl.* (Actinocarpus R. Br.)

cordifolium 3. A. foliis cordatis ſubrotundis obtuſiuſculis multinerviis, petiolis 6angularibus, floribus 12andris polygynis, capſulis uncinato-muricatis. *Amer. auſtr.*

parnaſſifolium 4. A. foliis cordato-ſubrotundis acutis 7nerviis, capſulis ariſtatis. *Italia.*

Plantago 5. A. foliis ſubcordato-oblongis acutis 5—7nerviis, ſcapo capſulisque 3gonis. *Europ. Aſia med.* (A. lanceolatum Schultz. var. fol. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis. A. triviale et parviflorum Pursh. varr. fol. obtuſis. A. graminifolium Ehrh. var. fol. linearibus.)

ſagittifolium W. 6. A. foliis ſagittatis ſubrotundo-ovatis, capſulis obovatis obtuſis. *Guinea.*

*Berterii** 7. A. foliis oblongis utrinque attenuatis 3nerviis, ſcapo 3gono, capſulis cuſpidatis. *Guadalupa.* Bertero.

natans 8. A. ſoliis ellipticis, nervis binis marginalibus, pedunculis 1floris ſubſolitariis, capſulis mucronatis. *Europ. Amer. bor.*

ranunculoides 9. A. foliis lineari-lanceolatis, ſcapo umbellifero, capſulis globoſis mucronatis. *Europ.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores completi.*

1392. *Trientalis.* Cal. 7partitus. Cor. 7partita basi staminifera. Caps. baccata 1locularis polysperma. Placenta globosa centralis. *Primuleae.*
1393. *Disandra.* Cal. 7partitus. Cor. 7partita rotata. Caps. 2locularis, dissepimento medio placentifero. *Gentianeae?*
1394. *Aesculus.* Cal. campanulatus. Petala 4-5 inaequalia. Stamina 7-8 disco hypogyno inserta. Caps. coriacea 2-3locularis oligosperma. Cotyledones crassissimae. *Hippocastaneae* Cand.
1395. *Erythrospermum* Lam. Cal. 4sepalus. Petala 4-7. Stam. 4-7, filamentis brevissimis. Stigmata 3-5. Fructus subbaccatus polyspermus. *Flacourtieae* Cand.
1396. *Petrocarya* Schreb. Cal. 5fidus bracteatus. Cor. 5petala. Stam. 14, 7sterilia. Drupa nuce 2loculari. *Rosaceae.*
† 1397. *Pancovia* W. Cal. 4partitus. Pet. 4 unguiculata plicato-crispa cucullata. Stam. ascendentia. *Familia?*
1398. *Jonesia* Roxb. Cal. 2phyllus. Cor. infundibuliformis, limbo 4fido. Stam. nectario annulato inserta. Legumen 4-8spermum. *Leguminosae.*
1399. *Tovaria* R. et P. Cal. 7sepalus. Cor. 7petala. Stamina disco 7gono stellato inserta. Stigma peltatum. Bacca 1locularis polysperma. *Melieae.*

** *Flores incompleti.*

1400. *Buginvillea* Commers. Cal. corollinus tubulosus 10dentatus plicatus bracteae coloratae insidens. Filamenta basi in tubum coalita. Achenium calyce tectum. *Nyctagineae.*
1401. *Pisonia.* Flores subdioeci. Cal. campanulatus plicatus 5fidus. Stam. (6-10) in plicis limbi, exserta. Nucula 5gona calyce tecta. *Nyctagineae.*
1402. *Petiveria.* Cal. 4sepalus. Stigma penicillatum. Caryopsis glochidibus 4. *Chenopodeae.*

DIGYNIA.

1403. *Limeum.* Cal. 5partitus inaequalis. Petala 5 brevissima. Filamenta basi connata. Caryopses duae in fructum coalitae. *Portulaceae.*

1404. *Diplaſia* Rich. Spica ſquamis undique imbricatis. Involucellum glumam 4valvem mentiens. *Cyperaceae.*

TETRAGYNIA.

1405. *Aſtranthus* Lour. Cal. 0. Cor. hypocrateriformis, limbo 14fido. Caryopſis ſupera. *Nyctagineae?*
1406. *Saururus.* Flores ſpicati. Squamae loco calycis corollaeque. Baccae 4 1ſpermae. *Piperaceae.*

HEPTAGYNIA.

1407. *Gilibertia* R. et P. Cal. ſuperus 7dentatus. Pet. 7. Fructus 7locularis 7ſpermus. *Aralieae.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

1392. Trientalis.

europaea — *Europ. Amer. bor. nemora.* Herba digitalis ſimpliciſſima, foliis verticillatis oblongo-lanceolatis inaequalibus, floribus axillaribus pedunculatis albis. (Tr. americana Pursh.)

1393. Disandra.

proſtrata — *Afric. bor. Madera.* Herba proſtrata pubeſcens, foliis orbiculatis crenatis villoſis, floribus axillaribus pedunculatis luteis. (Sibthorpia peregrina et africana L.)

1394. Aesculus.

** Capſulis echinatis.*

Hippocaſtanum — 1. Ae. corollis 5petalis, foliis 7nato-digitatis obovato-oblongis denticulatis ſubtus glabris. *Tibet.*

rubicunda Cand. — 2. Ae. corollis 4petalis, foliis ſub-7nato-digitatis obovato-oblongis duplicato-ſerratis ſubtus glabris. *Patria?*

glabra W. — 3 Ae. corollis 4petalis, unguibus calycem aequantibus, ſtaminibus corolla longioribus, foliis digitatis lanceolatis ſerrulatis utrinque glaberrimis. *Amer. bor.* (Ae. ohioenſis Mx.?)

pallida W. — 4. Ae. corollis 4petalis, unguibus calyce brevioribus, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis quinato-digitatis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus. *Amer. bor.*

*** Capſulis inermibus: corollis 4petalis.*

macroſtachya Mx. — 5. Ae. fruticoſa, radice ſtolonifera, foliis quinato-digitatis obſolete ſerrulatis ſubtus villoſo-tomentoſis, racemo elongato, ſtaminibus longiſſimis. *Carolina, Georgia.* (Ae. parviflora Walt.)

Pavia — 6. Ae. arborea, foliis quinato-digitatis utrinque glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, unguibus petalorum calycem aequantibus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Amer. bor.* (Pavia rubra Lam.)

discolor Pursh. 7. Ae. fruticoſa, foliis quinato-digitatis ſubtus tomentoſis, petalorum inaequalium unguibus calycem excedentibus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Georgia.* (Pavia hybrida Cand.)

flava Ait. 8. Ae. arborea, foliis quinato-digitatis ſubtus pubeſcentibus, unguibus petalorum inaequalium calyce longioribus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Virginia. Carolina.* (Ae. lutea Wangenh. Pavia Poir.)

1395. ERYTHROSPERMUM Lam.

verticillatum Poir. 1. E. foliis ternatis ſubſeſſilibus ſubrotundis coriaceis glabris, pedunculis ternis umbellatis folia aequantibus. *Inſ. Mascaren.*

pyrifolium Poir. 2. E. foliis alternis ovali-oblongis coriaceis utrinque lucidis, pedunculis terminalibus laxe racemoſis. *Inſ. Mascaren.*

ellipticum Poir. 3. E. foliis alternis elliptico-ſubrotundis coriaceis, pedunculis ſubracemoſis folio longioribus. *Inſ. Mascaren. Java.*

paniculatum Poir. 4. E. foliis ovalibus ſupra opacis ſubtus nitidis, panicula terminali pauciflora folia ſuperante. *Inſ. Mascaren.*

macrophyllum Poir. 5. E. foliis ſparſis lanceolatis acutiusculis nitidis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Inſ. Mascaren.*

amplexicaule Cand. 6. E. foliis ſparſis amplexicaulibus cordato-oblongis, pedunculis ſubumbellatis folio brevioribus. *Inſ. Mascaren.*

1396. PETROCARYA Schreb.

montana W. 1. P. foliis ovatis acuminatis. *Guiana.* (Parinari Aubl.)

campeſtris W. 2. P. foliis cordatis acutiusculis. *Guiana.* (Parinari Aubl.)

1397. PANCOVIA W.

bijuga W. *Guinea.* Arbor foliis pinnatis 2jugis coriaceis glabris, floribus racemoſis.

1398. JONESIA Roxb.

pinnata Roxb. *Ind. or.* Arbor foliis impari-pinnatis glabris, floribus cymoſis aurantiacis.

1399. TOVARIA R. et P.

pendula R. et P. *Peru.* Herba foliis ternatis lanceolatis nitidis ciliatis, floribus bracteatis racemoſis ſecundis ochroleucis, fructibus pendulis.

1400. BUGINVILLEA Commerſ.

ſpectabilis Juſſ. *Amer. auſtr.* Frutex ſcandens, ramis ſpineſcentibus, foliis ovatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 3floris, bracteis roſeis. (B. peruviana Bonpl., braſilienſis Neuwied.)

1401. PISONIA.

* *Inermes.*

grandis R. Br. 1. P. arborea, foliis oblongis acuminatis glabris, floribus cymoſis polygamis, perianthiis fructiferis ſpinuloſis. *Nov. Holl.*

pubeſcens Kunth. 2. P. arborea, foliis obovato-oblongis utrinque attenuatis pubeſcentibus ſubtus fuſcis, floribus corymboſis glabris. *Amer. auſtr.*

fragrans Desf. 3. P. arborea, foliis obovato-oblongis acutiusculis utrinque glabris ſupra nitidis coriaceis, floribus paniculatis. *Patria?*

discolor * 4. P. arborea, foliis oblongis obtuſis baſi oblique attenuatis glabris ſubtus discoloribus, racemis compoſitis axillaribus folio brevioribus. *Jamaic.* Bertero.

ſubcordata Sw. 5. P. arborea, foliis cordato-ſubrotundis eveniis, pedunculis cymoſis axillaribus folio brevioribus. *Inſ. Carib.*

nigricans Sw. 6. P. fruticoſa, foliis elliptico-oblongis utrinque glabris, pedunculis paniculatis axillaribus folia ſuperantibus. *Ind. occ.*

coccinea Sw. 7. P. fruticoſa, foliis oblongo-lanceolatis nervoſo-venoſis, pedunculis terminalibus elongatis pendulis ſub-5floris. *Hiſpaniola.*

obtuſata Sw. 8. P. fruticoſa, foliis ovali-oblongis obtuſis coriaceis venoſis, pedunculis cymoſis terminalibus. *Inſ. Carib. Jamaica.*

hirtella Kunth. 9. P. fruticoſa, foliis ovatis acutis membranaceis utrinque appreſſo-piloſis, floribus capitato-umbellatis 10andris. *Mexico.*

Pacurero Humb. 10. P. fruticoſa, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis, floribus corymboſis 8andris folia aequantibus. *Nov. Andaluſ. Braſil.*

** *Spinoſae.*

aculeata 11. P. ſpinis axillaribus recurvis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis, pedunculis cymoſis incano-pubeſcentibus. *Ind. occ.*

villoſa Poir. 12. P. ſpinis axillaribus recurvis, foliis ovatis obtuſis, pedunculis cymoſis villoſis. *Ind. or.*

1402. PETIVERIA.

alliacea *Ind. occ.* Frutex ramis ſtrictis pubeſcentibus, foliis alternis ovato-oblongis glabris, floribus terminalibus ſpicatis albidis, (P. octandra Jacq. var.)

DIGYNIA.

1403. LIMEUM.

africanum 1. L. caule proſtrato, foliis ovato-lanceolatis carnoſis petiolatis, floribus paniculatis. *Afr. auſtr.*

capenſe 2. L. caule erecto, foliis ovatis obtuſis ſeſſilibus, floribus ſubumbellatis. *Afr. auſtr.* (L. aphyllum L. ſuppl.)

aethiopicum 3. L. caule proſtrato, foliis lineari-lanceolatis ſubpubeſcentibus, floribus umbellatis. *Afr. auſtr.*

1404. DIPLASIA Rich.

karataefolia Perſ. *Guiana.* Cyperacea, foliis longiſſimis margine carinaque aculeatis, umbellis decompoſitis.

TETRAGYNIA.

1405. ASTRANTHUS Lour.

cochinchinenſis Lour. *Cochinchina.* Arbor foliis alternis ovatis ſerratis lanatis, floribus ſpicatis axillaribus pallidis.

1406. SAURURUS.

cernuus 1. S. foliis opacis. *Virginia.*

lucidus Donn. 2. S. foliis lucidis. *Amer. bor.*

1407. GILIBERTIA R. et P.

umbellata R. et P. *Peru.* Arbor foliis oblongis ſubdentatis lucidis, floribus umbellatis albidis involucratis.

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

I. *Flores completi.*

A. *Corolla monopetala.*

a. *infera.*

1408. *Erica.* Cal. 4ſepalus. Cor. 4fida. Stam. receptaculo inſerta. Antherae 2fidae. Capſ. 4locularis. *Ericeae.*

1409. *Salaxis* Salisb. Cal. 4ſepalus irregularis. Cor. campanulata 4fida. Stigma peltatum. Capſ. drupacea 3locularis 3ſperma. *Ericeae.*

1410. *Menzieſia* Sm. Cal. 1phyllus 4dentatus. Cor. 4fida. Stam. receptaculo inſerta. Capſ. 4locularis, marginibus valvarum inflexis diſſepimenta ſiſtentibus. *Ericeae.*

1411. *Hedwigia* Sw. Cal. 4dentatus. Cor. 4fida. Stylus 0. Capſ. 3cocca. *Tricoccae.*

1412. *Diospyros.* Flores polygami. Cal. 4-6fidus. Cor. urceolata 4-6fida. Stam. baſi corollae inſerta ſub-2antherifera. Stylus 4fidus. Bacca 8locularis, loculis 1ſpermis. *Styraceae.*

1413. *Cargillia* R. Br. Flores polygami. Cal. ſemi-4fidus cupularis. Cor. 4fida. Bacca 4locularis, loculis 2ſpermis. *Styraceae.*

1414. *Elliottia* Mühl. Cal. 4dentatus. Cor. 4partit. Antherae ſagittatae. Stigma capitatum. *Ericeae?*

1415. *Mimoſa* W. Flores polygami. Cal. 4-5dentatus. Cor. 4-5-dentata vel 0. Stam. 4, 8, 10. Lomentum. *Leguminoſae.*

1416. *Schrankia* W. Flores polygami. Cal. 5dentatus. Cor. 5fida. Legumen 4valve. *Leguminoſae.*

1417. *Chlora.* Cal. 8partitus. Cor. limbo 8lobo. Stigma 4fidum. Capſ. 2valvis 5locularis. Placentatio valvaris. *Gentianeae.*

1418. *Symphorema* Roxb. Invol. 6-8phyllum 6-8florum. Cal. 6-8-dentatus. Cor. tubuloſa, limbo 6-8partito reflexo. Stam. exſerta. Stigma 2fidum. Caryopſis calyce incluſa. *Familia?*

1419. *Mimuſops.* Cal. 6-8partitus. Cor. laciniae duplici ſerie ſenae vel octonae. Stam. ſterilia cum fertilibus alterna. Bacca oligoſperma. *Sapoteae.*

b. *Corolla ſupera.*

1420. *Cytinus.* Flores monoeci. Cal. 2phyllus. Cor. cyathiformis e tubulis nectariferis compoſita. Filamenta antheraeque cohaerent. Stigma peltatum. Bacca 8locularis polyſperma. *Ariſtolochieae.*

1421. *Vaccinium.* Cal. 4dentatus. Cor. urceolata ſ. campanulata, limbo 4fido reflexo. Antherae 2cornes. Bacca 4-5locularis. *Ericeae.*

1422. *Neaea* R. et P. Cal. 2-3ſepalus. Cor. tubuloſa. Stamina alterna longiora. Drupa 1ſperma calyce coronata. *Onagrae.*

1423. *Michauxia* Herit. Cal. 8-16fidus. Cor. rotata 8fida, limbo reflexo. Filamenta fornicata. Stigma 8fidum. Capſ. 8locularis. *Campanuleae.*

B. *Corolla pleiopetala.*

a. *infera.*

* *Corolla 4petala.*

1424. *Sweetia*.* Cal. campanulatus repandus. Petala obovata. Stamina imo calyci inſerta. Antherae globoſae. Legumen. *Familia?*

1425. *Sodada* Delil. Cal. 4ſepalus irregularis, ſepalo ſuperiori fornicato. Bacca ſtipitata 8ſperma. *Capparideae.*

1426. *Phyſoſtemon* Mart. Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Stamina inaequalia, minora apice inflata. Siliqua 1locularis 2valvis, ſeminibus 2ſeriatis echinatis. *Capparideae.*

1427. *Saſſia* Molin. Cal. 4ſepalus. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Familia?*

1428. *Kölreutera* Laxm. Cal. 5ſepalus. Petala 4 aſcendentia baſi appendiculata. Capſ. 3locularis, loculis 2ſpermis. *Melieae.*

1429. *Xylocarpus* Schreb. Cal. coriaceus 4lobus. Filamenta ſubcoalita. Drupa 4valvis, nucleis 1ſpermis. *Melieae.*

1430. *Vitmannia* Vahl. Cal. 4-5partitus extus glanduloſus. Stamina baſi ſquamulis aucta. Nux compreſſa 1ſperma. *Malpighieae?*

1431. *Elvaſia* Cand. Cal. 4partitus. Antherae 2loculares. Ovarium 4loculare. *Familia?*

1432. *Caſtela* Turp. Cal. 4dentatus. Petala diſco perigyno cum ſtaminibus inſerta. Drupae 4 1ſpermae. *Rhamneae?*

1433. *Roxburghia* Jon. Cal. 4ſepalus. Antherae geminae apice foliolo junctae. Capſ. 1locularis 2valvis polyſperma. *Smilacinae?*

1434. *Tetratheca* Sm. Cal. 4ſepalus. Antherae 4loculares. Capſ. 2valvis, ſeminibus pendulis. *Polygaleae?*

1435. *Boronia* Sm. Cal. 4fidus. Petala 4 perſiſtentia. Stamina ſubabortientia. Stigma 4fidum. Capſ. 4 coalitae 2valves. *Rutaceae.*

1436. *Correa* Sm. Cal. 4dentatus. Petala 4 in tubum conniventia. Capſ. 4locularis, loculis ſub-2ſpermis. *Rutaceae.*

1437. *Jambolifera.* Cal. 4ſepalus inaequalis. Stamina alterna petalorum baſi, alterna receptaculo inſerta. Diſcus perigynus 8angularis. Bacca 4locularis 4ſperma. *Rutaceae.*

1438. *Melicope* Forſt. Cal. 4partitus. Petala unguibus in tubum conniventibus. Glandulae 4 perigynae. Achenia 4. *Rutaceae.*

1439. *Porliera* R. et P. Cal. 4ſepalus. Squamae perigynae ſtaminiferae. Drupae 4 connatae. *Zygophylleae.*

1440. *Chitonia* Seſſ. Cal. 4partitus. Petala orbiculata. Stigma peltatum. Capſ. 4locularis 4valvis alato-tetragona 8ſperma. *Zygophylleae?*

1441. *Grislea.* Cal. 4fidus. Petala limbo calycis inſerta. Rima in baſi calycis nectarifera. Stamina exſerta. Capſ. 1locularis polyſperma. *Salicariae.*

1442. *Antichorus.* Cal. 4ſepalus. Capſ. ſubulata 4valvis 4locularis polyſperma. *Tiliaceae.*

1443. *Selas**. (Gela Lour.) Cal. breviſſimus 4dentatus. Petala linearia glabra. Antherae ſubrotundae. Stigma 2fidum. Drupa 1ſperma. *Familia?*

1444. *Ximenia.* Cal. 4fidus minimus. Petala baſi conniventia villoſiſſima apice revoluta. Antherae elongatae filamentis adnatae. Drupa ovata 1ſperma. *Santaleis* aff.

1445. *Lawſonia.* Cal. 4fidus. Stamina per paria approximata. Capſ. 4locularis polyſperma globoſa ſtylo coronata. *Salicariae?*

1446. *Amyris.* Cal. 4dentatus. Nectarium perigynum annulatum. Bacca 1ſperma. *Terebinthaceae.*

** *Corolla 5petala.*

1447. *Xanthophyllum* Roxb. Cal. 5ſepalus. Cor. papilionacea. Stamina baſi petalorum receptaculoque inſerta. Bacca 1ſperma ſtipitata. *Capparideae.*

1448. *Euſtathes* Lour. Cal. 5ſepalus. Stam. receptaculo inſerta. Bacca 1locularis 4ſperma. *Rhamneae?*

1449. *Scutula* Lour. Cal. truncatus ſcutiformis intus celluloſus demum baccatus. Petala margini calycis inſerta. Stam. inflexa. Bacca 8 cellulis diſtincta 1ſperma. *Familia?*

1450. *Keithia**. Cal. 1ſepalus irregulariter fiſſus caducus. Filamenta breviſſima. Antherae elongatae cuſpidatae. Ovarium ſiliquoſum ſubpedicellatum ſtylo coronatum. *Capparideae?*

1451. *Honckenya* W. Cal. 5ſepalus. Nect. ſtaminiformia. Capſ. echinata 5locularis polyſperma. Sem. arillata. *Melieae.*

† 1452. *Hagenia* Lam. Cal. 2ſepalus. Squamae 5 petaloideae nectariferae. Fructus? *Familia?*

1453. *Bäckea.* Cal. campanulatus, limbo 5dentato ampliato. Petala calyci inſerta. Capſ. 3locularis, placenta centrali. *Onagrae.*

1454. *Melicocca.* Flores ſubpolygami. Cal. 4-5partitus. Petala 4, 5, diſco hypogyno inſerta, vel 0. Bacca 1ſperma. *Sapindeae.*

1455. *Hypelate* P. Br. Cal. 4-5ſepalus. Diſcus perigynus ſtaminifer. Drupa 1ſperma. *Sapindeae.*

1456. *Cupania.* Cal. 5sepalus. Petala cucullata vel planiuscula. Stylus 3fidus. Caps. 3locularis 3valvis, valvis septiferis, loculis 1-2spermis. Semina arillata. *Sapindeae.*
1457. *Thouinia* Poit. Cal. 4-5partitus. Petala 4-5 medio barbata. Stigmata 3. Achenia 3 samaroidea. *Sapindeae.*
1458. *Euphoria* Commers. Cal. 5dentatus. Petala 5 medio subbarbata. Stigmata 2. Baccae 2 1spermae. *Sapindeae.*
1459. *Schmidelia* Schreb. Flores polygami. Cal. 4partitus. Petala 4 medio barbata. Baccae 2 1spermae. *Sapindeae.*
1460. *Ephielis* Schreb. Cal. 5partitus. Petala 5 basi glandulis duabus instructa. Stigma 1. Caps. 1locularis 2valvis 2sperma. *Sapindeae.*
1461. *Talisia* Aubl. Flores polygami. Cal. 5partitus. Petala 5 basi glandulosa. Fructus? *Sapindeae.*
1462. *Phaeocarpus* Mart. Flores polygami. Cal. 5partitus. Cor. 5petala. Squamae 2 perigynae staminibus oppositae. Caps. sub-3locularis polysperma. *Sapindeae.*
1463. *Blighia* Kön. Cal. 5partitus. Petala basi squamis fornicatis instructa. Filamenta medio incrassata. Discus perigynus. Caps. carnosa 3locularis 3sperma. Semina arillo carnoso cincta. *Sapindeae.*
1464. *Acer.* Flores polygami. Cal. 5partitus. Stamina disco hypogyno inserta. Caryopses 2 alatae. *Acera* Juss.
1465. *Luxemburgia* Hilar. Caps. 5sepalus. Petala 5 inaequalia. Antherae hypogynae subsessiles 4gonae coalitae. Caps. 1locularis 3valvis polysperma. *Ionidia? Frankenieae?*
1466. *Tropaeolum.* Cal. 5partitus calcaratus. Petala 5 inaequalia calyci inserta. Stamina basi libera. Baccae 3 1spermae. *Tropaeoleae* Juss.
1467. *Magallana* Cav. Cal. 5lobus calcaratus. Petala 5 inaequalia calyci inserta. Stam. basi coalita. Achenium 3alatum. *Tropaeoleae* Juss.

*** *Corolla 8petala.*

1468. *Jeffersonia* Bart. Cal. 4-5sepalus coloratus deciduus. Caps. 1locularis circumscissa polysperma. Semina arillata. *Papavereae.*

b. *Corolla pleiopetala supera.*

1469. *Oenothera.* Cal. tubulosus 4partitus deciduus. Petala 4. Caps. cylindrica vel prismatica 4locularis. Semina nuda cortice fungoso placentae columnari centrali affixa. *Onagrae.*
1470. *Jussieva.* Cal. 4-(5-)partitus persistens. Petala 4. Caps. prismatica 4locularis. Semina excorticata. *Onagrae.*
1471. *Epilobium.* Cal. tubulosus 4partitus. Petala 4. Caps. 4gona 4valvis. Semina comosa. *Onagrae.*
1472. *Gaura.* Cal. tubulosus 4partitus. Petala 4. Nux angulata 1sperma. *Onagrae.*
1473. *Fuchsia.* Cal. infundibuliformis coloratus 4fidus. Petala 4 convoluta. Bacca 4locularis polysperma. *Onagrae.*
1474. *Memecylon.* Cal. subdentatus. Petala 4. Antherae laterales. Bacca. *Melastomeae? Myrteae?*

1475. *Marlea* Roxb. Cal. 6-8dentatus. Petala 6-8 linearia. Antherae elongatae. Stigma 4dentatum. Drupa nuce 2loculari. *Familia?*

1476. *Rhizophora.* Cal. 4partitus ſemiſuperus. Petala 4. Antherae 2loculares. Stigma 2partitum. Fructus ligneus 1ſpermus, embryone germinante. *Rhizophoreae* R. Br.

II. *Flores incompleti.*

* *Fructus ſuperus.*

1477. *Daphne.* Cal. corollinus infundibuliformis deciduus 4fidus. Stam. tubo corollae inſerta. Drupa 1ſperma. *Thymelaeae.*

1478. *Gnidia.* Cal. corollinus tubuloſus 4fidus. Squamae ad faucem. Antherae tubo inſertae. Nux 1ſperma. *Thymelaeae.*

1479. *Paſſerina.* Cal. corollinus tubuloſus 4fidus marceſcens. Stamina tubo inſerta. Nux 1ſperma. *Thymelaeae.*

1480. *Dirca.* Cal. 0. Cor. campanulata, limbo obſoleto. Stam. corollae inſerta, alterna longiora, exſerta. Bacca 1ſperma. *Thymelaeae.*

1481. *Dodonaea.* Cal. 4partitus deciduus. Stylus ſubtrifidus. Capſ. 2-3locularis alata 2ſperma. *Sapindeae.*

1482. *Llaguno* R. et P. Flores polygami. Cal. 4-5fidus latere fiſſus. Stylus 3ſulcus. Capſ. inflata 3locularis, valvis membranaceis medio ſeptiferis. *Sapindeae.*

1483. *Stadmannia* Lam. Cal. 5dentatus. Stigma 3gonum. Bacca globoſa 1ſperma.

1484. *Pierardia* Roxb. Flores monoeci. Cal. 4partitus ſubtomentoſus. Stigmata 3. Bacca globoſa 3locularis 3ſperma. *Familia?*

1485. *Valentinia* Sw. Cal. 5partitus coloratus. Capſula baccata 3ſperma. *Sapindeae.*

1486. *Cedrota* Schreb. Cal. 6partitus. Stam. receptaculo inſerta. Fructus? *Familia?*

1487. *Baccaurea* Lour. Flores polygami. Cal. 5partitus. Stam. receptaculo inſerta. Bacca 3locularis oligoſperma.

1488. *Shepherdia* Nutt. Flores dioeci. Cal. campanulato-rotatus 4fidus. Stamina cum totidem glandulis ſquamiformibus alternantia. Bacca 1ſperma.

1489. *Aſpidiſtra* Ker. Cor. calycina 6fida. Antherae tubo corollae adnatae 2loculares. Stigma clypeatum latiſſimum. Germen ſub-4loculare. *Aroideae?*

1490. *Populus.* Flores dioeci. Squama cuneata laciniata. Cor. integra. Antherae 2loculares. Stigma 4-6lobum. Capſ. 2-3-valvis. Semina comoſa. *Amentaceae.*

** *Fructus inferus.*

1491. *Grubbia* Berg. Involucrum 2valve 3florum. Cor. 4petala ſupera. Bacca 1locularis. *Thymelaeae?*

1492. *Lagetta* Juſſ. Cal. corollinus urceolatus 4fidus. Glandulae 4 petaliformes calyci adnatae. Drupa piſiformis 1ſperma. *Thymelaeae.*

DIGYNIA.

1493. *Spallanzania* Pollin. Cal. duplex, ext. campanulatus 10-12-fidus, int. 5fidus. Petala 5 calyci inſerta. Caryopſis ſubſolitaria calyce incluſa. *Roſaceae.*
1494. *Codia* Forſt. Flores capitati involucrati. Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Fructus? *Dioſmeae?*
1495. *Weinmannia.* Cal. 4partitus. Cor. 4petala. Stamina diſco nectarifero inſerta. Folliculi duo connati. Semina piloſa. *Ericeae.*
1496. *Möhringia.* Cal. 4partitus. Cor. 4petala. Capſ. 4valvis 1locularis polyſperma. *Caryophylleae.*
1497. *Hermeſia* Humb. Flores ſubdioeci. Cal. 2-4ſepalus. Cor. 0. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Tricoccae.*
1498. *Galenia.* Cal. 4fidus. Cor. 0. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Chenopodeae.*
1499. *Marathrum* Humb. Involucrum campanulatum. Cor. 0. Capſ. 2locularis polyſperma. *Najades.*

TRIGYNIA.

1500. *Cardioſpermum.* Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Glandulae nectariferae cum nectarilymatibus labiatis 4. Capſ. inflata 3locularis. *Sapindeae.*
1501. *Urvillea* Kunth. Cal. 5ſepalus inaequalis. Cor. 4petala. Glandulae nectariferae 2. Capſ. 3alata 3ſperma. *Sapindeae.*
1502. *Seriana* Plum. Cal. 5ſepalus. Petala 4, intus appendiculata. Samarae 3 connexae. *Sapindeae.*
1503. *Paullinia.* Cal. 5ſepalus inaequalis. Petala 4, intus appendiculata. Capſ. coriacea 3locularis. Semina arillata. *Sapindeae.*
1504. *Sapindus.* Cal. 4-5ſepalus coloratus. Petala 4, 5, intus glanduloſa ſ. barbata. Capſ. 3cocca. *Sapindeae.*
1505. *Ponaea* Schreb. Cal. 5partitus. Petala 4, intus nuda. Capſ. 3alata 3ſperma. *Sapindeae.*
1506. *Tragopyrum* M. B. Cal. 2ſepalus. Petala 3 cum achenio 3quetro coaleſcentia. *Polygoneae.*
1507. *Pedicellia* Lour. Flores polygami. Cal. 5partitus. Nectarium crenatum carnoſum. Capſ. 3valvis 1ſperma. Sem. arillatum ſtipitatum. *Familia?*
1508. *Brünnichia* Banks. Cal. 5partitus coriaceus. Cor. 0. Nux 1ſperma. *Polygoneae.*
1509. *Coccoloba.* Cal. 5partitus. Cor. 0. Drupa 1ſperma. *Polygoneae.*
1510. *Polygonum.* Cal. corollinus 5ſepalus. Achenium 3quetrum. *Polygoneae.*

TETRAGYNIA.

1511. *Verea* Andr. Cal. 4partitus. Cor. hypocrateriformis, tubo ventricoſo, limbo 4fido. Squamae nectariferae perigynae. Capſ. 4 1loculares polyſpermae. *Sedeae.*
1512. *Diamorpha* Nutt. Cal. 4partitus. Pet. 4. Capſ. 4locularis extus dehiſcens, loculis 2ſpermis. *Sedeae.*

1513. *Adoxa.* Cal. 2ſepalus. Cor. 4-5fida ſupera. Stamina per paria approximata. Bacca 1locularis 4ſperma. Sem. arillata. *Saxifrageae.*

1514. *Haloragis* Forſt. Cal. 4ſepalus ſuperus. Pet. 4. Drupa 4locularis 4ſperma. *Onagrae.*

1515. *Paris.* Cal. 4ſepalus. Pet. 4 linearia. Antherae apice productae. Bacca 4locularis. *Sarmentaceae.*

1516. *Elatine.* Cal. 3-4partitus. Pet. 3, 4. Stam. numero varia. Capſ. 4locularis polyſperma. *Caryophylleae.*

1517. *Margaritaria* L. ſuppl. Flores dioeci. Cal. 4dentatus. Pet. 4. Bacca 4-5ſperma. *Terebinthaceae?*

1518. *Pythagorea* Lour. Cal. inferus 7-8ſepalus. Cor. ſupera 7-8-petala. Capſ. 4locularis polyſperma. *Familia?*

1519. *Francoa* Cav. Cal. ſuperus 4fidus. Petala 4. Glandulae 4 nectariferae. Capſ. 4 carinatae polyſpermae. *Violeae?*

1520. *Galvezia* R. et P. Cal. 4ſepalus. Petala 4. Stam. alterna breviora. Drupae 4 1ſpermae. *Laurinae.*

CLAS-

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

1408. ERICA.

I. *Tubiflorae, corollis tubulosis apice dilatatis.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia terna.*

discolor Andr. 1. E. foliis linearibus patentibus ciliatis, floribus terminalibus ternis, bracteis calyci serrulato appressis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. cupressiformis Salisb.)

rugosa Andr. 2. E. foliis confertis linearibus patenti-reflexis, floribus axillaribus pedunculatis, calycibus foliaceis, corollis rugosis, genitalibus exsertis, appendiculis antherarum subaristatis. *C. B. S.*

densifolia W. 3. E. foliis lineari-oblongis appresso-imbricatis, floribus axillaribus pubescentibus, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

Ewerana Dryand. 4. E. foliis linearibus scabris patentibus, floribus lateralibus solitariis subincurvis pubescentibus, calycibus appressis, staminibus inclusis, stylo exserto incurvo. *C. B. S.* (E. Uhria Andr., decora Salisb.)

cruenta Ait. 5. E. foliis lineari-subulatis glabris patentibus, floribus subaggregatis glabris, calycibus appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. melliflua Salisb.)

speciosa Andr. 6. E. foliis linearibus pubescentibus patulis, floribus terminalibus subternis villoso-viscosis, calycibus lanceolatis, limbo corollae erecto, antheris tubum aequantibus, stylo exserto. *C. B. S.*

Nivenia Andr. 7. E. foliis linearibus obtusis patentissimis glandulosо-pilosis duplicato-ciliatis, pedunculis terminalibus umbellatis, calycibus foliaceis appressis glandulosis, corollae costatae limbo revoluto, antheris coalitis exsertis. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

mutabilis Andr. 8. E. foliis linearibus ciliatis patentiſſimis, pedunculis corymboſis glanduloſo-piloſis, corollis ſtriatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. hirta et viridiflora Andr.)

nana Salisb. 9. E. foliis linearibus patentibus, ramis proſtratis, floribus terminalibus, calycibus bracteatis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. depreſſa Andr.)

vireſcens Link. 10. E. foliis linearibus incurvo-erectis hirſutis, floribus terminalibus viſcoſis, calycibus foliaceis bracteatis, ſtaminibus ſubincluſis, ſtylo exſerto incurvo. *C. B. S.*

ambigua Wendl. 11. E. foliis linearibus hirſutiusculis patulis, floribus terminalibus ſubſolitariis ſtriatis glabris, limbo brevi reflexo, calycibus ſubulatis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. cylindrica Andr.)

clavaeflora Salisb. 12. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, calycibus appreſſis obovatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſeſſiliflora Andr.)

Paterſonia Andr. 13. E. foliis linearibus ſtrictis patulis glabris confertis, floribus congeſtis glabris, limbo abbreviato reflexo genitalia aequante, calycibus ovato-ſubulatis. *C. B. S.* (E. abietina L., ſpiſſifolia Salisb.)

*** *Foliis ſenis, octonis.*

colorans Andr. 14. E. foliis linearibus patulis ciliatis, floribus axillaribus ſubſpicatis, calycibus linearibus appreſſis, genitalibus ſubincluſis. *C. B. S.*

ſpicata 15. E. foliis lineari-ſubulatis hiſpidis patenti-reflexis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus verticillato-glomeratis cernuis, ſepalis ſpathulatis unguiculatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſeſſiliflora L. ſuppl., favoſa Salisb.)

faſcicularis L. ſuppl. 16. E. foliis linearibus obtuſis glanduloſo-ciliatis patulis ſubrecurvis, floribus terminalibus verticillatis horizontalibus, limbo erecto, pedunculis bracteisque glanduloſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. octophylla Thunb., coronata Andr., radiiflora Salisb.)

†† *Antherae baſi nudae.*

* *Folia terna.*

coſtata Andr. 17. E. foliis linearibus obtuſiusculis pubeſcentibus patentiſſimis, floribus terminalibus ternis coſtatis, calycibus foliaceis bracteatis ſerrulatis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

diaphana * 18. E. foliis patentiſſimis glabris, floribus terminalibus ternis pendulis glabris, calycibus foliaceis bracteatis obtuſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. transparens Andr.)

clavata Andr. 19. E. foliis linearibus erectis, floribus ternis terminalibus pendulis viridibus, calyce duplici appresso, genitalibus exsertis. *C. B. S.*

pallens Andr. 20. E. foliis lineari-oblongis incanis patentissimis, floribus terminalibus subracemosis horizontalibus, calycibus bracteatis herbaceis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

dichrus * 21. E. foliis linearibus villosis erectis, floribus ternis terminalibus, calycibus coloratis appressis, limbo corollae erecto, staminibus inclusis, stylo apice incurvo exserto. *C. B. S.* (E. bicolor Andr.)

perspicua Wendl. 22. E. foliis linearibus ciliatis fasciculatis, floribus axillaribus subsessilibus horizontalibus villosis, calycibus foliaceis serratis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. Linnaea Andr., lituiflora Salisb.)

nudiflora 23. E. foliis linearibus acutis ciliatis patulis, floribus axillaribus terminalibusque aggregatis erectis tubuloso-subcampanulatis 4gonis, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. floribunda Wendl., sertiflora Salisb.)

versicolor Andr. 24. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus terminalibus ternis, calycibus coloratis bracteatis denticulatis, staminibus subinclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

refulgens Andr. 25. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus quaternis terminalibus cernuis, calycibus coloratis subulatis appressis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

transparens Thunb. 26. E. foliis linearibus horizontalibus margine hispidis, floribus terminalibus pedunculatis subincurvis cernuis striatis subpellucidis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. pellucida Andr., strigiliflora Salisb.)

exsudans Andr. 27. E. foliis linearibus obtusis glanduloso-viscosis patentibus, floribus terminalibus subaggregatis cernuis striatis, bracteis spathulatis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

sulfurea Andr. 28. E. foliis linearibus obtusis villosis fasciculatis, floribus subsessilibus axillaribus horizontalibus villosis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

flava Andr. 29. E. foliis filiformibus abbreviatis glabris erectis, floribus subgeminis horizontalibus, calycibus foliaceis appressis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

Sparrmanni Thunb. 30. E. foliis lineari-lanceolatis hirsutis revolutis patulis, floribus terminalibus subternis cernuis hirsutissimis conniventibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. aspera Andr., hystriciflora Salisb.)

erubescens Andr. 31. E. foliis lineari-lanceolatis margine revolutis hispido-ciliatis, ramis floriferis pendulis, calycibus bracteatis dentato-fimbriatis, corollis extus intusque glanduloso-pilosissimis, limbo revoluto, staminibus inclusis. *C. B. S.*

elata Andr. 32. E. foliis filiformibus obtusiusculis, ramis patentibus, floribus axillaribus confertis horizontali-

bus villosis, limbo revoluto, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. longiflora Salisb.)

flammea Andr. 33. E. foliis filiformibus suberectis glabris, floribus subsolitariis horizontalibus, calycibus subulatis appressis, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. bibax Salisb.)

Linnaeana Dryand. 34. E. foliis lineari-lanceolatis pilosis patentibus, floribus subsessilibus horizontalibus villosis, calycibus lanceolatis foliaceis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. Linnaeoides Andr.)

calamiformis Salisb. 35. E. foliis filiformibus patentibus, floribus terminalibus umbellatis, calycibus foliaceis appressis, limbo revoluto, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. radiata Andr.)

spuria Andr. 36. E. foliis linearibus subciliatis erecto-patulis, floribus subaggregatis terminalibus, limbo corollae revoluto, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. tubulosa Wendl., culcitaeflora Salisb.)

exsurgens Andr. 37. E. foliis filiformi-subulatis patenti-recurvis, floribus axillaribus confertis horizontalibus, limbo corollae revoluto, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. pharetraeformis Salisb.)

curviflora 38. E. foliis linearibus patentissimis glabris, floribus terminalibus subsolitariis laevibus, limbo erecto, calycibus foliaceis ovatis serrulatis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. fastuosa Salisb.)

simpliciflora W. 39. E. foliis 3gonis erecto-patulis glabris, floribus terminalibus solitariis erectis, calycibus foliaceis lanceolatis appressis, corollae tubulosae medio constrictae limbo patente, genitalibus subexsertis. *C. B. S.*

tubiflora 40. E. foliis linearibus obtusis pubescentibus erectis, floribus terminalibus subsolitariis erectis hirsutis, limbo revoluto, calycibus obtusiusculis ciliatis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. tubulosa Sm.)

ignescens Andr. 41. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus terminalibus solitariis cernuis, calycibus lanceolatis subciliatis, corollae superne pilosae limbo revoluto, genitalibus subexsertis. *C. B. S.*

lanata Wendl. 42. E. foliis lineari-oblongis villosis erectis imbricatis abbreviatis, floribus terminalibus geminis cernuis pubescentibus, calycibus foliaceis obtusiusculis, limbo corollae erecto, stylo exserto. *C. B. S.*

sordida Andr. 43. E. foliis linearibus obtusis lanatis patulis, floribus terminalibus solitariis cernuis villosis, calycibus foliaceis bracteatis appressis, limbo corollae revoluto, genitalibus longe exsertis. *C. B. S.* (E. laniflora Wendl., floccosa Salisb.)

serratifolia Andr. 44. E. foliis linearibus acutis margine plumosis patentissimis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus foliaceis bracteatis appressis glanduloso-ciliatis, corollae glabrae limbo patente, stamini-

bus ſubincluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. plumoſa Wendl., cylindriflora Saliſb.)

Maſſonii L. ſuppl. 45. E. foliis linearibus ſerrulatis hirſutis imbricatis patentibus, floribus axillaribus verticillatis nutantibus viſcoſis, calycibus bracteatis appreſſis villoſis, limbo corollae connivente, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. lycopodifolia Saliſb.)

procera Wendl. 46. E. foliis linearibus erectis pubeſcentibus, floribus terminalibus ſolitariis erectiuſculis, calycibus lanceolatis ciliatis, corollae medio conſtrictae tubo patente, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

conſpicua Ait. 47. E. foliis lineari-oblongis glabris patentibus, floribus terminalibus ſubaggregatis nutantibus, calycibus foliaceis ovatis, corollae elongato-clavatae villoſiuſculae limbo revoluto, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

glanduloſa Thunb. 48. E. foliis linearibus acutis glanduloſo-piloſis patentibus remotiuſculis, floribus verticillato-congeſtis ſubterminalibus, calycibus bracteatis glanduloſo-ciliatis, corollae ſericeae tubo erecto, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

paluſtris Andr. 49. E. foliis linearibus obtuſis pubeſcentibus patulis, ramis divaricatis, floribus terminalibus ternis cernuis, calycibus nudis ſubcoloratis, corollae tubuloſae limbo patulo, ſtylo ſubexſerto. *C. B. S.*

gemmifera Sims. 50. E. foliis oblongis appreſſis ciliato-ariſtatis, ramis apice incraſſatis, floribus nutantibus ſubvilloſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

*** *Folia ſena pluraque.*

ſplendens Wendl. 51. E. foliis linearibus obtuſis patulis, floribus verticillatis denſe congeſtis nutantibus, calycibus foliaceis ovatis, corollae pubeſcentis limbo ſubrevoluto, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

longifolia W. 52. E. foliis linearibus elongatis incurvo-patentibus margine cartilagineis ſcabris, floribus verticillato-congeſtis nutantibus comoſis tubuloſo-ſubampullaceis pubeſcentibus viſcoſis, calycibus foliaceis anguſtis bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. pinea Wendl.)

veſtita Thunb. 53. E. foliis linearibus erectis margine cartilagineis ſcabris, floribus verticillatis ſubſeſſilibus patentibus clavatis pubeſcentibus, calycibus ovatis glanduloſo-ciliatis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. longifolia Saliſb. Curt.)

pinea Thunb. 54. E. foliis linearibus obtuſis patentibus, floribus verticillatis ſubſeſſilibus patentibus clavatis glabris, calycibus glanduloſo-ciliatis, limbo corollae ſerrulato patulo, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. pinifolia Saliſb.)

pityophylla * 55. E. foliis filiformibus elongatis glabris patulis, floribus verticillatis congeſtis horizontalibus tomentoſis coſtatis, calycibus bracteatis foliaceis linearibus villoſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. pinifolia Andr.)

aurea Andr. 56. E. foliis linearibus recurvato-patulis, floribus verticillatis horizontalibus, calycibus bracteatis appreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

viridis Andr. 57. E. foliis linearibus patentiſſimis ſubrecurvis, floribus verticillatis horizontalibus tubuloſis coſtatis viſcoſis, limbo revoluto, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

Hibbertia Andr. 58. E. foliis linearibus margine revolutis glabris patentibus, floribus verticillatis horizontalibus clavatis viſcoſis, limbo erecto, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

onoſmaeflora Saliſb. 59. E. foliis linearibus patentibus glabris, floribus ſubverticillatis confertis glutinoſis coſtatis, limbo revoluto abbreviato, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. glutinoſa Andr., viſcoſa Wendl.)

echiiflora Andr. 60. E. foliis linearibus margine aſperis confertis patentiſſimis, floribus axillaribus congeſtis tubuloſis horizontalibus coſtatis viſcoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

argentiflora Andr. 61. E. foliis linearibus glabris patenti-incurvis, floribus axillaribus horizontalibus ſubpellucidis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

Archeria Andr. 62. E. foliis linearibus ſerrulato-ciliatis patentibus, floribus axillaribus terminalibusque congeſtis horizontalibus villoſo-viſcoſis, calycibus bracteatis ſerrulatis hiſpidis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

roſea Andr. 63. E. foliis filiformibus erectis, floribus ſubterminalibus ſeſſilibus glabris, calycibus ſubulatis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Saliſburia Andr. 64. E. foliis linearibus margine revolutis ſubtus albidis erectis, floribus racemoſo-ſpicatis comoſis confertis cernuis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

grandiflora Thunb. 65. E. foliis linearibus cuſpidatis glabris patentiſſimis, floribus axillaribus clavatis ſubincurvis patentibus, calycibus ovato-lanceolatis integerrimis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. formoſa Andr.)

Leea Andr. 66. E. foliis lineari-filiformibus rigidis obtuſis patentibus, floribus axillaribus tubuloſo-4gonis coſtatis, limbo patente, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. coſtaeflora Saliſb.)

coccinea 67. E. foliis linearibus cuſpidatis ciliatis patentibus, floribus axillaribus confertis incurvo-clavatis, calycibus villoſo-tomentoſis, limbo corollae erectiuſculo, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. frondoſa Saliſb.)

purpurea Andr. 68. E. foliis linearibus ciliatis patentiſſimis remotiuſculis, floribus verticillatis horizontalibus tubuloſo-clavatis glabris, calycibus bracteatis lanceolatis ſerrulatis, limbo corollae patulo, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. phylicifolia Saliſb.)

concinna Ait. 69. E. foliis linearibus ſubvilloſis erectis, floribus verticillatis clavatis pubeſcentibus, calycibus bracteatis denticulatis villoſis, limbo corollae patulo, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. abietina Andr., paludoſa Saliſb.)

II. *Coniflorae, corollis tubulosis apice constrictis.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia terna.*

halicacaba 70. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus terminalibus subternis pendulis ovato-tubulosis inflatis glabris, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. rupestris Salisb.)

Monsoniana Thunb. 71. E. foliis oblongis margine revolutis erectis 4fariam positis, floribus terminalibus aggregatis nutantibus oblongis conniventibus, calycibus bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. variifolia Salisb.)

lanuginosa Andr. 72. E. foliis linearibus ciliatis patentissimis, floribus subsolitariis axillaribus cernuis, calyce duplici colorato corollaque conica connivente tomentosis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

alopecuroides Wendl. 73. E. foliis linearibus erectis ramisque virgatis pubescentibus, floribus axillaribus aggregatis ovato-oblongis, calycibus coloratis ciliatis patentibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

cinerea 74. E. foliis linearibus fasciculatis, ramis pubescentibus, floribus axillaribus aggregatis suberectis ovato-oblongis, limbo abbreviato subrevoluto, staminibus inclusis. *Anglia. Norvegia. Europ. austr.*

** *Folia quaterna.*

gilva Wendl. 75. E. foliis lineari-3quetris rigidis glabris patulis, floribus axillaribus verticillatis pendulis ventricoso-cylindricis, calycibus appressis abbreviatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. gelida Andr., alveiflora Salisb.)

mammosa 76. E. foliis lineari-subulatis glabris erectis, floribus axillaribus umbellatis nutantibus, calycibus coloratis bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. abietina Thunb., verticillata Andr.)

cerinthoides 77. E. foliis linearibus reflexis ciliatis apice barbatis, floribus terminalibus congestis nutantibus piloso-viscosis, calycibus bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. crinifolia Salisb.)

tumida Ker. 78. E. foliis linearibus obtusis hirsutis reflexis, floribus subquaternis pedunculatis oblongo-cylindricis pubescentibus, calycibus foliaceis bracteatis patulis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. splendens Andr.)

†† *Antherae basi nudae.*

* *Folia terna, subquaterna. Antherae in filamenta decurrentes.*

Petiverii 79. E. foliis lineari-subulatis ciliatis erectis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus bracteatis subrotundis coloratis ciliatis, genitalibus longe exsertis. *C. B. S.* (E. baculiflora Salisb.)

focciflora Salisb. 80. E. foliis fubquaternis linearibus fquarrofis arcuatis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus bracteatis obtufis fcariofis glabris, genitalibus longe exfertis, capfula ovata. *C. B. S.* (E. Sebana viridis Andr.)

follicularis Salisb. 81. E. foliis quaternis fubulatis rigidis recurvis, floribus terminalibus fubfolitariis feffilibus pendulis, calycibus imbricatis, genitalibus longe exfertis, antheris fubcoalitis. *C. B. S.* (E. Petiveriana et Melaftoma Andr.)

Sebana Ait. 82. E. foliis lineari-filiformibus fquarrofis, ramulis confertiffimis, floribus fubaggregatis pendulis, calycibus bracteatis coloratis, corollae tubo apice incraffato, genitalibus longe exfertis. *C. B. S.* (E. coccinea L. fpec., cothurnalis Salisb.)

monadelpha Andr. 83. E. foliis ternis obtufis erectis pubefcentibus, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus imbricatis coloratis, genitalibus longe exfertis, filamentis geniculatis inferne coalitis. *C. B. S.* (E. furfurofa Salisb.)

Pluknetii 84. E. foliis ternis lineari-fubulatis patulis, floribus axillaribus pendulis, calycibus ebracteatis anguftis, genitalibus longe exfertis. *C. B. S.* (E. fufiformis, var. ε. Salisb.)

pudibunda Salisb. 85. E. foliis fubquaternis linearibus fubglutinofis patulis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus ciliatis, antheris clavatis, genitalibus exfertis. *C. B. S.* (E. nutans Wendl.)

** *Folia terna, fubquaterna.*
Antherae discretae.

flexuofa Andr. 86. E. foliis linearibus glabris erectis abbreviatis, floribus terminalibus fubternis fuberectis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus exfertis. *C. B. S.* (E. divaricata Wendl.)

Broadleyana Andr. 87. E. foliis ternis linearibus fafciculatis patulis, floribus axillaribus longe pedunculatis nutantibus, calycibus foliaceis anguftis, ftylo exferto. *C. B. S.*

Juliana Noif. 88. E. foliis lineari-3gonis erectis lucidis abbreviatis, floribus terminalibus aggregatis, fepalis dilatatis ciliatis, genitalibus inclufis. *C. B. S.*

armata * 89. E. foliis linearibus erectis fubquinis fpinulofis, floribus aggregatis terminalibus flavo-ftrigofis, calycibus fpinofis foliaceis, ftylo exferto. *C. B. S.*

notabilis Wendl. Lichtft. 90. E. foliis lineari-oblongis ferrulato-ciliatis appreffis abbreviatis, ramis gracilibus flexuofis, floribus minutis terminalibus aggregatis refinofo-vifcofis, genitalibus inclufis. *C. B. S.*

latifolia Andr. 91. E. foliis oblongo-lanceolatis fupra villofis fubtus albidis, ramis flexuofis, pedunculis axillaribus aggregatis, floribus globofo-conicis pendulis, genitalibus exfertis. *C. B. S.*

horizontalis Andr. 92. E. foliis quaternis linearibus patentiffimis, floribus terminalibus ternis fubfeffilibus cernuis, fe-

palis ſpathulatis ſerratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

ciliaris 93. E. foliis ternis ovatis glanduloſo-ciliatis patentiſſimis remotiuſculis, floribus ſubracemoſis ſecundis, ſepalis ſpathulatis ciliatis patentibus, limbo corollae contracto irregulari, ſtylo ſubexſerto. *Luſitania.*

**** Folia ſena.*

recurvata Andr. 94. E. foliis linearibus flexuoſis recurvis imbricatis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus pendulis, ſtaminibus incluſis, ſtylo longe exſerto. *C. B. S.*

III. *Ampullaceae: corolla oblonga fauce conſtricta, limbo patente.*

† *Antherae appendiculatae.*

** Folia oppoſita.*

glutinoſa Berg. 95. E. foliis linearibus glanduloſo-piloſis, pedunculis verticillatis, ſtaminibus incluſis, appendiculis ſerratis. *C. B. S.* (E. droſeroides Andr., Andromeda droſeroides L.)

lutea 96. E. foliis linearibus appreſſis glabris, ramis gracilibus flexuoſis, floribus faſciculatis, calycibus coloratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. imbellis Saliſb.)

*** Folia terna.*

Comptoniana Andr. 97. E. foliis ſubulatis glabris patenti-recurvis, floribus terminalibus aggregatis pedunculatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Sainsburiana Andr. 98. E. foliis filiformibus elongatis glabris erecto-patulis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus anguſtis, limbo corollae abbreviato, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Irbyana Andr. 99. E. foliis ternis margine ſcabris cuſpidatis erectis, floribus terminalibus umbellatis glutinoſiſſimis, calycibus foliaceis ebracteatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

glauca Andr. 100. E. foliis linearibus glaucis erecto-patulis, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis, calycibus coloratis ovatis patulis, genitalibus incluſis, appendiculis antherarum latis obtuſis. *C. B. S.*

infundibuliformis Andr. 101. E. foliis filiformibus obtuſis glabris erectis, floribus terminalibus aggregatis anguſtis, genitalibus incluſis, antheris apice appendiculatis. *C. B. S.*

Aitonia Andr. 102. E. foliis linearibus ſerrulatis patentibus, floribus terminalibus ſubternis; calycibus foliaceis appreſſis, antheris incluſis, appendiculis abbreviatis. *C. B. S.*

Shannoneana Andr. 103. E. foliis lineari-lanceolatis rigidis patulis, floribus terminalibus umbellatis cernuis, calyce colorato, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

***Folia quaterna.*

ſtricta Don. 104. E. foliis linearibus obtuſis glabris patentibus, floribus terminalibus umbellatis, calyce colorato, limbo corollae abbreviato, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Italia. Corſica.* (E. ramuloſa Viv., corſica Cand., multicaulis Salisb.)

denſa Andr. 105. E. foliis linearibus ſubimbricatis patulis, floribus axillaribus confertis ſubſeſſilibus, calycibus foliaceis appreſſis, limbo corollae abbreviato, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

inflata Thunb. 106. E. foliis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricoſis elongatis, calycibus ſubulatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. amabilis Salisb., glabra Link.)

ventricoſa Andr. 107. E. foliis linearibus ciliatis recurvo-patentibus floralibus latioribus margine ſcarioſis, floribus congeſtis terminalibus, calycibus anguſtis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. translucens Wendl., venuſta Salisb.)

retorta 108. E. foliis ovatis ſquarroſo-recurvis calycibusque fimbriato-ciliatis ariſtatis, pedunculis terminalibus umbellatis erectis, antheris utrinque barbatis incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. gorteriaefolia Salisb.)

****Folia ſena.*

imperialis Andr. 109. E. foliis filiformibus erectis imbricatis, floribus terminalibus corymboſis cernuis, limbo discolore, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

blanda Andr. 110. E. foliis linearibus patenti-reflexis imbricatis, floribus aggregatis horizontalibus, appendiculis antherarum breviſſimis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

†† *Antherae baſi nudae.*

**Folia oppoſita.*

rubella Ker. 111. E. foliis linearibus appreſſis imbricatis, umbellis terminalibus multifloris calycibus bracteatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

***Folia terna.*

albens 112. E. foliis ſubulato-3gonis ſcabris patentibus, floribus axillaribus ſparſis folio brevioribus, pedunculis bracteatis, calycibus ovatis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. viminalis Salisb.)

jasminiflora Andr. 113. E. foliis lineari-oblongis ſerrulatis recurvis 6fariam imbricatis, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus coloratis obtuſiusculis, corollae coſtatae limbo expanſo obtuſo, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. lagenaeformis Salisb.)

Bandonia Andr. 114. E. foliis lineari-lanceolatis glabris patulis, floribus umbellatis longe pedunculatis terminalibus erectis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

ariſtata Andr. 115. E. foliis oblongis ſubrecurvis hiſpidis apice ariſtatis imbricatis, floribus terminalibus aggregatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

magnifica Andr. 116. E. foliis linearibus obtusis patentissimis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus coloratis, limbo corollae erectiusculo, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

tetragona Thunb. 117. E. foliis linearibus acuminatis ciliatis erecto-patulis, floribus axillaribus erectis 4gonis, calycibus ciliatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

Bankſii W. 118. E. foliis sub-3gonis erectis glabris, caule depresso, floribus terminalibus subgeminis sessilibus pendulis, calycibus bracteatis obtusiusculis, genitalibus exsertis, antheris in filamenta decurrentibus. *C. B. S.* (E. fragilis Salisb.)

*** *Folia quaterna pluraque.*

ſtellifera Andr. 119. E. foliis lineari-lanceolatis subulatis pilosis patentissimis, floribus axillaribus terminalibusque racemosis erectis, calycibus foliaceis, limbo corollae 6fido, staminibus inclusis. *Hybrida?*

Lawſonia Andr. 120. E. foliis filiformibus patulis glabris, floribus axillaribus sparsis, calycibus corollisque angustis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

ſtellaris Noiſ. 121. E. foliis linearibus patentibus subincurvis villoso-hirsutis, floribus subsessilibus confertis terminalibus, sepalis linearibus ciliatis, antheris exsertis in filamenta productis. *C. B. S.*

metulaeflora Sims. 122. E. foliis subulatis ciliato-spinulosis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus bracteatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

praeſtans Andr. 123. E. foliis linearibus erectis glabris, floribus terminalibus aggregatis, calycibus margine scariosis tubum corollae aequantibus, stylo exserto. *C. B. S.* (E. daphnaeflora Salisb.)

Coventria Andr. 124. E. foliis linearibus patenti-reflexis glabris, ramis flexuosis, floribus terminalibus aggregatis sessilibus, calycibus foliaceis angustis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

acuminata Andr. 125. E. foliis 3gonis cuspidatis recurvis confertis, floribus terminalibus glomeratis subsessilibus, calycibus foliaceis acuminatis, limbo abbreviato revoluto, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

ferruginea Andr. 126. E. foliis linearibus recurvis ferrugineo-ciliatis, pedunculis terminalibus umbellato-radiatis horizontalibus, calycibus apice barbatis, corollis ore turgidis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

hyacinthoides Andr. 127. E. foliis linearibus nitidis patentibus, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus foliaceis bracteatis fimbriatis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

praegnans Andr. 128. E. foliis lineari-subulatis patenti-recurvis, floribus terminalibus congestis, calycibus foliaceis linearibus, laciniis limbi acutis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

princeps Andr. 129. E. foliis linearibus hirsuto-ciliatis recurvis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus foliaceis bracteatis hirtis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

faſtigiata 130. E. foliis linearibus nitidis erectis imbricatis, floribus terminalibus congestis sessilibus erectis,

calycibus bracteatis ſerrulatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. denticulata L., dentata Thunb. Wendl., primuloides *β.* Wendl., E. Walkeria Andr.)

ampullacea Curt. 131. E. foliis linearibus ciliatis reflexis, floribus terminalibus ſubquaternis pedunculatis, calycibus bracteatis acutis ciliatis, corollae ſtriatae limbo obtuſo, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. obbata Andr.)

tenuiflora Andr. 132. E. foliis linearibus glabris patulis, floribus terminalibus ſubquaternis erectis anguſte ampullaceis, calycibus foliaceis bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. cylindrica Thunb., fiſtulaeflora Saliſb.)

comoſa 133. E. foliis linearibus abbreviatis erecto-patulis, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus bracteatis ciliatis coloratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. transparens Berg., galiiflora Saliſb.)

mundula Andr. 134. E. foliis linearibus ſubulatis patentiſſimis lucidis glabris, floribus terminalibus quaternis ſeſſilibus erectis anguſtis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Muſcari Andr. 135. E. foliis lineari-3gonis glabris patulis, floribus terminalibus quaternis ſeſſilibus, calycibus foliaceis ſubulatis, limbo corollae abbreviato obtuſo, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. fragrans Saliſb.)

Swainſonia Andr. 136. E. foliis linearibus obtuſis confertis erectis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus lanceolatis, genitalibus ſubincluſis. *C. B. S.*

IV. *Urceolatae*: *corolla baſi ventricoſa, ovato-ſubgloboſa, ore contracto, limbo patulo.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia ſparſa vel oppoſita.*

obliqua Thunb. 137. E. foliis linearibus truncatis arcuatis margine glanduloſis, floribus terminalibus umbellatis viſcoſis, ſtylo incluſo. *C. B. S.*

togata Sims. 138. E. foliis oppoſitis appreſſis, calycibus cyathiformibus amplis coloratis, bracteis remotis, antheris incluſis. *C. B. S.*

Ollula Andr. 139. E. foliis confertis linearibus glabris erectis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus appreſſis foliaceis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

unica * 140. E. foliis confertis linearibus ciliatis erectis, floribus terminalibus corymboſis cernuis, calycibus coloratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. pedunculata Andr.)

** *Folia terna.*

depreſſa 141 E. foliis linearibus patentibus glabris, ramis decumbentibus, floribus ſparſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. rupeſtris Andr., humilis Saliſb.)

adenophora * 142 E. foliis lineari-oblongis margine revolutis glanduloſo-hiſpidis patulis remotiuſculis, floribus

terminalibus aggregatis glabris, calycibus viſcidis coloratis appreſſis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

nigrita 143. E. foliis lineari-triquetris glabris patentiſſimis, floribus terminalibus ſubternis, pedicellis piloſis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. laricina Berg., volutaeflora Saliſb.)

aggregata Wendl. 144. E. foliis linearibus hirſutis patentibus, floribus aggregato-racemoſis pubeſcentibus, limbo corollae erectiuſculo, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

urceolaris Ait. 145. E. foliis lineari-lanceolatis pubeſcentibus patulis, floribus terminalibus aggregatis pubeſcentibus, limbo corollae erectiuſculo, ſtylo incluſo. *C. B. S.* (E. caffra L., lamellaris Saliſb.)

marifolia 146. E. foliis ovato-ellipticis pubeſcentibus ſubtus albidis patentiſſimis, floribus terminalibus aggregatis ſcabris, limbo corollae ſubcontracto, calycibus foliaceis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

planifolia 147. E. foliis ovatis ciliatis remotiuſculis, floribus axillaribus ternis cernuis limbo contractis, calycibus patentibus glanduloſo-ciliatis, genitalibus exſertis. *G. B. S.* (E. thymifolia Wendl.)

thymifolia Andr. 148. E. foliis ſubcordato-ovatis ciliatis ſubtus glaucis, floribus axillaribus ſolitariis, antheris incluſis obſolete appendiculatis, ſtigmate exſerto. *C. B. S.*

*teucriifolia** 149. E. foliis lanceolatis villoſiuſculis ſubtus albidis patentiſſimis, floribus axillaribus cymoſis, calyce anguſto patulo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

hirta Thunb. 150. E. foliis linearibus hiſpidis, floribus terminalibus umbellatis longe pedunculatis ſubvilloſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. urceolaris Saliſb.)

ſanguinolenta Ker. 151. E. foliis linearibus mucronulatis patentibus, floribus terminalibus globoſis hirſutis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

regerminans 152. E. foliis linearibus margine revolutis erectis ſubimbricatis, floribus axillaribus confertiſſimis cernuis, genitalibus incluſis, appendiculis antherarum elongatis. *C. B. S.* (E. articularis Thunb., pulchella Andr., retroflexa Wendl., caduceifera Saliſb.)

incana Wendl. 153. E. foliis lineari-oblongis obtuſis ſubtus albidis patentibus, floribus terminalibus aggregatis pubeſcentibus, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

aſperifolia Saliſb. 154. E. foliis linearibus margine revolutis ciliatis patentiſſimis, floribus terminalibus ternis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſetacea Andr.)

ſcarioſa Wendl. 155. E. foliis lineari-oblongis margine revolutis glabris erectis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus coloratis bracteatis, limbo corollae erectiuſculo, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

bicolor Thunb. 156. E. foliis ovatis villoſis patentiſſimis 4fariam ſubimbricatis, floribus terminalibus ſubternis glabris, ſtaminibus corollae limbum erectiuſculum aequantibus. *C. B. S.* (E. calathiflora Saliſb.)

pubeſcens 157. E. foliis linearibus erecto-patulis ramiſque hirſutis, floribus faſciculatis terminalibus pubeſcen-

tibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. pallida Salisb.)

globosa Andr. 158. E. foliis lineari-oblongis duplicato-ciliatis recurvis, floribus terminalibus aggregatis cernuis globosis, calycibus coloratis glanduloso-pilosis, staminibus inclusis, appendiculis exiguis. *C. B. S.*

*campylophylla** 159. E. foliis lineari-subfalcatis margine revolutis ciliatis, floribus terminalibus subternis globosis, calycibus ciliatis, stylo exserto. *C. B. S.* (E. incurva Andr.)

nitida Andr. 160. E. foliis linearibus obtusis scabris patentibus, floribus terminalibus subracemosis cernuis, pedicellis tomentosis, calycibus bracteatis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

Lambertia Andr. 161. E. foliis lineari-lanceolatis glabris patentibus, pedunculis axillaribus subternis coloratis bracteatis, limbo corollae globosae erectiusculo, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

formosa Thunb. 162. E. foliis oblongis obtusis patentibus, floribus subaggregatis cernuis, calycibus patentibus, corollis glutinosis demum fissis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

resinosa Sims. 163. E. foliis lineari-oblongis scabris patentissimis, floribus aggregatis glutinosissimis, calycibus coloratis appressis, limbo corollae viridi erecto, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. Vernix Andr.)

ardens Andr. 164. E. foliis linearibus patentissimis rigidis glabris, floribus aggregatis axillaribus pendulis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

reflexa Link. 165. E. foliis lineari-oblongis obtusis patentissimis glanduloso-ciliatis, ramis reflexis sub-3floris, calycibus patulis coloratis, corollis viscosissimis, staminibus inclusis. *C. B. S.*

******Folia quaterna.***

gracilis Wendl. 166. E. foliis linearibus glabris erecto-patulis, floribus terminalibus aggregatis erectis urceolato-campanulatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. Bonplandiana Ker. ?)

racemifera Andr. 167. E. foliis linearibus confertis quaternis senisve erectis, floribus axillaribus dense verticillatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

Savileia Andr. 168. E. foliis linearibus glabris erectis, pedunculis laxe racemosis coloratis, calycibus foliaceis angustis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

subulata Wendl. 169. E. foliis linearibus subulatis subincurvis elongatis, ramis hirsutiusculis, floribus terminalibus conferte glomeratis, calycibus subulatis appressis, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

verecunda Salisb. 170. E. foliis linearibus cuspidatis incurvo-patulis, ramis hirsutis, pedunculis umbellatis coloratis cernuis, calycibus fimbriato-ciliatis, limbo corollae erectiusculo, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. cernua Andr.)

tenuissima Wendl. 171. E. foliis lineari-filiformibus glabris erectis subimbricatis, floribus terminalibus aggregatis,

calycibus breviſſimis nudis, limbo corollae erectiusculo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

tenella Andr. 172. E. foliis linearibus patentibus glabris abbreviatis, ramis divaricatis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus foliaceis appreſſis, limbo corollae reflexo, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

florida Thunb. 173. E. foliis linearibus piloſis, floribus terminalibus umbellatis glabris, calycibus villoſis reflexis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

mucoſa 174. E. foliis linearibus erectis glabris cartilagineo-ſerrulatis, floribus terminalibus umbellatis mucoſis, pedunculis bracteatis, calyce colorato appreſſo ovato, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Tetralix 175. E foliis lineari-oblongis ciliatis remotiusculis, floribus terminalibus cernuis ovato-oblongis, limbo abbreviato patulo, ſtaminibus incluſis, ſtylo ſubexſerto. *Europ. paludes.*

Bergiana 176. F. foliis lineari-oblongis hirſutis patentiſſimis, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis pendulis, calycibus reflexis, corollis glabris, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. quadriflora W. Andr., lacunaeflora Saliſb., nitens Lee Kenned.)

rubens Thunb. 177. E. foliis linearibus hiſpidis patulis, pedunculis terminalibus aggregatis bracteatis, calycibus foliaceis ſubappreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. peduncularis Saliſb.)

ramentacea 178. E. foliis lineari-3gonis patentibus ſtrictis glabris, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis, limbo corollae contracto, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. bullularis Saliſb.)

Blandfordia Andr. 179. E. foliis linearibus obtuſis patentibus, floribus terminalibus ſubſolitariis, calycibus bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

Solandra Andr. 180. E. foliis linearibus hiſpidis, caule ſuffruticoſo, ramis flexuoſis decumbentibus, floribus terminalibus umbellatis, calycibus coloratis longe ciliatis, ſtaminibus inclnſis. *C. B. S.*

mollis Lee et Kenned. 181. F. foliis teretiusculis hiſpidis petiolatis erectis, floribus ſubterminalibus aggregatis, calycibus minutis appreſſis, corollis villoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

lateralis W. 182. E. foliis lineari-3gonis patentiſſimis glabris, floribus axillaribus ſubverticillatis nutantibus, calycibus ciliatis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* (E. incarnata Andr., guttaeflora Saliſb.)

barbata Andr. 183. E. foliis oblongis ciliatis, ramis hirſutis, floribus terminalibus umbellatis cernuis, calycibus obtuſiusculis ciliatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

tomentoſa Saliſb. 184. E. foliis oblongis obtuſis ſubimbricatis incano-tomentoſis ciliatis craſſiusculis patulis, floribus ſubternis terminalibus, calycibus plumoſo-fimbriatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

margaritacea 185. E. foliis lineari-3gonis erectis glabris, floribus axillaribus terminalibusque aggregatis cernuis, calycibus ovatis appreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. obeſa Saliſb.)

acuta Andr. 186. E. foliis lineari-cuſpidatis rigidis glabris patulis, floribus terminalibus ternis nutantibus, calycibus coloratis ciliatis, ſtaminibns incluſis. *C. B. S.*

incurva Andr. 187. E. foliis lineari-ſubfalcatis mucronatis hirſutiusculis, floribus terminalibus ſubaggregatis pubeſceutibus, pedunculis bracteatis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

pendula Wendl. 188. E. foliis lineari-oblongis glabris patentiſſimis, pedunculis terminalibus aggregatis bracteatis, calycibus lanceolatis appreſſis, corollis cernuis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

cernua 189. E. foliis linearibus patulis oblongo-linearibus incano-villoſiusculis apice ſubariſtatis, pedunculis terminalibus umbellatis bracteatis cernuis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

phyſodes 190. E. foliis linearibus obtuſis viſcoſis patulis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis bracteatis, calycibus ovatis ciliatis appreſſis, corollis glutinoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ſequax Salisb.)

†† *Antherae baſi nudae.*

* *Folia terna.*

umbellata 191. E. foliis linearibus abbreviatis erectis, floribus terminalibus umbellatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. lentiformis Salisb.)

ſcoparia 192. E. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus racemoſis ſecundis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. fucata Thunb.)

axillaris Thunb. 193. E. foliis 3gonis glabris, ramis tomentoſis, floribus axillaribus pedunculatis ſubſolitariis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

† *totta* Thunb. 194. E. foliis oblongis patenti-reflexis hiſpidis, floribus terminalibus ſubſolitariis, calycibus bracteatis ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. ferox Salisb.)

hiſpidula L. ſuppl. 195. E. foliis ovato-ſubrotundis ciliatis patentiſſimis remotiusculis, floribus axillaribus terminalibusque ſubſolitariis erectis, ſtaminibus incluſis, ſtigmate peltato coronato exſerto. *C. B. S.* (E. hiſpida Thunb.)

dumoſa Andr. 196. E. foliis ovalibus margine revolutis patentibus hiſpidis, ramis flexuoſis, floribus terminalibus longe pedunculatis corymboſis pendulis, calycibus appreſſis foliaceis ebracteatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

Colleter * 197. E. ramis ſtrictis hirſutis, foliis lineari-oblongis obtuſis revolutis hiſpidiusculis patentibus, floribus axillaribus cernuis viſcoſis, ſtylo exſerto, ſtigmate peltato. *C. B. S.* Berg.

villoſa Andr. 198. E. foliis linearibus remotiusculis patentibus hirſuto-ciliatis, pedunculis axillaribus terminalibusque ſubternis cernuis, calycibus ovatis villoſis, limbo corollae ſubconnivente, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

199.

cordata Andr. 199. E. foliis ſubcordatis ſupra villoſis ſubtus lanatis, ramis divaricatis hirſutis, floribus terminalibus glomeratis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

odorata Andr. 200. E. foliis lineari-oblongis margine revolutis glanduloſo-ciliatis patentiſſimis, pedunculis umbellato-verticillatis cernuis coloratis, corolla viſcoſa, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

cruciformis Andr. 201. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus terminalibus quaternis decuſſatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

conferta Andr. 202. E. foliis lineari-ſubulatis elongatis rigidis patenti-reflexis, floribus capitatis ſubſeſſilibus, ſtaminibus exſertis. *C. B. S.*

flexicaulis Dryand. 203. E. foliis lineari-oblongis patentiſſimis glanduloſo-ciliatis, ramis flexuoſis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus coloratis glanduloſo-ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. glanduloſa Andr.)

*tricolor** 204. E. foliis lineari-filiformibus horizontalibus ramisque ſcabris, floribus aggregatis terminalibus ſuberectis, calycibus bracteatis coloratis, corollae limbo connivente producto, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. lactiflora Hort. angl. Otto.)

hiſpida Andr. 205. E. foliis linearibus obtuſis hiſpido-ciliatis patentiſſimis, floribus racemoſis pendulis ebracteatis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

racemoſa 206. E. foliis linearibus patentibus glanduloſo-piloſis, ramis villoſis, floribus racemoſis nutantibus, calycibus foliaceis glanduloſo-ciliatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

decora Andr. 207. E. foliis ſenis linearibus elongatis recurvatis, floribus racemoſis comoſis nutantibus, calycibus foliaceis bracteatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

V. *Campanulatae: corolla ſenſim in limbum dilatata.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia oppoſita.*

vulgaris 208. E. foliis lineari-triquetris ſagittatis 4fariam imbricatis, floribus racemoſis, ſtylo exſerto. *Europ.* (E. ciliaris Hudſ. var.)

** *Folia terna.*

paniculata 209. E. foliis lineari-triquetris glabris, ramis hirſutis, floribus faſciculatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. milleflora Saliſb.)

phylicoides W. 210. E. foliis lineari-3gonis 6fariam imbricatis, floribus axillaribus nutantibus, bracteis remotiuſculis, calycibus elongatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

laevis Andr. 211. E. foliis lineari-filiformibus glabris patentibus, ramis virgatis gracilibus, floribus terminalibus

ſubternis pendulis, ſtaminibus inclufis. *C. B. S.* (E. odorata*).

emarginata Andr. 212. E. foliis oblongis canaliculatis recurvis ciliatis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus bracteatis ciliatis, genitalibus inclufis. *C. B. S.*

tenuis Salisb. 213. E. foliis filiformibus glabris, floribus terminalibus ſubſolitariis, ſtaminibus inclufis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pygmaea Andr. 214. E. foliis ſubulatis ſquarroſo-flexuofis glabris, ramis decumbentibus, floribus terminalibus corymbofis pubeſcentibus, calycibus abbreviatis appreſſis, genitalibus inclufis. *C. B. S.*

procumbens Loddig. 215. E. ramis erectis, foliis linearibus patulis glabris, floribus terminalibus ſubaggregatis denſe villofis, calycibus abbreviatis, genitalibus inclufis. *C. B. S.*

calloſa Wendl. 216. E. foliis lineari-oblongis margine revolutis ſubtus albidis patulis, floribus terminalibus ſubternis erectiusculis, calycibus coloratis viſcidis, genitalibus inclufis, appendiculis antherarum abbreviatis. *C. B. S.* (E. canaliculata minor Andr.)

leucanthera L. ſuppl. 217. E. foliis linearibus glabris erectis, ramis virgatis flexuofis, floribus terminalibus cernuis, genitalibus inclufis. *C. B. S.* (E. ſpinaeflora Salisb.)

nigricans Loddig. 218. E. ramis flexuofis, foliis patentiſſimis ſubreflexis linearibus apice ariſtatis glabris, floribus terminalibus ſubternis, pedunculis bracteatis calycibusque coloratis viſcidulis, corolla campanulato-rotata, limbo revoluto, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

laxa Andr. 219. E. foliis linearibus ciliatis patulis, floribus terminalibus ſeſſilibus, calycibus bracteatis coloratis, ſtaminibus inclufis. *C. B. S.*

lucida Andr. 220. E. foliis filiformibus lucidis erectis, ramis patentibus ſtrictis, floribus terminalibus ternis, calycibus coloratis bracteatis ſerrulatis, ſtaminibus inclufis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pumila Andr. 221. E. foliis linearibus patulis glabris, caule ſuffruticoſo, ramis divaricatis, floribus terminalibus ternis cernuis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus inclufis. *C. B. S.*

incarnata Thunb. 222. E. foliis ovatis glabris, ramis villofis, floribus umbellatis, calycibus appreſſis, genitalibus inclufis. *C. B. S.* (E. amoena Salisb.)

*** *Folia quaterna.*

auſtralis 223. E. foliis linearibus mucronatis ſcabris patentibus, floribus terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque hirſutiusculis, ſtaminibus inclufis, ſtylo exſerto. *Europ. auſtr.* (E. piſtillaris Salisb.)

perſoluta 224. E. foliis linearibus glabris erectis ſubimbricatis, floribus terminalibus aggregatis cernuis, calycibus minutis, genitalibus inclufis. *C. B. S.* (E. prolifera Salisb., ſtrigoſa Wendl., caffra Andr.)

ſtrigoſa Ait. 225. E. foliis lineari-oblongis obtuſiusculis ramisque ſubvilloſis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus appreſſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. axillaris Salisb.)

confertifolia Wendl. 226. E. foliis lineari-oblongis lucidis appreſſis denſe imbricatis, floribus axillaribus umbellato-verticillatis, calycibus bracteatis coloratis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

arborea 227. E. foliis linearibus ſcabriusculis patulis, ramis incano-tomentoſis, floribus racemoſis ſubgloboſis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Europ. auſtr.* (E. ſcoparia Thunb., procera Salisb.)

pilulifera Thunb. 228. E. foliis linearibus ciliatis erecto-patulis, ramis divaricato-flexuoſis hirſutis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus patulis hirſutis, ſtylo exſerto. *C. B. S.* (E. nudicaulis Berg.)

amoena Wendl. 229. E. foliis linearibus hirſutis erectis imbricatis, ramis ſtrictis, floribus axillaribus verticillatis, calycibus hirſutis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. plumoſa Andr.)

mitraeformis Salisb. 230. E. foliis linearibus hirſutis, floribus terminalibus umbellatis pubeſcentibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. parviflora L., hirtiflora Sims.)

caneſcens Wendl. 231. E. foliis linearibus obtuſis caneſcentibus erectis, floribus terminalibus ſeſſilibus urceolato-campanulatis, calycibus foliaceis appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. pubeſcens Andr.)

congeſta Wendl. 232. E. foliis linearibus denſe piloſis patulis, floribus axillaribus terminalibusque congeſtis cernuis, calycibus foliaceis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

pedunculata Wendl. 233. E. foliis lineari-trigonis glabris incurvis imbricatis, ramis flexuoſis, pedunculis terminalibus umbellatis patulis 2bracteatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo ſubexſerto. *C. B. S.*

cubica 234. E. foliis 3gono-ſubulatis incurvo-patentibus glabris, floribus terminalibus umbellatis cernuis, pedunculis pubeſcentibus, ſepalis ovatis coloratis ſerrulatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. hottoniaeflora Salisb.)

*expromta** 235. E. ramis lanatis, foliis linearibus patenti-reflexis hirſutis apice barbatis, floribus aggregatis terminalibus cernuis, genitalibus longe exſertis. *C. B. S.* Berg.

*laſiophylla** 236. E. foliis linearibus ſcabris glanduloſo-ciliatis apice ariſtatis patentibus, ramis hirſutis, floribus racemoſis cernuis, calycibus appreſſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.* Berg.

******Folia ſena.*

empetrifolia 237. E. foliis oblongis obtuſis ciliatis erectis, floribus verticillato-glomeratis, bracteis calycibusque lanceolatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

empetroides Andr. 238. E. foliis linearibus glauceſcentibus ciliatis patenti-reflexis, floribus imbricato-ſubſpicatis comoſis, bracteis calycibusque hirſutis, corollae ab-

breviatae limbo erecto crenato, genitalibus inclusis, appendiculis antherarum latissimis. *C. B. S.*

†† *Antherae basi nudae.*

* *Foliis oppositis alternisque.*

*Aphanes** 239. E. ramis hirsutis, foliis lineari-3gonis obtusiusculis scabris, floribus axillaribus terminalibusque, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

pilosa Loddig. 240. E. foliis linearibus patulis pilosis, floribus subsolitariis pedunculatis erectis villosis, calycibus patulis villosissimis, genitalibus exsertis. *C. B. S.*

** *Folia terna.*

campanulata Andr. 241. E. foliis subulatis glabris erectis remotiusculis, calycibus foliaceis ciliatis, floribus terminalibus solitariis cernuis, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

canaliculata Andr. 242. E. foliis linearibus margine revolutis erecto-patulis, pedunculis terminalibus ternis bracteatis pubescentibus, calycibus coloratis, corollis campanulato-rotatis, genitalibus subexsertis. *C. B. S.*

patens Andr. 243. E. foliis ovali-oblongis ciliatis patentibus, ramis hirtis, floribus terminalibus subternis, calycibus coloratis ciliatis, corollis campanulato-rotatis, antheris inclusis conniventibus scabrs. *C. B. S.*

*anthina** 244. E. ramis hispidis, foliis linearibus obtusis patentibus glabriusculis, floribus subternis terminalibus cernuis, bracteis calycibusque laxis abbreviatis, antheris scabris inclusis, stylo subexserto. *C. B. S.* (E. florida Hort. angl.)

coarctata Wendl. 245. E. foliis linearibus subciliatis erecto-patulis, floribus geminatis axillaribus erectis subpedunculatis folia aequantibus, calyce foliaceo exiguo, stigmate umbraculiformi longe exserto. *C. B. S.*

absynthioides 246. E. foliis linearibus scabris patentibus remotiusculis, floribus geminatis axillaribus pedunculatis cernuis folia superantibus, calyce foliaceo appresso, stigmate 4fido peltato longe exserto. *C. B. S.* (E. fucata et virgulata Wendl., exsecta Hortul., Actaea Link.)

concava Ker. 247. E. foliis linearibus patulis, ramis ternatis, floribus axillaribus, antheris subexsertis. *C. B. S.*

*Rastellum** 248. E. ramis flexuosis hispidiusculis, foliis linearibus subfasciculatis reflexis, floribus terminalibus subcernuis 4gonis, calycibus coloratis appressis, genitalibus exsertis. *C. B. S.*

complanata Nois. 249. E. ramis flexuosis, foliis patenti-reflexis linearibus rigidis junioribus glanduloso-ciliatis, floribus subracemosis lateralibus, calycibus appressis coloratis viscosis, corolla subrotata, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

approximata Schlechtend. 250. E. ramis virgatis hirsutiusculis, foliis petiolatis teretiusculis abbreviatis glabris remotis patulis,

floribus ſubracemoſis glabris, calycibus coloratis appreſſis, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.* Berg.

virgata Wendl. 251. E. foliis ovalibus patentibus glanduloſo-ciliatis, ramis hirſutis, floribus terminalibus ternis ſeſſilibus erectis, calycibus foliaceis pubeſcentibus, ſtigmate peltato longe exſerto. *C. B. S.*

melanthera 252. E. foliis linearibus obtuſis laevibus patulis, floribus terminalibus ſubumbellatis nutantibus, bracteis calycibusque coloratis, genitalibus exſertis, ſtigmate obtuſo. *C. B. S.*

Paſſerina Thunb. 253. E. foliis ovatis glabris, floribus terminalibus ſubſolitariis, pedunculis calycibusque tomentoſis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

thalictriflora Loddig. 254. E. ramis hirſutis ſtrictis, foliis linearibus minutis glabris erectis, floribus terminalibus glomerato-capitatis erectis, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

bryantha Thunb. 255. E. foliis oblongis obtuſis, caule caeſpitoſo decumbente, pedunculis terminalibus corymboſis, ſtylo exſerto. *Sibiria. Camtſchatca.* (Andromeda L. Pall.)

Stelleriana W. 256. E. foliis ovalibus confertis, floribus terminalibus geminis ſubſeſſilibus cernuis, genitalibus incluſis. *Camtſchatca.* (Andromeda Pall.)

*** *Folia quaterna.*

herbacea 257. E. foliis linearibus acutis patulis glabris, floribus axillaribus racemoſis ſubſecundis cernuis, calycibus coloratis acuminatis, corolla tubuloſo-campanulata, genitalibus exſertis. *German. auſtr. Europ. auſtr.* (E. ſaxatilis Saliſb.)

vagans 258. E. foliis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis glabris patulis, floribus axillaribus ſubgeminis campanulato-abbreviatis, calycibus coloratis, genitalibus exſertis. *Cornubia. Gallia auſtr. Afric. bor.*

multiflora 259. E. foliis ſubquaternis linearibus glabris patentibus, floribus axillaribus racemoſo-corymboſis nutantibus campanulato-tubuloſis, genitalibus exſertis. *Europ. auſtr.* (E. peduncularis Presl., E. purpuraſcens L.?)

ſicula Guſſ. 260. E. foliis lineari-oblongis obtuſis patentibus caneſcentibus, floribus terminalibus quaternis erectis, bracteis remotis calycibusque coloratis lanceolatis, corolla campanulato-urceolata, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *Sicil.*

*bella** 261. E. foliis lineari-filiformibus glabriuſculis patentibus apice incurvis, pedunculis terminalibus racemoſis hiſpidulis erectis, calycibus reflexis, ſtylo filiformi exſerto. *C. B. S.* (E. pulchella Hort. angl.)

mediterranea 262. E. foliis linearibus glabris patentibus, floribus axillaribus racemoſis nutantibus, calycibus coloratis ebracteatis, genitalibus exſertis. *Europ. auſtr.* (E. lugubris Saliſb.)

pyramidalis Ait. 263. E. foliis linearibus pubeſcentibus patulis, floribus terminalibus ternis campanulato-elongatis,

calycibus foliaceis, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pyramidiformis Wendl. 264. E. foliis linearibus hiſpidis patulis, floribus terminalibus ſubternis erectis, calycibus appreſſis hiſpidis, ſtylo exſerto, ſtigmate 4fido. *C. B. S.*

viſcaria 265. E. foliis linearibus glabris patentiſſimis, floribus axillaribus verticillatis cernuis glutinoſo-pubeſcentibus, calycibus foliaceis ciliatis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

propendens Andr. 266. E. foliis linearibus pubeſcentibus patulis, ramis flexuoſis divaricatis, floribus terminalibus ternis pendulis, calycibus coloratis ſerrulatis, ſtaminibus incluſis, ſtylo ſubexſerto. *C. B. S.*

mellifera 267. E. foliis linearibus hiſpidis patentiſſimis remotiusculis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus foliaceis, ſtylo capitato exſerto. *C. B. S.*

microſtoma Berg. 268. E. ramis hirſuto-lanatis, foliis lanceolato-linearibus acuminatis hiſpido-ciliatis patulis, floribus axillaribus pedunculatis aggregatis, genitalibus longe exſertis. *C. B. S.*

ſtylaris * 269. E. foliis linearibus obtuſis patentiſſimis ramisque hiſpidis, floribus terminalibus glomeratis erectiusculis, calycibus coloratis patulis ciliatis, ſtylo longe exſerto, ſtigmate capitato. *C. B. S.* Berg.

jubata Loddig. 270. E. foliis lineari-filiformibus ſubglutinoſis incurvo-patentibus, pedunculis terminalibus corymboſis hiſpidis, calycibus 4gonis coloratis ſerrulatis, corolla campanulato-rotata, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

VI. *Calycinae: calycibus corollas aequantibus vel ſuperantibus.*

† *Antherae appendiculatae.*

* *Folia terna.*

elegans Andr. 271. E. foliis linearibus glaucis patulis, floribus ſubcapitatis cernuis involucratis, involucris calycibusque coloratis patulis corollam urceolatam ſubaequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

lachnaea Andr. 272. E. foliis ovalibus pubeſcentibus imbricatis, floribus aggregatis terminalibus, calycibus bracteatis, corolla ſubcampanulato-rotata, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

corifolia 273. E. foliis linearibus glabris erecto-appreſſis, floribus terminalibus faſciculato-racemoſis, calycibus patentibus corollam urceolatam aequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.* (E. articularis L., calycina Andr.)

ſexfaria Ait. 274. E. foliis linearibus glabris patulis 6fariam poſitis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus cernuis, calycibus obtuſis corollam ſubcampanulatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.* (E. ſpumoſa Thunb.)

rigidifolia Wendl. 275. E. foliis linearibus rigidis nitidis erecto-patulis, floribus terminalibus aggregatis cernuis, calycibus coloratis corollam subcampanulatam aequantibus, staminibus inclusis, stylo exserto. *C. B. S.*

pachyphylla * 276. E. foliis petiolatis ellipticis crassis abbreviatis glaberrimis nitidis margine scabris, floribus aggregatis terminalibus glabris, calycibus corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* Berg.

pallida Wendl. 277. E. foliis linearibus appressis concavis subtus canaliculatis glabris acutis glaucis, floribus terminalibus erectis, bracteis coloratis amplis laxis, calycibus corollam urceolatam superantibus. *C. B. S.* Lichtenst.

gnaphalodes 278. E. foliis ovatis glabris appressis imbricatis, floribus terminalibus fasciculatis, calycibus ciliatis corollam campanulatam subaequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. teretiuscula Wendl. var.)

calycina 279. E. foliis linearibus subtus albidis appressis imbricatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis, calycibus patulis coloratis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. gnidiaefolia Salisb.)

flagellaris Link. 280. E. foliis lineari-oblongis obtusis appressis ciliatis, ramis virgatis flexuosis, floribus terminalibus subternis erectis, calycibus bracteatis patulis corollam multo superantibus. *C. B. S.*

triflora 281. E. foliis linearibus elongatis patulis glabris, floribus terminalibus aggregatis, calycibus bracteatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. pyrolaeflora Salisb.)

andromedaeflora Andr. 282. E. foliis linearibus ciliatis rigidis patentibus, floribus axillaribus, calycibus coloratis amplis corollam campanulatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

** *Folia quaterna.*

baccans 283. E. foliis lineari-3gonis obtusiusculis glabris erectis imbricatis, pedunculis terminalibus subumbellatis bracteatis, calycibus coloratis amplis corollam urceolatam subaequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

squamosa Andr. 284. E. foliis linearibus obtusis serrulatis erectis imbricatis, floribus terminalibus aggregatis cernuis, calycibus imbricatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

†† *Antherae basi nudae.*

* *Folia opposita.*

oppositifolia Andr. 285. E. foliis filiformibus appressis, floribus terminalibus congestis erectis, calycibus patulis corol-

lam ampullaceam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

tenuifolia 286. E. foliis linearibus appressis, floribus terminalibus aggregatis subsessilibus, calycibus coloratis corollam ovatam subaequantibus, staminibus inclusis. *C. B. S.* (E. linifolia Salisb.)

aperta * 287. E. foliis linearibus cuspidatis margine scariosis glaberrimis erectis, floribus terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque coloratis, corolla rotata, genitalibus exsertis. *C. B. S.*

** *Folia terna.*

bracteata Thb. 288. E. foliis lanceolatis glabris appressis, floribus terminalibus umbellatis, bracteis calycibusque coloratis elongatis, genitalibus inclusis. *C. B. S.* (E. obvallaris Salisb.)

Thunbergii L. suppl. 289. E. foliis linearibus glabris erectis, floribus terminalibus umbellatis, calycibus bracteatis corollam urceolatam limbo discolore superantibus, stylo exserto. *C. B. S.* (E. medioliflora Salisb.)

velleriflora Salisb. 290. E. foliis linearibus hirsutis patentibus remotiusculis, floribus terminalibus ternis, calycibus villosissimis corollam urceolatam subsuperantibus, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. villosa Wendl., capitata Thunb., bruniades Andr.)

bruniades 291. E. foliis lineari-oblongis abbreviatis villosis erectis, floribus terminalibus subumbellatis cernuis, calycibus villosissimis corollam pubescentem subcampanulatam aequantibus, genitalibus exsertis. *C. B. S.* (E. carbasina Salisb.)

capitata 292. E. foliis lineari-oblongis villosis erectis, floribus subsolitariis terminalibus, calycibus inflatis villosis corollam pubescentem urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis, antheris basi productis. *C. B. S.* (E. byssina Salisb.)

tiaraeflora Andr. 293. E. foliis linearibus rigidis patentissimis, floribus terminalibus glomeratis cernuis, calycibus bracteatis coloratis, tubo corollae basi dilatato, antheris conniventibus exsertis. *C. B. S.* (E. placentaeflora Salisb.)

fragrans Andr. 294. E. foliis subulatis glaucis erectis, floribus subternis cernuis, calycibus laxis coloratis corollam campanulatam subaequantibus, antheris basi bifidis. *C. B. S.*

fimbriata Andr. 295. E. foliis lineari-oblongis crassis appressis ciliatis, floribus terminalibus glomeratis, calycibus bracteatis coloratis fimbriatis, corolla subglobosa, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

glomerata Andr. 296. E. foliis lineari-subulatis appressis glabris, floribus terminalibus glomeratis, calycibus coloratis bracteatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

moschata Andr. 297. E. foliis linearibus obtusis patentibus, floribus terminalibus fasciculatis, calycibus bracteatis coloratis corollam campanulatam aequantibus, genitalibus inclusis. *C. B. S.*

mucronata Andr. 298. E. foliis lineari-lanceolatis cuſpidatis patentibus glabris, pedunculis terminalibus racemoſis, calycibus bracteatis coloratis corollam campanulatam ſubaequantibus, ſtaminibus incluſis. *C. B. S.*

imbricata 299. E. foliis linearibus erectis imbricatis, ramis hirſutiusculis, floribus terminalibus ſubaggregatis erectiusculis, calycibus glabris imbricatis corollam urceolatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

ſtaminea Andr. 300. E. foliis linearibus glabris erectis, floribus axillaribus ſparſis, calycibus bracteatis corollam ſubrotatam aequantibus, ſtaminibus divaricatis longe exſertis. *C. B. S.*

caeſia Salisb. 301. E. foliis linearibus abbreviatis glabris erectis, ramis ſtrictis, floribus terminalibus geminis erectis, calycibus bracteatis corollam campanulatam aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

petiolata Thb. 302. E. foliis lanceolatis craſſiusculis patentibus longe petiolatis, ramis confertis, floribus terminalibus ternis, calycibus bracteatis corollam urceolatam aequantibus, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

penicilliflora Salisb. 303. E. foliis lineari-ſubulatis ciliatis erectis, floribus terminalibus ſubaggregatis pedunculatis, calycibus bracteatis ciliatis corollam urceolatam aequantibus, antheris longe exſertis baſi productis conniventibus. *C. B. S.* (E. calyculata Wendl.)

taxifolia 304. E. foliis 3gonis glabris patentibus, floribus terminalibus aggregatis erectis, calycibus bracteatis coloratis corollam ampullaceam ſubaequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

† *obcordata* Link. 305. E. foliis lanceolatis carinatis margine ſcarioſis erectis, floralibus dilatatis, calycibus patentibus corollam urceolatam aequantibus, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

ſpumoſa 306. E. foliis ſub-3gonis glabris patentibus, floribus terminalibus ſubternis erectis, calycibus patulis corollam ovalem aequantibus, genitalibus exſertis. *C. B. S.*

triceps Link. 307. E. foliis ſub-3gonis ciliatis erecto-patulis, ramis pubeſcentibus, floribus terminalibus ternis pedunculatis, calycibus patulis corollam ſubaequantibus, antheris ciliatis baſi productis ſtyloque capitato longe exſertis. *C. B. S.*

nivea Loddig. 308. E. foliis ternis quaternis linearibus obtuſis appreſſis glabris, floribus terminalibus ſubaggregatis cernuis, calycibus patulis obtuſis corollam ſubcampanulatam aequantibus, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

craſſota * 309. E. foliis oppoſitis ternisque linearibus cuſpidato-ariſtatis glabris patulis, floribus terminalibus ſubternis cernuis, pedunculis bracteis calycibusque fimbriatis, corolla conica, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

1409. SALAXIS Salisb.

arborescens W. 1. S. foliis ternis appressis teretiusculis, floribus lateralibus subterminalibus, pedunculis pubescentibus. *Ins. Mascaren.*

montana W. 2. S. foliis ternis appressis 4gonis, floribus lateralibus subterminalibus, pedunculis glabris. *Ins. Mascaren.*

abietina W. 3. S. foliis subsenis linearibus patentibus, floribus lateralibus subterminalibus. *Ins. Mascaren.*

1410. MENZIESIA Sm.

coerulea Wahlb. Sw. 1. M. foliis confertis linearibus obtusis ciliatis patentibus, pedunculis aggregatis, calycibus acutissimis patentibus, floribus decandris. *Lappon. Grönland. Sibir. Amer. bor.* (Erica coerulea W. Andromeda L.)

empetriformis Sm. 2. M. foliis confertis linearibus serrulatis subtus convexis, pedunculis terminalibus aggregatis, calycibus obtusis, floribus decandris. *Amer. bor. occident.*

aleutica * 3. M. foliis imbricatis linearibus serrulatis subtus planis, pedunculis terminalibus aggregatis floccosis, calycibus acutis, floribus 8andris. *Ins. Aleut.*

Bruckenthalii Baumg. 4. M. foliis confertis linearibus glanduloso-ciliatis, floribus racemosis terminalibus campanulatis 8andris, calycibus denticulatis appressis, stylo exserto. *Alp. dinar.*

globularis Salisb. 5. M. foliis lanceolatis pilosis subtus glaucis, floribus globosis 8andris. *Virgin. Carolin.* (M. Smithii Mx., pilosa Juss.)

polifolia Juss. 6. M. foliis alternis oblongis subtus tomentosis, floribus campanulatis 8andris pendulis, genitalibus inclusis. *Hibernia.* (Erica et Andromeda Daboecia L. E. Dabeoci Sm. Vaccinium cantabricum Huds.)

ferruginea Sm. 7. M. foliis spathulatis serrulato-ciliatis subtus glabris, floribus urceolatis 8andris. *Amer. bor. ora occid.*

triflora Bert. 8. M. foliis alternis spathulato-oblongis utrinque nitidis, pedunculis aggregatis reflexis, calycibus obtusis. *Jamaica.* (Andromeda 8andra Sw.)

1411. HEDWIGIA Sw.

balsamifera Sw. *Hispaniol.* Arbor excelsa, foliis pinnatis glabris integerrimis, floribus racemosis albidis.

1412. DIOSPYROS.

* *Foliis utrinque glabris.*

virginiana 1. D. foliis elliptico-oblongis obtusis utrinque concoloribus nitidis, petiolis pubescentibus. *Amer. boreal.*

reticulata W. 2. D. foliis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis utrinque nitidis ſubtus tenuiſſime reticulatis, calycibus villoſis. *Inſ. Mascaren.* (D. teſſellaria Poir.)

Ebenaſter Retz. 3. D. foliis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis utrinque reticulatis, calycibus gemmisque glabris. *Bengal.* (D. Ebenum L. ſuppl.)

Melanoxylon Roxb. 4. D. foliis oblongo-lanceolatis apice rotundatis baſi attenuatis nitidis, gemmis pubeſcentibus. *Ind. or.*

Ebenum Retz. 5. D. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, gemmis hirtis. *Ceylon. Madagascar.* (D. glaberrima Rottb., lanceolata Poir.)

montana Roxb. 6. D. foliis ovato-oblongis acutis, floribus ♂ corymboſis, ♀ ſolitariis. *Ind. or.*

obovata Jacq. 7. D. foliis obovato-oblongis nervoſo-venoſis, pedunculis axillaribus 3floris, fructibus 4ſpermis. *Jamaica. Hiſpaniola.* (D. 4ſperma Sw. revoluta Poir.)

obtuſifolia Humb. 8. D. foliis oblongis elongatis obtuſis ſubtus pallidis, pedunculis ſub-5floris, floribus 5fidis 10andris. *Mexico.*

ſylvatica Roxb. 9. D. foliis oblongis utrinque attenuatis, floribus ♂ cymoſis, ♀ ſolitariis 3gynis. *Ind. or.*

digyna Jacq. 10. D. foliis oblongis utrinque attenuatis, floribus ſolitariis 2gynis, corolla calycem multo ſuperante. *Celebes.*

lycioides Deſf. 11. D. foliis lanceolatis obtuſis mucronatis perennantibus, floribus ſolitariis 5fidis. *Patria?*

Embryopteris Perſ. 12. D. foliis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus glaucis, floribus ♂ ſubcorymboſis polyandris. *Ind. orient. Inſ. Philippin.* (Embryopteris glutinifera Roxb. peregrina Gärtn. Cavanillea philippenſis Lam. D. discolor W.)

Melanida Poir. 13. D. foliis ovatis ſubtus pallidis, floribus 5fidis, fructibus 10ſpermis. *Inſ. Mascaren.*

leucomelas Poir. 14. D. foliis ſubcordatis oblongis coriaceis lucidis ſubtus pallidis, floribus 6fidis, fructibus 12ſpermis. *Inſ. Mascaren.*

nodoſa Poir. 15. D. foliis ovato-lanceolatis coriaceis nitidis, ramis nodoſis, floribus 5fidis. *Inſ. Mascaren.* (D. angulata Poir.)

chryſophyllos Poir. 16. D. foliis ovato-oblongis obtuſis ſubtus fulvo-ſplendentibus, floribus 5fidis. *Inſ. Mascaren.*

lobata Lour. 17. D. foliis ovato-lanceolatis, floribus ſolitariis ☿ 4fidis. *Cochinchina.*

dodecandra Lour. 18. D. foliis oblongo-lanceolatis, floribus 4fidis 12andris, fructibus lentiformibus 8ſpermis. *Cochinchina.*

** *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

Lotus 19. D. foliis oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, gemmis interne hirſutis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

orixenſis Klein. 20. D. foliis ovato-oblongis acutiusculis ſubtus villoſis. *Ind. or.*

Kaki L. ſuppl. 21. D. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, ramis tomentoſis, pedunculis 2floris. *Japon.*

hirſuta L. ſuppl. 22. D. foliis oblongis obtuſis ſubtus ramisque villoſis, floribus congeſtis ſeſſilibus. *Ceylon.*

ſalicifolia Humb. 23. D. foliis ſpathulatis ſubtus pubeſcentibus, ramis cinereis. *Amer. auſtr.*

Chloroxylon Roxb. 24. D. foliis ovatis acutis ſubtus villoſis, ramis ſpinoſis, floribus aggregatis. *Ind. or.* (D. tomentoſa Poir.)

cordifolia Roxb. 25. D. foliis cordato-oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, ramis ſpinoſis. *Ind. or.*

ruguloſa R. Br. 26. D. foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus tomentoſis ruguloſis, floribus 4fidis. *Nov. Holl.*

† *pubeſcens* Pursh. 27. D. foliis oblongis acutis ſubtus pubeſcentibus, fructibus oligoſpermis. *Amer. bor.*

1413. CARGILLIA R. Br.

laxa R. Br. 1. C. foliis oblongis ſubundulatis glabris concoloribus, ramis laxis, calycibus tubo corollae brevioribus, ſtylo 3-4partito. *Nov. Holl.*

auſtralis R. Br. 2. C. foliis oblongis baſi attenuatis ſubtus pallidis, calycibus tubum corollae aequantibus, ſtylo indiviſo. *Nov. Holl.*

1414. ELLIOTTIA Mühl.

racemoſa Mühl. *Georgia.* Frutex ramis virgatis, foliis lanceolatis integerrimis alternis ſubtus glauceſcentibus, floribus racemoſis albis.

1415. MIMOSA W.

* *Foliis conjugato-pinnatis.*

hirſuta * 1. M. inermis, ſtipulis linearibus, pinnis 12jugis, foliolis ovalibus marginatis ciliatis, petiolo communi hirſuto. *Monte Video.* Sello.

viva 2. M. inermis herbacea, pinnis 4jugis, foliolis ſubrotundis, lomento 1articulato. *Jamaica.*

floribunda W. 3. M. aculeata, pinnis 2jugis, foliolis ſubdimidiato-ovatis ſubtus ſtrigoſis, intimis minimis, ramis retrorſum hirſutis, capitulis paniculatis. *Caracas.*

ſenſitiva 4. M. aculeata, pinnis 2jugis, foliolis ſubdimidiato-ovatis acutis ſubtus pubeſcentibus, intimis minimis, floribus 5andris. *Braſil.* (M. obtuſifolia W.)

albida Humb. 5. M. aculeata, pinnis 2jugis, foliolis inaequilateris acutis cano-pubeſcentibus, intimis minimis, capitulis geminis, floribus 4andris, lomentis hiſpidis. *Peru.*

ſtrigoſa W. 6. M. aculeata, ramis ferrugineo-tomentoſis, pinnis 2jugis, foliolis ſubdimidiatis ovato-oblongis

acutis utrinque ftrigofis, intimis minimis ovatis cufpidatis. *Amer. auftr.*

debilis Humb. 7. M. aculeata herbacea, pinnis 2jugis, foliolis obovatis mucronatis utrinque pubefcentibus, intimis minimis, capitulo folitario. *Amer. auftr.*

† *cafta* 8. M. aculeata, pinnis 4jugis, foliolis oblongis inaequilateris fubaequalibus utrinque glabris, floribus 10andris. *Ind. or.*

ciliata * 9. M. aculeis fparfis horizontalibus, ramis ftrigofis, fetis deorfum appreffis, pinnis 6jugis, foliolis fubdimidiatis ovato-oblongis nervofis bafi ciliatis, floribus axillaribus feffilibus 5andris. *Monte Video.* Sello.

polycarpa Humb. 10. M. aculeis horizontalibus oppofitis, pinnis multijugis, foliolis linearibus fubtus pilofis, capitulis feffilibus, floribus 4andris, lomentis 3articulatis fetofo-fpinulofis. *Peru.*

** *Foliis fubdigitato-pinnatis.*

tomentofa Humb. 11. M. inermis, pinnis quaternis multijugis, foliolis linearibus obtufis lanatis, floribus 4andris, bracteis fpathulatis ciliatis. *Ad Orinocum.*

pectinata Humb. 12. M. fpinis fparfis horizontalibus validis, ramis hifpidis, foliolis pectinatis linearibus fetofo-ciliatis, floribus 4andris. *Quito.*

brevifolia Humb. 13. M. fpinis patentibus, pinnis quaternis 2jugis, foliolis ovalibus canefcentibus, lomentis digitatis glabris. *Amer. auftr.*

tetrandra Humb. 14. M. aculeis fparfis recurvis, pinnis quaternis multijugis, foliolis linearibus fetofo-ciliatis, capitulis oblongis geminatis, floribus 4andris, lomentis fetofo-ciliatis. *Amer. auftr.*

pudibunda W. 15. M. aculeis fubgeminatis uncinatis, ftipulis fimbriatis, pinnis quaternis multijugis, foliolis linearibus hirfutis, capitulis geminis. *Brafil.*

pudica 16. M. ramis hirto-aculeatis, pinnis quaternis multijugis, foliolis hirfutis, lomentis congeftis margine fetofis. *Amer. auftr.*

polydactyla Humb. 17. M. ramis hifpido-aculeatis, pinnis octonis multijugis, foliolis linearibus acutis ciliatis, petiolis elongatis, capitulis geminatis petiolo longe brevioribus, floribus 4andris. *Amer. auftr.*

*** *Foliis 2pinnatis.*

† *Inermes.*

polyftachya 18. M. foliis cirrho terminatis, partialibus 3-4-, propriis 6jugis oblongis obtufis glabris, fpicis teretibus elongatis. *Ind. occ.*

† *diftachya* Cav. 19. M. foliis partialibus propriisque 4jugis remotis obovatis, ftipulis linearibus, fpicis geminis cylindricis axillaribus. *Nov. Hifpan.*

multiglandulofa Humb. 20. M. foliis partialibus 4-propriis multijugis linearibus imbricatis glabris, petiolis ramulisque

glandulofo-pilofis, capitulis terminalibus racemofis. *Amer. auftr.*

microcephala Humb. 21. M. foliis partialibus 16-propriis multijugis, linearibus ciliatis, capitulis oblongis racemofis, lomentis ftrigofis. *Amer. auftr.*

†† *Aculeatae f. fpinofae.*

femifpinofa 22. M. aculeis fuperne confertis, foliis partialibus 3-, propriis 4jugis remotiusculis ovalibus ciliatis, petiolis divaricatis pubefcentibus fubaculeatis, lomentis glabris. *Nov. Granat.*

armata Rottl. 23. M. aculeis confertis horizontalibus, foliis partialibus 4-propriis 8jugis oblongis fericeis, pedunculis incano-pubefcentibus, capitulis axillaribus fubfolitariis, lomentis falcatis pubefcentibus margine aculeatis. *Ind. or.* (M. hamata W.)

intermedia Humb. 24. M. ramis petiolisque hifpidis aculeatis, foliis partialibus fub-4-propriis 12jugis linearibus obtufis glabris, lomentis obovatis fub-2articulatis ftylo mucronatis glabris. *Caracas.*

humilis Humb. 25. M. aculeis fubulatis rectis oppofitis, foliis partialibus 4-propriis 10jugis linearibus 3nerviis ciliatis, ramis ftrigofis, capitulis geminis, lomentis 2articulatis ftrigofo-hirtis. *Amer. auftr.*

fomnians Humb. 26. M. aculeis fparfis bafi dilatatis uncinatis, foliis partialibus 4-propriis multijugis linearibus glabris, capitulis longiffime pedunculatis, lomentis linearibus hifpidulis. *Nov. Granat.*

palpitans Humb. 27. M. aculeis fparfis rectis abbreviatis, foliis partialibus 5-propriis multijugis minutis linearibus, lomentis linearibus margine fetofis. *Amer. auftr.*

Rottleri * 28. M. aculeis fparfis recurvis, foliis partialibus 6-propriis 10jugis remotiusculis ovalibus glabris, capitulis paniculatis, lomentis falcatis glabris. *Ind. orient.* (M. fpinofiliqua Rottl., rubicaulis Lam.)

agreftis Sieb. 29. M. aculeis ramorum horizontalibus rectis, ramis incanis, foliis partialibus 6-propriis 10jugis pubefcentibus, racemis fpicatis folia fuperantibus. *Palaeftina.*

dormiens Humb. 30. M. aculeis petiolorum oppofitis fubulatis elongatis, partialium bafi fpina recta, ramis hirfutis, foliis partialibus 6-propriis multijugis, capitulis folitariis axillaribus. *Amer. auftr.*

afperata 31. M. aculeis petiolorum uncinatis, partialium bafi fpina recta, ramis hirtis, foliis partialibus 8-propriis multijugis, lomentis hirtis. *Ind. occ.* (M. pigra L.)

canefcens W. 32. M. aculeis uncinatis fparfis, ramulis petiolisque fetofo-hifpidis, foliis partialibus 8-propriis multijugis linearibus incano-pilofis, capitulis folitariis axillaribus. *Guinea.*

aemula * 33. M. aculeis confertiffimis rectis fubflexuofis, foliis partialibus 8-propriis fub-12jugis fubrotun-

dis ſtellato-pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, capitulis corymboſis hirtis. *Braſil.* Sello.

abſtergens Roxb. 34. M. aculeis ramorum confertis ſubrecurvis, ramis punctatis, ramulis villoſis, foliis partialibus 8-propriis multijugis linearibus ciliatis, petiolis inermibus pubeſcentibus baſi glanduloſis, capitulis paniculatis. *Ind. or.*

mascarenenſis * 35. M. aculeis ramorum ſparſis ſubreflexis, foliis partialibus 10-propriis multijugis minutis linearibus ramulisque villoſis, pedunculis lateralibus ſubgeminis. *Inſ. Mascaren.*

rugata Lam. 36. M. aculeis ramorum ſparſis ſubreflexis, foliis partialibus 10-propriis multijugis linearibus obtuſis, glandula petioli baſilari, lomentis latis rugoſis. *Ind. or.*

Habbas Delil. 37. M. aculeis petioli axillaribus rectis elongatis, interaxillaribus oppoſitis horizontalibus, foliis partialibus 10-propriis multijugis ramisque hirſutis, lomentis hirtis. *Aegypt.* (M. pigra W. herb.)

latiſpinoſa Lam. 38. M. aculeis oppoſitis latis compreſſis, ramis angulatis petiolisque pubeſcentibus, foliis partialibus propriisque 10jugis lineari-oblongis ciliatis. *Madagascar.*

hiſpida W. 39. M. aculeis ſparſis uncinatis, petiolis ſtrigoſis ſubaculeatis, foliis partialibus 10-propriis multijugis linearibus ſtrigilloſis, lomentis ſetoſis. *Caracas.*

pellita Humb. 40. M. aculeis ſparſis compreſſis uncinatis, ſubulato recto ad baſin petioli, ramis teretiusculis ſetoſo-hiſpidis, foliis partialibus 12-propriis multijugis linearibus ciliatis, lomentis denſiſſime hirtis. *Amer. auſtr.*

angulata * 41. M. aculeis ramorum ſparſis uncinatis, ramis angulatis, petiolis inermibus villoſiſſimis glanduloſis, foliis partialibus propriisque multijugis linearibus ciliatis, capitulis paniculatis. *Braſil.*

braſilienſis * 42. M. aculeis ſtipularibus oppoſitis erectis, petiolis hirſutis ſubinermibus, foliis partialibus propriisque multijugis linearibus imbricatis, capitulis folio brevioribus. *Braſil.*

ferruginea Rottl. 43. M. aculeis ramorum petiolorumque pubeſcentium recurvis, foliis partialibus propriisque multijugis linearibus dimidiatis imbricatis glabris, glandula oblonga ad baſin petioli, capitulis paniculatis terminalibus. *Ind. or.*

† *ſinuata* Lour. 44. M. caule ſcandente aculeato, foliis 2pinnatis multijugis linearibus, capitulis axillaribus ſolitariis longe pedunculatis, leguminibus ſinuoſis compreſſis. *Cochinchina.*

1416. SCHRANKIA W.

aculeata W. 1. Schr. caule 4gono, aculeis uncinatis compreſſis, foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis multijugis, leguminibus aculeatis acutis. *Nov. Hiſpan.* (Mimoſa 4valvis L.)

hamata Humb. 2. Schr. caule 5gono, aculeis confertis uncinatis, foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis multijugis, leguminibus roſtrato-acuminatis. *Amer. auſtr.*

uncinata W. 3. Schr. caule 5gono, aculeis confertis compreſſis uncinatis, foliis 2pinnatis, partialibus 6-propriis multijugis obtuſis, capitulis geminis axillaribus, leguminibus acuminatis denſe aculeatis. *Florida.* (Mimoſa horridula Mx. Vent. Intſia Walt.)

1417. CHLORA.

ſeſſilis W. 1. Chl. foliis ovatis 5nerviis, floribus ſeſſilibus 4fidis 8andris intus villoſis. *Buenos Ayres.* (Gentiana ſeſſilis L.)

imperfoliata 2. Chl. foliis ſeſſilibus cordato-ovatis, flore ſubſolitario 6fido. *Italia ſup.* (Chl. dubia Lam.)

perfoliata 3. Chl. foliis connato-perfoliatis ovatis glaucis, floribus 8fidis. *Anglia. Europ. auſtr.* (Gentiana perfoliata L.)

1418. SYMPHOREMA Roxb.

involucratum Roxb. *Ind. or.* Arbor ſcandens, ramis brachiatis, foliis oppoſitis oblongis ſerratis pubeſcentibus, pedunculis aggregatis, involucris villoſis, floribus albis.

1419. MIMUSOPS.

Elengi 1. M. foliis ovato-oblongis acutis coriaceis nitidis, pedunculis ſolitariis glabris petiolos aequantibus, corollae laciniis ſubtriplici ſerie. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (M. lucida Poir.)

parvifolia R. Br. 2. M. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis tomentoſis petiolos ſuperantibus. *Nov. Holl.*

disſecta * 3. M. foliis ſpathulatis emarginatis coriaceis, pedunculis ſolitariis, corollae laciniis triplici ſerie, floribus 6andris. *Inſ. Amic.* (Achras disſecta Forſt.)

hexandra Roxb. 4. M. foliis obovatis emarginatis, pedunculis geminis, floribus 6andris. *Ind. or.*

Kauki 5. M. foliis obovatis obtuſiſſimis ſubtus argenteis, pedunculis ſubternis tomentoſis, laciniis corollae 4plici ſerie. *Arabia. Inſ. Mascaren. Molucc. Ind. or. Nov. Holl.* (M. obtuſifolia Lam. Binectaria Forsk.)

Imbricaria W. 6. M. foliis oblongis venoſis nitidis glabris, pedunculis confertis, laciniis corollae 3fidis, fructibus 4ſpermis. *Ind. or. Inſ. Mascaren.* (Imbricaria maxima Poir.)

1420. CYTINUS.

Hypociſtis *Europ. auſtr.* Planta annua in Ciſtorum radicibus paraſitica aphylla ſquamoſa, floribus faſciculatis luteſcentibus.

1421. VACCINIUM.

* *Foliis deciduis.*

† *Corolla campanulata.*

α. *Flores racemoſi.*

Arctoſtaphylos 1. V. caule arboreo, foliis ovatis mucronatis utrinque glabris, floribus racemoſis, calycibus obtuſis, corollis venoſis. *Armenia. Caucaſ.*

maderenſe Link. 2. V. caule arboreſcente, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus ſerrulatis, floribus racemoſis pendulis, calycibus acutiusculis, corollis 1coloribus. *Madera.* (V. Arctoſtaphylos Andr.)

arboreum Mx. 3. V. caule arboreſcente, foliis ovatis mucronatis glanduloſo-ſerratis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, racemis bracteatis nutantibus, laciniis corollae acutis, antheris incluſis. *Carolin. Florida.* (V. diffuſum Ait.)

dumoſum Andr. 4. V. caule fruticoſo, ramis reſinoſo-punctatis pubeſcentibus, foliis obovato-oblongis mucronatis integerrimis ſubtus concoloribus, racemis bracteatis, laciniis corollae rotundatis, antheris incluſis. *Amer. bor.* (V. hirtellum Ait., frondoſum Mx.)

frondoſum 5. V. caule fruticuloſo, foliis elliptico-oblongis obtuſis integerrimis glabris ſubtus glaucis reſinoſo-punctatis, racemis bracteatis laxis, pedicellis filiformibus, laciniis corollae acutis. *Amer. bor.* (V. venuſtum Ait., glaucum Mx.)

† *pallidum* Ait. 6. V. foliis ovatis acutis ſerrulatis glabris, racemis bracteatis, corollis cylindrico-campanulatis. *Amer. bor.*

β. *Flores ſolitarii.*

mucronatum 7. V. foliis oblongis mucronatis integerrimis glabris, pedunculis ſimpliciſſimis 1floris folio ſubbrevioribus. *Amer. bor.*

erythrocarpon Mx. 8. V. ramis flexuoſis divaricatis, foliis oblongis acuminatis ſerrulato-ciliatis pubeſcentibus, pedunculis 1floris, corollae laciniis revolutis, antheris exſertis dorſo muticis. *Carolina.* (Oxycoccus erectus Pursh.)

ſtamineum 9. V. foliis oblongis acutis integerrimis ſubtus incano-pubeſcentibus, pedunculis abbreviatis, laciniis corollae oblongis acutis, antheris exſertis dorſo ariſtatis, baccis pyriformibus (albis). *Amer. bor. Mexico.*

album 10. V. foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus ramulisque incano-pubeſcentibus, pedunculis ſubſolitariis, laciniis corollae ovatis acutis, antheris exſertis dorſo ariſtatis, baccis globoſis (albis). *Amer. bor.* (V. ſtamineum Andr.)

hirtum Thunb. 11. V. ramis divaricatis, junioribus villoſis, foliis ovatis acutis ſerratis utrinque pubeſcentibus, laciniis corollae revolutis. *Japon.*

†† *Corolla urceolata.*

a. Flores racemoſi, faſciculati.

bracteatum Thunb. 12. V. ramis divaricatis, foliis ovatis acutis ſerrulatis, racemis foliatis ſecundis, bracteis ſetaceis. *Japon.*

ciliatum Thb. 13. V. ramulis erectis villoſis, foliis ovatis acutis integerrimis hiſpidis, racemis foliatis ſecundis. *Japon.*

reſinoſum Ait. 14. V. foliis oblongis obtuſiuſculis ſubtus reſinoſo-punctatis, venis ſubtus pubeſcentibus, racemis aggregatis corymboſis abbreviatis aphyllis bracteolatis, corollis 5gonis. *Amer. bor.* (V. parviflorum Andr. Andromeda baccata Wangenh.)

corymboſum 15. V. foliis oblongis acutis integerrimis ſubtus ſubtomentoſis, racemis aphyllis corymboſis, bracteis ſquamaceis, corollis ſubgloboſis. *Amer. bor.* (V. album Lam., diſomorphum Mx.)

amoenum Ait. 16. V. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris, venis ſubtus ſubpubeſcentibus, racemis confertis bracteatis, corollis ſubcylindricis. *Amer. bor.* (V. diſomorphum var. Mx.)

virgatum Ait. 17. V. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerrulatis glabris, ramis floriferis aphyllis elongatis, racemis ſeſſilibus corymboſis abbreviatis, corollis cylindricis, ſtylo ſubexſerto. *Amer. bor.*

fuſcatum Ait. 18. V. foliis oblongis mucronatis ſerrulatis glabris, venis ſubtus ramulisque pubeſcentibus, racemis compoſitis aphyllis, pedicellis ſecundis nutantibus elongatis, corollis cylindricis, ſtylo ſubexſerto. *Amer. bor.* (V. formoſum Andr.)

galezans Mx. 19. V. foliis ſpathulatis ſeſſilibus ſubſerrulatis venoſis pubeſcentibus, floribus faſciculatis ſubſeſſilibus, calycibus acuminatis, corollis ovatis fauce conſtrictis, ſtylo exſerto. *Amer. bor.*

liguſtrinum 20. V. ramis angulatis ſtrictis, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus ſerrulatis venoſis pubeſcentibus, faſciculis gemmaceis ſeſſilibus, corollis oblongis. *Amer. bor.*

tenellum Ait. 21. V. ramis angulatis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis ſerrulatis utrinque lucidis ſeſſilibus, faſciculis florum ſeſſilibus confertis, corollis ovatis. *Amer. bor.* (V. penſylvanicum Lam.)

β. Flores ſubſolitarii.

geminiflorum Kunth. 22. V. ramis ſtrictis, foliis oblongis mucronatis crenulatis glabris, floribus axillaribus geminis

nutantibus ovatis 10andris, calycibus repandis, antheris dorſo 2ariſtatis. *Mexico.*

Myrtillus 23. V. ramis angulatis patentibus, foliis ovatis mucronatis ſerrulatis glabris, pedunculis 1floris nutantibus. *Europ.*

uliginoſum 24. V. foliis obovatis mucronatis integerrimis ſubtus reticulato-venoſis glaucefcentibus ſubpubeſcentibus, pedunculis aggregatis nutantibus abbreviatis, corolla urceolato-campanulata. *Europ. et Amer. bor.* (V. pubeſcens fl. dan.)

anguſtifolium Ait. 25. V. foliis lanceolatis ſubintegerrimis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis ſparſis ſubſolitariis. *Canada.* (V. myrtilloides Mx.)

caeſpitoſum Mx. 26. V. caule breviſſimo caeſpitoſo glaberrimo, foliis obovatis ſerratis, pedunculis ſolitariis breviſſimis. *Ad ſinum Hudſon.*

** *Foliis ſempervirentibus.*

† *Corolla campanulata.*

Vitis idaea 27. V. caule baſi repente, foliis obovatis emarginatis revolutis ſubſerrulatis coriaceis ſupra lucidis ſubtus punctatis, racemis terminalibus nutantibus. *Europ. et Amer. bor.*

myrtifolium Mx. 28. V. caule baſi repente, foliis ovalibus lucidis revolutis ſubdenticulatis, faſciculis axillaribus paucifloris ſubſeſſilibus. *Carolina.* (Fructus nigri.)

craſſifolium Andr. 29. V. ramis aſcendentibus, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis rigidis glabris ſerratis, racemis terminalibus corymboſis paucifloris bracteatis, floribus nutantibus. *Carolina.*

penaeoides Kunth. 30. V. caule baſi repente, foliis oblongis ſubimbricatis acutis crenulatis glabris ſubciliatis, floribus ſolitariis pedunculatis, calycibus 2bracteatis. *Quito.*

alaternoides Kunth. 31. V. caule ſubarboreſcente, foliis ſubrotundo-ellipticis acutiuſculis integerrimis glabris ſub-3nerviis, floribus axillaribus ſubgeminis ſeſſilibus, calycibus 2bracteatis. *And. Peru.*

confertum Kunth. 32. V. caule ramoſiſſimo, foliis ovato-oblongis crenulatis glabris, floribus axillaribus ſubcymoſis folium aequantibus 10andris, calycibus ebracteatis, antheris dorſo muticis. *Mexico.*

caracaſanum Kunth. 33. V. foliis oblongis acutis crenulatis glabris ſupra nitidis, racemis axillaribus ſecundis folia ſuperantibus, antheris dorſo 2ariſtatis. *Caracas.*

†† *Corolla urceolata.*

acuminatum Bonpl. 34. V. caule arboreo, foliis confertis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis ſubgeminis, calycibus 2bracteatis. *Nov. Granat.*

empetrifolium Kunth. 35. V. caule repente, foliis imbricatis ovalibus exiguis integerrimis glaberrimis ſubvenoſis, flo-

ribus ſolitariis pedunculatis cylindrico-urceolatis, calycibus 2bracteatis. *And. Peru.*

floribundum Kunth. 36. V. caule fruticoſo erecto, foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis glabris ſubtus punctatis, racemis terminalibus aggregatis nutantibus ſecundis, pedicellis baſi bracteatis. *Peru.*

meridionale Sw. 37. V. caule arboreo, foliis ovatis acuminatis exiguis ſerrulatis venoſis glabris nitidis, racemis terminalibus aphyllis, antheris dorſo ariſtatis. *Jamaica.*

braſilienſe * 38. V. foliis ovalibus mucronatis integerrimis glaberrimis ſubtus venoſis, racemis terminalibus aggregatis bracteatis, corollis cylindrico-urceolatis, antheris muticis. *Braſil.* Sello.

cereum Forſt. 39. V. foliis ovatis acutiuſculis glanduloſo-ſerrulatis utrinque glabris ſubtus reticulato-venoſis, pedunculis confertis, corolla 5gona, antheris dorſo ariſtatis. *Inſ. Amicorum.*

orientale Sw. 40. V. caule arboreſcente, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, racemis ſpicatis terminalibus, floribus 10andris. *Cochinchina.* (Acoſta ſpicata Lour.)

nitidum Andr. 41. V. caule fruticoſo ramoſiſſimo, ramis diſtichis, foliis obovatis acutis ſerratis glabris ſupra nitidis, racemis terminalibus corymboſis bracteatis nutantibus, corollis cylindricis. *Carolina.*

Myrſinites Mx. 42. V. caule fruticoſo ramoſiſſimo, foliis ſeſſilibus oblongis mucronatis ſerrulatis ſupra lucidis ſubtus ſcabro-punctatis, faſciculis gemmaceis lateralibus. *Carolina. Florida.*

buxifolium Andr. 43. V. humile, foliis obovatis crenulatis glabris, faſciculis congeſtis ſubſeſſilibus, filamentis glanduloſis. *Virginia.* (V. brachycerum Mx.)

ovatum Pursh. 44. V. foliis petiolatis ovatis acutis revolutis ſerratis glabris, racemis abbreviatis bracteatis, calycibus acutis, corollis cylindricis. *Amer. bor. occid.*

obtuſum Pursh. 45. V. caule repente, foliis ovalibus exiguis mucronatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris. *Amer. bor. occid.*

††† *Corolla ſubrotata.*

Oxycoccus 46. V. caule repente, ramis filiformibus proſtratis, foliis ovato-oblongis acutiuſculis integerrimis ſupra lucidis ſubtus albidis, pedunculis elongatis, laciniis corollae oblongis. *Europ. Amer. bor.* (Oxycoccus paluſtris Perſ.)

macrocarpon Ait. 47. V. caule repente, ramis aſcendentibus, foliis ovalibus obtuſis integerrimis ſupra lucidis ſubtus albidis, pedunculis elongatis, laciniis corollae lanceolatis acuminatis. *Amer. bor.* (Oxycoccus Perſ.)

hiſpidulum 48. V. caule repente filiformi hiſpido, foliis ovatis integerrimis, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Amer. bor.* (Arbutus filiformis Lam. Gaultheria ſerpyllifolia Pursh.)

1422. Neaea R. et P.

verticillata R. et P. 1. N. foliis quaternis lanceolatis. *Peru.*

oppoſitifolia R. et P. 2. N. foliis oppoſitis oblongis acuminatis. *Peru.*

1423. Michauxia Herit.

campanuloides Herit. 1. M. foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis cordatis, caule ſtrigoſo. *Syria.*

laevigata Vent. 2. M. foliis radicalibus ovatis, caulinis oblongis, caule laevi. *Perſia.*

1424. Sweetia *.

fruticoſa * *Braſil.* Frutex ſpithameus, ramis virgatis verrucoſis aphyllis, floribus racemoſis ſecundis flavis.

1425. Sodada Forsk.

decidua Forsk. *Arabia. Aegypt.* Frutex orgyalis, ramis ſpineſcentibus ſubaphyllis, floribus rubris.

1426. Physostemon Mart.

lanceolatus Mart. 1. Ph. foliis lanceolatis, ſiliquis elongatis tenuibus ſubteretibus. *Braſil.*

tenuifolius Mart. 2. Ph. foliis linearibus, ſiliquis ovatis compreſſis. *Braſil.*

rotundifolius Mart. 3. Ph. foliis ovatis acutis, ſiliquis ovatis compreſſis. *Braſil.*

1427. Sassia Molin.

tinctoria Mol. 1. S. foliis ovatis, ſcapo multifloro. *Chili.*

perdicaria Mol. 2. S. foliis cordatis, ſcapo 1floro. *Chili.*

1428. Kölreutera Laxm.

paniculata Laxm. *China.* Arbuscula foliis pinnatis, foliolis oblongis obtuſis laciniato-dentatis, floribus paniculatis flavis. (Sapindus chinenſis L.)

1429. Xylocarpus Schreb.

Granatum Kön. 1. X. foliis ſub-3jugis ovatis acutis, racemis pendulis. *Inſ. Molucc.* (Carapa moluccenſis Lam.)

Carapa * 2. X. foliis multijugis oblongis glabris, paniculis aggregatis erectis. *Hiſpaniola. Guiana.* (Carapa guianenſis Aubl. Perſoonia guareoides W.)

1430. VITMANNIA Vahl.

elliptica Vahl. *Ceylon.* Arbor foliis oblongis obtuſis, floribus umbellatis. (Samadera Gärtn. Niota 4petala Lam. et 5petala Poir.)

1431. ELVASIA Cand.

calophyllea Cand. *Braſil.* Frutex foliis oblongis parallele venoſis, floribus paniculatis.

1432. CASTELA Turp.

depreſſa Turp. 1. C. ſpinis axillaribus, foliis ſubcordato-oblongis ſeſſilibus. *Hiſpaniola.*

erecta Turp. 2. C. ſpinis infraaxillaribus, foliis lanceolatis petiolatis. *Inſ. Carib.*

1433. ROXBURGHIA Jon.

glorioſoides Roxb. *Ind. or.* Herba radice tuberoſa, caule ſcandente ramoſo, foliis cordatis acuminatis nervoſis, calyce flavo, corolla rubra.

1434. TETRATHECA Sm.

ericaefolia Sm. 1. T. foliis verticillatis linearibus revolutis ſcabris, ramis glabris, calycibus ovatis acutiuſculis. *Nov. Holl.*

piloſa Labill. 2. T. foliis verticillatis ſparſisve ovatis dentatis vel linearibus integerrimis revolutis hiſpidulis, ramis pubeſcentibus, calycibus orbiculatis glanduloſis. *Terra Diemen.* (T. glanduloſa Sm.)

juncea Sm. 3. T. foliis alternis lanceolatis ramisque angulatis glabris elongatis. *Nov. Holl.*

thymifolia Sm. 4. T. foliis verticillatis lanceolatis ciliatis, ramis piloſiuſculis, calycibus lanceolatis acutis ciliatis. *Nov. Holl.*

glanduloſa Labill. 5. T. foliis alternis ovato-oblongis dentatis ramisque glanduloſo-piloſis, calycibus ovato-lanceolatis. *Terra Diemen.*

1435. BORONIA Sm.

** Folia impari-pinnata.*

pſoraleoides Cand. 1. B. foliis ſubbijugis ramulisque glabris punctato-glanduloſis, foliolis linearibus obtuſis, floribus ſolitariis 4andris. *Nov. Holl. auſtr.*

pinnata Sm. 2. B. foliis 4jugis ramulisque glaberrimis, foliolis linearibus acutis, pedunculis 2fidis, floribus 8andris. *Nov. Holl.*

tetrandra Labill. 3. B. foliis 4jugis linearibus obtuſis glabris, ramis piloſis, floribus ſolitariis 4andris. *Nov. Holl. occ.*

pilosa Labill. 4. B. foliis 4jugis ramulisque pilosiusculis, foliolis linearibus approximatis, floribus solitariis 8andris. *Nov. Holl.*

alata Sm. 5. B. foliis 4jugis subtus pilosis crenatis revolutis, pedunculis dichotomis, bracteis fimbriatis. *Nov. Holl. occid.*

** *Folia simplicia.*

serrulata Sm. 6. B. foliis trapezoideis acutis antice serrulatis glabris punctato-glandulosis, pedunculis aggregatis terminalibus. *Nov. Holl.*

crenulata Sm. 7. B. foliis obovatis mucronulatis crenulatis, pedunculis 1floris, calycibus fimbriatis, filamentis apice obtusis glandulosis. *Nov. Holl.*

denticulata Sm. 8. B. foliis linearibus retusis denticulatis, pedunculis corymbosis, filamentis apice obtusis glandulosis. *Nov. Holl.*

parviflora Sm. 9. B. foliis obovato-lanceolatis obsolete crenatis, pedunculis 1floris bracteolatis, filamentis clavatis glandulosis. *Nov. Holl.*

tetrathecoides Cand. 10. B. foliis linearibus acutis integerrimis glabris subrevolutis, pedunculis axillaribus 1floris 2bracteolatis, filamentis hispidis. *Nov. Holl.* (Tetratheca oppositifolia Pers.)

pilonema Labill. 11. B. foliis oblongo-linearibus utrinque attenuatis integerrimis, pedunculis terminalibus solitariis ebracteatis subturbinatis, filamentis glabris. *Nov. Holl. austr.*

polygalaefolia Sm. 12. B. foliis lineari-lanceolatis integerrimis verticillato-alternis, pedunculis axillaribus 1floris, filamentis glabris. *Nov. Holl.*

ledifolia Gay. 13. B. foliis lineari-lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus 1floris, filamentis hispidis. *Nov. Holl.* (Lasiopetalum ledifolium Vent.)

1436. CORREA Sm.

* *Breviflorae, petalis subdistinctis.*

alba Andr. 1. C. foliis ovatis subtus tomentosis, dentibus calycis acutis. *Nov. Holl.* (C. cotinifolia Salisb.)

rufa Gärtn. 2. C. foliis ovato-oblongis subtus rufo-tomentosis, dentibus calycis latis obtusis. *Nov. Holl.* (Mazeutoxeron Labill.)

** *Longiflorae, petalis coalitis.*

speciosa Andr. 3. C. foliis ovatis obtusis supra asperis subtus ramisque stellato-tomentosis, calycibus truncatis, floribus erectis. *Nov. Holl.* (C. rubra Sm.)

virens Sm. 4. C. foliis cordato-oblongis subdenticulatis glanduloso-tomentosis, calycibus denticulatis, floribus pendulis tomentosis. *Nov. Holl.* (C. viridiflora Andr., reflexa Pers. Mazeutoxeron Labill.)

1437. JAMBOLIFERA.

pedunculata 1. J. foliis elliptico-oblongis glabris, floribus paniculatis, petalis lineari-lanceolatis calyce longioribus. *Ceylon.*

chinensis * 2. J. foliis ovatis emarginatis, floribus racemoso-corymbosis. *China austr.* (J. pedunculata Lour.)

odorata Lour. 3. J. foliis ovatis basi oblique truncatis subtus punctatis, floribus racemoso-corymbosis. *Cochinchina.*

resinosa Lour. 4. J. foliis oblongis, pedunculis axillaribus multifloris. *Cochinchina.*

1438. MELICOPE Forst.

ternata Forst. *Nov. Zeeland.* (Entoganum laevigatum Gärtn.)

1439. PORLIERA R. et P.

hygrometrica R. et P. *Peru. Chili.* Frutex foliis abrupte pinnatis linearibus.

1440. CHITONIA Sess.

mexicana Sess. *Mexico.* Frutex foliis impari-pinnatis ovatis, floribus solitariis rubris.

1441. GRISLEA.

secunda 1. Gr. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis glabris, corymbis axillaribus secundis. *Cumana.*

tomentosa Roxb. 2. Gr. foliis sessilibus cordato-lanceolatis subtus tomentosis, corymbis axillaribus patulis. *Ind. or.* (Woodfordia floribunda Salisb. Lythrum fruticosum L.)

1442. ANTICHORUS.

depressus *Arabia.* (Jussieva edulis Forsk.) Planta annua pusilla, foliis alternis ovatis serratis glabris, floribus axillaribus geminis oppositis luteis.

1443. SELAS *. (Gela Lour.)

lanceolatum * *Cochinchina.* Arbuscula foliis ovato-lanceolatis integerrimis lucidis, floribus axillaribus corymbosis lutescentibus.

1444. XIMENIA.

americana 1. X. pedunculis sub-4floris spinescentibus, foliis oblongis obtusis membranaceis, ramis glabris, fructibus stylo coronatis. *Ind. occ.* (X. multiflora Jacq. Heymassoli spinosa Aubl.)

† *ferox* Poir. 2. X. pedunculis ſubumbellatis, ramis ſpinoſis, foliis ſubrotundis coriaceis ſubſeſſilibus pubeſcentibus. *Hiſpaniola.*

elliptica Forſt. 3. X. pedunculis ſub-4floris inermibus, foliis ellipticis ſubcoriaceis, ramis verrucoſis, fructibus ſtylo coronatis. *Nov. Caledon. Hiſpaniola.* Bert.

inermis 4. X. pedunculis 1floris, foliis oblongo-lanceolatis acutiuſculis coriaceis, ramis glabris, fructibus apice obtuſiuſculis. *Ind. occ.*

1445. Lawsonia.

alba Lam. 1. L. foliis obovatis ſubſeſſilibus glaberrimis integerrimis, ramis ſubſpineſcentibus, panicula ramoſiſſima. *Ind. or. Aegypt. Arabia.* (L. inermis et ſpinoſa L.)

purpurea Lam. 2. L. foliis lanceolatis elongatis ſubſeſſilibus, floribus corymboſis. *Ind. or.*

Acronychia Forſt. 3. L. foliis petiolatis ſpathulato-oblongis, floribus cymoſis. *Nov. Caledon.*

falcata Lour. 4. L. foliis petiolatis falcatis acuminatis ſubcrenatis, floribus corymboſis. *Cochinchina.*

1446. Amyris.

** Foliis ſimplicibus.*

polygama Cav. 1. A. foliis ſpathulato-lanceolatis nitidis integerrimis, racemis axillaribus aggregatis. *Chili.*

Lunani * 2. A. foliis oblongo-ellipticis coriaceis opacis, racemis terminalibus ſubſolitariis. *Jamaica:* culta.

*** Foliis ternatis.*

*diatrypa** 3. A. foliolis ſubrotundis obtuſis emarginatis integerrimis pellucido-punctatis ſupra lucidis, paniculis axillaribus paucifloris folio brevioribus. *Hiſpaniola.*

braſilienſis * 4. A. foliolis lanceolatis baſi attenuatis apice rotundatis mucronatis integerrimis venoſis ſupra nitidis ſubtus discoloribus, petiolis 3quetris, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Braſil.* Sello.

ſylvatica Jacq. 5. A. foliolis ſubcordato-ovatis acutis crenatis nitidis, paniculis axillaribus. *Cumana.*

Kataf Forsk. 6. A. foliolis ovatis apice ſerratis, pedunculis terminalibus dichotomis. *Arabia. Afric. orient. et occid.* (A. Kafal Forsk. var.)

gileadenſis 7. A. foliolis obovatis integerrimis petiolatis, pedunculis ſubaggregatis 1floris. *Arabia.* (nec Palaeſtina nec Aegyptus.)

*** *Foliis pinnatis.*

† *integerrimis.*

Opobalsamum 8. A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis obovatis integerrimis sessilibus, pedunculis terminalibus 1floris. *Arabia.*

heterophylla W. 9. A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis ovatis oblongisque acuminatis venosis coriaceis, lateralibus minimis, racemis axillaribus abbreviatis. *Guiana. Guadalupa.* (Icica Aracouchini Aubl.)

enneandra W. 10. A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis oblongis utrinque attenuatis venosis, petiolis medio nodosis, paniculis axillaribus elongatis. *Guiana.* (Icica 9andra Aubl.)

ambrosiaca 11. A. foliis 3jugis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis cymosis congestis axillaribus. *Guiana. Brasil.* (Icica guianensis et 7phylla Aubl.)

decandra W. 12. A. foliis 3jugis, foliolis oblongis utrinque attenuatis, paniculis axillaribus divaricatis. *Guiana.* (Icica 5andra Aubl.)

altissima W. 13. A. foliis 3jugis, foliolis oblongis utrinque attenuatis, racemis axillaribus. *Guiana.* (Icica Aubl.)

toxifera 14. A. foliis 3jugis, foliolis ovatis acuminatis, panicula axillari elongata. *Carolina.*

zeylanica Retz. 15. A. foliis 3jugis, foliolis ovatis acutis venosis, racemis axillaribus interruptis, floribus involucratis tomentosis 6andris. *Ceylon.*

Protium 16. A. foliis 3jugis, foliolis lanceolatis inaequilateris longe acuminatis undulatis, paniculae diffusae ramis incanis. *Java.*

balsamifera 17. A. foliis 2pinnatis, partialibus 3jugis, foliolis ovatis acuminatis, racemis laxis. *Jamaica.*

†† *Foliis crenatis, dentatis.*

maritima 18. A. foliis ternatis pinnatisque 3jugis, foliolis oblongis obtusis apice crenatis basi attenuatis opacis glabris, paniculis axillaribus. *Ind. occid. Brasil.*

dentata W. 19. A. foliis pinnatis 4jugis, foliolis subalternis ovatis dentatis emarginatis punctatis membranaceis, racemis axillaribus. *Ind. or.*

anisata W. 20. A. foliis pinnatis 6jugis, foliolis ovato-lanceolatis basi inaequalibus obsolete dentatis, paniculis axillaribus corymbosis. *Guinea.*

capensis * 21. A. foliis pinnatis 5jugis, foliolis ovatis obtusis crenatis subsessilibus, ramis flexuosis aculeatis, floribus paniculatis. *C. B. S.* (Fagara capensis Thunb.)

† *inaequalis* * 22. A. foliis pinnatis multijugis, petiolis teretibus inermibus pubescentibus, foliolis basi inaequalibus ovatis crenatis glabris pellucido-punctatis, racemis paucifloris folio brevioribus. *Afr. austr.* (Elaphrium inaequale? Cand. Burchell.)

armata * 23. A. foliis pinnatis multijugis, petiolis ſubangulatis glabris aculeatis, foliolis lanceolatis crenatis nitidis pellucido-punctatis parallele venoſis, floribus cymoſis ſub-4andris. *Afric. auſtr.* (Fagara armata Thunb.)

Elaphrium * 24. A. foliis pinnatis 5jugis, petiolo marginato, foliis ovato-oblongis crenatis glaberrimis, racemis paucifloris folia ſuperantibus. *Nov. Granat.* (Elaphrium glabrum Jacq. Fagara W.)

tomentoſa * 25. A. foliis pinnatis 4jugis, petiolo marginato, foliolis ovatis obtuſis crenatis utrinque tomentoſis, racemis paucifloris folio brevioribus. *Curaçao.* (Elaphrium tomentoſum Jacq. Fagara 8andra W.)

copallifera * 26. A. foliis pinnatis pubeſcentibus, petiolo marginato, foliolis ovatis dentatis, racemis interruptis folia aequantibus, pedicellis confertis breviſſimis. *Mexico.* (Elaphrium copalliferum Seſſ.)

penicillata * 27. A. foliis pinnatis glabriuſculis, petiolo marginato barbato, foliolis oblongis acuminatis dentatis, racemis paucifloris folio brevioribus. *Mexico.* (Elaphrium penicillatum Seſſ.)

1447. XANTHOPHYLLUM Roxb.

vireſcens Roxb. 1. X. foliis eglanduloſis, paniculis interfoliaceis, germinibus 4ſpermis. *Silhet, prov. Ind. or.*

flaveſcens Roxb. 2. X. foliis baſi 2glanduloſis, paniculis axillaribus, germinibus 8-10ſpermis. *Bengal.*

1448. EUSTATHES Lour.

ſylveſtris Lour. *Cochinchina.* Arbor magna, foliis ovato-oblongis acuminatis glabris integerrimis, floribus racemoſis albis.

1449. SCUTULA Lour.

ſcutellata Lour. 1. Sc. pedunculis lateralibus multifloris, baccis compreſſis. *Cochinchina.*

umbellata Lour. 2. Sc. floribus terminalibus umbellatis, baccis ſubrotundis. *Cochinchina.*

1450. KEITHIA *.

braſilienſis * *Braſil.* (N. Entd. 3. 57.)

1451. HONCKENYA W.

ficifolia W. *Guinea.* Frutex foliis lobatis dentatis fulvo-tomentoſis, floribus terminalibus ternis violaceis.

†1452. HAGENIA Lam.

abyssinica W. *Abyssinia.* Arbor ramis angulatis, foliis interrupte pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis sessilibus argute serratis, floribus paniculatis purpureis. (Cusso Bruce.)

1453. BÄCKEA.

frutescens 1. B. foliis oppositis linearibus, pedunculis axillaribus solitariis. *China.*

linifolia Rudg. 2. B. foliis oppositis lineari-filiformibus, pedunculis solitariis 1floris. *Nov. Holl.*

virgata Ker. 3. B. foliis oppositis confertisque lineari-lanceolatis punctatis, floribus corymbosis sub-5andris. *Nov. Caledon.* (Leptospermum virgatum et Melaleuca virgata Forst.)

densifolia Sm. 4. B. foliis 4fariam imbricatis obtusis reflexo-mucronatis. *Nov. Holl.*

diosmaefolia Rudg. 5. B. foliis 4fariam imbricatis obovatis punctatis pellucido-marginatis calycibusque serrulatis, pedunculis axillaribus confertis 1floris. *Nov. Holl.*

1454. MELICOCCA.

bijuga 1. M. foliis 2jugis ovali-oblongis utrinque attenuatis, racemis compositis. *Ind. occ.* (M. carpoodea Juss., olivaeformis Kunth.)

geniculata * 2. M. foliis ternatis pinnatisque 2jugis, petiolis apice nodosis geniculatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis, paniculis axillaribus patentissimis. *Brasil.*

paniculata Juss. 3. M. foliis 2jugis, foliolis oblongo-lanceolatis subsessilibus, panicula corymbosa terminali trichotoma, floribus 10andris, fructibus subglobosis. *Hispaniola.*

dentata Juss. 4. M. foliis sub-5jugis, foliolis alternis obovato-oblongis apice dentatis obtusis, pedunculis axillaribus paucifloris, floribus 10andris, fructibus subglobosis. *Ins. Mascaren.*

1455. HYPELATE P. Br.

trifoliata Sw. *Jamaica.* Arbuscula foliis ternatis, foliolis obovatis nitidis integerrimis, racemis compositis corymbosis, floribus albis parvis polygamis.

1456. CUPANIA.

* *Petala apice convoluta cucullata.*

tomentosa Sw. 1. C. foliis pinnatis sub-3jugis, foliolis obovato-oblongis emarginatis apice crenato-repandis subtus subtomentosis, paniculis terminalibus diffusis tomentosis. *Ind. occ.* (C. latifolia Kunth. Trigonis tomentosa Jacq.)

excelſa Kunth. 2. C. foliis pinnatis ſub-5jugis, foliolis oblongis obtuſiusculis remote denticulatis coriaceis ſupra glabriusculis ſubtus pubeſcentibus. *Mexico.*

ſcrobiculata Kunth. 3. C. foliis pinnatis ſub-4jugis oblongis retuſis remote dentatis ſubmembranaceis glabris, axillis venarum ſubtus ſcrobiculatis. *Nov. Granat.*

glabra Sw. 4. C. foliis pinnatis 4jugis obovato-oblongis repando-crenatis utrinque glabris ſupra nitidis, racemis compoſitis axillaribus, fructibus glaberrimis. *Ind. occid.*

Saponaria Perſ. 5. C. foliis pinnatis 6jugis, foliolis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus ſcabris, racemis terminalibus compoſitis. *Ind. occid.* (C. ſaponarioides Sw. Ornitrophe macrophylla Poir.)

geminata Poir. 6. C. foliis binatis ovato-oblongis integerrimis ſupra glaucis ſubtus pubeſcentibus. *Cayenn.*

** *Petala planiuscula.* *Molinaea* Juſſ.

caneſcens Perſ. 7. C. foliis 2jugis elliptico-oblongis integerrimis glabris nitidis, racemis compoſitis. *Ind. or.* (Molinaea Roxb.)

laevis Perſ. 8. C. foliis 3jugis oblongis integerrimis coriaceis laevibus, corymbis paniculatis, fructibus ſubalatis. *Inſ. Mascaren.* (Molinaea laevis et alternifolia W.)

venuloſa Cand. 9. C. foliis 2jugis oblongis integerrimis laevibus ſubtus reticulato-venoſis. *Inſ. Mascaren.*

lentiſcifolia Perſ. 10. C. foliis 3jugis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis glabris, panicula terminali. *Inſ. amicorum.* (Guioa Cav.)

† *dentata* Seſſ. 11. C. foliis ſub-6jugis ovali-oblongis petaliſque crenato-dentatis. *Mexico.*

1457. THOUINIA Poit.

integrifolia * 1. Th. foliis ſimplicibus ovato-oblongis acutis glabris ſubtus discoloribus, racemis terminalibus paniculatis. *Braſil.* Sello.

ſimplicifolia Poit. 2. Th. foliis ſimplicibus lanceolatis acutis dentato-ſerratis ſubtus ſubtomentoſis, racemis ſimplicibus. *Hiſpaniola.*

trifoliata Poit. 3. Th. foliis ternatis ſupra nitidis, axillis venarum ſubtus barbatis, foliolis obovatis ſubſerratis, racemis ſimplicibus. *Hiſpaniola.*

† *villoſa* Seſſ. 4. Th. foliis ternatis ovatis acutis apice ſerratis villoſis, racemis paniculatis. *Nov. Hiſpan.*

pinnata Turp. 5. Th. foliis pinnatis obovatis emarginatis, floribus paniculatis 5petalis. *Hiſpaniola.*

polygama Meyer. 6. Th. foliis pinnatis ovali-oblongis acutiusculis integerrimis glaberrimis, floribus racemoſis polygamis. *Guiana.*

decandra Humb. 7. Th. foliis pinnatis lanceolatis dentatis, floribus paniculatis 10andris. *Mexico.*

1458. EUPHORIA Commerf.

Litchi Desf. 1. E. foliis pinnatis 4jugis, foliolis lanceolatis fubtus glaucis, racemis laxis, fructibus fquamofis. *Ind. or. Cochinchina. China.* (E. punicea Lam. Dimocarpus Litchi Lour. Scytalia chinenfis Gärtn.)

Longan Lam. 2. E. foliis pinnatis 3jugis, foliolis oblongis fubtus pubefcentibus venofis, floribus laxe paniculatis, fructibus laevibus. *China. Cochinchina.* (Dimocarpus Lour.)

informis Cand. 3. E. foliis pinnatis, foliolis oblongis, racemis paucifloris, fructibus tuberculofis. *Cochinchina.* (Dimocarpus Lour.)

Nephelium Cand. 4. E. foliis pinnatis 2jugis, foliolis lanceolatis glabris, fructibus crinitis. *Java. Cochinchina.* (Dimocarpus crinitus Lour. Nephelium lappaceum L.)

1459. SCHMIDELIA Schreb.

* *Foliis fimplicibus.*

rigida Sw. 1. Schm. foliis ovatis acuminatis fpinulofo-denticulatis rigidis fubtus cinereo-pubefcentibus, floribus racemofis. *Hifpaniola.* (Ornitrophe W.)

Allophylus Cand. 2. Schm. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis breviffimis. *Ceylon.* (Allophylus zeylanicus L.)

** *Foliis ternatis.*

Cobbe Cand. 3. Schm. foliolis petiolatis ovatis acutis ferratis fubtus ad venas pubefcentibus, racemis axillaribus fimplicibus tomentofis, petalis glabris. *Ceylon. Nov. Caledon. Brafil. Cochinchina.* (Rhus L. Ornitrophe W. Toxicodendron Gärtn. Pometia et Aporetica ternata Forft. Allophylus ternatus Lour. Schm. guaranitica Hilar. var.)

*cochinchinenfis** 4. Schm. foliolis petiolatis ovato-lanceolatis inaequaliter ferratis glabris, fpicis axillaribus polygamis, petalis pilofis. *Ind. or. Cochinchin.* (Gemella trifolia Lour. Aporetica gemella Cand. Schm. diftachya Cand.)

racemofa 5. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis fubferratis glabris, floribus verticillato-racemofis. *Ind. or.* (Ufubis triphylla Burm.)

ferrata Cand. 6. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ferrulatis glabriusculis, petiolis pedunculisque racemofis pubefcentibus. *Ind. or.* (Ornitrophe Roxb.)

Cominia Sw. 7. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ferratis villofis, racemis paniculatis tomentofis. *Jamaica. Nov. Granat.* (Schm. mollis Kunth., Rhus L., Ornitrophe W.)

africana Cand. 8. Schm. foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ferratis glabris, racemis compofitis, petalis pilofis. *Guinea. Inf. Molucc.* (Allophylus P. B., Schm. racemofa Afz., timorienfis Cand.)

glabrata Kunth. 9. Schm. foliolis petiolatis ellipticis mucronatis integerrimis glabris, racemis ternatis. *Nov. Granat.*

integrifolia Cand. 10. Schm. foliolis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis ſubſimplicibus. *Inſ. Mascaren.* (Ornitrophe Lam. W.)

occidentalis Sw. 11. Schm. foliolis ſeſſilibus oblongis utrinque attenuatis apice ſerratis ſupra ad venas ſubtusque villoſiusculis, racemis ſimplicibus, petalis piloſis. *Ind. occid.* (Ornitrophe W., O. ſpicata Poir.)

*** *Foliis pinnatis.*

pinnata Cand. 12. Schm. foliolis ſub-5jugis ovato-lanceolatis glabris, racemis compoſitis pubeſcentibus, floribus faſciculatis. *Nov. Hebrid.* (Pometia Forſt. Ornitrophe Poir.)

1460. EPHIELIS Schreb.

fraxinea W. 1. E. foliis abrupte pinnatis 3jugis oblongis glabris, petiolo aequali, panicula terminali. *Guiana. Portorico. Hiſpaniola.* (Mataïba guianenſis Aubl.)

Patriſiana * 2. E. foliis impari-pinnatis 2jugis ſubtus villoſis, petiolo ſubalato, racemis ſimplicibus. *Guiana?* (Matayba Cand.)

† *Vouarana* * 3. E. foliis impari-pinnatis 3jugis, foliolis alternis oblongis glabris, racemis ſimplicibus. *Guiana.* (Vouarana Aubl.)

1461. TALISIA Aubl.

hexaphylla Vahl. 1. T. foliis pinnatis 3jugis, foliolis oblongo-lanceolatis nitidis glabris, racemis ſimplicibus, calycibus corollam aequantibus. *Inſ. Carib.*

roſea Vahl. 2. T. foliis pinnatis multijugis, foliolis oblongis acuminatis ſubtus ad venas hirſutis, racemis decompoſitis, calycibus corolla brevioribus. *Guiana.* (T. guianenſis Aubl.)

glabra Cand. 3. T. foliis pinnatis multijugis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis utrinque glaberrimis. *Guiana.*

acladodes Cand. 4. T. trunco ſimplici, foliis abrupte pinnatis, foliolis oblongo-linearibus acuminatis, racemo terminali. *Peru.* (Acladodea pinnata R. et P.)

1462. PHAEOCARPUS Mart.

campeſtris Mart. *Braſil.* Arbor foliis impari-pinnatis, floribus paniculatis, capſula globoſo-3gona.

1463. BLIGHIA Kön.

ſapida Kön. *Guinea.* Arbor excelſa ramoſa, foliis pinnatis glabris, floribus racemoſis albis, fructibus pomaceis. (Akeeſia africana Tuſſ. Bonannia nitida Rafin.)

1464. ACER.

* *Foliis indivisis.*

oblongum Wall. 1. A. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris subtus glaucescentibus, racemis compositis, fructibus glabris. *Nepal.*

tataricum 2. A. foliis cordatis subincisis inaequaliter dentatis, corymbis erectis, fructibus glabris. *Asia bor.*

** *Foliis trilobis, trifidis.*

heterophyllum W. 3. A. foliis sempervirentibus integris 3lobisque obsolete denticulatis glabris, brevissime petiolatis. *Asia minor?* (A. sempervirens L.)

obtusifolium Sm. 4. A. foliis rotundatis obtuse 3lobis denticulato-crenatis petiolos aequantibus. *Creta.*

creticum 5. A. foliis sempervirentibus basi attenuatis 3fidis, laciniis subdenticulatis lateralibus brevioribus, corymbis paucifloris erectis, fructibus glabris. *Creta. Graecia.*

monspessulanum 6. A. foliis annuis cordatis 3lobis, lobis subintegerrimis aequalibus, corymbis paucifloris erectis, fructibus glabris. *Europ. austr.* (A. commutatum Presl.)

ibericum M. B. 7. A. foliis obtuse 3lobis subdentatis nitidis subtus glaucis reticulato-venosis. *Caucas.*

trifidum Thunb 8. A. foliis 3fidis integerrimis utrinque glabris subtus pallidis. *Japon.*

pensylvanicum 9. A. foliis cordatis 3fidis acuminatis serratis glabris, racemis simplicibus elongatis pendulis, ramis striatis. *Amer. bor.* (A. striatum du Roi. Lam. hybridum Bosc.)

barbatum Mx. 10. A. foliis breviter 3lobis serratis utrinque glabris, pedunculis ♂ ramosis ♀ simplicissimis, calycibus ♂ intus dense pilosis. *Carolina.* (A. carolinianum Walt.)

*** *Foliis 5lobis, 5fidis.*

montanum Ait. 11. A. foliis sub-5lobis acutis serratis subtus pubescentibus, racemis compositis erectis. *Amer. bor.* (A. spicatum Lam. parviflorum Ehrh.)

obtusatum Kit. 12. A. foliis cordatis leviter obtusissime 5lobis subtus pubescentibus, lobis repandis, umbellis pendulis, pedunculis fructibusque pilosis. *Hungaria. Italia.*

opulifolium Vill. 13. A. foliis cordatis 5lobis subtus glaucescentibus reticulato-venosis, lobis obtusis crenato-dentatis, umbellis pendulis, pedunculis fructibusque glabris. *Gallia occid. Ital. sup. Pyren.* (A. hispanicum Pourr.)

Opalus Ait. 14. A. foliis longe petiolatis subrotundis coriaceis obtuse 5lobis subtus pallidis, lobis obtuse dentatis, corymbis erectis, fructibus glabris. *Italia.* (A. rotundifolium Lam. italum Lauth. villosum Presl.)

campestre 15. A. foliis cordatis obtuse 5lobis nitidis subtus glabris, lobis subintegerrimis, corymbis erectis, fructuum alis divaricatis. *Europa, Tauria.* (A. austriacum Trattin.)

nigrum Mx. 16. A. foliis cordatis 5lobis subtus pubescentibus, corymbis sessilibus nutantibus, fructuum glabrorum alis divergentibus. *Amer. bor.*

Pseudoplatanus 17. A. foliis cordatis 5lobis subtus glaucescentibus glabriusculis, lobis inaequaliter dentatis, racemis pendulis, fructibus glabris. *Europ.*

saccharinum 18. A. foliis subcordatis acute 5lobis subtus pubescentibus, lobis subintegerrimis, corymbis praecocibus laxis nutantibus, pedunculis pilosis, floribus apetalis. *Amer. bor.*

platanoides 19. A. foliis cordatis 5fidis glabris, laciniis acuminato-cuspidatis subdentatis, corymbis erectiusculis fructibusque glabris. *Europ.* (A. laciniatum du Roi. crispum Lauth. varr.)

rubrum Ehrh. 20. A. foliis longe petiolatis subcordatis 5fidis glabris subtus glaucis, laciniis acuminatis inciso-dentatis, umbellis erectis, fructuum glabrorum alis divergentibus. *Amer. bor.*

dasycarpon Ehrh. 21. A. foliis cordatis 5fidis subtus albidis glabriusculis, laciniis acuminatis inciso-dentatis, floribus capitato-umbellatis, germinibus lanatis. *Amer. bor.* (A. eriocarpon Mx., glaucum Marsh.)

macrophyllum Pursh. 22. A. foliis digitato-5fidis, laciniis sub-3fidis repando-dentatis subtus pubescentibus, racemis erectis, germinibus hirsutissimis. *Amer. bor. ora occid.*

**** *Foliis multifidis.*

pictum Thunb. 23. A. foliis 7fidis glabris (albo-variegatis), laciniis acuminatis subintegerrimis. *Japon.*

septemlobum Thunb. 24. A. foliis 7fidis utrinque glabris subtus pallidis, laciniis acuminatis aequaliter argute serratis. *Japon.*

circinatum Pursh. 25. A. foliis subcordato-orbiculatis 7lobis glabris, axillis venarum subtus pilosis, lobis inaequaliter acute dentatis. *Amer. bor. ora occid.*

palmatum Thunb. 26. A. foliis palmato-7fidis utrinque glabris, laciniis lanceolatis aequaliter argute serratis, floribus umbellatis. *Japon.*

japonicum Thunb. 27. A. foliis cordato-subrotundis multipartitis utrinque villosis, corymbis erectis, fructibus lanatis. *Japon.*

dissectum Thunb. 28. A. foliis multipartito-palmatis glabris, laciniis lanceolatis subpinnatifidis serratis, floribus umbellatis. *Japon.*

***** *Foliis compositis.*

Negundo 29. A. foliis ternatis pinnatisque inciso-serratis, floribus dioecis, ♂ corymbosis sub-4andris, ♀ racemosis pendulis. *Amer. bor.* (A. fraxinifolium Nuttall. Negundo aceroides Mönch.)

pinnatum Lour. 30. A. foliis impari - pinnatis ſub - 4jugis ovato - oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis. *Cochinchina.*

1465. LUXEMBURGIA Hilar.

octandra Hil. 1. L. foliis ſubſeſſilibus lineari - lanceolatis, floribus 8andris. *Braſil.*

polyandra Hil. 2. L. foliis petiolatis oblongis, floribus polyandris. *Braſil.*

1466. TROPAEOLUM.

* *Foliis ſimplicibus peltatis ſublobatis.*

minus 1. Tr. foliis peltatis orbiculatis ſubrepandis, nervis margine mucronatis, petalis acuminato - ſetaceis. *Peru.*

majus 2. Tr. foliis peltatis orbiculatis repandis, nervis margine petalisque obtuſis. *Peru.* (Tr. hybridum L. *ἀναμόρφωσις.*)

pinnatum Andr. 3. Tr. foliis peltatis reniformi - orbiculatis repandis, nervis apice mucronatis, petalis cuneatis crenato - inciſis. *Patria?*

pubeſcens Kunth. 4. Tr. foliis baſi truncatis obſolete acute 5lobis ſubtus pubeſcentibus, petalis lobato - 2ariſtatis calycem ſubaequantibus. *Peru.*

tuberoſum R. et P. 5. Tr. foliis baſi truncatis 5lobis glabris, petalis ſubdentatis calycem aequantibus, radice tuberoſa. *Peru.*

ciliatum R. et P. 6. Tr. foliis 5 - 7lobis, ſtipulis bracteisque ciliatis, petalis integerrimis calycem aequantibus. *Peru.*

bicolor R. et P. 7. Tr. foliis baſi truncatis 7lobis, petalis inciſo - ciliatis inaequalibus. *Peru.*

dipetalum R. et P. 8. Tr. foliis baſi truncatis 5lobis ſubtus glaucis, lobis obtuſis mucronatis, petalis duobus majoribus ſpathulatis inciſo - crenatis. *Peru.*

peregrinum 9. Tr. foliis palmatis, petalis omnibus lobatis fimbriatis, calcare recto corollam excedente. *Nov. Granat.*

aduncum Sm. 10. Tr. foliis ſubcordato - peltatis 5 - 7lobis ſubtus glaucis, lobis inciſis obtuſis, petalis majoribus lobatis, minoribus inciſo - fimbriatis, calcare adunco petala majora aequante. *Peru. Mexico.* (Tr. peregrinum Jacq. Ker. Kunth.)

** *Foliis compoſitis.*

pentaphyllum Lam. 11. Tr. foliis quinato - digitatis, foliolis oblongis acutis integerrimis, petalis omnibus ſeſſilibus acutis calyce brevioribus ſubintegerrimis. *Monte Video.*

polyphyllum Cav. 12. Tr. foliis deno - digitatis, foliolis obovatis ſubdentatis oblongisque integerrimis, petalis unguiculatis ſpathulatis calyce longioribus integerrimis. *Chili.*

1467. MAGALLANA Cav.

porifolia Cav. *Patagonia.* Herba ſcandens foliis Spartitis linearibus pellucido-punctatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis luteis.

1468. JEFFERSONIA Bart.

diphylla Perſ. *Amer. bor.* Herba acaulis, pedunculis radicalibus 1floris, floribus albis, foliis cordatis 2lobis ſubtus glaucis. (Podophyllum diphyllum L.)

1469. OENOTHERA.

* *Fructibus cylindricis ſ. prismaticis aequalibus.*

† *Floribus flavis.*

biennis 1. Oen. caule herbaceo erecto ramoſo hirſutiusculo, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus ſeſſilibus ſubſpicatis, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, capſulis ſubcylindricis apice 4dentatis. *Amer. bor.* (Oen. muricata Murr., gauroides Horn.)

parviflora 2. Oen. caule herbaceo ſubvilloſo, foliis lanceolatis dentatis, floribus ſeſſilibus ſubſpicatis, ſtaminibus corolla longioribus, capſulis cylindricis apice 8dentatis. *Amer. bor.*

grandiflora Ait. 3. Oen. caule ſuffruticoſo glabro ramoſo, foliis oblongis ſubpetiolatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, petalis ampliſſimis integerrimis, ſtaminibus declinatis, capſulis ſubcylindricis hirſutiusculis. *Amer. bor.* (Oen. ſuaveolens Perſ.)

longiflora Jacq. 4. Oen. caule herbaceo hirto, foliis caulinis ſeſſilibus ovato-oblongis nervoſo-venoſis denticulatis utrinque villoſis, petalis 2lobis, capſulis ſeſſilibus ſubcylindricis hirtis. *Buenos Ayres.*

corymboſa Lam. 5. Oen. caule ſtricto hiſpido ſulcato, foliis lanceolatis ſubpetiolatis repando-dentatis, floribus ſubaggregatis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla brevioribus, capſulis ſubcylindricis abbreviatis hirtis apice 4lobis. *Mexico.* (Oen. ſpectabilis Horn.)

villoſa Thunb. 6. Oen. caule herbaceo ramoſo hirto, foliis ſubpetiolatis lanceolatis denticulatis villoſis, floribus ſeſſilibus, capſulis cylindricis lanatis. *C. B. S.*

† *albicans* Lam. 7. Oen. caule villoſo, foliis lanceolatis glaucis dentatis, floribus ſeſſilibus, petalis dentatis, capſulis cylindricis apice 4dentatis. *Peru.*

nocturna Jacq. 8. Oen. caule herbaceo foliisque lanceolatis repando-dentatis nervoſis pubeſcentibus, petalis rotundatis, capſulis cylindricis. *Patria?* (Oen. ſtriata Ledeb.)

ſinuata 9. Oen. caule ramoſo piloſo, foliis ſubpetiolatis oblongis ſinuato-dentatis glabriusculis, floribus ſeſſilibus, capſulis cylindrico-prismaticis hirſu-

tis apice 4lobis. *Amer. bor. auſtr.* (Oen. laciniata Hill., proſtrata R. et P.)

odorata Jacq. 10. Oen. caule herbaceo ramoſo, foliis lanceolatis ſemiamplexicaulibus undulatis calloſo-denticulatis, petalis emarginatis, capſulis cylindricis ſulcatis villoſiuſculis. *Patagon.* (Oen. undulata Dryandr.)

ſerrulata Nutt. 11. Oen. caule ſuffruticoſo humili, foliis oblongo-linearibus ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus, petalis integris ſtamina ſuperantibus, capſula prismatica gracili ſeſſili. *Amer. bor.*

tenuifolia Cav. 12. Oen. caule herbaceo erecto ramoſo, foliis linearibus integerrimis, floribus ſeſſilibus, petalis crenulatis ſtamina ſuperantibus, capſulis tereti-prismaticis. *Chili.* (Oen. ſtrigoſa W. herb. Nee?)

dentata Cav. 13. Oen. caule fruticoſo ramoſo, foliis linearibus denticulatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, ſtaminibus corolla brevioribus, capſulis gracilibus 4gonis. *Chili.* (Oen. Chamiſſonis Link.)

micrantha Horn. 14. Oen. caule ramoſo proſtrato hirto, foliis ſubpetiolatis lanceolatis denticulatis hirſutis, floribus ſeſſilibus minutis, capſulis curvatis angulatis. *California.* (Oen. hirta Link.)

cheiranthifolia Horn. 15. Oen. caule ramoſiſſimo aſcendente hirſuto, foliis ſeſſilibus ſpathulatis obtuſis ſubintegerrimis villoſis, floribus ſeſſilibus, capſulis curvatis angulatis acutis hirſutis. *Chili.*

minima Pursh. 16. Oen. caule ſimplici 1floro, foliis lanceolatis integerrimis piloſis, floribus hirſutis exiguis, capſulis prismaticis. *Georgia.*

†† *Floribus violaceis aut albis.*

purpurea Curt. 17. Oen. caule glabro ſubramoſo, foliis lanceolatis acutiuſculis glauceſcentibus integerrimis, floribus ſeſſilibus, capſulis angulatis ſulcatis. *Amer. bor. ora occid.*

Romanzovii Ledeb. 18. Oen. caule ramoſo incano-pubeſcente, foliis lanceolatis acutiuſculis glauceſcentibus ſubintegerrimis, floribus ſeſſilibus, capſulis cylindricis cano-tomentoſis. *Amer. bor. ora occid.*

tenella Cav. 19. Oen. caule herbaceo ſimplici erecto, foliis ſpathulatis ſubvilloſis integerrimis, floribus axillaribus, antheris alternis ſeſſilibus corolla brevioribus, capſula ſubprismatica ſericea. *Chili.*

humifuſa Nutt. 20. Oen. caule proſtrato ramoſo villoſo, foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis ſericeis, floribus ſeſſilibus, petalis obcordatis ſtamina aequantibus. *Florida.*

albicaulis Fraſ. 21. Oen. caule ſimpliciuſculo erecto albido, foliis lineari-lanceolatis ſubſerrulatis ſubtus villoſiuſculis, petalis integris. *Louiſiana.*

molliſſima 22. Oen. caule herbaceo villoſiuſculo, foliis lanceolatis acuminatis denticulatis ſubundulatis glabriuſculis, capſula teretiuſcula ſulcata hirſuta apice 4loba. *Buenos Ayres.* (Oen. nocturna W. herb.)

pubescens W. herb. 23. Oen. caule simplici erecto, foliis oblongo-lanceolatis obsolete dentatis pubescentibus, capsulis curvatis cylindricis sericeo-villosis. *Amer. austr.* Humb.

pinnatifida Nutt. 24. Oen. caule decumbente pubescente, foliis radicalibus subintegerrimis, caulinis pinnatifidis linearibus, petalis obcordatis stamina superantibus, capsula prismatica sulcata. *Ad fl. Missuri.*

** *Fructibus obovatis s. clavatis.*

† *Floribus flavis.*

fruticosa 25. Oen. caule basi ramoso, ramis divaricatis pubescentibus, foliis lanceolatis acutis subdentatis, petalis obcordatis, capsulis pedicellatis clavato-oblongis angulatis. *Virginia.* (Oen. tetragona Roth.)

glauca Mx. 26. Oen. glaberrima ramosa, foliis oblongis utrinque attenuatis glaucescentibus obsolete denticulatis, floribus terminalibus subracemosis, petalis emarginatis, capsula pedicellata obovata 4gona. *Amer. bor.*

Fraseri Pursh. 27. Oen. caule simpliciusculo glabro superne ramoso, foliis ovatis petiolatis glanduloso-denticulatis, floribus racemosis, capsula pedicellata obovata 4gona. *Carolin. austr.*

ambigua Nutt. 28. Oen. caule simplici piloso, foliis ovato-lanceolatis acutis subdenticulatis punctatis, laciniis calycinis abbreviatis, capsula subsessili clavata 4alata. *Pensylvan.*

chrysantha Mx. 29. Oen. caule debili pubescente, foliis lanceolatis obtusiusculis integerrimis, laciniis calycinis tubum excedentibus, capsula sessili clavata 4angula. *Amer. bor.*

riparia Nutt. 30. Oen. caule ramoso glabro, foliis lineari-lanceolatis acutis nitidiusculis remote denticulatis, floribus racemosis, capsula pedicellata obovata 8angula alata. *Carolin. bor.*

macrocarpa Pursh. 31. Oen. caule caespitoso, foliis longe petiolatis lanceolatis glanduloso-denticulatis margine nervisque sericeo-albidis, floribus sessilibus, calycis tubo longissimo, petalis obcordatis, capsula amplissima coriacea compressa 4alata. *Louisiana.* (Oen. missurensis Sims., alata Nutt.)

hybrida Mx. 32. Oen. caule erecto villoso, foliis lanceolatis undulatis remote subdentatis utrinque pubescentibus, capsula pedicellata obovato-4gona. *America bor.*

incana Bart. 33. Oen. caule erecto foliisque oblongis integerrimis incano-hirsutis, floribus racemosis, capsula subsessili obovato-oblonga 4angula. *Mariland.*

multicaulis R. et P. 34. Oen. caule colorato, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, floribus secundis, petalis calycem aequantibus, capsulis clavatis 8gonis. *Peru.* (Oen. aurantia W. herb.)

aſcendens W. herb. 35. Oen. caule debili aſcendente ramoſo, foliis lanceolatis dentatis pubeſcentibus, capſulis ſeſſilibus clavatis curvatis. *Amer. auſtr.* Humb.

linearis Mx. 36. Oen. caule pubeſcente, foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis ſubintegerrimis hirſutis, floribus terminalibus aggregatis, capſula pedicellata clavata 4gona villoſa. *Carolina.*

pumila 37. Oen. caule aſcendente ſuperne glanduloſo-pubeſcente, ramis flexuoſis, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis, capſula ſubſeſſili obovata 4gona. *Amer. bor.*

puſilla Mx. 38. Oen. caule ſimpliciuſculo erecto, foliis lanceolatis obtuſiuſculis integerrimis, capſula clavato-turbinata 8gona. *Amer. bor.*

rhizocarpa * 39. Oen. acaulis, foliis lanceolatis elongatis glabris baſi pinnatifidis repando-denticulatis, floribus radicalibus ſeſſilibus, tubo calycis longiſſimo, petalis integris ſtamina aequantibus, capſula ovata 4alata reticulata. *Louiſiana.* Nuttall.

†† *Floribus albis vel rubris.*

caeſpitoſa Sims. 40. Oen. acaulis, foliis oblongo-lanceolatis inciſo-denticulatis decurrentibus, pedunculis radicalibus 1floris, tubo calycis longiſſimo, petalis obcordatis, capſula oblonga, valvarum marginibus criſtato-muricatis. *Ad fl. Miſſuri.* (Oen. ſcapigera Pursh.)

acaulis Cav. 41. Oen. caule abbreviato pubeſcente, foliis lyrato-pinnatifidis hirſutiuſculis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, petalis rotundatis ſtamina ſuperantibus, capſula obovata 4angula. *Chili.* (Oen. grandiflora R. et P.)

tetraptera Cav. 42. Oen. caule herbaceo, foliis lanceolatis baſi pinnatifido-dentatis, petalis emarginatis, capſula pedicellata obovata 4alata. *Nov. Hiſpan.*

ſpecioſa Nutt. 43. Oen. caule ſuffruticoſo, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſerratis nervoſis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſubracemoſis, petalis obcordatis ſtamina aequantibus, capſulis obovatis angulatis. *Louiſiana.*

roſea Ait. 44. Oen. caule ramoſo pubeſcente, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubdentatis glabris, capſula pedicellata obovata 4angula glabriuſcula. *Peru.* (Oen. rubra Cav.)

ſubulata R. et P. 45. Oen. caule ſuffruticoſo villoſo, foliis ſubulatis, floribus ſeſſilibus, petalis 2fidis, capſula clavata 8angula ſuperne alata. *Chili.*

virgata R. et P. 46. Oen. caule decumbente radicante, ramis virgatis, foliis lyratis lanceolatisque dentatis, floribus ſubracemoſis, capſula pedicellata clavata 8angula. *Peru.*

1470. JUSSIEVA.

* *Floribus octandris.*

villoſa Lam. 1. J. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus integerrimis utrinque villoſis, capſulis ſubſeſſilibus ſtriatis. *Ind. or. Molucc. Cochinchina.* (J. ſuffruticoſa L. Epilobium fruticoſum Lour.)

caryophyllea Lam. 2. J. caule herbaceo ramoſo ſuperne angulato, foliis petiolatis lanceolatis integerrimis glabris, capſulis ſubſeſſilibus turbinatis abbreviatis. *Ind. or.*

† *tetragona* * 3. J. caule herbaceo 4gono, foliis ſubſeſſilibus lineari-lanceolatis integerrimis glabris, capſulis cylindricis elongatis. *China. Cochinchina.* (Epilobium tetragonum Lour.)

hirta 4. J. caule ſuffruticoſo hirſuto, foliis petiolatis oblongis utrinque attenuatis parallele venoſis villoſis, floribus pedunculatis amplis, capſulis turbinatis villoſiſſimis. *Ind. occid.*

octonervia Lam. 5. J. caule herbaceo foliisque lanceolatis integerrimis venoſis glabris, petalis emarginatis, capſulis elongatis cylindricis 8nerviis glaberrimis. *Ind. occ.* (J. octovalvis Sw. Oenothera L.)

acuminata Sw. 6. J. caule herbaceo ſubangulato ſuperne hirſutiusculo, foliis oblongis utrinque attenuatis venoſis glabriusculis, capſulis elongatis hirſutis 8nerviis. *Ind. occid. Braſil.* (J. ſcabra W.)

erecta 7. J. caule herbaceo 4gono foliisque lanceolatis petiolatis venoſis glaberrimis, petalis calycem ſubaequantibus, capſulis cylindricis. *Ind. or. et occ. Virgin. Carolina.* (J. anguſtifolia Lam., nervoſa Poir., paluſtris Meyer.)

inclinata 8. J. caule baſi radicante, foliis petiolatis obovatis, floribus pedunculatis. *Surinam.*

ſagittata Poir. 9. J. caule ſub-4gono glabro, foliis ſeſſilibus oppoſitis lineari-ſagittatis integerrimis, capſulis ſeſſilibus ſubgloboſo-4gonis. *Hiſpaniola.*

linifolia Vahl. 10. J. caule herbaceo glabro angulato, foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis integerrimis, capſulis ſeſſilibus teretibus gracilibus. *Amer. auſtr.*

linearis W. 11. J. caule tereti glabriusculo, foliis linearibus elongatis capſulisque teretibus hiſpidis. *Guinea.*

ſubacaulis Pursh. 12. J. caule glabro repente, foliis lineari-lanceolatis repando-dentatis, floribus pedunculatis. *Ad fl. Miſſuri.*

ſedoides Humb. 13. J. caule ſimplici herbaceo, foliis ſpathulatis congeſtis apice dentatis ſubcarnoſis petiolatis, capſulis elongatis. *Amer. auſtr.*

natans Humb. 14. J. caule natante glabro, foliis ſuborbiculatis ſubdentatis glabris, petiolis tuberculatis, floribus longe pedunculatis, capſulis elongatis. *Nov. Granat.*

** *Floribus decandris.*

grandiflora Mx. 15. J. radice repente, caule ſuffruticoſo hirſuto, foliis ſpathulato-lanceolatis ſubſeſſilibus glabriusculis, pedunculis calycibusque villoſis. *Carolina. Georgia.*

peruviana 16. J. caule ſuffruticoſo, foliis ſeſſilibus oblongis integerrimis ſcabris, pedunculis apice 2bracteatis, capſulis ſubclavatis. *Lima.*

montevidenſis * 17. J. caule herbaceo aſcendente ſuperne hirſuto, foliis longe petiolatis oblongis venoſis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis medio 2bracteatis. *Monte Video.* Sello.

pubeſcens 18. J. caule ſuffruticoſo hirto, foliis lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis ſubſeſſilibus hirſutis, pedunculis ſubebracteatis calycibusque hirſutis. *Amer. auſtr.*

leptocarpa Nutt. 19. J. caule herbaceo ſimplici angulato hirſuto, foliis lanceolatis glabriusculis utrinque attenuatis, floribus ſeſſilibus, capſulis teretibus gracilibus. *Ad fl. Miſſiſippi.*

variabilis Meyer. 20. J. caule aſcendente glabro, foliis ſubpetiolatis lanceolatis obſolete ſerratis, pedunculis apice 2bracteatis, capſulis 4gonis. *Guinea.*

repens 21. J. caule repente aſcendente glabro herbaceo, foliis ſubſpathulatis integerrimis petiolatis, capſulis pedunculatis teretiusculis. *Ind. or. occid.* (J. aſcendens L. Cuboſpermum paluſtre Lour.)

1471. EPILOBIUM.

* *Petalis integris, ſtigmate 4fido ſubdeclinato.*

anguſtiſſimum Ait. 1. E. foliis linearibus eveniis ſubintegerrimis. *Alp. Europ.* (E. anguſtifolium Lam., rosmarinifolium Hänk., Halleri Retz.)

anguſtifolium 2. E. radice repente, caule glabro, foliis lineari-lanceolatis integerrimis venoſis glabris. *Europa. Amer. bor. China.* (E ſpicatum Lam., latifolium Schmidt.)

latifolium 3. E. foliis oblongo-lanceolatis ſubintegerrimis eveniis incano-pubeſcentibus, floribus amplis. *Regio arctica.* (In Aſia boreali et inſulis Aleutis glabreſcit: E. humile W. herb.)

** *Petalis emarginatis ſ. obcordatis, ſtigmatibus rectis.*

† *Stigmate 4fido.*

hirſutum 4. E. caule tereti ramoſo villoſo, foliis oblongis ſemiamplexicaulibus utrinque attenuatis denticulatis ſubtus hirſutis, floribus amplis. *Europ. Aſia et Amer. bor.* (E. amplexicaule Lam., tomentoſum Vent., incanum Perſ.)

molle Lam. 5. E. caule tereti villoſo, foliis lanceolatis ſeſſilibus denticulatis pubeſcentibus, floribus corymboſis,

petalis calycem ſuperantibus. *Europ. Afr. auſtr.* (E. villoſum Thunb., parviflorum Schreb., pubeſcens Roth.)

virgatum Lam. 6. E. caule erecto tereti pubeſcente, foliis ſeſſilibus oppoſitis oblongo-lanceolatis denticulatis glabris, floribus axillaribus breviter pedunculatis. *Ager romanus.* (E. lanceolatum Sebaſt.)

junceum Forſt. 7. E. caule tereti fiſtuloſo ſuperne incano pubeſcente, foliis ſeſſilibus lanceolatis acutis denticulatis glabriuſculis, calycibus acuminatis corollam ſubſuperantibus. *Nov. Zeeland. Amer. auſtr.* (E. denticulatum R. et P.)

luteum Pall. 8. E. caule 4gono glabro, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſerrulatis, pedunculis axillaribus elongatis, calycibus corollam aequantibus. *Inſ. Aleut.*

montanum 9. E. caule tereti glabro, foliis ovato-oblongis acutis ſubſeſſilibus dentatis. *Europ. Caucaſ.*

ſtrictum Mühlb. 10. E. caule ſtricto foliisque linearibus venoſis integerrimis venoſis, floribus axillaribus, capſulis gracilibus incano-villoſis. *Penſylvan.*

†† *Stigmate indiviſo.*

alſinifolium Vill. 11. E. radice repente, caule aſcendente 4gono glabro, foliis ſubpetiolatis ovato-oblongis denticulatis. *Europ. med. Scotia. Caucaſ.* (E. origanifolium Lam., algidum M. B.)

alpeſtre Schmidt. 12. E. caule teretiuſculo glabro, foliis ternis quaternis ſeſſilibus oblongis denticulatis glabris, floribus ſubracemoſis, petalis calycem ſuperantibus. *Europ. med.*

roſeum Schreb. 13. E. caule obſolete 4gono ſubpubeſcente, foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis, petalis calycem ſubaequantibus. *Europ. humida.* (E. Otites Hofmannsegg. in W. herb.?)

glabellum Forſt. 14. E. caule teretiuſculo aſcendente, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris, floribus axillaribus. *Nov. Zeeland.*

coloratum Mühlb. 15. E. caule tereti glabro, foliis petiolatis lanceolatis denticulatis venoſis, ramis ſuperne incano-pubeſcentibus, petalis calycem ſubſuperantibus. *Amer. bor.*

alpinum 16. E. caule baſi repente aſcendente paucifloro, foliis elliptico-ſubrotundis ſubintegerrimis ſubſeſſilibus. *Europ. et Amer. bor.* (E. anagallidifolium Lam., pumilum Perſ., nutans fl. dan.)

tetragonum 17. E. caule ſub-4gono glabro, foliis anguſte lanceolatis ſerrulatis ſeſſilibus, floribus racemoſis. *Europ. et Amer. bor.* (E. trigonum Hortul., flaccidum Brot., Chamaenerion obſcurum Schreb.)

paluſtre 18. E. caule tereti pubeſcente, foliis linearibus ſubintegerrimis. *Europ. et Amer. bor.*

davuricum Fiſch. 19. E. caule tereti ſuperne pubeſcente, foliis linearibus obſolete denticulatis, floribus racemoſis minutis. *Davuria.*

ſquamatum Nutt. 20. E. radice bulboſa ſquamata, caule tereti ramoſo incano-pubeſcente, foliis linearibus integerrimis ſubrevolutis, floribus minutis. *Penſylvan.* (E. lineare Mühlb., rosmarinifolium Pursh., oliganthon Mx.?)

*** *Dubium.*

rotundifolium Forſt. 21. E. foliis oppoſitis ſubrotundis denticulatis. *Nov. Zeeland.*

1472. GAURA.

biennis 1. G. caule herbaceo elato villoſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis denticulatis, floribus racemoſis. *America bor.*

mutabilis Cav. 2. G. caule ſuffruticoſo pubeſcente, foliis petiolatis ovatis dentatis, floribus ſpicatis. *Nov. Hiſpan.* (Oenothera anomala Curt.)

fruticoſa Jacq. 3. G. caule fruticoſo glabro, foliis lineari-lanceolatis denticulatis, floribus racemoſis. *Amer. auſtr.*

chinenſis Lour. 4. G. caule ſuffruticoſo 4gono hiſpido, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus, floribus racemoſo-ſpicatis. *China auſtr.*

tripetala Cav. 5. G. caule herbaceo hirſuto, foliis lanceolatis denticulatis, floribus ſpicatis 3petalis 6andris. *Mexico.*

coccinea Fraſ. 6. G. caule herbaceo ſericeo, foliis lineari-lanceolatis ſubdenticulatis, floribus laxe racemoſis. *Louiſiana.*

1473. FUCHSIA.

* *Foliis ternis oppoſitisque.*

coccinea 1. F. foliis ſubcordato-ovatis denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris nutantibus. *Chili. Patagonia.* (F. magellanica Lam.)

macroſtemma R. et P. 2. F. foliis ovatis ſubſinuato-dentatis, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus 4gonis. *Chili.*

decuſſata R. et P. 3. F. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis utrinque pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris, ramis decuſſatis ſublanatis. *Peru.*

denticulata R. et P. 4. F. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis ſubtus villoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Peru.*

ſerratifolia R. et P. 5. F. foliis oblongis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus abbreviatis 1floris. *Peru.*

lycioides Andr. 6. F. foliis ternis oppoſitis ſubfaſciculatis oblongis integerrimis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis patentibus, calycibus reflexis. *Chili. Amer. bor. ora occid.?* (F. roſea R. et P.?)

ovalis R. et P. 7. F. foliis ternis oppoſitisque amplis ovalibus pubeſcentibus ſupra nitidis, pedunculis axillaribus racemoſis folioſis. *Peru.*

corymbiflora R. et P. 8. F. foliis ſubternis oppoſitisque oblongo-lanceolatis ſubintegerrimis pubeſcentibus, floribus corymboſis, petalis acutis. *Peru.*

ſimplicicaulis R. et P. 9. F. foliis ſubquaternis lineari-lanceolatis obſolete denticulatis, pedunculis terminalibus quaternis 1floris involucratis, calycibus pubeſcentibus. *Peru.*

** *Foliis alternis ſparſisque.*

excorticata 10. F. foliis ovato-oblongis obſolete denticulatis ſubtus albidis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus campanulatis patentibus. *Nov. Zeeland.* (Skinnera Forſt.)

apetala R. et P. 11. F. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus discoloribus, floribus corymboſis apetalis. *Peru.*

1474. MEMECYLON.

edule Roxb. 1. M. foliis oblongis nitidis, umbellis corymboſis. *Ind. or.*

cordatum Lam. 2. M. foliis cordatis ſubamplexicaulibus integerrimis retuſis, umbellis pedunculatis compoſitis ſubgloboſis. *Inſ. Mascaren.*

capitellatum 3. M. foliis oblongis integerrimis obtuſiusculis petiolatis, umbellis capitatis axillaribus ſubſeſſilibus. *Ceylon.*

tinctorium W. 4. M. foliis ovato-oblongis petiolatis, corymbis axillaribus. *Ind. or.*

grande Retz. 5. M. foliis ovatis acuminatis integerrimis, corymbis axillaribus pedunculatis. *Ind. or.*

1475. MARLEA Roxb.

begonifolia Roxb. *Bengal. China auſtr.* Frutex ramoſus, foliis alternis inaequaliter ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus cymoſis abbreviatis, floribus luteis. (Stylidium chinenſe Lour.)

1476. RHIZOPHORA.

Mangle 1. Rh. foliis oblongis acutiusculis eveniis glaberrimis coriaceis, ramis radicantibus, pedunculis 2-3fidis, fructibus clavato-ſubulatis. *Ind. or. et occ.*

mucronata Lam. 2. Rh. foliis ovatis obtuſis mucronatis ſubtus venoſis punctatis, pedunculis dichotomis. *Inſ. Mascaren.*

racemoſa Meyer. 3. Rh. foliis obovatis obſolete venoſis ſubtus ſcabris, pedunculis dichotomis. *Guiana.*

cylindrica 4. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis ſub-1floris, fructibus cylindricis obtuſis. *Inſ. Molucc.*

Candel 5. Rh. foliis obtuſis, pedunculis 2geminis folio longioribus, fructibus ſubulatis. *Ind. or.*

conjugata 6. Rh. foliis ovato-oblongis obtufiusculis, floribus feffilibus, fructibus cylindrico-fubulatis. *Ind. orient.*

1477. DAPHNE.

* *Floribus lateralibus.*

Mezereum 1. D. floribus feffilibus fubternis pubefcentibus, laciniis corollae ovatis acutis, foliis lanceolatis bafi attenuatis glaberrimis. *Europ. Afia boreal.* (D. Liottardi Vill.)

Laureola 2. D. racemis axillaribus paucifloris nutantibus, floribus glabris bracteatis, laciniis corollae obtufis, foliis lanceolatis bafi attenuatis glaberrimis. *Europ. med.*

pontica 3. D. pedunculis elongatis 2floris, floribus ebracteatis glabris, laciniis corollae lanceolatis longe acuminatis, foliis obovato-lanceolatis glaberrimis. *Afia minor.*

triflora Lour. 4. D. capitulis 3floris feffilibus congeftis, involucro 3phyllo, foliis lanceolatis fubpetiolatis. *China auftr.*

pendula Sm. 5. D. capitulis multifloris longiffime pedunculatis nutantibus, involucro diphyllo, corollae fericeae laciniis ovatis acutis, foliis lanceolatis glabris. *Java.* (Scopolia compofita L. fuppl.)

involucrata Wall. 6. D. capitulis multifloris pedunculatis erectis, floribus fericeis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolatis fubtus glaucefcentibus. *Ind. or.*

Gardneri Wall. 7. D. capitulis multifloris pedunculatis globofis fericeis, laciniis corollae fubrotundis alternis crenulatis, foliis lanceolatis petiolatis fubtus villofis. *Nepal.*

mexicana * 8. D. capitulis multifloris pedunculatis fericeis nudis, laciniis corollae obtufis, foliis lanceolatis obtufiusculis petiolatis utrinque glaberrimis. *Mexico.* (D. falicifolia Kunth.)

ceftrifolia Kunth. 9. D. capitulis multifloris pedunculatis pubefcentibus, corollae fericeae laciniis acutis, foliis obovato-lanceolatis fubcoriaceis utrinque glabris. *Nov. Granat.*

** *Floribus terminalibus.*

tinifolia Sw. 10. D. floribus terminalibus aggregatis fubracemofis, pedunculis fub-3fidis, corollae villofae laciniis obtufis, foliis fpathulato-oblongis glabris. *Jamaica.*

Gnidium 11. D. floribus paniculatis congeftis fericeis, laciniis corollae obtufis, foliis confertis lineari-lanceolatis acuminato-cufpidatis. *Europ. auftr. Afric. bor.*

indica 12. D. floribus congeftis feffilibus fericeo-pubefcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis oppofitis oblongis acutiusculis glabris. *China.*

Inſ. Amicorum. Nov. Holl. (D. foetida Forſt. Capura purpurata L.)

rotundifolia Forſt. 13. D. floribus congeſtis ſeſſilibus ſericeo-pubeſcentibus, laciniis corollae obtuſis, foliis oppoſitis ſubrotundis petiolatis glabris, ramis incano-tomentoſis. *Inſ. Amicorum.*

odora Thunb. 14. D. floribus aggregatis ſeſſilibus glabris, laciniis corollae cordato-ovatis obtuſis, foliis confertis oblongis glabris nitidis. *Japon.*

chinenſis Lam. 15. D. floribus aggregatis breviſſime pedunculatis ſubpubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis ſeſſilibus oblongis glabris nitidis. *China.* (D. odora Lour.)

cannabina Lour. 16. D. floribus umbellatis, laciniis corollae ovatis, foliis oblongo-lanceolatis oppoſitis. *Cochinchina. Nepal.*

occidentalis Sw. 17. D. floribus umbellatis dioecis incano-villoſis, laciniis lanceolatis acutis, foliis lanceolatis ſubtus incanis pubeſcentibus. *Jamaica.*

alpina 18. D. floribus aggregatis ſeſſilibus ſericeo-pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acutis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis ſubtus obſolete lanatis. *Alp. Europ. med.*

altaica Pall. 19. D. floribus aggregatis ſubſeſſilibus glabris, laciniis corollae ovatis obtuſis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis mucronatis glabris. *Sibir.*

Cneorum 20. D. floribus aggregatis ſeſſilibus extus incano-pubeſcentibus, laciniis corollae obtuſis, foliis ſubſpathulato-linearibus ſeſſilibus mucronulatis glabris. *Montes Europ. med.*

ſtriata Trattin. 21. D. floribus aggregatis ſeſſilibus glabris ſtriatis, laciniis corollae acutis, foliis ſubſpathulato-linearibus ſeſſilibus mucronulatis glabris. *Helvet. Hungar.*

glomerata Lam. 22. D. floribus glomerato-faſciculatis glabris, laciniis corollae acuminatis, foliis obovatis nitidis utrinque glabris. *Caucaſ.* (D. comoſa Adam.)

collina Sm. 23. D. floribus faſciculatis ſericeo-lanatis, laciniis corollae obtuſis, foliis ſpathulatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus ſubpiloſis. *Italiae colles.*

buxifolia Vahl. 24. D. floribus aggregatis villoſis, laciniis corollae obtuſiuſculis, foliis obovatis opacis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus. *Aſia minor.*

ſericea Vahl. 25. D. floribus aggregatis villoſis, laciniis corollae obtuſis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis ſupra glabris ſubtus villoſis. *Creta. Aſia minor.* (D. oleaefolia Lam.)

oleoides Schreb. 26. D. floribus geminis ſericeo-pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis lanceolatis utrinque glabris. *Creta. Caucaſ.*

jaſminea Sm. 27. D. floribus geminis glabriuſculis, foliis ſpathulatis glabris, caule ramoſiſſimo depreſſo. *Graecia.*

glanduloſa Bertol. 28. D. floribus ſubternis, foliis oblongis obtuſis ſubtus glanduloſo-punctatis. *Apennin.*

ſalicifolia Lam. 29. D. floribus aggregatis ſeſſilibus pubeſcentibus, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, foliis li-

neari-lanceolatis obtufis mucronatis utrinque glabris. *Caucaf.* (D. caucafica Pall.)

macrophylla Kunth. 30. D. capitulis multifloris pedunculatis congeftis, floribus fericeo-hirfutis, laciniis acutis, foliis oblongis coriaceis fubtus pubefcentibus. *Quito.*

anomala Kunth. 31. D. capitulis multifloris pedunculatis, floribus fericeis dioecis, laciniis acutis, foliis obovato-oblongis utrinque glabris. *Nov. Granat.*

1478. GNIDIA.

** Foliis anguftis.*

pinifolia 1. Gn. foliis linearibus fubulatis patulis glabris, floralibus fublanceolatis, floribus capitatis villofis, fquamis petaloideis hirfutis lacinias corollae fubaequantibus. *C. B. S.* (Gn. radiata Wendl.)

imberbis Dryand. 2. Gn. foliis lineari-triquetris acutis glabris, floralibus fublanceolatis, floribus capitatis villofis, fquamis octonis imberbibus minutis. *C. B. S.* (Gn. pinifolia Wendl. fimplex Andr.)

fimplex 3. Gn. foliis linearibus acutis concavis, floralibus capitulum aequantibus, fquamis quaternis corollisque glabris. *C. B. S.*

juniperifolia 4. Gn. foliis linearibus fubulatis ramisque glaberrimis, floralibus fimilibus, floribus fubgeminis glabris. *C. B. S.* (Gn. pinifolia L. fuppl., acerofa Gmel.)

biflora Thunb. 5. Gn. foliis lanceolatis carinatis acutis patulis ramisque glabris, floralibus linearibus, floribus lateralibus fubgeminis glabris, laciniis corollae acutis. *C. B. S.* (Gn. carinata Thunb. prodr.? acutifolia Wikftr.)

fcabra Thunb. 6. Gn. foliis linearibus obtufis fubtus convexis ramisque villofiusculis, floribus aggregatis villofis, laciniis oblongis obtufis. *C. B. S.*

linoides Wikftr. 7. Gn. foliis oppofitis feffilibus lineari-lanceolatis fubulatis glabris fubtus 3nerviis, floribus folitariis terminalibus fericeis, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Pafferina Thunb.)

nana Wikftr. 8. Gn. foliis fparfis feffilibus linearibus obtufis fubtus convexis glabriusculis, floribus terminalibus aggregatis villofis 4andris, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Struthiola Thunb.)

*** Foliis latioribus.*

oppofitifolia 9. Gn. foliis oppofitis oblongo-lanceolatis acutis glabris, floribus aggregatis terminalibus pubefcentibus, laciniis corollae oblongis obtufis. *C. B. S.* (Gn. laevigata Thunb., Pafferina laevigata L., Nectandra Berg.)

racemofa Thunb. 10. Gn. foliis fpathulato-lanceolatis glabris confertis, floribus fubracemofis villofis, laciniis corollae minutis obtufis. *C. B. S.*

ftricta Wikftr. 11. Gn. foliis minutis oblongis acutiusculis utrinque fubvillofis, ramulis brevibus rigidis verrucofis,

floribus terminalibus aggregatis pubefcentibus, laciniis corollae linearibus obtufis. *C. B. S.* (Pafferina Thunb.)

fetofa Wikftr. 12. Gn. foliis fparfis lanceolatis acutis fubtus 5nerviis glabris, floribus terminalibus fafciculatis extus fetofis, laciniis corollae oblongis obtufis. *C. B. S.* (Pafferina Thunb.)

virefcens Wikftr. 13. Gn. foliis fparfis oblongis obtufis pubefcentibus, floribus terminalibus fubaggregatis villofis, laciniis corollae lanceolatis obtufiusculis. *C. B. S.* (Pafferina anthylloides α. Thunb.)

tomentofa 14. Gn. foliis fparfis ovalibus margine fcabris glabriusculis, floribus terminalibus aggregatis villofis, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.*

argentea Thunb. 15. Gn. foliis obovatis fubmucronatis argenteo-villofis, floribus terminalibus aggregatis villofis, laciniis corollae obtufis. *C. B. S.*

fericea 16. Gn. foliis obovatis confertis ramisque villofiusculis, floribus terminalibus aggregatis fericeo-villofis, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (Pafferina L. Nectandra Berg.)

imbricata L. fil. 17. Gn. foliis oblongis obtufis utrinque villofis fubtus nervofis, floribus aggregatis fericeis, laciniis corollae lanceolatis acuminatis. *C. B. S.*

filamentofa L. fil. 18. Gn. foliis ovalibus glaberrimis, floribus capitatis villofo-hirfutis, laciniis corollae lanceolatis acuminatis, genitalibus exfertis. *C. B. S.* (Gn. glauca Sims., Lachnaea buxifolia Lam., glauca Salisb.)

1479. PASSERINA.

* *Foliis anguftis.*

annua Wikftr. 1. P. caule glabro ramofo, foliis fparfis linearibus patulis, floribus axillaribus fubfolitariis incano-pubefcentibus, laciniis corollae conniventibus. *Europ. med. Caucaf. Afric. bor.* (Stellera Pafferina L.)

uniflora 2. P. caule fuffruticofo glabro, foliis oppofitis feffilibus linearibus acutis erectis glaberrimis, fuperioribus fublanceolatis, floribus terminalibus folitariis fericeis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.*

laxa L. fil. 3. P. ramis laxis tenuibus pilofis, foliis fparfis feffilibus linearibus acutis glabris, fuperioribus lanceolatis obtufiusculis pubefcentibus, floribus terminalibus aggregatis hirfutiusculis, corollae tubo medio coarctato, laciniis obtufiusculis fubconniventibus. *C. B. S.* (P. tenuiflora W. ?)

linearifolia Wikftr. 4. P. ramulis verrucofis, foliis fparfis feffilibus linearibus obtufis fubtus convexis, floribus terminalibus villofis, laciniis corollae lato-lanceolatis acutis. *C. B. S.*

filiformis 5. P. ramis fubtomentofis, foliis lineari-fubulatis fubtus convexis glabris appreffis, floribus axillaribus pubefcentibus, laciniis corollae patentibus acutiusculis. *C. B. S.*

eriocephala Thunb. 6. P. ramis virgatis glabriusculis, foliis oppositis linearibus obtusiusculis glabris patulis, floribus terminalibus aggregatis bracteatis dense lanatis, laciniis corollae lanceolatis patentibus. *C. B. S.* Lachnaea L. Andr., P. cephalophora Thunb.)

conglomerata Thunb. 7. P. ramulis flexuosis, foliis 4fariam imbricatis linearibus truncatis, floribus terminalibus conferte capitatis bracteatis lanatis, laciniis corollae obtusis. *C. B. S.* (Lachnaea L.)

capitata 8. P. ramis strictis, foliis sparsis linearibus erectis glabris, capitulis terminalibus pedunculatis villosis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.*

thesioides Wikstr. 9. P. ramis pubescentibus, foliis sparsis linearibus obtusis glabris, floribus axillaribus subgeminis pubescentibus, laciniis corollae obtusiusculis. *Hispan.* (Daphne Lam.)

corifolia Wikstr. 10. P. ramis laxis pubescentibus, foliis sparsis linearibus obtusiusculis glabris, floribus axillaribus solitariis pubescentibus 2bracteatis, laciniis corollae obtusis. *Hispan.* (Daphne coridifolia Lam. D. pubescens L.)

calycina Cand. 11. P. ramis divaricatis, foliis confertis linearibus acutis subtus convexis nitidis, floribus axillaribus subsolitariis breviter pedunculatis dioecis 2bracteatis, laciniis corollae obtusis. *Pyren.* (Daphne Lapeyr.)

† *nivalis* Ram. 12. P. ramis prostratis, foliis linearibus obtusiusculis carnosis subciliatis, floribus axillaribus dioecis glabris bracteatis. *Pyren.* (Daphne calycina Lam. Pass. juniperifolia *β.* Lapeyr.)

nitida Desf. 13. P. foliis subfasciculatis linearibus obtusiusculis utrinque sericeis, floribus aggregatis pubescentibus basi ventricosis. *Afr. bor.* (Daphne nitida Vahl., argentata Lam.)

** *Foliis latioribus.*

dioeca Ram. 14. P. ramis verrucosis, foliis confertis cuneiformibus glabris, floribus axillaribus subsolitariis dioecis basi squamatis glabris, laciniis corollae acutis. *Alp. cott. pyren.* (P. empetrifolia Lapeyr., Daphne dioeca Gouan., calycina Berger.)

tinctoria Pourr. 15. P. ramis sublanatis, foliis lineari-lanceolatis obtusis abbreviatis tenuissime lanatis, floribus axillaribus subsolitariis 2bracteatis glabris, laciniis corollae acutis. *Gallia narbon. Hispan. Lusit.* (P. hirsuta Ass. Brot. Daphne vermiculata Vahl.)

hirsuta 16. P. ramis laxis pendulis tomentosis, foliis ovatis obtusis subtus glabris supra albo-tomentosis, floribus aggregatis sessilibus villosis subdioecis, laciniis corollae obtusis. *Europ. austr. Afric. bor.*

striata Lam. 17. P. ramis pilosiusculis, foliis oppositis lanceolatis acutis glabris subtus striatis, floribus axillaribus subaggregatis pedunculatis pubescentibus, laciniis corollae lanceolatis acutis. *C. B. S.* (P. nervosa Thunb.)

18.

Thymelaea Cand. — 18. P. ramis strictis glabris, foliis sparsis oblongo-lanceolatis mucronatis glaucis, floribus axillaribus sessilibus glabriusculis, laciniis corollae acuminatis. *Gallia austr. Hispan.* (Daphne L.)

Tartonraira Schrad. — 19. P. foliis spathulato-oblongis nervoso-venosis incanis sericeo-tomentosis, floribus axillaribus glomeratis dioecis villosis basi squamatis, laciniis corollae obtusis. *Gallia austr. Italia.* (Daphne L.)

Stelleri Wikstr. — 20. P. caulibus caespitosis glabris, foliis sparsis lanceolatis obtusiusculis glabris, floribus capitato-racemosis 10andris glabris, laciniis corollae obtusis. *Sibir.* (Stellera Chamaejasme L.)

racemosa Wikstr. — 21. P. caule annuo ramoso, foliis sparsis spathulato-lanceolatis brevissime petiolatis glabris, floribus racemosis laevibus, tubo corollae articulato, laciniis conniventibus minutis linearibus. *Sibir.* (Stellera altaica Pers.?)

ericoides — 22. P. ramulis tomentosis, foliis oblongis obtusis subtus convexis carinatis glabris, floribus axillaribus solitariis subpubescentibus, laciniis corollae orbiculatis. *C. B. S.*

rigida Wikstr. — 23. P. ramis rigidis, foliis 4fariam imbricatis ovatis obtusis subtus glabris, floribus axillaribus solitariis pubescentibus, laciniis corollae obtusis. *C. B. S.*

globosa Lam. — 24. P. foliis imbricatis obovatis sericeo-villosis, floribus aggregatis dioecis villosis. *C. B. S.*

ciliata — 25. P. ramis superne pubescentibus, foliis sparsis oblongo-lanceolatis obtusiusculis ciliatis glabriusculis, floribus axillaribus solitariis sericeis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.*

villosa — 26. P. ramis pilosis, foliis oblongis obtusis floribusque axillaribus villosis, laciniis corollae obtusis. *Europ. austr. Asia minor.* (Daphne villosa L., tomentosa Lam., orientalis W.)

Lessertii Wikstr. — 27. P. ramis superne villosis, foliis oblongis obtusiusculis utrinque pubescentibus, floribus racemosis villosis, laciniis corollae lanceolatis obtusis. *Persia.*

virgata Desf. — 28. P. ramis virgatis foliisque alternis lanceolatis villosis, floribus axillaribus aggregatis sessilibus, laciniis corollis ovatis obtusis. *Afric. bor.*

canescens Schousb. — 29. P. ramis lanatis, foliis imbricatis ovatis acutis utrinque lanuginosis, floribus terminalibus aggregatis villosis dioecis, laciniis corollae obtusis. *Hispan. austr. Afric. bor.*

Thunbergii Wikstr. — 30. P. ramulis pubescentibus semi-amplexicaulibus oppositis oblongis obtusis utrinque villosiusculis, floribus terminalibus subgeminatis sericeis, laciniis corollae acutis. *C. B. S.* (Gnidia oppositifolia Thunb.)

grandiflora L. fil. — 31. P. foliis oppositis oblongis obtusis glabris subtus convexis, floribus terminalibus solitariis sessilibus campanulatis sericeis, laciniis corollae oblongis obtusis. *C. B. S.*

ſpicata L. fil. 32. P. ramis ſtrictis, foliis imbricatis ſubellipticis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus pubeſcentibus, laciniis corollae patentibus obtuſis. *C. B. S.*

anthylloides L. fil. 33. P. ramis ſuperne villoſiſſimis, foliis imbricatis oblongis obtuſis ſubtus villoſis, floribus terminalibus capitatis 10andris. *C. B. S.*

1480. DIRCA.

paluſtris *Amer. bor.* Frutex ſuborgyalis, foliis obovato-oblongis glabris integerrimis, floribus gemmaceis ſubternis nutantibus ochroleucis. Eximia ligni tenacitas appellationem *Leatherwood* genuit.

1481. DODONAEA.

viſcoſa 1. D. foliis obovato-oblongis obtuſis baſi attenuatis viſcoſis, floribus racemoſis. *Ind. occid. Africa occid.*

ſpathulata Sm. 2. D. foliis ſpathulato-linearibus viſcidis, floribus racemoſis dioecis. *Inſ. ocean. auſtr.*

microcarpa Cand. 3. D. foliis ſpathulato-linearibus ſubemarginatis laevibus, floribus racemoſis, fructibus pedicello brevioribus. *Inſ. Maſcaren.*

cuneata Sm. 4. D. foliis ſpathulatis acutiuſculis mucronatis apice ſub-3dentatis, junioribus viſcoſis, pedunculis ſubaggregatis abbreviatis. *Nov. Holl.* (D. oblongifolia Link.)

aſplenifolia Rudg. 5. D. foliis ſpathulatis apice 3dentatis viſcoſis, ramis 3quetris, floribus ſubracemoſis. *Nov. Holl.*

triquetra Andr. 6. D. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, ramis 3gonis, floribus axillaribus cymoſis dioecis. *Nov. Holl. Ind. or.* (D. dioeca Roxb.)

eriocarpa Sm. 7. D. foliis oblongo-lanceolatis undulatis, ramulis fructibusque piloſis, ſepalis reflexis. *Inſ. Sandwich.*

Burmanniana Cand. 8. D. foliis oblongo-lanceolatis obtuſiuſculis baſi attenuatis viscoſis, floribus terminalibus paucis. *Ind. or.* (D. anguſtifolia Roxb.)

bialata Kunth. 9. D. foliis lanceolatis utrinque attenuatis viſcoſis, racemis compoſitis, fructibus bialatis. *Nov. Granat.*

jamaicenſis Cand. 10. D. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſubviſcoſis, ramis triquetris ſquamuloſis, floribus ſubracemoſis. *Jamaica. Hiſpaniola.* (D. elaeagnoides Rud., anguſtifolia Sw., ſalicifolia Cand.)

1482. LLAGUNOA R. et P.

nitida R. et P. 1. Ll. foliis ovatis acutis ſerratis baſi ſub-3lobis glabris, pedunculis 3fidis. *Peru.* (Amirola Perſ.)

prunifolia Kunth. 2. Ll. foliis ovato-ellipticis argute dentatis ſubtus pubeſcentibus. *Peru.*

mollis Kunth. 3. Ll. foliis ellipticis ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus tomentoſis. *Peru.*

1483. Stadmannia Lam.

*pubescens** 1. St. foliis impari-pinnatis bijugis, foliolis obtusissimis pubescentibus, petiolo communi tomentoso. *Ind. or.* (Schleichera Roth.)

*trijuga** 2. St. foliis abrupte pinnatis 3jugis, foliolis oblongis obtusis subundulatis glabriusculis, floribus fasciculato-racemosis. *Ceylon. Ins. Molucc.* (Schleichera W., Melicocca Juss.)

Sideroxylon Cand. 3. St. foliis impari-pinnatis sub-4jugis, foliolis alternis acutis oblongis nitidis, racemis paniculatis terminalibus. *Ins. Mascaren. Molucc.*

*diversifolia** 4. St. foliis abrupte pinnatis 2- vel 7jugis, foliolis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus glomeratis. *Ins. Mascaren.* (Melicocca Juss.)

1484. Pierardia Roxb.

dulcis Jack. *Sumatra.* Arbor foliis alternis obovatis, floribus racemosis flavis.

1485. Valentinia Sw.

ilicifolia Sw. Frutex 3pedalis, foliis alternis ovato-lanceolatis coriaceis undulato-spinosis, floribus umbellatis coccineis. *Cuba. Hispaniola.*

1486. Cedrota Schreb.

longifolia W. *Guiana. Martinica.* Arbor excelsa, foliis oppositis lanceolatis elongatis integerrimis, floribus paniculatis viridibus. (Aniba guianensis Aubl.)

1487. Baccaurea Lour.

ramiflora Lour. 1. B. ramis floriferis, foliis oblongis fructibusque glabris. *Cochinchina.*

cauliflora Lour. 2. B. trunco basi florifero, foliis oblongis fructibusque glabris. *Cochinchina.*

sylvestris Lour. 3. B. ramis floriferis, foliis oblongis subtus pubescentibus, fructibus tomentosis. *Cochinchina.*

1488. Shepherdia Nutt.

argentea Nutt. 1. Sh. foliis oblongis obtusis utrinque argenteo-lepidotis. *Ad fl. Missuri.* (Hippophaë Pursh.)

canadensis Nutt. 2. Sh. foliis oblongis supra glabriusculis subtus stellato-pubescentibus rufo-lepidotis. *Canada.* (Hippophaë L.)

1489. Aspidistra Ker.

lurida Ker. *Patria?* Herba acaulis, foliis lanceolatis nervosis, floribus radicalibus solitariis fuscis. (Macrogyne convallariaefolia Link.)

1490. POPULUS.

graeca Ait. 1. P. foliis bafi truncato-fubcordatis acutis appreffo-ferratis fubtus candicantibus ramisque glaberrimis. *Graecia. Inf. maris aegei.*

candicans Ait. 2. P. foliis cordatis ovatis acuminatis inaequaliter ferratis fubtus albidis reticulato-venofis, petiolis hirfutis, gemmis refinofis. *Canada.* (P. canadenfis et latifolia Mönch.)

balfamifera 3. P. foliis ovatis acuminatis appreffo-ferratis fubtus albidis reticulato-venofis, gemmis refinofis. *Amer. bor. Sibir.* (P. Tacamahaca Mill.)

heterophylla 4. P. foliis fubauriculato-cordatis ovatis obtufis uncinato-dentatis fubtus fubpubefcentibus, ramis teretibus. *Amer. bor.* (P. cordifolia Burgsd.)

angulata Ait. 5. P. foliis junioribus ampliffimis cordatis, adultis deltoideo-ovatis acuminatis obtufe uncinato-dentatis utrinque concoloribus glabris, ramis alato-angulatis. *Virgin. Florida.* (P. heterophylla du Roi, balfamifera Mill.)

laevigata Ait. 6. P. foliis fubcordatis deltoideo-ovatis inaequaliter ferratis bafi ad petiolum fupra 2glandulofis utrinque laevibus, ramis junioribus angulatis. *Amer. bor.* (P. canadenfis Mx.)

trepida W. 7. P. foliis fuborbiculatis acuminatis uncinato-dentatis ciliatis ad petiolum fupra 2glandulofis utrinque glabris, junioribus fericeis, petiolis compreffis, gemmis refinofis. *Amer. bor.* (P. tremuloides Mx.)

tremula 8. P. foliis fubrotundo-ovatis obtufiusculis repando-dentatis bafi eglandulofis utrinque glabris, juniorioribus pubefcentibus, petiolis compreffis. *Europ.*

nigra 9. P. foliis deltoideo-ovatis acuminatis glandulofo-dentatis utrinque glabris, petiolis fubcompreffis, gemmis refinofis. *Europ.*

dilatata Ait. 10. P. foliis lato-deltoideis acuminatis undique bafique crenulatis laevibus, petiolis compreffis, ramis erectis. *Italia.* (P. italica du Roi, faftigiata Desf., pyramidata Mönch.)

monilifera Ait. 11. P. foliis fubcordato-deltoideis acuminatis cartilagineo-uncinato-dentatis ciliatis, bafi fupra 2glandulofis utrinque glabris, petiolis compreffis, ramis teretibus. *Amer. bor.* (P. glandulofa et carolinenfis Mönch.)

betulifolia Pursh. 12. P. foliis rhomboideis acuminatis dentatis glabris, ramulis junioribus pilofis. *Ad lacus magnos Canadae.* (P. nigra et hudfonica Mx.)

†*grandidentata* Mx. 13. P. foliis fubrotundo-ovatis acutis inaequaliter finuato-dentatis glabris bafi glandulofis, junioribus villofis, petiolis fuperne compreffis. *Canada.*

†*marilandica* Bofc. 14. P. foliis amplis ovato-fubrotundis membranaceis crenatis utrinque glabris, petiolis compreffis, ramis ftriatis. *Marilandia.*

alba 15. P. foliis fubrotundis angulato-dentatis fubtus tomentofis. *Europ. Afia.* (P. nivea W. et canenefcens Sm., hybrida M. B.)

1491. GRUBBIA Berg.

rosmarinifolia Berg. *C. B. S.* Frutex ramofus, foliis oppofitis linearibus revolutis fubtus tomentofis, floribus axillaribus feffilibus albidis hirfutis. (Ophira ftricta L.)

1492. LAGETTA Juff.

lintearia Juff. *Ind. occid.* Arbor excelfa, libro textili, foliis alternis petiolatis fubcordato-ovatis integerrimis glabris, floribus racemofo-paniculatis albis. (Daphne Lagetto Sw.)

D I G Y N I A.

1493. SPALLANZANIA Pollin.

agrimonioides Pollin. *Italia.* Herba foliis interrupte pinnatis fuperioribus ternatis, floribus fubfolitariis luteis. (Agrimonia agrimonoides L. Aremonia Neck. Amonia Neftl.)

1494. CODIA Forft.

montana Forft. *Nov. Caledon.* Frutex foliis ellipticis coriaceis glabris, pedunculis axillaribus hirfutis, floribus capitatis parvis hirfutis lana fulva involutis.

1495. WEINMANNIA.

glabra L. fil. 1. W. foliis impari-pinnatis 6jugis glabris, foliolis obovato-ellipticis ferratis, petiolo communi alato articulato, articulis obovatis, ramis hirfutis, floribus fafciculatis racemofis. *Ind. occid.*

trichofperma Cav. 2. W. foliis impari-pinnatis 5jugis fupra nitidis fubtus ferrugineis, foliolis obovatis ferratis, petiolo communi alato articulato, articulis 4angulis, ramis hirfutis, floribus racemofis. *Chili.*

hirta Sw. 3. W. foliis impari-pinnatis fupra nitidis fubtus villofis, foliolis obovatis crenatis, petiolo communi alato articulato, articulis fubcordatis, ramis hirfutis, floribus verticillato-racemofis. *Jamaica.*

tomentofa L. fil. 4. W. foliis impari-pinnatis 6jugis fubtus tomentofis, foliolis ovalibus integerrimis, petiolo communi alato articulato, articulis ovalibus, floribus fpicato-racemofis. *Nov. Granat.*

trifoliata L. fil. 5. W. foliis ternatis glabris, foliolis ellipticis ferrulatis nervofis, petiolo filiformi, floribus paniculatis. *Afric. auftr.*

racemofa Forft. 6. W. foliis fimplicibus obovato-ellipticis crenatis utrinque glabris venofis, racemis fubgeminis fimplicibus. *Nov. Zeeland, Peru.* (W. ovata Cav.)

paniculata Cav. 7. W. foliis fimplicibus lanceolatis ferratis glabris fubtus glaucis, floribus paniculatis. *Chili.*

parviflora Forst. 8. W. foliis simplicibus oblongis acutis-uncinato-dentatis glabris, racemis paniculatis hirsutis. *Ins. societ.*

1496. MÖHRINGIA.

muscosa *Ad fontes Europ. med. et austr.* Plantula Arenariae forma, foliis linearibus oppositis, floribus pedunculatis solitariis albis.

1497. HERMESIA Humb.

castaneaefolia Humb. 1. H. foliis alternis lanceolatis mucronato-serratis utrinque glabris, floribus spicato-paniculatis. *Amer. austr.*

*banksiaefolia** 2. H. foliis oppositis lanceolatis mucronato-serratis subtus tomentosis, floribus capitatis. *Patria?*

1498. GALENIA.

linearis Thunb. 1. G. foliis linearibus, caule erecto. *Afric. austr.* (G. africana L.)

procumbens L. suppl. 2. G. foliis obovatis reflexis subcarnosis, caule procumbente. *Afric. austr.*

1499. MARATHRUM Humb.

foeniculaceum Humb. *Nov. Granat.* Planta singularis, tuberibus ad rupes inundatas fixa, foliis decompositis lineari-setaceis serrulatis, pedunculis vaginatis, floribus spathathaceis, antheris roseis.

TRIGYNIA.

1500. CARDIOSPERMUM.

* *Glandulae hypogynae rotundatae abbreviatae.*

Halicacabum 1. C. foliis 2ternatis inciso-dentatis caule fructibusque glabris. *India utraque.*

molle Kunth. 2. C. foliis 2ternatis inciso-dentatis caule fructibusque pubescentibus. *Ind. occid.* (C. microcarpon Kunth., pubescens Lag.)

loxense Kunth. 3. C. foliis 2ternatis crenatis subtus sericeo-canescentibus, ramis lanatis, capsulis pubescentibus. *Peru.*

Corindum 4. C. foliis 2ternatis subcordatis incisis obtusis subtus tomentosis. *Brasil.*

** *Glandulae hypogynae lineares elongatae.*

hirsutum W. 5. C. foliis 2ternatis inciso-dentatis glabriusculis, ramis hirsutis. *Afric. occid. Amer. austr.* (C. hispidum Kunth.)

grandiflorum Sw. 6. C. foliis 3ternatis incifis acuminatis fubtus fericeo-tomentofis, capfulis acuminatis tomentofis. *Jamaica.*

elegans Kunth. 7. C. foliis 2ternatis incifo-ferratis capfulisque fubglobofis glabris. *Peru.*

coluteoides Kunth. 8. C. foliis 2ternatis incifo-crenatis fubtus pubefcentibus, capfulis glabris. *Amer. auftr.* (C. macrophyllum Kunth.)

1501. URVILLEA Kunth.

ulmacea Kunth. 1. U. foliis ternatis fubtus pubefcentibus, foliolis ovatis acuminatis ferratis. *Amer. auftr.* (Kölreutera triphylla Perf.)

Berteriana Cand. 2. U. foliis ternatis fubtus glabriusculis, foliolis ovatis acuminatis irregulariter dentatis. *Amer. auftr.* Bertero.

1502. SERIANA Plum.

**Foliis ternatis.*

*Plumeriana** 1. S. foliolis oblongis obtufis repando-finuatis ramisque glabris. *Ind. occid.* (Paullinia Seriana L.)

finuata Schum. 2. S. foliolis oblongo-lanceolatis mucronato-dentatis bafi attenuatis fupra lucidis, ramis hirfutis. *Hifpaniola.*

mollis Kunth. 3. S. foliolis ovatis crenatis fericeis, extremo 3lobo, fructibus hirfutis. *Peru.*

emarginata Kunth. 4. S. foliolis ovatis oblongis emarginatis fubauriculatis, lateralibus apice obfolete crenatis, fructibus glabris. *Mexico.* (S. acapulcenfis Kunth.)

***Foliis biternatis.*

fpectabilis Schum. 5. S. foliolis obovato-oblongis integerrimis utrinque glabris, extremo retufo, petiolis alatis, fructuum alis bafi dilatatis. *Amer. auftr.*

mexicana W. 6. S. foliolis obovatis fubintegerrimis fubemarginatis glabris, petiolis alatis, caule aculeato, racemis compofitis. *Mexico.* (Paullinia L.)

lupulina Schum. 7. S. foliolis crenatis fubtus ferrugineis, terminali rhombeo, lateralibus ovatis, petiolis fubalatis, racemis fimplicibus. *Amer. auftr.*

*dubia** 8. S. foliolis obovato-oblongis lucidis mucronato-dentatis, petiolis fubalatis, racemis compofitis. *Portorico.*

divaricata Schum. 9. S. foliolis ovatis acutis integerrimis lucidis, petiolis nudis, paniculae ramis divaricatis. *Jamaica.* (Paullinia Sw.)

caracafana W. 10. S. foliolis oblongis lucidis remote dentatis, medio utrinque attenuato, lateralibus rotundatis, petiolis nudis, racemis paniculatis. *Cuba. Amer. auftr.* (Paullinia Jacqu. Ser. glabrata Kunth. offana et paucidentata Cand., lucida Schum.)

racemofa Schum. 11. S. foliolis ovatis acutis profunde ferratis, petiolis fubnudis, floribus racemofis. *Nov. Hifpan.*

pubescens Kunth. 12. S. foliolis ovato-oblongis obtusis submucronatis subintegerrimis subtus pubescentibus, petiolis nudis, ramis villosis. *Amer. austr.*

paniculata Kunth. 13. S. foliolis oblongis acuminatis crenatis glabris, axillis venarum subtus barbatis, racemis paniculatis, fructibus apice pubescentibus. *Amer. austr.*

oxyphylla Kunth. 14. S. foliolis ovato-oblongis cuspidatis remote serratis glabris, medio 3fido, fructibus glabriusculis. *Peru.*

angustifolia W. 15. S. foliolis lineari-lanceolatis acutis integerrimis, petiolis alatis, racemis simplicibus. *Ind. occid.* (Paullinia mexicana Jacqu.)

**** Foliis triternatis.*

triternata W. 16. S. foliolis ovato-oblongis obtusis repandis, petiolis submarginatis, racemis paniculatis. *Ind. occ.* (Paullinia 3ternata L., diversifolia Jacqu.)

***** Foliis pinnatis.*

† *australis** 17. S. foliis impari-pinnatis 6jugis pilosis, petiolo interrupte alato. *Nov. Holl.* (Dodonaea pinnata Sm.)

parviflora Kunth. 18. S. foliis impari-pinnatis, foliolis 3jugis, lateralibus ternatis ovato-oblongis crenato-serratis mucronatis subtus pubescentibus. *Amer. austr.*

heterophylla Cand. 19. S. foliis inferioribus 2jugis, superioribus 2ternatis, foliolis ovatis subdentatis glabris, petiolis apice subalatis. *Amer. austr.* Bertero.

1503. PAULLINIA.

** Foliis ternatis.*

Cururu 1. P. foliolis ovali-oblongis obtusis mucronato-dentatis, petiolo alato, fructibus pyriformibus mucronatis. *Ind. occid.*

riparia Kunth. 2. P. foliolis oblongis acutis grosse serratis nitidis, petiolo alato, fructibus pyriformibus. *Amer. austr.*

nitida Kunth. 3. P. foliolis oblongis acutis crenatis lucidis, petiolo nudo, fructibus pyriformibus. *Amer. austr.*

turbacensis Kunth. 4. P. foliolis oblongis acuminatis dentatis nitidis, petiolo nudo, fructibus pyriformibus villosissimis. *Nov. Granat.*

nodosa Jacqu. 5. P. foliolis ovatis subdentatis glabris, medio obovato, petiolo nudo, racemis nodosis. *Ins. Antill.*

densiflora Sm. 6. P. foliolis ovatis subserratis, petiolis alatis, ramis triangulis, floribus thyrsoideis axillaribus. *Nov. Granat.*

*** Foliis biternatis.*

velutina Berter. 7. P. foliolis lanceolatis utrinque attenuatis dentatis capsulisque alatis tomentosis, petiolo nudo. *Nov. Granat.*

barbadensis Jacqu. 8. P. foliolis ovalibus subintegerrimis coriaceis, petiolo submarginato, capsulis ovatis villosiusculis. *Ins. Carib.*

curassavica 9. P. foliolis oblongis obtusis repando-dentatis, medio basi attenuato, petiolo marginato, capsulis subrotundo-ovalibus. *Ind. occid.*

carthagenensis Jacqu. 10. P. foliolis obovato-oblongis crenatis nitidis, petiolo superne marginato, ramis inermibus sulcatis glabris. *Ind. occid.* (P. 3ternata Kunth.)

caribaea Jacqu. 11. P. foliolis obovato-oblongis apice dentatis, petiolis marginatis, ramis aculeatis. *Ins. Carib. Amer. austr.*

pubescens Kunth. 12. P. foliolis ovato-oblongis acutis dentatis subtus villoso-tomentosis, petiolis submarginatis. *Amer. austr.* (P. mollis Kunth.?)

*** *Foliis pinnatis.*

cupanifolia Rich. 13. P. foliis bijugis glaberrimis, foliolis sessilibus ovato-oblongis remote crenatis, petiolo superne marginato. *Guiana.*

connarifolia Rich. 14. P. foliis bijugis glabris coriaceis subtus ferrugineis, foliolis sessilibus ovatis mucronatis subintegerrimis, petiolo nudo, pedunculis ecirrhosis. *Guiana.* (P. rufescens Rich.)

fibulata Rich. 15. P. foliis bijugis subcoriaceis subtus ferrugineo-tomentosis, foliolis subpetiolatis ovatis denticulatis, pedunculi cirrhis incrassatis fibuliformibus. *Guiana.*

pinnata 16. P. foliis bijugis glabris, foliolis oblongis elongatis remote dentatis, petiolis marginatis, capsulis pyriformibus sub-3cornibus. *Ind. occid. Brasil. Afric. aequinoct.* (P. macrophylla Kunth.)

Vespertilio Sw. 17. P. foliis bijugis nitidis glabris, foliolis oblongis acutis remote dentatis, petiolis nudis, capsulis alatis. *Ins. Carib.*

tetragona Aubl. 18. P. foliis sub-2jugis integerrimis, petiolis nudis, capsulis subalatis, caule 4gono. *Guiana.*

acutangula Pers. 19. P. foliis 2jugis, foliolis ovato-oblongis acuminatis dentato-serratis, capsulis obovatis triangulo-alatis. *Peru.* (Semarillaria R. et P.)

obovata Pers. 20. P. foliis 2jugis, foliolis lanceolatis serratis, capsulis obovatis. *Peru.* (Semarillaria R. et P.)

tomentosa Jacqu. 21. P. foliis 2jugis capsulisque obovatis tomentosis, foliolis ovato-rhombeis repandis obtusis, petiolo marginato. *Ind. occid.*

senegalensis Juss. 22. P. foliis 2jugis, foliolis sessilibus ovatis remote crenatis, petiolis marginatis, caule angulato subtomentoso, capsulis ovatis 3gonis. *Senegambia.*

Cupana Kunth. 23. P. foliis 2jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acuminatis crenato-serratis coriaceis, capsulis ovatis acutis. *Ad Orinocum.*

sphaerocarpa Rich. 24. P. foliis 2jugis glabris, foliolis subsessilibus ovatis remote crenatis obtusiusculis, capsulis globosis laevibus. *Guinea.*

subrotunda Pers. 25. P. foliis 2jugis, foliolis oblongis apice serratis, capsulis subrotundis. *Peru.* (Semarillaria R. et P.)

pteropoda Cand. 26. P. foliis 2jugis villosis, foliolis ovatis dentatis, petiolis marginatis, capsulis subglobosis 3sulcis. *Mexico.*

meliaefolia Juſſ. 27. P. foliis 3jugis ſubtus pubeſcentibus, foliolis ſubſeſſilibus lanceolatis remote dentatis, capſulis pyriformibus apice 3alatis. *Braſil.*

ingaefolia Rich. 28. P. foliis 3jugis coriaceis glabris, petiolo apice marginato, ramis ſtriatis ſcabris. *Guiana.*

**** *Foliis bipinnatis aut ſupradecompoſitis.*

japonica Thunb. 29. P. foliis 2pinnatis, foliolis ovatis ternatis inciſis, petiolis marginatis, floribus paniculatis, caule herbaceo. *Japon.*

cauliflora Jacqu. 30. P. foliis 2pinnatis, foliolis ternatis, petiolis ſuperne marginatis, floribus corymboſo-capitatis. *Amer. auſtr.*

bipinnata Poir. 31. P. foliis 2pinnatis, foliolis ſubſeſſilibus ovatis apice ſubcrenatis, petiolis nudis ramisque ſubtomentoſis, capſulis alatis. *Braſil.*

hiſpida Jacqu. 32. P. foliis inferioribus 2pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis ſubſerratis, ramis angulatis hiſpidis, ſtipulis ovatis ciliatis, racemis aggregatis. *Amer. auſtr.*

thalictrifolia Juſſ. 33. P. foliis ſub-3pinnatis, petiolis divaricatis ſubmarginatis, foliolis minutis ovato-ſubrotundis angulatis, capſulis alatis. *Hiſpaniola. Braſil.*

polyphylla Schum. 34. P. foliis ſupradecompoſitis ſubtus villoſis, foliolis ovato-cuneatis apice crenatis, capſularum valvis obovatis. *Ind. occid.*

1504. SAPINDUS.

* *Petiolo communi alato.*

Saponaria 1. S. petiolo late alato, foliis 3jugis lanceolatis acuminatis. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.*

marginatus W. 2. S. petiolo ſuperne anguſte marginato, foliis 6jugis lanceolatis. *Georgia.* (S. Saponaria Mx.)

Forſythii Cand. 3. S. petiolo anguſte marginato, foliis 4jugis oblongis utrinque attenuatis coriaceis. *Inſ. Carib.*

ſtenopterus Cand. 4. S. petiolo anguſte marginato, foliis 4jugis lanceolatis acuminatis, panicula ramoſiſſima. *Hiſpaniola.*

** *Petiolo communi nudo.*

rigidus Ait. 5. S. foliis 3jugis ovato-oblongis acuminatis. *Ind. occid.*

inaequalis Cand. 6. S. foliis 4jugis inaequilateris ovato-oblongis acutis coriaceis nitidis, paniculae ramis divaricatis. *Guadalupa.* Bertero.

laurifolius Vahl. 7. S. foliis 3jugis ovato-oblongis acuminatis glabris, panicula laxa, petalis margine tomentoſis. *Malabaria.*

arboreſcens Aubl. 8. S. foliis 3jugis oblongis acutiuſculis venoſis, racemis axillaribus ſubſimplicibus. *Guiana. Afric. occid.* (S. ſenegalenſis Poir.)

tetraphyllus Vahl. 9. S. foliis bijugis oblongo-lanceolatis glabris, racemis ſubſimplicibus, petalis glabris. *Ind. or.*

ſalicifolius Cand. 10. S. foliis 2jugis lineari - lanceolatis acuminatis glabris, racemis compoſitis, petalis intus barbatis. *Inſ. Timor.*

angulatus Poir. 11. S. foliis 3jugis late ovatis obtuſis coriaceis lucidis ſubtus pubeſcentibus, fructibus dorſo angulato - carinatis. *Patria?*

longifolius Vahl. 12. S. foliis 5jugis lanceolatis glabris, racemis paniculatis, floribus extus tomentoſis. *Ind. or.*

emarginatus Vahl. 13. S. foliis ſub - 3jugis oblongis emarginatis ſubtus villoſis, paniculis ramoſiſſimis pubeſcentibus, petalis margine tomentoſis. *Ind. or.*

rubiginoſus Roxb. 14. S. foliis 4jugis oblongo - lanceolatis acutis ſubtus villoſis, paniculis terminalibus, petalis glabris. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (S. fraxinifolius Cand.)

fruteſcens Aubl. 15. S. foliis 7jugis oblongo - lanceolatis acuminatis glabris, racemis axillaribus. *Guiana.* (S. ſurinamenſis Poir.)

Mukoroſſi Gärtn. 16. S. foliis 6jugis ovato - lanceolatis membranaceis, fructibus globoſis. *Japon.*

Rarak Cand. 17. S. foliis 10jugis oblongis ſubfalcatis acutis membranaceis glaberrimis, floribus paniculatis glabris. *Inſ. Molucc. Cochinchina.*

† *abruptus* 18. S. foliis abrupte pinnatis lanceolatis integerrimis glabris, floribus racemoſis. *China auſtr.*

1505. PONAEA Schreb.

ſaponarioides W. *Guiana.* Arbor foliis abrupte pinnatis 8jugis inaequilateris oblongis, floribus ſpicato - paniculatis albidis. (Toulicia guianenſis Aubl.)

1506. TRAGOPYRUM M. B.

pungens M. B. 1. Tr. ramis rigidis ſubſpineſcentibus, foliis ſubſpathulatis mucronatis, vaginis ſubulatis internodio brevioribus, ſtylis baſi coalitis. *Sibir.*

lanceolatum M. B. 2. Tr. ramis divaricatis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, vaginis ſubulatis internodio brevioribus, ſtylis diſtinctis. *Sibir.* (Polygonum fruteſcens L.)

*glaucum** 3. Tr. ramis erectis ſtrictis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaucis, vaginis ſubulatis. *Sibir.*

grandiflorum M. B. 4. Tr. foliis ovato - oblongis acutis margine revolutis, vaginis lanceolatis internodia aequantibus, flóribus maximis. *Armenia.* (Polygonum grandiflorum W.)

buxifolium M. B. 5. Tr. foliis ſubrotundis mucronatis undulato-criſpis, vaginis ſubulatis internodio brevioribus. *Caucaſ. Sibir.* (Polygonum fruteſcens Güldenſt., criſpulum Sims., caucaſicum Hofm.)

*polygamum** 6. Tr. foliis ſpathulato - linearibus, vaginis lanceolatis internodio brevioribus, racemis filiformibus ramoſis, floribus polygamis, ſtylis diſtinctis. *Carolina.* (Polygonum polygamum Vent., parvifolium Nutt.)

1507. PEDICELLIA Lour.

oppositifolia Lour. *Cochinchina.* Arbor foliis lanceolatis oppositis integerrimis, floribus racemosis pallidis.

1508. BRÜNNICHIA Banks.

cirrhosa Gärtn. *Georgia. Inf. Baham.* Frutex scandens, foliis cordatis acutis, floribus racemosis secundis. (Rajania ovata Walt.)

1509. COCCOLOBA.

** Foliis coriaceis.*

uvifera 1. C. foliis suborbiculatis obtusissimis nitidis, racemis spicatis elongatis fructiferis nutantibus. *Ind. occid. Amer. austr.*

pubescens 2. C. foliis amplissimis cordato-subrotundis subsessilibus venosis rugulosis utrinque hirsutiusculis. *Ind. occid.*

excoriata 3. C. foliis cordato-oblongis acutiusculis glabris, racemis spicatis elongatis, ramis subexcoriatis. *Ind. occid.*

nivea Jacqu. 4. C. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis supra nitidis glabris, racemis spicatis erectiusculis. *Ind. occid.* (C. nitida Kunth.)

punctata 5. C. foliis ovato-oblongis acuminatis elongatis nitidis, spicis abbreviatis erectis, fructibus calyce coronatis. *Ind. occid.* (C. coronata Jacqu.)

diversifolia Jacqu. 6. C. foliis adultioribus subcordato-ovatis, junioribus ovato-oblongis integerrimis nitidis, racemis erectis. *Hispaniola*

flavescens Jacqu. 7. C. foliis cordato-oblongis obtusis mucronatis, racemis erectis. *Hispaniola.*

obtusifolia Jacqu. 8. C. foliis elliptico-oblongis obtusis, racemis erectis, fructibus pendulis. *Amer. austr.* (C. gracilis Kunth.)

microstachya W. 9. C. foliis ovatis obtusis inaequilateris glaberrimis, racemis abbreviatis nutantibus. *Ind. occid.* (C. parvifolia Poir.)

obovata Kunth. 10. C. foliis subcordato-obovatis acutis nitidis, racemis erectis fructiferis nutantibus. *Amer. austr.* (C. nutans Kunth.)

barbadensis Jacqu. 11. C. foliis subrotundo-ellipticis emarginatis undulatis glaberrimis, racemis erectis elongatis. *Inf. Carib. Amer. austr.*

emarginata Jacqu. 12. C. foliis subrotundis exciso-emarginatis. *Amer. austr.*

*brasiliensis** 13. C. foliis oblongis utrinque attenuatis obtuse serrulatis, vaginis truncatis approximatis, racemis erectis compositis. *Brasil.* Sello.

*** Foliis membranaceis.*

latifolia Lam. 14. C. foliis latissimis subrotundo-ovalibus basi attenuatis venosis. *Amer. austr.*

acuminata Kunth. 15. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, venis ſubtus petiolisque pubeſcentibus, racemis pendulis. *Nov. Granat.*

tenuifolia 16. C. foliis ſubrotundis utrinque ſubattenuatis, racemis erectis, fructibus 3gonis. *Jamaica.*

ſagittifolia Ort. 17. C. foliis ſubſagittatis ovato-oblongis, racemis axillaribus. *Peru. Braſil.* (C. ſagittata Poir. Polygonum acetoſaefolium Vent.)

1510. POLYGONUM.

**Floribus octandris.*

† *trigynis.*

α. *Floribus ſpicatis.*

Bistorta 1. P. caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovato-oblongis undulatis in petiolum decurrentibus. *Europae, Aſiae med.* et *Amer. bor. prata.* (P. bistortoides Pursh.)

ellipticum W. herb. 2. P. caule ſimpliciſſimo 1ſtachyo, foliis ſpathulato-ellipticis ſubtus hirſutiuſculis, inferioribus longe petiolatis, ſummis amplexicaulibus, ſtipulis laxis truncatis. *Ad fl. Lenam in Sibir. or.* Pall.

viviparum 3. P. caule ſimpliciſſimo 1ſtachyo, foliis lanceolatis. *Europ.* et *Aſiae med. alpes.*

ſetaceum Baldw. 4. P. caule erecto polyſtachyo, ſpicis geminis interruptis hirſutis, foliis lanceolatis, vaginis ciliatis. *Georgia.*

hirſutum Walt. 5. P. caule ſuberecto ramoſo rufo-hirto, foliis lanceolatis hirſutis, ſpicis filiformibus continuis. *Carolina auſtr.*

Loureirii Poir. 6. P. caule 4gono ſimplici, foliis ovato-lanceolatis glabris, ſpicis breviſſimis. *China auſtr.* (P. ciliatum Lour.)

odoratum Lour. 7. P. caule baſi repente, foliis lanceolatis glabris, ſpicis elongatis ſtrictis. *Cochinchina.*

acre Kunth. 8. P. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis lanceolatis ciliatis, ſpicis filiformibus. *Amer. auſtr.*

β. *Floribus racemoſis.*

mite Perſ. 9. P. caule foliato erecto, foliis lanceolatis elongatis, ſtipulis ciliatis, racemis paniculatis erectis terminalibus *Amer. bor.* (P. hydropiperoides Mx. barbatum Walt.)

tenuiflorum Presl. 10 P. caule glabro erecto, ſtipulis truncatis integerrimis, foliis lanceolatis maculatis glabris margine ſcabris, petiolis aſperis, racemis ramoſis elongagatis, pedunculis laevibus. *Sicil. Ind. or.* (P. nutans Roxb. in W. herb.)

punctatum Ell. 11. P. caule erecto ramoſo, foliis lanceolatis pellucido-punctatis, ſtipulis ciliatis, floribus faſciculato-racemoſis. *Amer. bor.*

tenerum * 12. P. caule ramoſo, foliis ſpathulatis glaucis, racemis filiformibus, pedicellis nutantibus. *Georgia.* (P. gracile Baldw.)

ſericeum Pall. 13. P. caule decumbente, foliis ovato-ellipticis ſupra villoſis ſubtus incano-ſericeis, ſtipulis acutis fiſſis, racemis laxis. *Sibir.*

ſcandens 14. P. caule herbaceo ſcandente, foliis cordato-ſagittatis acuminatis laevibus, racemis axillaribus, fructu alato. *Amer. bor.*

Fagopyrum 15. P. caule herbaceo erecto, foliis cordato-ſagittatis, fructibus 3quetris. *Japon. Sibir.*

emarginatum Roth. 16. P. caule herbaceo erecto, foliis cordato-ſagittatis, fructibus apice emarginatis 3quetris, angulis cartilagineis. *China.*

tataricum 17. P. caule herbaceo erecto, foliis cordato-haſtatis, fructibus oblongis 3quetris, angulis dentatis. *Tatar.*

Convolvulus 18. P. caule herbaceo volubili angulato, foliis cordato-ſagittatis, laciniis calycinis obtuſe carinatis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

dumetorum 19. P. caule herbaceo volubili laevi, foliis cordatis acuminatis, floribus carinato-alatis. *Europ. Aſia.*

cilinode Mx. 20. P. caule herbaceo ſcandente pubeſcente, ſtipulis baſi ciliatis, foliis cordatis, fructibus apteris. *Canada.*

corymboſum W. 21. P. foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus, ſtipulis minutis ciliatis, pedunculis glanduloſo-piloſis corymboſis. *Java.*

appreſſum Labill. 22. P. foliis ſubcordato-ſubrotundis acutiuſculis crenulatis, racemis axillaribus ſpicatis ſimplicibus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

γ. *Floribus glomeratis.*

ſagittatum 23. P. caule herbaceo retrorſum aculeato ſcandente, foliis ſagittatis, ſtipulis integerrimis lanceolatis, floribus glomeratis pedunculatis. *Amer. boreal. Sibir. Japon.*

chinenſe 24. P. caule angulato flexuoſo, foliis late ovato-oblongis acutis, ſtipulis lanceolatis, floribus racemoſo-faſciculatis. *Ind. or. China. Japon.*

brachiatum Lam. 25. P. caule flexuoſo ſuperne ſcabro, foliis baſi truncatis ovatis acutis, ſtipulis lanceolatis laceris, pedunculis aculeatis, glomerulis paniculatis. *Monte Video. Ind. or.*

δ. *Floribus paniculatis.*

multiflorum Thunb. 26. P. radice tuberoſa, caule angulato volubili, foliis cordatis acuminatis, panicula patentiſſima. *Japon.*

tamnifolium Humb. 27. P. caule fruticoſo volubili, foliis cordato-ovatis acutis glabris, ſtipulis truncatis glabris, pani-

culis axillaribus patulis. *Nov. Granat. Nov. Zeeland.* (Coccoloba auſtralis Forſt.)

elegans Tenor. 28. P. caule ſuffruticoſo flexuoſo, foliis oblongo-lanceolatis, ſtipulis ciliatis, floribus ſpicato-paniculatis. *Neapol.*

alpinum All. 29. P. caule ramoſo erecto, foliis ovato-lanceolatis glabris ciliatis, floribus racemoſo-paniculatis. *Italia. Helvetia.*

undulatum Murr. 30. P. caule ramoſo baſi pubeſcente, foliis lanceolatis undulatis ſupra ſcabris ſubtus piloſis, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.* (P. ciliatum W. herb. acidum Pall.)

diffuſum Pall. in W. herb. 31. P. caule diffuſe ramoſo hirſuto, foliis ovato-lanceolatis hiſpidis, ſtipulis truncatis laxis, floribus imbricato-paniculatis. *Sibir.*

divaricatum 32. P. caule ramoſiſſimo glabro, ramis divaricatis, foliis lanceolatis laevibus, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.*

ſalignum W. 33. P. caule ramoſo, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſtipuliſque ciliatis, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.*

acidulum W. 34. P. caule ramoſo, ramis divaricatis, foliis linearibus elongatis margine ſtipuliſque glaberrimis, floribus racemoſo-paniculatis. *Sibir.*

articulatum 35. P. caule herbaceo erecto, foliis linearibus anguſtiſſimis, ſtipulis truncatis integerrimis, paniculae ramis articulatis. *Amer. bor.*

haſtatum Murr. 36. P. caule decumbente herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis craſſiuſculis ſubhaſtatis glabris, ſtipulis abbreviatis truncatis, floribus glomerato-paniculatis terminalibus. *Sibir.* (P. craſſifolium W. rumicifolium Pall. in W. herb.)

coarctatum W. herb. 37. P. caule erecto foliiſque oblongo-lanceolatis glaberrimis, ſtipulis truncatis laxiuſculis, panicula coarctata. *Sibir. orient.*

ε. *Floribus axillaribus.*

aviculare 38. P. caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis margine ſcabris, ſtipulis paucinerviis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

Dryandri * 39. P. caule proſtrato, foliis eveniis. *Ind. or.* (P. elegans Dryand.)

arenarium Kit. 40. P. caule herbaceo angulato aſcendente diffuſo, foliis lineari-lanceolatis, ſtipulis laceris. *Hungaria.*

flagellare Bertol. Sebaſt. 41. P. caule ſuffruticoſo proſtrato, foliis lanceolato-linearibus, ſtipulis laceris, pedunculis flore longioribus. *Italia. Sicilia.* (P. litorale Link.)

Bellardi All. 42. P. caule herbaceo erecto ramoſo, foliis lanceolatis acutis, ſtipulis fiſſis laceris, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Italia. Tauria.* (P. patulum MB. geniculatum Poir.)

maritimum 43. P. caule fuffruticofo afcendente, foliis ellipticis fubcarnofis margine revolutis glaucis, ftipulis fiffis elongatis. *Europ. auftr. Amer. bor.* (P. glaucum Nutt.)

lacerum Kunth. 44. P. caule fuffruticofo erectiufculo, foliis lanceolatis, ftipulis elongatis integris lacerisque, floribus pedunculatis. *Peru. Monte Video.* (P. miferum W. herb.)

acetofum MB. 45. P. caule procumbente ramofo, foliis oblongo-lanceolatis glaucis, ftipulis abbreviatis fiffis fubdentatis. *Deferta maris cafpii.*

affine Steph. in W. herb. 46. P. caule erecto ramofo bafi fruticofo, foliis obovatis mucronatis, ftipulis laxis membranaceis laceris. *Sibir.*

erectum 47. P. caule erecto fimpliciufculo glabro, foliis ovali-oblongis petiolatis laevibus, ftipulis laceris. *Amer. bor.*

tenue Mx. 48. P. caule herbaceo gracili erecto ramofo, foliis linearibus acuminatis ftrictis, ftipulis tubulofis ciliatis, floribus alternis fubfolitariis. *Amer. bor.* (P. linifolium Mühl.)

Laxmanni Lepech. 49. P. caule herbaceo erectiufculo ramofiffimo, ramis patentibus, foliis lineari-lanceolatis ftrigofis, ftipulis late-ovatis villofiufculis, floribus pedunculatis aggregatis. *Sibir.* (P. davuricum W. herb.)

fetofum Jacq. 50. P. caule fuffruticofo erecto, foliis linearibus fubulatis, ftipulis ciliatis, floribus fubfolitariis. *Afia minor.*

herniarioides Delil. 51. P. caule fuffruticofo erecto, foliis fpathulatis abbreviatis, ftipulis ciliato-villofis, floribus pedunculatis fubaggregatis. *Aegypt.*

†† *Floribus octandris digynis.*

penfylvanicum 52. P. caule herbaceo erecto, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis margine fcabris, pedunculis glandulofo-hifpidis, floribus racemofo-fpicatis. *Amer. bor.*

acuminatum Kunth. 53. P. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis longiffime acuminatis ftrigofis, ftipulis ciliato-villofis, floribus fafciculato-fpicatis, bracteis longiffime ciliatis. *Amer. auftr.* (P. cufpidatum W. herb.)

ferrulatum * 54. P. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis acuminatis aculeato-ferrulatis, ftipulis approximatis fubmuticis, racemis fpicatis filiformibus. *Ind. or. Inf. Molucc. Madagascar.* (P. ferratum Poir.)

fcabrum Poir. 55. P. caule elato glabro, ramis patentibus, foliis lanceolatis margine fcabris, ftipulis longe barbatis, floribus racemofo-fpicatis. *Afric. bor.* (P. ferratum L.?)

56.

attenuatum R. Br. 56. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis elongatis pubescentibus, stipulis ciliatis petiolos aequantibus, spicis cylindricis strictis. *Nov. Holl.*

† *glandulosum* Poir. 57. P. foliis lanceolatis glabris margine scabris, stipulis campanulatis ciliatis, floribus subracemosis axillaribus terminalibusque, calycibus glandulosis. *Ad Fulgerias in Armorica.*

** *Floribus heptandris digynis.*

orientale 58. P. caule herbaceo hirsuto, foliis ovatis acuminatis ciliatis, stipulis subcampanulatis villosis, floribus racemoso-spicatis. *Asia media. Amer. bor. Nov. Holl.*

segetum Humb. 59. P. caule procumbente herbaceo, ramulis glandulosis, foliis lanceolatis acuminatis glabris, stipulis truncatis striatis, floribus racemoso-spicatis. *Nov. Granat.*

*** *Floribus hexandris,*

† *trigynis.*

barbatum 60. P. caule erecto herbaceo rufo, foliis lanceolatis subsessilibus supra scabris, stipulis longissime ciliato-setosis appressis, racemis spicatis terminalibus. *China. Japon.*

tomentosum W. 61. P. foliis ovato-oblongis acuminatis utrinque villoso-tomentosis, stipulis truncatis hispidis ciliato-setosis, spicis virgatis. *Ceylon.*

tinctorium Lour. Ait. 62. P. foliis ovatis acutiusculis oleraceis glabris, stipulis truncatis arctis ciliatis, spicis virgatis. *China austr.*

decipiens R. Br. 63. P. foliis lanceolatis acuminatis laevibus, stipulis ciliatis, spicis subfiliformibus. *Nov. Holl.*

floribundum Schlechtend. in W. herb. 64. P. caule erecto ramoso, ramis striatis, foliis oblongis acutis glaberrimis, stipulis laceris, racemis spicatis fastigiatis. *Sibir.* Pallas.

† † *Floribus hexandris digynis.*

Persicaria 65. P. foliis lanceolatis submaculatis, stipulis ciliatis, pedunculis laevibus, racemis spicatis oblongis erectis. *Europ. Asia. Amer. bor.* (P. incanum Schmidt. var. foliis subtus pubescentibus. P. nodosum Pers. alia varietas, spica subramosa.)

lapathifolium 66. P. foliis oblongo-lanceolatis scabris, stipulis truncatis, pedunculis asperis, racemis spicatis oblongis erectis. *Europ.* (P. pensylvanicum Curt.)

persicarioides Kunth. 67. P. caule erectiusculo glabro, foliis lanceolatis supra scabris, stipulis pilosiusculis striatis ciliatis, racemis gracilibus, pedunculis glabris, pedicellis aggregatis. *Mexico.*

Hydropiper 68. P. foliis lanceolatis undulatis glabris, ſtipulis ſubciliatis, ſpicis gracilibus laxis nutantibus. *Europ.*

ſalicifolium Brouſſ. Delil. 69. P. ramis patentibus, foliis lineari-lanceolatis elongatis glabris, ſtipulis ciliatis, racemis gracilibus erectis, floribus diſtantibus. *Inſ. Canar. Aegypt.*

glabrum W. 70. P. foliis lanceolatis acuminatis cauleque glaberrimis, ſtipulis truncatis integerrimis, ſpicis aggregatis virgatis, bracteis truncatis flores ſubimbricatos ſuperantibus. *Ind. or.*

minus Hudſ. 71. P. caule baſi repente, foliis lineari-lanceolatis ſubeveniis, ſtipulis ciliatis, ſpicis filiformibus erectiusculis. *Europ.* (P. ſtrictum All. anguſtifolium Roth.)

anguſtifolium Poir. 72. P. caule glabro, ramis divaricatis, foliis linearibus anguſtiſſimis, ſtipulis breviſſimis integerrimis, racemis axillaribus paucifloris. *Patria?*

equiſetiforme Sm. 73. P. caule ſuffruticoſo aſcendente, foliis oblongo-lanceolatis rigidiusculis glabris, ſtipulis ſtriatis lacero-capillaribus, racemis ſpicatis terminalibus elongatis, bracteis albidis villoſis. *Creta. Aegypt.*

incarnatum Ell. 74. P. caule herbaceo geniculato ſuperne glanduloſo, foliis lanceolatis ſupra pubeſcentibus, ſtipulis glabris, floribus faſciculato-paniculatis glanduloſis, pedunculis punctatis. *Carolina auſtr.*

arifolium 75. P. caule retrorſum aculeato angulato ſcandente, foliis haſtatis acuminatis ſcabris, ſtipulis ciliatis, floribus ſubracemoſis terminalibus glabris, pedunculis glanduloſo-hiſpidis. *Amer. boreal. Japon. Nov. Holland. Terra Diemen.* (P. ſtrigoſum R. Br.)

auſtrale * 76. P. caule glabro, foliis lanceolatis acuminatis elongatis pubeſcentibus, ſtipulis glabris ciliatis, floribus ſpicatis, pedunculis piloſis. *Nov. Holl.* (P. articulatum R. Br. auſtrale Perſ.?)

adenophorum * 77. P. foliis lanceolatis acuminatis elongatis ſubtus glanduloſis margine ſcabris, ſtipulis truncatis, ſpicis alternis cylindricis, pedunculis glabris. *Nov. Holl.* (P. glanduloſum R. Br.)

elatius R. Br. 78. P. caule ſcabriusculo, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis in petiolum decurrentibus, ſtipulis ciliatis, ſpicis alternis cylindricis, pedunculis bracteisque glanduloſo-pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

lanigerum R. Br. 79. P. foliis lanceolatis acuminatis lanatis, ſtipulis truncatis, ſpicis cylindricis alternis. *Nov. Holl.*

arcticum Pall. in W. herb. 80. P. caule baſi radicante erecto ramoſo herbaceo, foliis lanceolato-oblongis baſi attenuatis obtuſiusculis glaberrimis, ſtipulis abbreviatis laceris, racemis terminalibus, floribus polygamis. *Ad mare glaciale in Sibir.*

**** *Floribus pentandris,*

† *trigynis.*

ocreatum 81. P. foliis linearibus margine revolutis flaccidis pilosiusculis, stipulis amplis laxis truncatis, caule ramisque basi villosis, spicis confertis subracemosis. *Sibir.*

plebejum R. Br. 82. P. caule diffuso, foliis linearibus subsessilibus, stipulis fisso-ciliatis, floribus axillaribus subgeminis. *Nov. Holl.*

†† *Floribus pentandris digynis.*

virginianum 83. P. foliis amplis ovatis venosis acutis ciliatis, racemis elongatis filiformibus, floribus distantibus. *Amer. bor.*

amphibium 84. P. foliis oblongis glabris, spica oblonga. *Europ. Asia.* (Varietas terrestris folia habet acuminata pilosiuscula.)

coccineum Mühlb. W. 85. P. foliis ovato-oblongis stipulisque truncatis glabris, racemo spicato stricto, pedunculo hispidiusculo. *Amer. bor.* (Varietas terrestris habet folia acuminata.)

perfoliatum 86. P. caule retrorsum aculeato, foliis 3angulari-sagittatis subpeltatis, bracteis orbiculatis perfoliatis horizontalibus, floribus racemosis. *Ind. or. Japon.*

hispidum Kunth. 87. P. caule erectiusculo hirto, foliis ovato-oblongis acuminatis stipulisque glutinoso-hispidis, floribus racemoso-spicatis. *Nov. Granat.* (P. hirtum W. herb.)

† *viridiflorum* Poir. 88. P. foliis lineari-lanceolatis elongatis glabris, stipulis ovato-subulatis, floribus racemosis pendulis subbulbiferis. *Amer.?*

prostratum R. Br. 89. P. caule prostrato piloso, foliis lanceolatis margine scabris, stipulis ciliatis, spicis axillaribus pedunculatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

subsessile R. Br. 90. P. foliis lanceolatis elongatis pubescentibus subsessilibus, stipulis strigoso-ciliatis, spicis cylindricis pedunculatis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

filiforme Thb. 91. P. caule erecto strigoso, foliis ovatis petiolatis villosis, stipulis truncatis ciliatis, spicis filiformibus elongatis. *Japon.*

salsugineum M. B. 92. P. caule erecto ramosissimo, foliis lineari-subulatis, stipulis ciliatis, floribus axillaribus. *Ad Volgam. Caucas.*

***** *Floribus tetrandris.*

gracile R. Br. 93. P. caule erecto, foliis lanceolatis acuminatis glabris margine scabris pellucido-punctatis, stipulis ciliatis, spica filiformi rara nutante, floribus glandulosis. *Nov. Holl.*

****** *Floribus triandris.*

ramoſiſſimum Mx. 94. P. caule erecto ramoſiſſimo, foliis lanceolatis, ſtipulis laceris, floribus axillaribus aggregatis. *Amer. bor.*

TETRAGYNIA.

1511. VEREA Andr.

alternans * 1. V. foliis orbiculato-ſpathulatis integerrimis carnoſis, paniculae ramis alternis. *Arabia. C. B. S.* (Cotyledon orbiculata Forsk., alternans Vahl.)

nudicaulis * 2. V. foliis ſpathulato-ovatis ſubcrenatis, paniculae dichotomae ramis oppoſitis. *Aegypt. China?* (Cotyledon L. Calanchoë aegyptiaca et ſpathulata Cand.)

acutiflora Andr. 3. V. foliis lato-lanceolatis crenatis, floribus paniculatis, laciniis corollae acutis. *Ind. or.*

crenata Andr. 4. V. foliis obovatis duplicato-crenatis, floribus cymoſo-paniculatis. *Afric. occid.* (Calanchoë crenata Cand. Cotyledon Ait.)

lanceolata * 5. V. foliis lanceolatis apice ſerratis, floribus paniculatis villoſis. *Arabia.* (Cotyledon Forsk. Vahl.)

laciniata W. 6. V. foliis 3partitis, laciniis lanceolatis dentatis, ſuperioribus pinnatifidis integrisque linearibus, floribus cymoſis. *Ind. or.* (Cotyledon L. Calanchoë Cand.)

pinnata * 7. V. foliis quinato-pinnatis, foliolis obovatis crenatis, crenis filamentoſo-barbatis, floribus paniculatis pendulis. *Inſ. Mascaren.* (Cotyledon Lam. Bryophyllum calycinum Salisb.)

1512. DIAMORPHA Nutt.

puſilla Nutt. *Carolina bor.* Herba exilis ſucculenta, foliis teretibus alternis, floribus terminalibus cymoſis minutis. (Sedum puſillum Mx. Tillaea cymoſa Nutt.)

1513. ADOXA.

Moſchatellina *Europ. Caucaſ.* Herba tenera moſchum redolens, radice bulboſa, foliis ternato-pinnatifidis obtuſis, floribus capitatis vireſcentibus pedunculatis, primariis 4fidis reliquis 5fidis.

1514. HALORAGIS Forſt.

Cercodia Ait. 1. H. foliis ovato-oblongis ſerratis, floribus pedunculatis verticillatis, fructibus angulato-ala-

tis. *Nov. Zeeland.* (Tetragonia ivaefolia L. fuppl. Cercodia erecta Murr. Haloragis Tetragonia Herit., alata Forft. Jacq.)

racemofa Labill. 2. H. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis ferrulatis, floribus racemofis, fructibus angulato-alatis. *Nov. Holl. occid. auftr.*

Gonocarpus * 3. H. foliis ovato-oblongis ferrulatis, floribus axillaribus feffilibus folitariis, fructibus globofo-angulatis. *Nov. Holl. bor.* (Gonocarpus 4gyna Labill.)

proftrata Forft. 4. H. foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus pedunculatis folitariis, fructibus globofis. *Inf. botan. Nov. Caledon.*

digyna Labill. 5. H. foliis linearibus acutis, floribus verticillato-racemofis nutantibus digynis, fructibus globofis. *Nov. Holl. occid. auftr.*

1515. PARIS.

quadrifolia 1. P. foliis quaternis, fepalis linearibus petala fuperantibus. *Europ. fylvae umbrofae.*

verticillata MB. 2. P. foliis octonis, fepalis lanceolatis petala 3plo fuperantibus. *Sibir. orient. Nepal.* (P. polyphylla Sm.)

incompleta MB. 3. P. foliis fubdenis, fepalis lanceolatis nervofis, petalis nullis, antheris apice non productis. *Armenia. Iberia.* (P. apetala et Demidovia polyphylla Hofm.)

1516. ELATINE.

Hydropiper 1. E. caule proftrato radicante, foliis oppofitis oblongis utrinque attenuatis glabris, floribus pedunculatis alternis 4fidis 8andris. *Europae inundata.*

tripetala Sm. 2. E. caule proftrato radicante, foliis oppofitis fpathulatis fcabris, floribus alternis oppofitisque 3fidis 3-6andris. *Europ. inundata.* (E. Hydropiper Engl. bot., 3andra Schk. Hofm., 6andra Cand. Birolia paludofa Bellard. Tillaea 6andra Lapierre.)

Alfinaftrum 3. E. caule erecto, foliis oblongo-lanceolatis, floribus 4fidis feffilibus verticillatis. *Europ. aquae.*

1517. MARGARITARIA L. fuppl.

nobilis L. fuppl. *Ind. occ. Amer. auftr.* Arbor foliis oppofitis ovatis integerrimis, floribus paniculatis dioecis.

1518. PYTHAGOREA Lour.

cochinchinenfis Lour. *Cochinchina.* Arbuscula ramofiffima, foliis ovato-lanceolatis ferratis, floribus racemofis albis.

1519. FRANCOA Cav.

appendiculata Cav. 1. Fr. acaulis, foliis cordatis ovatis obtuſe angulatis, floribus racemoſis, petalis appendiculatis. *Chili.*

ſonchifolia * 2. Fr. cauleſcens, foliis lyratis tomentoſis decurrentibus, floribus racemoſis. *Chili.* (Llaupanke Feuill. Panke ſonchifolia Molin.)

1520. GALVEZIA R. et P.

punctata R. et P. *Chili.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis ſerratis pellucido-punctatis aromaticis, floribus paniculatis albis. (Pitavia punctata Molin.)

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurinae.

1521. *Laurus.* Flores diclini. Cal. corollinus 6fidus. Stamina 12, quorum 3 ſterilia: filamenta utrinque glanduloſa: antherae a baſi ſurſum dehiſcentes 2loculares. Bacca nuda 1ſperma.

1522. *Tetranthera* Jacqu. Character Lauri, praeter antheras 4loculares.

1523. *Perſea* Gärtn. Flores ☿. Char. Lauri, praeter antheras 4loculares, glandulas germini circumſtantes et drupam calycis baſi ſuffultam.

1524. *Cryptocarya* R. Br. Flores ☿. Cal. corollinus 6fidus, limbo deciduo, tubo perſiſtente. Stamina 12, quorum 3 ſterilia. Antherae 2loculares. Glandulae 6 cum filamentis interioribus alternantes. Drupa tubo baccato calycis incluſa.

1525. *Caſſyta.* Flores ☿. Cal. corollinus 6fidus omnis perſiſtens. Stam. 12, quorum 3 ſterilia, 3 baſi 2glanduloſa. Antherae 2loculares. Fructus baccatus calyce tectus, ejusque laciniis coronatus.

1526. *Anacardium.* Flores diclini. Cal. 5partitus. Petala 5. Stamina 10, unico abortiente. Nux reniformis receptaculo carnoſo ſuffulta. *Terebinthaceae.*

1527. *Plegorrhiza* Molin. Cor. 1petala. Capſ. 1ſperma. *Familia?*

1528. *Thalaſſia* Banks. Flores dioeci ſpathacei. Cal. 3ſepalus. Cor. 0. Antherae ſeſſiles. ♀ ignoti. *Familia?*

DI-TRIGYNIA.

1529. *Mercurialis.* Cal. 3ſepalus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Cocci 2, 3 1ſpermi. *Tricoccae.*

1530. *Rheum.* Cal. corollinus 6partitus. Nux 3quetro-alata. *Polygoneae.*

1531. *Eriogonum* Mx. Involucrum campanulatum ſub-6florum. Cal. corollinus campanulatus 6fidus. Semen calyce tectum triquetrum. *Polygoneae.*

1532. *Pleea* Mx. Flores ſpicati ſpathacei. Cor. 6partita patens. Capſ. 3locularis polyſperma. Semina ad margines valvarum. *Aſphodeleae.*

1533. *Triplaris.* Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Capſ. 3valvis 1ſperma. *Polygoneae.*

HEXAGYNIA.

1534. *Butomus.* Cal. corollinus 6ſepalus. Capſ. 6 polyſpermae, ſemina ad parietes valvarum. *Hydrocharides.*

1535. *Hydrocharis.* Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Nectaria inciſa. Capſ. 6locularis polyſperma. *Hydrocharides.*

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

1521. Laurus.

* *Foliis perennantibus.*

nobilis 1. L. foliis oblongo-lanceolatis ſubundulatis venoſis, floribus axillaribus umbellato-racemoſis folio brevioribus, calycibus 4fidis. *Europ. auſtr.*

Culilaban 2. L. foliis oppoſitis ovato-acuminatis 3plinerviis ſubtus glaucefcentibus, floribus corymboſis, calycibus 6partitis. *Inſ. Molucc. Cochinchina.* (L. Caryophyllus Lour.)

Beiolgota Hamilt. 3. L. foliis oblongis utrinque attenuatis 3plinerviis ſubtus glaucis venoſo-reticulatis, ramis 4gonis, panicula trichotoma, floribus ternis. *Ind. orient.* (L. Malabathrica Roxb.?)

coriacea Sw. 4. L. foliis ovato-oblongis acuminatis ſubcoriaceis reticulato-venoſis nitidis, racemis axillaribus compoſitis folio brevioribus. *Jamaica. Hiſpaniola.*

ſalicifolia Sw. 5. L. foliis alternis lato-lanceolatis acutis nervoſo-venoſis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.*

Catesbiana Mx. 6. L. foliis ovato-lanceolatis nitidis, panicula terminali, fructu ovato. *Georgia. Florida.*

carolinenſis Catesb. 7. L. foliis ovali-lanceolatis ſubtus glaucefcentibus ſubpubeſcentibus, glomerulis florum pedunculatis axillaribus. *Carolina. Louiſiana.* (L. axillaris Lam.)

thyrſiflora Poir. 8. L. foliis ovato-oblongis acuminatis nervoſo-venoſis, panicula elongata terminali, pedicellis 1floris. *Madagascar.*

punctata * 9. L. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis nitidis venoſis margine pellucido-punctatis, paniculis axillaribus folia aequantibus. *Braſil.* Sello.

** *Foliis annuis.*

Benzoin 10. L. foliis oblongis utrinque attenuatis venoſis enerviis, pedunculis aggregatis 1floris. *Amer. bor.*

pendula Sw. 11. L. foliis oblongis utrinque attenuatis nervoſo-venoſis ſubtus glaucescentibus, paniculis axillaribus folia aequantibus, fructibus pendulis. *Jamaica.*

divaricata Poir. 12. L. foliis oblongis acuminatis nervoſis ſubtus reticulatis, panicula laxa terminali, pedunculis divaricatis. *Cayenn.*

*** *Dubiae.*

Chloroxylon 13. L. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis rigidis 3nerviis, pedunculis ſolitariis 1floris, calycibus 5fidis 5andris 3gynis. *Jamaica.*

martinicenſis Jacq. 14. L. foliis oblongis acuminatis coriaceis, racemis paniculatis, pedunculis calycibusque tomentoſis. *Martinic.*

glauca Thunb. 15. L. foliis lanceolatis acuminatis nervoſis ſubtus glaucis, ramis tuberculatis, pedunculis breviſſimis ſub-1floris. *Japon.*

pedunculata Thunb. 16. L. foliis oppoſitis oblongis acutis nervoſis, pedunculis ſparſis ſolitariis 1floris. *Japon.*

lucida Thunb. 17. L. foliis ovato-oblongis acutis obſolete ſerratis lucidis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Japon.*

umbellata Thb. 18. L. foliis ovatis obtuſis ſerratis nervoſis, ramulis umbellatis, floribus racemoſis. *Japon.*

polyadelpha Lour. 19. L. foliis lanceolatis integerrimis coriaceis ſub-3nerviis, floribus corymboſis, ſtaminibus 3adelphis. *Cochinchina.*

Soncaurium Hamilt. 20. L. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtriplinerviis ſubtus venoſis. *Emodi montes.*

Tazia Hamilt. 21. L. foliis lanceolatis acuminatis 3plinerviis, ramis 4angulis. *Ind. or.*

ſailiana Hamilt. 22. L. foliis oblongis utrinque attenuatis quintuplinerviis ſubtus glaucis. *Emodi montes.*

floribunda Sw. 23. L. foliis annuis ovato-lanceolatis venoſis, floribus racemoſo-paniculatis. *Jamaica.*

1522. TETRANTHERA Jacq.

* *Foliis perennantibus.*

laurifolia Jacq. 1. T. foliis obovato-oblongis integerrimis, floribus involucratis ſubumbellatis, pedicellis filamentisque piloſis. *Japon.* (Tomex tetranthera W. Litſea chinenſis Lam. Sebifera glutinoſa Lour.)

japonica * 2. T. foliis oblongis obtuſis venoſis ſubtus tomentoſis, floribus glomeratis pedunculatis villoſis. *Japon.* (Tomex japonica Thunb. Litſea Perſ.)

citrifolia * 3. T. foliis ovatis obtuſis venoſis nitidis, floribus involucratis ſubumbellatis indiviſis. *Ora Coromandel. Nov. Holl.* (T. apetala Roxb. Litſea citrifolia Juſſ.)

trinervia * 4. T. foliis oblongis acuminatis 3plinerviis ſubtus glaucis, floribus involucratis congeſtis breviſſime

pedunculatis. *Ind. or. China. Cochinchina.* (Laurus Myrrha Lour. Litſea zeylanica Nees.)

ſebifera * 5. T. foliis oblongis obtuſis enerviis ſubtus pubeſcentibus, floribus ♂ capitatis involucratis, ♀ paniculatis, pedunculis lanatis divaricatis 1floris. *Ind. or.* (Tomex W. Laurus involucrata Retz.)

ferruginea R. Br. 6. T. foliis oblongis acutis 1nerviis ſubtus ramisque ferrugineo-tomentoſis, floribus umbellatis involucratis. *Cochinchina. Nov. Holl.* (Hexanthus umbellatus Lour.)

dealbata R. Br. 7. T. foliis oblongis acuminatis 3plinerviis ſubtus albidis, petiolis ramisque tomentoſis, floribus glomeratis involucratis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

terſa * 8. T. foliis lanceolatis attenuatis venoſis ſupra nitidis ſubtus ſubtomentoſis, floribus ♂ capitatis (ſtaminibus polyadelphis), ♀ ſolitariis axillaribus breviſſime pedunculatis. *Inſ. Molucc.* (Glabraria terſa L.)

glaucescens * 9. T. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis reticulato-venoſis ſubtus glaucis, floribus involucratis ♂ corymboſis, ♀ paucis. *Mexico.* (Litſaea glauceſcens ♀ et Cervanteſii ♂ Kunth.)

† *Berterii* * 10. T. foliis oblongo-lanceolatis elongatis utrinque attenuatis venoſis opacis glaberrimis, floribus ſubcymoſo-glomeratis breviſſime pedunculatis axillaribus polygamis. *Amer. auſtr.* Bertero.

** *Foliis annuis.*

aeſtivalis * 11. T. foliis lanceolatis obtuſiusculis glabris baſi ſubtus barbatis, ramis divaricatis, floribus umbellatis polygamis. *Carolina.* (Laurus aeſtivalis L., geniculata Walt. Mx.)

Diospyros * 12. T. foliis oblongis ſubtus venoſis pubeſcentibus, ramis virgatis, gemmis pedunculisque villoſis, floribus glomerato-umbellatis. *Carolina.* (Laurus Diospyroides Mx. Diospyrus Perſ., meliſſaefolia Walt.)

piloſa * 13. T. foliis oblongis piloſis enerviis, floribus racemoſis polygamis. *Cochinchina.* (Laurus piloſa Lour.)

albida * 14. T. foliis integris ſub-3lobisque glaberrimis venoſis, floribus dioecis. *Carolina.* (Evoſmus albida Nutt.)

1523. PERSEA Gärtn.

* *Foliis perennantibus,*

† *nervoſis.*

Cinnamomum * 1. P. foliis elliptico-oblongis obtuſiusculis 3plinerviis ramulisque glaberrimis, floribus paniculato-corymboſis axillaribus folia ſuperantibus. *Ceylon. Cochinchina.* (Laurus L.)

Caſſia * 2. P. foliis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis 3plinerviis, petiolis ramulisque ſericeo-tomentoſis,

floribus racemoſo-paniculatis folia aequantibus. *Ind. or. Cochinchina.* (Laurus L.)

dulcis * 3. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis triplinerviis, petiolis ramulisque glabris, corymbis 3fidis paucifloris. *Java. Ind. orient.* (Laurus dulcis Roxb. L. Burmanni Nees excl. ſyn. Burm.)

Tamala * 4. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis triplinerviis, panicula terminali. *Emodi montes.* (Laurus Hamilt.)

Camfora * 5. P. foliis ovato-oblongis acuminatis triplinerviis, paniculis axillaribus multifloris folio brevioribus. *Japon. China.* (Laurus L.)

montana * 6. P. foliis ovato-acuminatis triplinerviis rigidis nitidis, floribus paniculatis pubeſcentibus. *Ind. occid.* (Laurus montana Sw., paniculata Poir.)

curvifolia * 7. P. foliis oblongis acuminatis incurvis reflexis obſolete 3nerviis, floribus racemoſis. *Cochinchina.* (Laurus Lour.)

†† *venoſis.*

indica * 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis glaberrimis opacis coriaceis, corymbis pedunculatis axillaribus, calycibus incanis. *Inſ. Canar. Japon.* (Laurus L.)

foetens * 9. P. foliis oblongis acutis glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, paniculis axillaribus elongatis. *Inſ. Canar.* (Laurus Ait. L. maderenſis Lam., Till Poir.)

canarienſis * 10. P. foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis, pedunculis axillaribus elongatis 3-4floris. *Inſ. Canar.* (Laurus W. L. reticulata et Teneriffae Poir.)

gratiſſima Gärtn. 11. P. foliis elliptico-oblongis obtuſiuſculis ſubtus pubeſcentibus glauceſcentibus, corymbis axillaribus, calycibus tomentoſis, fructu pyriformi. *Amer. aequinoct.* (Laurus Perſea L.)

exaltata * 12. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis nitidis, racemis corymboſis axillaribus, fructu ovali. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Laurus exaltata Sw. Ocotea turbacenſis Kunth.)

alpigena * 13. P. foliis oblongis obtuſis ſubrevolutis coriaceis ſubtus venoſis glauceſcentibus, racemis erectis folio longioribus. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Laurus Sw. Ocotea obtuſifolia Kunth.)

Leucoxylon * 14. P. foliis oblongo-lanceolatis elongatis acuminatis glaberrimis ſupra nitidis, pedunculis axillaribus abbreviatis ſubracemoſis fructiferis cum calyce incraſſatis verrucoſis. *Ind. occid.* (Laurus Sw. Perſea cinnamomifolia et macropoda Kunth. varr.?)

Borbonia * 15. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, racemis axillaribus abbreviatis, calycibus fructiferis ſubbaccatis. *Amer. bor. et auſtr.* (Laurus L. Ocotea Cymbarum Kunth.)

ſanguinea * 16. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus venoſo-reticulatis, racemis erectis folio brevio-

ribus, calycibus turbinatis. *Surinam.* (Nectandra ſanguinea Rottb.)

ſurinamenſis * 17. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque glaberrimis, ramis patentiſſimis, paniculis filiformibus elongatis, floribus glomeratis. *Surinam. Braſil.* (Laurus Sw., Nectandra bijuga Rottb.)

cupularis * 18. P. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ſupra nitidis, paniculis ſeſſilibus terminalibus, calycibus turbinatis. *Inſ. Mascaren.* (Laurus cupularis Lam.)

globoſa * 19. P. foliis ovatis glabris ſubtus glauceſcentibus, cymis pedunculatis axillaribus, fructibus globoſis. *Ind. occid.* (Laurus Lam.)

cauſtica * 20. P. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus reticulato-rugoſis, pedunculis 1floris, fructibus ſubreniformibus. *Chili.* (Laurus cauſtica Molin.)

Cubeba * 21. P. foliis oblongo-lanceolatis ſubeveniis nitidis, floribus congeſtis pedunculatis, fructibus globoſis minimis. *Cochinchina.* (Laurus Lour.)

craſſifolia * 22. P. foliis ovato-oblongis ſupra nitidis ſubtus caneſcentibus, fructibus ovatis pubeſcentibus. *Cayenn.* Richard. (Laurus Poir.)

retroflexa * 23. P. foliis lanceolatis nitidis glabris, floribus racemoſis axillaribus, calycibus fructiferis dureſcentibus reflexis. *Hiſpaniol.* Poiteau. (Laurus Poir.)

laevigata Kunth. 24. P. foliis ovalibus utrinque glabris ſubtus reticulatis, paniculis axillaribus folio brevioribus, calycibus incano-pubeſcentibus. *Nov. Granat.*

Mutiſii Humb. 25. P. foliis ellipticis coriaceis ſubtus glauco-pruinoſis, corymbis axillaribus, calycibus patentiſſimis ferrugineis, fructibus globoſis. *Nov. Granat.*

ſericea Kunth. 26. P. foliis ellipticis ſubtus ferrugineo-ſericeis, pedunculis axillaribus ſub-6floris, calycibus ſericeis, fructibus ovatis. *Peru.*

ferruginea Kunth. 27. P. foliis ovatis acutis ſupra nitidis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, corymbis axillaribus dichotomis. *Peru.*

Pichurim * 28. P. foliis oblongis utrinque acuminatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus reticulatis piloſiusculis, paniculis axillaribus folio brevioribus, fructibus oblongis. *Amer. auſtr.* (Ocotea Kunth.)

Boſo * 29. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus reticulato-venoſis, floribus paniculatis axillaribus pubeſcentibus, calycibus acutis. *Ad fl. Amazonum.* (Ocotea Kunth.)

umbroſa * 30. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus reticulato-venoſis, floribus paniculatis axillaribus pubeſcentibus, calycibus obtuſis. *Ad fl. Amazonum.* (Ocotea Kunth.)

pſychotrioides * 31. P. foliis lanceolatis acuminatis ſubtus incano-pubeſcentibus, paniculis folio brevioribus, calyce pubeſcente. *Mexico.* (Ocotea Kunth.)

argentea * 32. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis ſubtus argenteo-ſericeis, paniculis folio brevioribus, calyce pubeſcente. *Nov. Granat.* (Ocotea ſericea Kunth.)

tigricida * 33. P. foliis oblongis utrinque attenuatis fubtus calycibusque fufco-tomentofis, paniculis axillaribus folia aequantibus. *Nov. Granat.* (Laurus Mutis. Ocotea discolor et rigida Kunth.)

mollis * 34. P. foliis fubcordato-oblongis acuminatis utrinque villofiffimis, paniculis folio brevioribus, calycibus ferrugineo-tomentofis. *Nov. Granat.* (Ocotea Kunth.)

** *Foliis annuis.*

membranacea * 35. P. foliis oblongis utrinque attenuatis venofis glabris nitidis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.* (Laurus Sw.)

patens * 36. P. foliis oblongis utrinque attenuatis venofis glabris opacis, ramis patentibus, paniculis axillaribus folia fuperantibus. *Ind. occ.* (Laurus Sw.)

parviflora * 37. P. foliis elliptico-oblongis acutis utrinque glabris opacis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Jamaica.* (Laurus Sw.)

Saffafras * 38. P. foliis ovatis obtufiusculis integris 3lobisque 3nerviis fubtus pubefcentibus, racemis corymbofis folio brevioribus. *Amer. bor.* (Laurus L.)

*** *Dubiae.*

petiolaris Kunth. 39. P. foliis ovato-oblongis acutis fubtus tenuiffime pubefcentibus, petiolis elongatis verrucofis, pedunculis oligocarpis incraffatis. *Amer. auftr.*

longifolia * 40. P. foliis oblongo-lanceolatis elongatis utrinque attenuatis fubtus petiolis paniculisque folio brevioribus pubefcentibus, fructibus ovatis. *Nov. Granat.* (Ocotea Kunth.)

latifolia * 41. P. foliis obovatis coriaceis fupra nitidis fubtus reticulatis, paniculis folio brevioribus, fructibus oblongis. *Nov. Granat.* (Ocotea Kunth.)

macrophylla * 42. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis fupra nitidis fubtus tomentofis, paniculis folio brevioribus, fructibus oblongis. *Nov. Granata.* (Ocotea Kunth.)

lineata * 43. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis parallele venofis fubtus incano-pubefcentibus, paniculis folio brevioribus, fructibus fubglobofis. *Ad fl. Orinocum.* (Ocotea Kunth.)

falicifolia * 44. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis glaberrimis, pedunculis axillaribus racemofis folio brevioribus. *Mexico.* (Ocotea Kunth.)

1524. CRYPTOCARYA R. Br.

glaucefcens R. Br. 1. Cr. foliis ovali-oblongis acutiusculis glabris fubtus glaucis, paniculis axillaribus. *Nov. Holl.*

triplinervia R. Br. 2. Cr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis triplinerviis fubtus fubpubefcentibus, paniculis axillaribus terminalibusque. *Nov. Holl.*

obovata R. Br. 3. Cr. foliis obovato-oblongis obtufiffimis utrinque glabris, paniculis terminalibus. *Nov. Holl.*

† *mucronata* * 4. Cr. foliis oblongis acuminatis glabris ſubtus reticulato-ruguloſis, fructibus oblongis mucronatis. *Cayenn.* (Laurus mucronata Poir.)

† *dubia* Kunth. 5. Cr. foliis obovato-oblongis utrinque reticulato-venoſis glabris, corymbis axillaribus paucifloris folio brevioribus. *Nov. Granat.* Mutis. *Braſilia.* Sello.

1525. CASSYTA. (Aphyllae volubiles paraſiticae.)

filiformis 1. C. glaberrima, ſpicis indiviſis, fructibus diſtantibus globoſis. *Intra tropicos Aſiae, Africae et Americae.*

glabella R. Br. 2. C. glaberrima, ſpicis indiviſis glomeratis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

melantha R. Br. 3. C. glabra, ſpicis indiviſis, floribus imbricatis nigro-pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

paniculata R. Br. 4. C. glabriuscula, ſpicis diviſis, floribus diſtantibus glabris, fructibus angulatis. *Nov. Holl.*

pubeſcens R. Br. 5. C. pubeſcens, ſpicis indiviſis, floribus diſtantibus globoſis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

1526. ANACARDIUM.

occidentale *Ind. or. et occid.* Arbor foliis alternis obovato-oblongis, floribus paniculato-congeſtis albido-rubeſcentibus. (Caſſuvium pomiferum Lam.)

1527. PLEGORRHIZA Molin.

adſtringens W. Molin. *Chili. Buenos Ayres.* Frutex ramoſus, foliis oblongis, floribus corymboſis vireſcentibus.

1528. THALASSIA Banks.

teſtudinum Kön. 1. Th. foliis ſeſſilibus ſublinearibus obtuſiſſimis multinerviis, ſtipite baſi radicante. *Mare caribaeum.*

ciliata Kön. 2. Th. foliis ſeſſilibus linearibus retuſis multinerviis ciliato-ſerrulatis, ſtipite baſi vaginis imbricato. *Mare rubrum.* (Zoſtera ciliata Forsk.)

ſtipulacea Kön. 3. Th. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis obtuſis 3nerviis, ſtipulis oppoſitis complicatis. *Mare rubrum.* (Zoſtera ſtipulacea Forsk.)

DI-TRIGYNIA.

1529. MERCURIALIS.

* *Suffruticoſae.*

tomentoſa 1. M. lanato-tomentoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis apice ſerratis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Gallia auſtr. Hiſpan.*

elliptica Lam. 2. M. glabra, ramis brachiatis, foliis ellipticis glanduloso-serratis, stipulis reflexis, fructibus subsessilibus. *Ins. balear. Lusitan. Madera.*

indica Lour. 3. M. glaberrima, foliis lanceolatis serratis, calycibus ♂ polyandris. *Cochinchina.*

** *Herbaceae.*

perennis 4. M. caule simplicissimo, foliis ovato-oblongis serratis hirsutiusculis, fructibus pedunculatis hirsutis. *Europ.* (M. ovata Sternb.)

annua 5. M. caule brachiato, foliis ovato-oblongis serratis ciliatis. *Europ.* (M. ambigua L. fil. varietas androgyna.)

1530. RHEUM.

palmatum 1. Rh. foliis palmato-multifidis glabriusculis, laciniis acuminatis. *Emodi montes. Mongolia flava. Tibetanum regnum.*

compactum 2. Rh. foliis sublobatis subcoriaceis nitidis argute denticulatis. *Tibet. Mongolia.* (Rh. tataricum L. suppl., leucorrhizon Pall.)

hybridum Ait. 3. Rh. foliis repandis acutis supra glabris subtus pilosiusculis. *Mongolia.*

undulatum 4. Rh. foliis undulatis subvillosis. *Asia media.*

Rhaponticum 5. Rh. foliis undulatis glabris, venis subtus pilosiusculis. *Thracia. Deserta Sibiriae.*

Ribes 6. Rh. foliis subrotundis verruculoso-asperis. *Syria. Persia.*

1531. ERIOGONUM Mx.

tomentosum Mx. 1. E. caule erecto dichotomo, foliis subtus tomentosis, inferioribus spathulatis in petiolum decurrentibus, superioribus subverticillatis oblongis, fasciculis florum sessilibus axillaribus solitariis. *Carolina. Georgia. Nov. Hispania.* (Chrysosplenium oppositifolium Walt. Espinosa verticillata Lag.)

flavum Fras. 2. E. caule simplici nudo, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis utrinque villoso-lanatis, fasciculis florum pedunculatis umbellatis sericeis. *Ad fl. Missuri.* (E. sericeum Pursh.)

latifolium Sm. 3. E. caule suffruticoso ramoso, foliis alternis cordatis obtusis undulatis supra lanatis subtus tomentosis, fasciculis florum glomeratis. *California.*

parvifolium Sm. 4. E. caule suffruticoso ramoso, foliis alternis petiolatis ovatis obtusis supra glabris nitidis subtus ferrugineo-lanatis, florum fasciculis glomeratis. *California.*

pauciflorum Pursh. 5. E. caule simplici basi folioso, umbellis paucifloris, floribus subsessilibus, foliis lineari-lanceolatis utrinque cano-tomentosis. *Louisiana.*

1532. PLEEA Mx.

tenuifolia Mx. *Carolina.* Herba Antherici facie, foliis linearibus glabris, floribus ſpicatis flavis.

1533. TRIPLARIS.

americana 1. Tr. foliis oblongis acutis nervoſis venoſis, racemis axillaribus terminalibusque brachiatis. *Amer. auſtr.* (Tr. pyramidalis Jacq.)

ramiflora Vahl. 2. Tr. foliis ovatis acuminatis enerviis venoſis, racemis lateralibus ſimplicibus ſubſolitariis. *America auſtr.*

HEXAGYNIA.

1534. BUTOMUS.

umbellatus *Europ. Aſia bor.* Herba ſuborgyalis, foliis radicalibus linearibus, ſcapo tereti, floribus umbellatis rubris.

1535. HYDROCHARIS.

Morſus ranae 1. H. foliis cordato-orbiculatis ſubnervoſis, floribus dioecis. *Europ. fluvii.*

Spongia Boſc. 2. H. foliis cordato-ovatis enerviis ſubtus ſpongioſis, floribus monoecis. *Carolinae aquae.*

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

1. *Flores perfecti.*

A. *Corolla monopetala.*

a. *Fructus ſuperus.*

1536. *Panzera* W. Cal. 4partitus. Petalum 1cucullatum ſubrotundum. Stamina elongata, alterna abortientia. Legumen oblongum compreſſum 3ſpermum. *Leguminoſae.*

1537. *Cyrta* Lour. Cal. 5dentatus. Cor. campanulata 5fida. Antherae dorſo filamentorum adnatae. Drupa incurva 1ſperma. *Styraceae?*

1538. *Inocarpus* Forſt. Cal. 2partitus. Cor. infundibuliformis. Antherae ſubſeſſiles duplici ſerie in tubo corollae. Drupa 1ſperma, nuce fibroſa reticulata. *Sapoteae.*

1539. *Styrax.* Cal. 5dentatus. Cor. infundibuliformis 5partita. Stamina baſi ſubcoalita. Drupa ſub-2ſperma. *Styraceae.*

1540. *Potalia* Aubl. Cal. 4partitus. Cor. 10fida. Filamenta annulo nectarifero inſerta. Bacca 3locularis polyſperma. *Familia?*

1541. *Arbutus.* Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo reflexo 5dentato. Antherae dorſo biariſtatae. Bacca 6locularis, placentis laminas polyſpermas ſiſtentibus. *Ericeae.*

1542. *Arctoſtaphylos* Adanſ. Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo reflexo 5dentato. Antherae dorſo biariſtatae. Drupa 5locularis, ſeminibus 5 axi centrali affixis. *Ericeae.*

1543. *Encyanthus* Lour. Bracteae ante antheſin coloratae imbricatae. Cal. parvus perſiſtens. Cor. campanulata 5fida. Foveae nectariferae 5 in baſi corollae. Antherae bicornes. Bacca 5locularis. *Ericeae.*

1544. *Gaultheria.* Cal. 5fidus 2bracteatus. Cor. urceolato-ovata. Antherae apice bicornes. Capſ. 5locularis calyce baccato veſtita. *Ericeae.*

1545. *Epigaea.* Cal. 5partitus 3bracteatus. Cor. hypocrateriformis. Antherae nudae. Capſ. 5locularis, valvis inflexis diſſepimenta formantibus, columna centrali 5partita. *Ericeae.*

1546. *Andromeda.* Cal. 5partitus. Cor. ſubcampanulata limbo reflexo. Antherae bicornes. Capſula 5locularis, marginibus valvarum nudis, columna centrali 5loba. *Ericeae.*

1547. *Lyonia* Nutt. Cal. 5dentatus. Cor. ſubgloboſa. Antherae nudae. Capſ. 5locularis, marginibus ope valvarum acceſſoriarum clauſis. *Ericeae.*

1548. *Rhododendron.* Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis. Stamina declinata. Capſ. 5locularis, valvis inflexis diſſepimenta formantibus: columna centralis 5loba. Semina membrana involuta. *Ericeae.*

1549. *Kalmia.* Cal. 5fidus. Cor. ſubhypocrateriformis, intus foveolis antheras recipientibus extus 10 tuberculis. Capſ. 5locularis ſimillima fructui Rhododendri. *Ericeae.*

1550. *Pteroſpora* Nutt. Cal. 5partitus. Cor. ovata, limbo reflexo 5dentato. Antherae peltatae biſetae. Capſ. 5locularis polyſperma. Semina alata. *Monotropeae.*

1551. *Codon.* Cal. 10partitus. Cor. campanulata 10fida. Capſula 2locularis polyſperma. *Familia?*

b. *Fructus inferus.*

1552. *Ceratoſtemma* Juſſ. Cal. 5fidus perſiſtens. Cor. tubuloſa coriacea. Antherae elongatae 2furcae medio affixae. Capſ. 5locularis. *Ericeae.*

1553. *Thibaudia* Pav. Cal. 5fidus perſiſtens. Cor. tubuloſa. Antherae elongatae 2furcae baſi affixae. Bacca 5locularis, loculis polyſpermis. *Ericeae.*

1554. *Luſſacia **. Cal. 5fidus perſiſtens. Cor. tubuloſa. Antherae elongatae bifurcae baſi affixae. Drupa 5locularis, loculis 1ſpermis. *Ericeae.*

1555. *Polyphragmon* Desf. Cal. 5dentatus perſiſtens. Cor. infundibuliformis, limbo 10fido. Stamina in medio tubo. Stigma 6fidum. Bacca multilocularis. *Rubiaceae.*

B. *Corolla pleiopetala.*

a. *regularis.*

α. *Fructus ſuperus.*

1. *Melaſtomeae.*

1556. *Melaſtoma.* Cal. 5-4fidus perſiſtens. Petala calycis limbo inſerta. Antherae refractae. Bacca 3-4locularis calyce veſtita. Semina reniformia in pulpa nidulantia.

1557. *Triſtemma* Juſſ. Cal. 5fidus extus duplici corona membranaceo-ciliata prope limbum cincta. Petala unguiculata calyci inſerta. Bacca 5locularis.

1558. *Rhexia.* Cal. 5-4fidus perſiſtens. Petala calyci inſerta. Antherae baſi appendiculatae. Capſ. 3-4-5locularis, placentis demum liberis in quovis loculo.

1559. *Osbekia.* Cal. 5-4fidus. Petala calyci inſerta. Capſ. 4-5locularis, placentis columnae centrali affixis.

2. *Terebinthaceae.*

1560. *Boswellia* Colebr. Cal. 5dentatus. Petala 5. Urceolus glanduloſus crenulatus perigynus. Capſ. 3quetra 3locularis. Sem. hinc alata.

1561. *Garuga* Roxb. Cal. 5dentatus. Petala 5 calyci inſerta. Glandulae 5 nectariferae. Stamina calyci inſerta. Stigma 5lobum. Drupa ſub-2ſperma.

1562. *Buchanania* Roxb. Cal. 5dentatus. Petala 5. Nectarium duplex, ext. urceolatum, int. dentibus ſubulatis perigynis. Drupa nuce 2valvi.
1563. *Burſeria* Jacq. Cal. 3-5dentatus. Petala 3-5. Stam. 6-10. Stigma ſeſſile 3lobum. Capſ. 3valvis 1ſperma. Semen arillatum.
† 1564. *Baraultia* Steud. Cal. urceolatus 5fidus. Pet. 5 minima bifida unguiculata calyci inſerta. Filamenta baſi dilatata, 5 petalis oppoſita longiora. Annulus glanduloſus ſtamina ambiens. Fructus?

3. *Aurantia.*

1565. *Feronia* Corr. Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta baſi dilatata in receptaculo carnoſo. Stigma 5lobum. Pomum 5loculare, loculis polyſpermis.
1566. *Glycosmis* Corr. Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta aequalia. Stigma ſimplex. Fructus carnoſus 1-2locularis.
1567. *Limonia.* Cal. 5fidus. Petala 5. Filamenta aequalia. Pomum 5loculare 5ſpermum.
1568. *Cookia* Sonner. Cal. 5ſepalus. Petala 5 navicularia. Pomum 5loculare 5ſpermum.
1569. *Murraya.* Cal. 5partitus. Petala 5. Nectarium ſubcampanulatum. Bacca ſub-1ſperma.

4. *Ericeae.*

1570. *Ledum.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis baſi dehiſcens. Sem. membrana reticulata obvoluta.
1571. *Leiophyllum* Perſ. Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 3locularis apice dehiſcens.
1572. *Clethra.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Stigmata 3. Capſ. 3locularis, placentis liberis in quovis loculo.
1573. *Cliftonia* Banks. Cal. 5partitus. Pet. 5. Filamenta medio dilatata. Stigma ſeſſile. Capſ. 4alata 4locularis.
1574. *Pyrola.* Cal. 5fidus. Pet. 5 rotundata. Filamenta aſcendentia. Antherae baſi 2cornes 2loculares. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis, angulis dehiſcens. Sem. membrana obvoluta.
1575. *Chimaphila* Pursh. Cal. 5fidus. Petala 5 rotundata. Filamenta medio in diſcum dilatata. Antherae baſi 2cornes. Stigma 5lobum. Capſ. 5locularis apice dehiſcens.
1576. *Monotropa.* Cal. 4-5ſepalus. Pet. 4-5 baſi ſaccata. Stigma peltatum. Capſ. 4-5locularis polyſperma. Semina membrana obvoluta. *Monotropeae Ericeis affines.*

5. *Ochneae.*

1577. *Gomphia* Schreb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae ſeſſiles elongatae apice 2poroſae. Drupae ſubquinae in receptaculo carnoſo.
1578. *Quaſſia.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Filamenta baſi ſquamis ſuffulta. Stylus gynobaſi inſiſtens. Capſ. 5 bivalvis 1ſpermae.
1579. *Zwingera* Schreb. Cal. 5fidus. Pet. 5. Filamenta baſi dilatata ſquamata. Stigmata 5. Capſ. 5 monoſpermae.

6. *Rutaceae.*

1580. *Ruta.* Cal. 5partitus perſiſtens. Pet. 5 unguiculata. Pori nectariferi ad baſin ovarii. Capſ. 5locularis.
1581. *Dictamnus.* Cal. 5partitus deciduus. Pet. 5 unguiculata. Genitalia declinata. Filamenta glanduloſa. Folliculi 5 2ſpermi intus dehiſcentes.

1582. *Eriostemon* Sm. Cal. 5partitus. Pet. 5. Filamenta (in plerisque) pilosa. Folliculi 5 sub-2spermi basi nexi.
1583. *Crowea* Sm. Cal. 5partitus. Pet. 5 sessilia. Filamenta latiuscula pilis intertextis nexa, media interna parte antheras foventia. Stylus brevissimus. Folliculi 5 1spermi coaliti.
1584. *Choisia* Kunth. Cal. 5sepalus. Pet. 5. Stigma 5lobum. Caps. 5locularis 5rostrata.
1585. *Guaiacum*. Cal. 5partitus. Pet. 5. Stamina libera. Capsula 5locularis 5sperma: semina axi affixa.
1586. *Zygophyllum*. Cal. 5partitus. Pet. 5. Fornix squamaceus filamentis nexus. Caps. prismatica 5locularis, loculis polyspermis.
1587. *Larrea* Cav. Cal. 5sepalus. Pet. 5. Filamenta intus squamis aucta. Caps. 5 1spermae coalitae.
1588. *Fagonia*. Cal. 5sepalus deciduus. Pet. 5 unguiculata. Caps. subrotunda 5locularis 5sperma.
1589. *Tribulus*. Cal. 5sepalus deciduus. Pet. 5. Stigma 5fidum. Nuces 5 spinosae 4 loculares axi annexae.

7. *Leguminosae*.

1590. *Entada* Adans. Flores polygami. Cal. campanulatus 5dentatus. Pet. 5. Lomentum grande subcompressum: semina glutine obvoluta.
1591. *Desmanthus* W. Flores polygami. Cal. campanulatus 5dentatus. Pet. 5. Legumen continuum 1loculare exsuccum.
1592. *Prosopis*. Cal. 5dentatus. Pet 5 linearia patentia. Antherae apice glandulosae. Stylus incurvus. Legumen multiloculare non dehiscens resinoso-gummosum.
1593 *Schotia* Jacqu. Cal. campanulatus coloratus 5fidus. Pet. 5 conniventia calyci insidentia. Legumen 2spermum.
1594. *Omphalobium* Jacqu. fil. Cal. herbaceus 5partitus. Pet. 5 patentia receptaculo inserta. Filamenta basi nexa. Legumen 2spermum. Arillus dimidiatus seminum.
1595. *Cynometra*. Cal. 4partitus. Pet. 4. Antherae apice fissae. Legumen semilunare 1spermum carnosum.
1596. *Gymnocladus* Lam. Cal. infundibuliformis 5fidus. Pet. 5 rotundata calyci inserta. Stam. corolla breviora. Legumen pleiospermum carnosum intus pulposum septatum.
1597. *Guilandina*. Cal. hypocrateriformis 5fidus. Pet. calyci inserta. Legumen latum oligospermum, seminibus osseis.
1598. *Hyperanthera* Vahl. Cal. 5partitus. Pet. 5 calyci inserta subinaequalia. Legumen elongatum 3valve polyspermum: semina 3alata.
1599. *Adenanthera*. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Stamina apice glandulosa medio antherifera. Legumen compressum membranaceum polyspermum.
1600. *Cadia* Forsk. Cal. 5fidus. Pet. 5 obcordata. Legumen inflatum polyspermum.
1601. *Haematoxylon*. Cal. urceolatus coloratus, limbo 5fido. Pet. 5 calyci inserta. Legumen capsulare.
1602. *Baryxylon* Lour. Cal. 5sepalus reflexus deciduus. Pet. 5 subrotunda plicata patentia receptaculo inserta. Antherae 4loculares. Stigma concavum. Legumen crassum teres polyspermum.
1603. *Zuccagnia* Cav. Cal. turbinatus limbo 5partito. Pet. 5 calyci inserta. Stigma infundibuliforme. Legumen 1spermum crinitum.

8. *Malpighieae.*

1604. *Bunchoſia* Juſſ. Cal. 5partitus extus glanduloſus. Pet. 5 unguiculata. Stam. baſi nexa. Stylus ſimplex aut apice 2-3fidus. Drupa ſub-2ſperma.
1605. *Thryallis.* Cal. 5partitus perſiſtens. Pet. 5 ſubrotunda. Capſ. 3quetra 3locularis, loculis extus dehiſcentibus.
1606. *Hiptage* Gärtn. Cal. 5partitus baſi glanduloſus. Pet. 5 fimbriata. Stam. unicum ceteris longius. Fructus 3 1ſpermi 4alati, alis inaequalibus.
1607. *Zymum* Nor. Juſſ. Cal. 5fidus. Pet. 5 unguiculata inflexa. Stam. alterna minora. Ovarium poris 3 impreſſum. Fructus 3 1ſpermi appendiculati.

1608. *Dionaea.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae lateraliter dehiſcentes. Stigma orbiculatum. Capſ. 1locularis 5valvis polyſperma. *Hypericeae.*
1609. *Hydropityon* Gärtn. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 rotundata. Filamenta craſſa piloſa: antherae cordatae. Stigma orbiculatum. Capſ. 1ſperma. *Caryophylleae*?
1610. *Balanites* Delil. Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma, nucleo pentagono. *Familia?*
1611. *Chilmoria* Hamilt. Flores polygami. Cal. 5ſepalus, Pet. 5, cum ſquamis totidem alternantia. Stam. 5-15. Stigma peltatum ſeſſile. Bacca lignoſa 1locularis polyſperma. *Familia?*
1612. *Godoya* R. et P. Cal. coloratus 5ſepalus. Pet. 5 pilorum ope cum calyce nexa. Stamina receptaculo inſerta, antheris apice 2poroſis. Stigma ſeſſile 5angulum. Capſ. 5locularis 5valvis polyſperma, ſeminibus alatis. *Guttiferae*?
1613. *Leptochlaena* Thuar. Calyx duplex, ext. urceolatus, int. 3ſepalus. Pet. 5 baſi cohaerentia. Stigma 3lobum. Capſ. 1ſperma. *Chlaenaceae* Thuar.
1614. *Heiſteria.* Cal. 5fidus, demum ampliatus. Pet. 5. Stigma 3fidum. Drupa 1ſperma. *Santaleae?*
1615. *Ceratopetalum* Sm. Cal. 5partitus ſtaminifer perſiſtens. Pet. 5 pinnatifida. Antherae calcaratae. Capſ. 2locularis. *Familia?*
1616. *Viviania* Cav. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stamina alterna ſquamis nectariferis inſerta. Stigmata 3. Capſ. 3locularis. *Familia?*

β. *Fructus inferus.*

1617. *Petaloma* Sw. Cal. urceolatus 5dentatus. Pet. 5 cum ſtaminibus calyci inſerta. Antherae apice 2poroſae. Bacca ſeminifera ſub-4ſperma. *Melaſtomeae?*
1618. *Combretum.* Cal. campanulatus 5dentatus. Petala 5 calyci inſerta. Stamina longiſſima. Caryopſis 4alata. *Combreteae.*
1619. *Quisqualis.* Cal. longiſſime tubuloſus, limbo 5dentato. Pet. 5 oblonga. Stamina calyci inſerta. Drupa 5gona 1ſperma. *Combreteae.*
1620. *Guiera* Juſſ. Cal. cylindricus 4dentatus. Petala 4 parva. Stamina longe exſerta. Capſ. 5gona 1locularis 5ſperma, ſeminibus exilibus filo pendulis. *Combreteae.*
1621. *Schousboa* W. Cal. campanulatus, limbo 5fido deciduo. Pet. 5. Stam. exſerta. Capſ. ſubbaccata 5angula 1ſperma. *Combreteae.*

1622. *Chamaelaucium* Desf. Flos ante anthesin calyptra circumscissa tectus. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stam. fertilia cum totidem abortientibus alterna basi nexa. Caps. 1locularis oligosperma. *Myrteae.*

b. *Corolla irregularis.*

1623. *Rhodora.* Cal. 5dentatus. Cor. 2labiata, lab. sup. 2-3fidum, inf. 2dentatum. Stam. declinata inaequalia receptaculo inserta, antheris geminis. Stigma 5lobum. Caps. 5locularis, placenta centrali, seminibus membrana laxa obvolutis. *Ericeae.*

1624. *Lacara**. Cal. campanulatus 5dentatus. Pet. 5 unguiculata, summum imumque concava. Stam. fundo calycis inserta. Caps. pilosa. *Familia?*

1625. *Reichardia* Roth. Cal. campanulatus margine crenato. Cor. 6petala subpapilionacea. Stam. declinata basi villis nexa. Samara in alam oblongam desinens. *Leguminosae?*

Leguminosae.

1626. *Bauhinia.* Cal. irregularis 5fidus basi hians deciduus. Pet. 5 calyci inserta unguiculata, suprema majora. Stam. declinata, unico majori: saepe 5, 7 vel 9 abortiunt. Legumen elongatum polyspermum.

1627. *Cassia.* Cal. 5sepalus. Pet. 5, inferiora declinata. Stamina declinata inaequalia, inferiorum antherae elongatae apice poro gemino hiscentes. Legumen compressum subseptatum, interdum pulpa repletum.

1628. *Caesalpinia.* Cal. 5fidus inaequalis. Pet. 5, unicum insigne. Stamina basi pilosa. Legumen compressum oligospermum.

1629. *Hofmannseggia* Cav. Cal. 5partitus. Pet. 5, unguibus glanduloso-pilosis, supremum insigne. Stam. glanduloso-pilosa, unico abortiente. Stigma clavatum. Legumen gracile compressum.

1630. *Mezoneuron* Desf. Cal. 5partitus, lacinia infima maxima. Pet. 5, summum minus ceteris. Stam. declinata. Legumen membranaceum non dehiscens, nervo longitudinali percursum, ad quem figuntur semina.

1631. *Cubaea* Scop. Cal. 5lobus inaequalis persistens. Cor. 5petala subpapilionacea. Stamina inaequalia. Legumen compressum oligospermum.

1632. *Parkinsonia.* Cal. 5partitus. Pet. 5, infimum reniforme. Stam. subaequalia. Legumen moniliforme elongatum.

1633. *Afzelia* Sm. Cal. 4partitus. Pet. 4, supremum maximum. Stam. 2 abortientia. Legumen multiloculare, semina membrana obvoluta.

1634. *Hymenaea.* Cal. 4partitus. Cor. 5petala subpapilionacea, imo carinato. Pistillum setaceum elongatum. Legumen ligneum 1loculare, seminibus in pulpa farinosa nidulantibus.

1635. *Myrospermum* Jacqu. Cal. campanulatus, limbo obsolete dentato. Cor. 5petala subpapilionacea, supremo maximo obcordato. Stam. declinata. Legumen apice tumidum oligospermum basi membranaceum.

1636. *Anagyris.* Cal. 2labiatus 5dentatus. Cor. papilionacea, vexillo abbreviato, carina 2petala elongata. Legumen polyspermum.

1637. *Cercis.* Cal. urceolatus 5dentatus. Alae insignes divaricatae. Stam. inaequalia. Legumen compressum sutura alata.

1638. *Anthonotha* P. B. Cal. 2lobus. Pet. 5, in quibus vexillum maximum, carina longe unguiculata 2loba. Stam. inaequalia, 3 majora perfectiora. Legumen magnum polyspermum.

Cor. papilionacea.

1639. *Sophora.* Cal. 5dentatus. Legumen moniliforme polyſpermum.
1640. *Podaliria* Lam. Cal. 5fidus inaequalis baſi intruſa. Stamina perſiſtentia baſi ſubconnata. Legumen ventricoſum polyſpermum.
1641. *Baptiſia* Vent. Cal. 2labiatus. Vexillum lateribus reflexis. Stamina decidua. Legumen ventricoſum polyſpermum.
1642. *Virgilia* Lam. Cal. 5fidus. Pet. longitudine aequalia. Vexillum planum. Stigma imberbe. Legumen compreſſum oblongum polyſpermum.
1643. *Cyclopia* Vent. Cal. 5fidus inaequalis baſi intruſa. Vexillum rugis longitudinalibus: alae plica transverſa. Stamina decidua. Stigma hinc barbatum. Legumen compreſſnm polyſpermum.
1644. *Thermia* Nutt. Cal. 2labiatus. Petala longitudine ſubaequalia. Vexillum lateribus reflexis, carina obtuſa. Stamina perſiſtentia. Legumen lineare compreſſum polyſpermum.
1645. *Edwardſia* Salisb. Cal. 5dentatus. Legumen 4pterum polyſpermum.
1646. *Chorizema* Labill. Cal. 2labiatus. Carina ventricoſa alis brevior. Stylus uncinatus, ſtigmate oblique obtuſo. Legumen ventricoſum polyſpermum.
1647. *Podolobium* R. Br. Cal. 2labiatus. Carina compreſſa alas aequans. Stylus aſcendens. Legumen ſtipitatum lineari-oblongum.
1648. *Oxylobium* Andr. Cal. 5partitus. Carina compreſſa alas aequans. Stylus aſcendens. Legumen ovatum acutum polyſpermum.
1649. *Gompholobium* Sm. Cal. 5partitus ſubaequalis. Vexillum planum. Legumen ſubgloboſum obtuſiſſimum polyſpermum.
1650. *Sphaerolobium* Sm. Cal 2labiatus. Stylus apice hinc membrana acutus. Legumen globoſum 1ſpermum.
1651. *Gaſtrolobium* R. Br. Cal. 2labiatus. Petala longitudine aequalia. Stylus ſubulatus aſcendens. Legumen ventricoſum. Semina 2ſtrophiolata.
1652. *Calliſtachys* Vent. Cal. 2labiatus. Vexillum erectum. Legumen ſtipitatum lignoſum polyſpermum apice dehiſcens, ante maturitatem multiloculare.
1653. *Euchilos* R. Br. Cal. 2labiatus, lab. ſup. maximo, baſi 2bracteatus. Germen ſtipitatum. Legumen compreſſum ſub-1ſpermum. Strophiolus ſeminis lobis poſticis integris.
1654. *Pultenaea* Sm. Cal. 5fidus 2bracteatus. Germen ſeſſile. Legumen 2ſpermum. Strophiolus ſeminis lobis poſticis incifis.
1655. *Sclerothamnus* R. Br. Cal. 2labiatus 2bracteatus. Germen pedicellatum. Legumen ventricoſum 1ſpermum.
1656. *Davieſia* Sm. Cal. 5fidus ebracteatus. Carina petalis reliquis minor. Germen pedicellatum. Legumen compreſſum angulatum elaſtice dehiſcens 1ſpermum. Strophiolus ſeminis poſtice integer.
1657. *Eutaxia* R. Br. Cal. 2labiatus. Vexillum latum. Stylus uncinatus. Stigma capitatum. Legumen ventricoſum ſub-1ſpermum. Semina ſtrophiolata.
1658. *Dillwynia* Sm. Cal. 2labiatus. Stamina et petala tubo calycis medio inſerta. Vexillum latum divaricato-bilobum. Stylus uncinatus. Legumen ventricoſum 2ſpermum. Semina ſtrophiolata.
1659. *Aotus* Sm. Cal. 2labiatus. Stamina decidua. Stylus filiformis. Legumen 2ſpermum.

1660. *Viminaria* Sm. Cal. 5dentatus angulatus. Legumen coriaceum evalve farctum 1fpermum.

1661. *Jackfonia* R. Br. Cal. 5partitus. Stam. decidua. Legumen 2valve ovatum 1fpermum, valvis intus pubefcentibus.

1662. *Burtonia* R. Br. Cal. 5partitus. Petala longitudine aequalia. Legumen fubrotundum 1fpermum intus laeve.

1663. *Brachyfema* R. Br. Cal. bafi ventricofus 5fidus. Vexillum breviffimum. Germen ftipitatum bafi vaginulatum. Legumen ventricofum polyfpermum.

1664. *Mirbelia* Sm. Cal. 2labiatus. Legumen 2loculare 2fpermum, futura inflexa.

1665. *Ormofia* Jackf. Cal. 2labiatus. Stigmata 2, inferius incurvum. Legumen compreffum lignofum fub-2fpermum.

II. *Flores imperfecti.*

1. *Fructus fuperi.*

1666 *Samyda.* Cal. coloratus perfiftens 5fidus. Urceolus ftriatus ftaminifer. Capf. 4-5valvis polyfperma. *Samydeae.*

1667. *Cafearia.* Cal. fub-4fidus perfiftens. Urceolus ftaminifer glandulis totidem ftipitatis interruptus. Stigma 3lobum. Capf. baccata 3valvis. Semina baccata. *Samydeae.*

1668. *Augea* Thunb. Cal. 5partitus. Urceolus ftaminifer fubcontinuus. Capf. 10locularis. *Familia?*

1669. *Aquilaria* Cav. Cal. 5partitus. Urceolus crenatus, intus ftamina fetacea gerens. Capf. 2locularis 2valvis 2fperma: femina in pulpa fungofa. *Samydeae.*

1670. *Daïs.* Flores capitati involucrati. Cal. bafi ventricofus tubulofus, limbo fub-5fido. Stam. tubo inferta. Bacca 1fperma. *Thymelaeae.*

1671. *Rhynchotheca* R. et P. Cal. 5fepalus. Stylus breviffimus, ftigmatibus 5 elongatis. Cocci 5 1fpermi fuperne caudati. *Geranieae.*

1672 *Heterodendron* Desf. Cal. urceolatus margine repando. Filamenta breviffima. Antherae 4gonae 2loculares. Styl. 0. Germina 4 globofa. *Terebinthaceae.*

1673. *Stylobafium* Desf. Flores polygami. Cal. urceolatus 5lobus. Antherae 4loculares (?) Stylus lateralis ftigmate capitato. Drupa fub-1fperma. *Terebinthaceae.*

1674. *Calpidia* Thuar. Cal. campanulatus coloratus bafi perfiftens. Stam. bafi calycis inferta. Antherae 2lobae. Nux 1fperma calycis bafi formata. *Nyctagineae.*

1675. *Darwinia* Rudg. Cal. corollinus tubulofus, limbo 5fido. Antherae duplici ferie fauci corollae infertae, filamentis breviffimis. Stylus longiffime exfertus. Germen fuperum. *Familia?*

1676. *Hardwickia* Roxb. Cal. corollinus 5fepalus. Stam. alterna longiora. Stylus afcendens. Legumen lanceolatum 1fpermum. *Leguminofae.*

1677. *Copaifera.* Cal. 4partitus patens. Antherae 2loculares. Legumen oligofpermum. *Leguminofae.*

1678. *Crudia* Schreb. Cal. 4partitus. Legumen maximum alatum. *Leguminofae.*

1679. *Diplochlaena* R. Br. Involucrum multiflorum ext. 5partitum, int. 10phyllum. Cal. 5paleaceus. Filamenta elongata bafi pilofa perfiftentia. Folliculi 5 1fpermi. *Rutaceae.*

1680. *Adenoſtemon* Perſ. Cal. corollinus 7ſepalus. Stamina triplici ſerie ſenſim minora. Glandulae duae ad baſin filamenti. Stigma diviſum. Drupa nuce 2-3loculari. *Familia?*
1681. *Queria* Löfl. Cal. 5partitus. Stam. inaequalia, ſaepe alterna abortientia. Capſ. 1locularis 3valvis 1ſperma. *Paronychie.*

2. *Fructus inferi.*

1682. *Terminalia.* Flores polygami. Cal. 5fidus interne piloſus. Drupa 1ſperma. *Bucideae.*
1683. *Bucida.* Flores ☿. Cal. campanulatus 5dentatus. Stamina duplici ſerie, alterna longiora. Antherae geminae. Drupa 1ſperma. *Bucideae.*
1684. *Gimbernatia* R. et P. Flores polygami. Cal. campanulatus 5fidus. Drupa 1ſperma inaequaliter alata. *Bucideae.*
1685. *Getonia* Roxb. Cal. 5ſepalus perſiſtens. Filamenta alterna latiora, et in limbo calycis. Achenium 5ſtriatum calyce coronatum. *Onagrae?*

D I G Y N I A.

1686. *Royena.* Cal. urceolatus 5fidus. Cor. urceolata 5loba. Stam. corollae inſerta. Styli coaliti. Bacca ſupera 4locularis ſubdiſperma. *Styraceae.*
1687. *Turaria* Molin. Cal. tubuloſus 5fidus. Cor. 1petala. Antherae didymae. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Styraceae.*
1688. *Adraſtea* Cand. Cal. 5ſepalus cuſpidatus. Pet. 5. Antherae loculis lateralibus elongatis. Fructus? *Dillenieae.*
1689. *Recchia* Seſſ. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. denticulata. Stigmata capitata. Fructus? *Dillenieae.*
1690. *Hydrangea.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Stam. alterna longiora. Capſ. 2locularis calyce ſtylisque coronata. *Saxifrageae?*
1691. *Cunonia.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae didymae. Folliculi 2 connati ſtylis coronati: ſemina triquetra. *Ericeae.*
1692. *Tiarella.* Cal. corollinus 5partitus. Pet. 5 anguſta longe unguiculata. Capſ. 1locularis 2valvis. *Saxifrageae.*
1693. *Mitella.* Cal. ventricoſus 5dentatus. Pet. 5 pinnatifida. Stigmata 2 ſeſſilia. Capſ. 1locularis 2valvis obtuſa. *Saxifrageae.*
1694. *Saxifraga.* Cal. 5fidus perſiſtens. Pet. 5. Capſ. 2roſtris, diſſepimento placentifero, ſeminifera. *Saxifrageae.*
1695. *Gypſophila.* Cal. angulatus 5fidus. Pet. 5. Capſ. 1locularis 5valvis. *Caryophylleae.*
1696. *Saponaria.* Cal. cylindricus baſi nudus. Petala 5 unguiculata. Capſ. oblonga 1locularis.
1697. *Dianthus.* Cal. tubuloſus baſi ſquamis ſuffultus. Pet. 5. Stamina tum petalorum baſi tum annulo perigyno inſerta. Capſ. 1locularis apice dehiſcens. *Caryophylleae.*
1698. *Trianthema.* Cal. corollinus 5fidus ſub apice mucronatus. Styli ſaepe connati. Capſ. circumſciſſa 2locularis. *Portulaceae.*
1699. *Scleranthus.* Cal. urceolatus 5fidus. Caryopſis 1 in baſi calycis perſiſtentis. *Chenopodeae.*
1700. *Chryſoſplenium.* Cal. corollinus ſuperus 4-5lobus. Capſ. 2partibilis polyſperma, ſeminibus fundo affixis. *Saxifrageae.*
1701. *Pachynema* R. Br. Cal. 5ſepalus perſiſtens. Pet. 5 (ex ic. Leſſert.) o (e Cand.) Filamenta craſſiſſima. Ovaria 2 ſupera. *Dillenieae.*

TRIGYNIA.

1702. *Bembix* Lour. Cal. inferus 2partitus. Pet. 5. Stam. alterna longiora: antherae 2loculares. Bacca ovata 3locularis. *Familia?*
1703. *Deutzia* Thunb. Cal. inferus campanulatus 5fidus. Pet. 5 obtuſa. Filamenta apice 3fida. Capſ. 3locularis polyſperma. *Familia?*
1704. *Malpighia.* Cal. 5partitus extus glanduloſus. Pet. unguiculata. Stamina baſi ſubconnata. Drupa 3pyrena. *Malpighieae.*
1705. *Galphimia* Cav. Cal. 5partitus eglanduloſus. Pet. unguiculata. Capſ. 3cocca, coccis dorſo dehiſcentibus. *Malpighieae.*
1706. *Baniſteria.* Cal. 5partitus extus glanduloſus. Pet. unguiculata. Styli apice plani. Samarae 3 1alatae. *Malpighieae.*
1707. *Vargaſia* Berter. Cal. 5partitus eglanduloſus. Pet. ſubſeſſilia. Styli baſi connati apice revoluti. Samara apice alata. *Malpighieae.*
1708. *Triopteris.* Cal. 5partitus extus glanduloſus. Pet. unguiculata. Samarae 3-4alatae. *Malpighieae.*
1709. *Hiraea* Jacqu. Cal. 5partitus glanduloſus ſ. eglanduloſus. Pet. unguiculata. Achenia 3 dorſo criſtata, ala membranacea cincta. *Malpighieae.*
1710. *Erythroxylon.* Cal. 5partitus. Pet. baſi ſquama plicata aucta. Stamina baſi cohaerentia. Drupa 1ſperma. *Familia?*
1711. *Schinus.* Flores dioeci. Cal. 5partitus. Pet. 5. Stylus 0. Stigmata 3. Bacca 3locularis 3ſperma. *Terebinthaceae.*
1712. *Stellaria.* Petala 2fida. Capſ. 1locularis ſub-6valvis polyſperma. *Caryophylleae.*
1713. *Arenaria.* Petala integra. Capſ. 1locularis ſemi-3-5-6-valvis polyſperma. *Caryophylleae.*
1714. *Cucubalus.* Petala 2fida. Capſ. baccata. *Caryophylleae.*
1715. *Silene.* Petala 2fida, fauce (plerumque) coronata. Capſ. baſi 3locularis. *Caryophylleae.*
1716. *Cherleria.* Cal. 5ſepalus. Pet. minima emarginata. Capſ. 3valvis oligoſperma. *Caryophylleae.*
1717. *Garidelia.* Cal. corollinus 5ſepalus. Nectaria petaloidea 2labiata 2fida. Capſ. 2-3 polyſpermae connatae. *Ranunculeae.*
1718. *Diaphora* Lour. Flores androgyni. Cal. 3valvis, interiore ariſtata. Cor. 2valvis calyce longior. Antherae ſubſeſſiles apice caudatae receptaculo paleaceo inſertae. Styl. 0. Stigmata 3. *Gramen.*

TETRAGYNIA.

1719. *Micropetalon* Perſ. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 minutiſſima aut 0. Stigmata 4 ſeſſilia. Capſ. ovata 4valvis. *Caryophylleae.*

PENTAGYNIA.

1720. *Ceraſtium.* Cal. 5partitus. Pet. 2fida. Capſ. 1locularis apice 10dentata. *Caryophylleae.*
1721. *Lychnis.* Cal. tubuloſus 5dentatus. Petala unguiculata fauce (plerumque) coronata. Capſ. 1locularis. *Caryophylleae.*
1722. *Spergula.* Cal. 5partitus. Pet. integra. Capſ. 1locularis apice profunde dentata. *Caryophylleae.*
1723. *Bergia.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 5locularis 5valvis. *Caryophylleae.*

1724. *Oxalis.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stamina alterna longiora. Capſ. 5gona 5locularis 5valvis, ſeminibus arillatis ad angulos loculorum fixis. *Oxalideae.*
1725. *Ledocarpon* Desf. Cal. 5partitus bracteis ſuffultus. Pet. 5. Stam. alterna longiora. Capſ. 5locularis, valvis introrſum flexis, polyſperma. *Oxalideae.*
1726. *Lancretia* Delil. Cal. 4-5ſepalus. Pet. 4-5. Stam. alterna breviora. Capſ. 5locularis 5valvis. *Hypericeae.*
1727. *Droſophyllum* Link. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Capſ. 1locularis 5valvis. *Droſereae.*
1728. *Grielum.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Stam. perſiſtentia. Utriculi 5. *Geranieae.*
1729. *Penthorum.* Cal. 5partitus. Pet. 5 aut 0. Capſ. 5locularis 5roſtris, ſeminibus ad diſſepimenta fixis. *Sedeae.*
1730. *Sedum.* Cal. 5-6partitus. Pet. 5, 6. Squamae nectariferae ad baſin petalorum. Capſ. 5-6 aut plures discretae folliculares, ſeminibus ad ſuturam fixis. *Sedeae.*
1731. *Cotyledon.* Cal. 5partitus. Cor. 5partita. Squamae nectariferae in fundo corollae. Capſ. 5 folliculares, ſeminibus ad ſuturam fixis. *Sedeae.*
1732. *Suriana.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Styli laterales. Capſ. 5 1ſpermae. *Roſaceae.*
1733. *Bieberſteinia* Steph. Cal. 5ſepalus irregularis perſiſtens. Petala 5 unguiculata. Styli centrales. Capſ. 5 1ſpermae. *Roſaceae?*
1734. *Joncquetia* Schreb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Capſ. 1locularis 5valvis 5cocca. *Terebinthaceae.*
1735. *Robergia* Schreb. Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma, nuce 2valvi. *Terebinthaceae.*
1736. *Cneſtis* Juſſ. Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 5 2valves 1ſpermae. *Terebinthaceae.*
1737. *Spondias.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Drupa nuce 5loculari, putamine echinato. *Terebinthaceae.*
1738. *Averrhoa.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stamina alterna longiora baſi annulo juncta. Bacca 5locularis, loculis oligoſpermis. *Terebinth.* — *Oxalid.*
1739. *Kiggelaria.* Flores dioeci. Cal. 5partitus. Pet. 5. Glandulae nectariferae 5 3lobae. Antherae apice foratae. Capſ. 1locularis 5valvis polyſperma. *Terebinthaceae.*
1740. *Smegmaria* W. Cal. 5partitus. Pet. 5, 6. Diſcus ſtelliformis nectarifer. Stam. 5 nectario, 5 receptaculo inſerta. Capſ. 5 ſtellatae 1loculares 2valves polyſpermae. *Familia?*
1741. *Coriaria.* Flores ſubdioeci. Cal. campanulatus 10fidus duplici ordine. Pet. 0. Styl. 0. Stigmata 5 ſubulata. Nuculae 1ſpermae. *Familia?*

DECAGYNIA.

1742. *Nevrada.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Capſ. 10locularis calyce veſtita. *Portulaceae.*
1743. *Gaſtonia* Commerſ. Cal. ſuperus 1ſepalus truncatus. Pet. 5. Capſ. baccata 10locularis. *Aralieae.*
1744. *Phytolacca.* Cal. 5partitus inferus. Genitalia numero varia. Pet. 0. Bacca ſub-10locularis, loculis 1ſpermis. *Chenopodeae.*

CLASSIS X.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

1536. Panzera W.

falcata W. *Guiana.* Arbor excelſa, foliis pinnatis, floribus paniculatis. (Eperua Aubl.)

1537. Cyrta Lour.

agreſtis Lour. *Cochinchina.* Arbuscula, foliis ovatis ſerratis, floribus ſubracemoſis albis.

1538. Inocarpus Forſt.

edulis Forſt. *Inſ. Molucc. et ocean. auſtr.* Arbor, foliis alternis ovato-oblongis elongatis coriaceis integerrimis, floribus racemoſis albis.

1539. Styrax.

officinalis 1. St. foliis ovatis utrinque ſubattenuatis ſubtus villoſiusculis, racemis ſimplicibus paucifloris. *Aſia minor. Syria. Graecia.*

tomentoſus Humb. 2. St. foliis ovato-oblongis membranaceis acutis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus ſub-8floris. *Quito.*

albus Mart. 3. St. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis ſubtus reticulatis tomentoſis, pedunculis paucifloris abbreviatis. *Braſil.*

Benzoin Dryand. 4. St. foliis oblongis acuminatis ſubtus tomentoſis, racemis compoſitis folia aequantibus. *Sumatra.*

grandifolius Ait. 5. St. foliis obovatis ſubtus villoſis, pedunculis inferioribus 1floris ſuperioribus racemoſis. *Amer. bor.* (St. officinalis Walt.)

pulverulentus Mx. 6. St. foliis ſubſeſſilibus obovatis obtuſis ſubtus pulverulento-tomentoſis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis. *Carolina.* (St. laevigatus Sims.)

laevigatus Ait. 7. St. foliis ovatis denticulatis glabris, axillis venarum ſubtus barbatis, pedunculis axillaribus 1floris calycibusque pubeſcentibus. *Carolina.* (St. glabrum Cav., americana Lam., laeve Walt.)

1540. POTALIA Aubl.

amara Aubl. *Guiana.* Arbuscula foliis oppoſitis oblongis, floribus corymboſis albo-luteis. (Nicandra Schreb. W.)

1541. ARBUTUS.

* *Arboreae.*

Unedo 1. A. foliis oblongis coriaceis glabris crenato-ſerratis, ramulis glanduloſo-piloſis, paniculis terminalibus laevibus pendulis. *Europ. auſtr. Hibernia.*

canarienſis Lam. 2. A. foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus glaucis, paniculis erectis hiſpido-glutinoſis. *Inſ. Canar.*

hybrida Ker. 3. A. foliis oblongis acutis ſerratis glabris, ramulis piloſis, paniculae terminalis pendulae pedunculis pubeſcentibus, calycibus glabris. *Patria?* (A. andrachnoides Link.)

Andrachne 4. A. foliis oblongis obtuſiusculis integerrimis ſubſerratisque, panicula erectiuscula viſcido-pubeſcente. *Graecia. Tauria. Aſia minor.* (A. integrifolia Lam.)

laurifolia L. ſuppl. 5. A. foliis oblongis utrinque attenuatis argute ſerratis glabris, racemis axillaribus ſimpliciſſimis ſecundis. *Amer. bor.*

petiolaris Kunth. 6. A. foliis longe petiolatis oblongis mucronatis denticulatis membranaceis ſubtus tomentoſis, racemis congeſtis abbreviatis. *Mexico.*

denſiflora Kunth. 7. A. foliis oblongis acutis argute dentatis coriaceis ſubtus fuſco-villoſiusculis, panicula erecta terminali thyrſoidea. *Mexico.*

mollis Kunth. 8. A. foliis oblongis acutis argute dentatis coriaceis ſupra villoſis ſubtus incano-tomentoſis, panicula terminali thyrſoidea. *Mexico.*

phillyreaefolia Perſ. 9. A. ramis divaricatis, foliis lanceolatis acuminatis glabris argute ſerratis, floribus axillaribus. *Peru.*

xalapenſis Kunth. 10. A. foliis oblongis acutis integerrimis ſupra glabris ſubtus fuſco-tomentoſis, panicula erecta pubeſcente. *Mexico.*

ferruginea L. ſuppl. 11. A. foliis oblongis obtuſis glabris integerrimis, racemis terminalibus. *Nov. Granat.*

Menzieſii Pursh. 12. A. foliis ovalibus integerrimis glabris longe petiolatis, paniculis axillaribus congeſtis. *Ora occid. Amer. bor.*

** *Fruteſcentes.*

tomentoſa Pursh. 13. A. foliis ſubcordato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, racemis ſubcapitatis pedunculatis axillaribus. *Ora occid. Amer. bor.*

mucronata Forſt. 14. A. foliis ovato-oblongis cuſpidatis ſerratis rigidis utrinque nitidis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis. *Ad fretum Magellan.*

microphylla Forſt. 15. A. foliis ovatis acutis ſerratis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ad fretum Magellan.* (A. ſerpyllifolia Lam.)

pumila Forſt. 16. A. caule proſtrato, foliis alternis diſtichis oblongis ſubintegerrimis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Ad fretum Magellan.* (Andromeda empetrifolia Lam.)

1542. ARCTOSTAPHYLOS Adanſ.

Uva urſi * 1. A. caule procumbente fruticoſo, foliis obovatis integerrimis coriaceis nitidis, floribus faſciculatis. *Europ. et Amer. bor.* (Arbutus L.)

alpina * 2. A. caule fruticoſo, foliis deciduis oblongis ſerratis reticulato-rugoſis ſubtus albidis, racemis terminalibus. *Alp. Helvet. Regio arctica Europ. Aſiae et Amer.* (Arbutus L.)

pungens Kunth. 3. A. caule erecto fruticoſo, foliis ovato-oblongis acutis mucronatis coriaceis utrinque tenuiſſime pubeſcentibus, racemis terminalibus. *Mexico.*

glauceſcens Kunth. 4. A. caule fruticoſo, foliis oblongis obtuſis mucronatis coriaceis ſubtus glaucis, racemis terminalibus ſecundis. *Mexico.*

polifolia Kunth. 5. A. caule erecto fruticoſo, foliis lineari-lanceolatis margine revolutis integerrimis ſubtus glauco-pubeſcentibus, racemis terminalibus. *Mexico.*

1543. ENCYANTHUS Lour.

quinqueflorus Lour. 1. E. caule arboreo, floribus quinis. *China auſtr.*

biflorus Lour. 2. E. caule fruticoſo, floribus geminis. *China auſtr.*

1544. GAULTHERIA.

* *Pedunculis unifloris.*

procumbens 1. G. foliis oblongis utrinque attenuatis mucronatis ſubſerratis coriaceis utrinque glabris, caule decumbente, pedunculis nutantibus. *Amer. bor.*

buxifolia W. 2. G. foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis dentatis coriaceis ſubtus punctato-ſcabris, caule erecto, ramis hirtis, pedunculis filiformibus. *Caracas.*

anaſtomoſans Kunth. 3. G. foliis ovatis acutis obſolete denticulatis ſupra nitidis ſubtus reticulato-venoſis ſtrigoſo-hirſutis, pedunculis piloſis. *Amer. auſtr.* (Andromeda anaſtomoſans Mut. L. ſuppl. glomerata Cav.)

purpurafcens Kunth. 4. G. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ferrulatis fubtus purpurafcentibus pedunculisque hirfutis. *Nov. Granat.*

myrfinoides Bonpl. 5. G. foliis ovato-oblongis acutis apice crenato-denticulatis fupra nitidis, pedunculis pubefcentibus. *Nov. Granat.*

** *Floribus racemofis.*

fcabra W. 6. G. foliis cordato-ovatis acutis denticulatis fcabris fubtus reticulato-venofis, racemis fimplicibus, calycibus glandulofo-pilofis. *Caracas.*

odorata W. 7. G. foliis fubcordato-oblongis cufpidatis argute denticulatis fupra nitidis fubtus fcabris, ramis racemisque glandulofo-pilofis. *Nov. Granat.*

erecta Vent. 8. G. foliis ovatis mucronatis ferrugineo-hirfutis, ramis racemisque glandulofo-vifcofis. *Peru.*

Shallon Pursh. 9. G. foliis fubcordato-ovatis acutis coriaceis ferrulatis utrinque glabris, racemis ferrugineo-pubefcentibus. *Ora occid. Amer. bor.*

fragrantiffima Wall. 10. G. foliis ovato-lanceolatis ferratis fubtus refinofo-punctatis, ramis flexuofis, racemis pubefcentibus. *Nepal.*

hifpida * 11. G. foliis oblongis utrinque rotundatis apice callofis integerrimis margine revolutis utrinque hifpidulis, ramis hirtis, racemis terminalibus ftrictis fecundis vifcofo-pilofis. *Brafil.* Sello.

tomentofa Kunth. 12. G. foliis oblongis acutis fubintegerrimis margine revolutis fupra glabris fubtus ferrugineo-tomentofis, racemis terminalibus erectis floribusque tomentofis. *Quito.* (Andromeda bracteata Cav.?)

rigida Kunth. 13. G. foliis fubcordato-oblongis acutis argute denticulatis utrinque glabris, racemis pubefcentibus. *Cumana.*

cordifolia Kunth. 14. G. foliis profunde cordatis ovatis acutis ferrulatis coriaceis fubtus racemisque glandulofo-pilofis, corollis glutinofis. *Nov. Granat.*

coccinea Kunth. 15. G. foliis fubrotundo-ovatis acutiusculis denticulatis fupra nitidis fubtus fcabris, racemis corollisque glandulofo-pilofis. *Caracas.*

reticulata Kunth. 16. G. foliis oblongis utrinque attenuatis crenulato-ferratis fupra nitidis fubtus reticulato-venofis, racemis pubefcentibus, corollis glabris. *Quito.*

antipoda Forft. 17. G. foliis ovato-fubrotundis denticulatis utrinque reticulato-venofis glaberrimis, ramis tomentofis, racemis paniculatis fubhirfutis, corollis glabris. *Nov. Zeeland.*

1545. EPIGAEA.

repens 1. E. caule repente fruticofo ferrugineo-hirfuto, foliis cordato-oblongis obtufiusculis integerrimis hirfutis, racemis fubfpicatis, corollis cylindricis. *Amer. bor.*

2.

cordifolia Sw. 2. E. caule erectiusculo fuſco-ſtrigoſo, foliis cordato-ſubrotundis rigidis hiſpidis venoſis ſerrulato-ſetoſis, racemis ſubſpicatis, corollis ovatis. *Guadalupa. Cayenna.* (Gaultheria ſphagnicola Rich.)

1546. ANDROMEDA.

* *Pedunculis ſolitariis unifloris.*

† *Foliis imbricatis.*

tetragona 1. A. foliis 4fariam imbricatis appreſſis ſub-3quetris obtuſis glabris, pedunculis elongatis, corollis campanulatis. *Regio arctica Europ. Aſiae et Amer.*

lycopodioides Pall. 2. A. foliis 4fariam imbricatis appreſſis obtuſiusculis abbreviatis, pedunculis geminis axillaribus, corollis campanulatis. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.*

faſtigiata Wall. 3. A. foliis 4fariam imbricatis lanceolato-ſagittatis revolutis, floribus axillaribus. *Nepal. Mongolia.*

cupreſſiformis Wall. 4. A. foliis 4fariam imbricatis ovatis 3gonis margine membranaceis apice ariſtatis, pedunculis villoſis. *Nepal.*

ericoides Pall. 5. A. foliis appreſſis convexis ſetaceo-ciliatis, corollis globoſis (8andris?). *Davuria. Camtſchatca.*

hypnoides 6. A. foliis conferto-imbricatis erectis lineari-ſubulatis, pedunculis elongatis, corollis campanulatis. *Regio arctica Europ. Aſiae et Amer.*

†† *Foliis ſparſis.*

calyculata 7. A. foliis ovali-oblongis obtuſis obſolete ſerrulatis ſubmucronatis utrinque lepidotis, pedunculis axillaribus ſecundis abbreviatis. *Boruſſia orient. Ruſſia. Sibiria. Amer. bor.*

myrſinites Lam. 8. A. foliis ovato-oblongis argute ſerratis glabris, pedunculis axillaribus breviſſimis. *Ad fretum Magellan.*

criſpa Desf. Link. 9. A. foliis ſpathulato-lanceolatis undulato-criſpis ſubtus ferrugineo-lepidotis, pedunculis abbreviatis. *Carolina.* (A. anguſtifolia Pursh.)

proſtrata Cav. 10. A. caule fruticoſo proſtrato, foliis ovatis acutis ſubſerratis glabris, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Peru.*

** *Pedunculis unifloris aggregatis.*

polifolia 11. A. fruticoſa, foliis lineari-lanceolatis margine revolutis ſupra nitidis ſubtus glaucis, pedunculis terminalibus ſubumbellatis coloratis corolla ter longioribus, laciniis calycinis ovatis. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

rosmarinifolia Pursh. 12. A. fruticoſa, foliis linearibus margine revolutis ſubtus glaucis, pedunculis terminalibus ſubaggregatis corolla longioribus. *Amer. bor.* (A. glaucophylla Link.)

jamaicenſis Sw. 13. A. fruticoſa, foliis oblongis obtuſis ſubcoriaceis ſupra nitidis ſubtus ſublepidotis, pedunculis confertis aggregatis calycibusque ſquamatis. *Jamaica.*

mariana 14. A. fruticoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis deciduis, pedunculis ramorum aphyllorum aggregatis, calycibus foliaceis elongatis, corollis ovato-cylindricis. *Amer. bor.*

ſpecioſa Mx. 15. A. fruticoſa, foliis ovato-oblongis ſerratis ſempervirentibus reticulato-venoſis ſubtus glaucescentibus, pedunculis ramorum aphyllorum aggregatis, corollis campanulatis. *Amer. bor.* (A. caſſinaefolia Vent., pulverulenta Bartr.)

† *rhomboidalis* Ham. 16. A. fruticoſa, ramis floriferis 3quetris, foliis ſubrhomboideo-oblongis cartilagineis glabris ſubtus ferrugineis integerrimis apice calloſis, pedunculis axillaribus elongatis filiformibus. *Florida.*

*** *Floribus racemoſis ſ. paniculatis.*

faſciculata Sw. 17. A. arborea, foliis oblongis obtuſis ſubcrenulatis coriaceis, racemis petiolo brevioribus, pedunculis aggregatis deflexis. *Jamaica.*

ſalicifolia Lam. 18. A. arborea, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus albidis 3nerviis, racemis terminalibus ſecundis. *Inſ. Mascaren.*

buxifolia Lam. 19. A. fruteſcens, foliis cordato-ovatis integerrimis mucronulatis ſubtus albido-tomentoſis, racemis terminalibus ſecundis. *Inſ. Mascaren.*

rupeſtris Forſt. 20. A. fruteſcens, foliis oblongis ſerrulatis, racemis ſimpliciſſimis bracteatis, corollis campanulatis. *Nov. Zeeland.*

nitida Mx. 21. A. fruticoſa, ramis ſub-3quetris, foliis oblongis acuminatis integerrimis coriaceis nitidis, racemis axillaribus, corollis cylindricis. *Carolina. Florida.* (A. coriacea Ait., lucida Lam., mariana Jacq.)

acuminata Ait. 22. A. fruticoſa, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubſerrulatis coriaceis nitidis reticulato-venoſis, racemis corymboſis axillaribus breviſſimis, pedicellis nutantibus. *Georgia. Florida.* (A. lucida Jacq., populifolia Lam., laurina Mx., reticulata Walt.)

ſpinuloſa Pursh. 23. A. fruticoſa, foliis ovato-oblongis acuminatis ſubſerrulatis, ſerraturis appreſſo-ſpinuloſis, racemis ſubſpicatis axillaribus bracteatis ſecundis. *Carolin. auſtr.* (A. Catesbaei Walt.)

axillaris Ait. 24. A. fruticoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis cartilagineo-ſerratis coriaceis glabris lucidis, petiolis ramulisque glanduloſo-piloſis, racemis ſpicatis axillaribus bracteatis, floribus confertis. *Amer. bor.* (A. Walteri W.)

racemoſa 25. A. fruticoſa, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſerrulatis membranaceis glabris, racemis terminalibus elongatis ſubſimplicibus bracteatis, co-

rollis cylindricis, antheris apice geminatim 4ariſtatis. *Amer. bor.* (A. paniculata Walt.)

bracamorenſis Kunth. 26. A. arboreſcens, foliis ovato-oblongis obtuſiuſculis integerrimis margine revolutis coriaceis utrinque glabris, racemis erectis ſubſolitariis. *Nov. Granat.* Humb.

revoluta * 27. A. foliis ovato-oblongis obtuſis mucronatis coriaceis margine revolutis integerrimis utrinque glabris, racemis axillaribus nutantibus. *Braſil.*

pubeſcens Poir. 28. A. foliis ovatis obtuſis coriaceis integerrimis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, racemis breviſſimis faſciculatis. *Inſ. Carib.* (A. rubiginoſa Perſ.)

eriophylla Vand. 29. A. foliis ſubrotundo-ovatis integerrimis apice calloſis ſupra tomentoſis ſubtus lanatis, racemis terminalibus ſecundis bracteatis. *Braſil.*

ilicifolia Perſ. 30. A. foliis late cordatis baſi ſubdentatis coriaceis glaberrimis, floribus racemoſo-paniculatis. *Peru.*

pyrifolia Perſ. 31. A. foliis ovatis acuminatis integerrimis paniculaque glabris. *Inſ. Maſcaren.*

japonica Thb. 32. A. foliis lanceolatis baſi attenuatis apice crenulatis glaberrimis, racemis aggregatis terminalibus. *Japon.*

arborea 33. A. foliis oblongis acuminatis mucronato-ſerratis glabris, paniculis terminalibus, corollis pubeſcentibus, antheris muticis. *Amer. bor.*

floribunda Pursh. 34. A. foliis ovato-oblongis acutis ſerrulatis appreſſo-ciliatis glabris coriaceis, racemis ſecundis congeſto-paniculatis, pedicellis 2bracteatis. *Georgia.*

1547. LYONIA Nutt.

ferruginea Nutt. 1. L. fruticoſa, foliis obovatis integerrimis coriaceis margine revolutis ſubtus ſquamoſo-farinoſis reticulato-venoſis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris furfuraceis. *Georgia. Florida.* (Andromeda Walt.)

rigida Nutt. 2. L. arboreſcens, foliis ſpathulato-lanceolatis integerrimis margine revolutis ſubtus lepidoto-tomentoſis coriaceis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris furfuraceo-ferrugineis, corollis globoſis, antheris muticis. *Carolina.* (Andromeda ferruginea Ait.)

paniculata Nutt. 3. L. foliis lanceolatis baſi attenuatis ſubintegerrimis floribusque pubeſcentibus, paniculae ramis aggregatis. *Amer. bor.* (Andromeda paniculata L., racemoſa Lam.)

frondoſa Nutt. 4. L. foliis ſpathulatis ſerrulatis furfuraceo-hiſpidulis, ramis floriferis folioſis, glomerulis axillaribus paucifloris ſubſeſſilibus. *Amer. bor.* (Andromeda frondoſa Pursh., racemoſa Walt.)

1548. RHODODENDRON.

* *Arborea.*

maximum 1. Rh. foliis oblongis acutis ſubtus discoloribus glabris, umbellis terminalibus, calycis laciniis obtuſis ſubelongatis, corollis campanulatis. *Amer. boreal.*

ponticum 2. Rh. foliis oblongis glabris ſubtus concoloribus, corymbis terminalibus, calycis dentibus abbreviatis acutis, corollis campanulato-rotatis. *Aſia minor ad pontum.*

punctatum Andr. 3. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus ferrugineis reſinoſo-punctatis, umbellis terminalibus, calycis dentibus breviſſimis, corollae infundibuliformis laciniis obtuſis undulatis. *Amer. bor.*

arboreum Sm. 4. Rh. foliis oblongo-lanceolatis nitidis ſubtus pubeſcentibus, racemis terminalibus, capſulis 10locularibus. *Ind. or.*

azaleoides Desf. 5. Rh. foliis oblongis opacis utrinque pubeſcentibus, corymbis terminalibus, laciniis calycis inaequalibus, corolla infundibuliformi. *Patria?*

** *Fruticoſa.*

dauricum 6. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus ferrugineo-punctatis, floribus terminalibus ſubaggregatis, corollis rotatis. *Sibir.*

ferrugineum 7. Rh. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra glabris ſubtus ferrugineo-lepidotis, floribus ſubumbellatis, laciniis calycinis dentato-ciliatis, corollis infundibuliformibus. *Alp. Europ. et Aſiae med.*

chrysanthum Pall. 8. Rh. foliis oblongis ſubtus venoſo-reticulatis discoloribus glabris, umbellis terminalibus, corollis rotatis ſubirregularibus. *Davuria.*

caucaſicum Pall. 9. Rh. foliis oblongis ſupra nitidis ſubtus eveniis ferrugineo-tomentoſis, umbellis terminalibus, corollis rotatis. *Caucaſ.*

campanulatum Wall. 10. Rh. foliis elliptico-oblongis mucronulatis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, corollae campanulatae laciniis planis integerrimis. *Emodi montes.*

anthopogon Wall. 11. Rh. ramulis villoſis, foliis ovalibus ſubtus denſe tomentoſis, floribus capitatis, corollae hypocrateriformis fauce barbata, genitalibus incluſis. *Emodi montes.*

ſetoſum Wall. 12. Rh. ramulis undique ſetoſis, foliis ovalibus obtuſiſſimis ſubtus margineque ſetoſis, pedicellis glanduloſo-ſetoſis, dentibus calycinis breviſſimis. *Emodi montes.*

hirſutum 13. Rh. foliis ſubovalibus crenulatis ciliatis ſubtus reſinoſo-punctatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis fimbriato-barbatis, corollis campanulatis. *Alp. Europ. med.*

catawbiense Mx. 14. Rh. foliis ovalibus glabris ſubtus discoloribus, corymbis compactis terminalibus, calycibus elongatis, corollis campanulatis. *Carolina.*

camtſchaticum Pall. 15. Rh. foliis obovatis ciliatis nudis, pedunculis hirſutis ſubgeminis, calycibus amplis foliaceis, corollis rotatis. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.*

Chamaeciſtus 16. Rh. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis rigidiusculis ciliatis, pedunculis ſubgeminis calycibusque glanduloſo-piloſis, corollis rotatis. *Alp. rhaet. noric. carn. dinar.*

linearifolium Poir. 17. Rh. foliis linearibus coriaceis obtuſis margine revolutis ſubtus ferrugineo-pubeſcentibus, floribus corymboſis, calycibus minutis obtuſis velutinis. *Ind. or.*

lapponicum Wahlenb. 18. Rh. foliis oblongis obtuſis rigidis foveolato-punctatis ſubtus discoloribus lepidotis, ramis divaricatis procumbentibus, pedunculis umbellatis, corollis campanulatis ſub-5andris. *Regio arctica Europ. Aſiae et Amer. bor.* (Azalea L.)

1549. KALMIA.

latifolia 1. K. foliis longe petiolatis ſubternis oblongis utrinque glabris ſubconcoloribus, corymbis terminalibus viſcido-pubeſcentibus. *Amer. bor.*

glauca Ait. 2. K. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus oblongis glabris margine revolutis ſubtus glaucis, corymbis terminalibus bracteatis, pedunculis calycibusque glaberrimis. *Amer. boreal.* (K. polifolia Wangenh.)

anguſtifolia 3. K. foliis petiolatis ternis oblongis obtuſis ſubtus ſubferrugineis, corymbis lateralibus, bracteis linearibus, pedunculis calycibusque glanduloſo-pubeſcentibus. *Amer. bor.*

cuneata Mx. 4. K. foliis ſparſis ſeſſilibus cuneato-oblongis apice ſubariſtatis ſubtus pubeſcentibus, corymbis lateralibus paucifloris. *Carolina.*

hirſuta Walt. Lam. 5. K. foliis ſparſis ſubſeſſilibus ellipticis calycibusque hirſutiſſimis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris folia ſuperantibus. *Carolin. auſtr.*

1550. PTEROSPORA Nutt.

andromedea Nutt. *Ad cataractas Niagarae et in inſula fluvii Hudſon.* Herba pedalis aphylla viſcido-piloſa, floribus racemoſis rubentibus.

1551. CODON.

Royeni *Rariſſima Africae auſtralis.* Burchell. Herba ramoſa, foliis cordato-ovatis coriaceis repandis glabris, floribus ſolitariis albidis. (C. Royeni Thb. longe aliena planta.)

1552. CERATOSTEMMA Juss.

peruvianum Pers. — *Peru.* Frutex ramosus, foliis ovalibus coriaceis sessilibus, floribus paniculatis.

1553. THIBAUDIA Pav.

* *Floribus glabris.*

madagascarensis * — 1. Th. foliis ovatis alternis, floribus axillaribus racemosis. *Madagascar.* (Cavinium Aub. Thuar.)

floribunda Mut. — 2. Th. foliis lanceolatis acuminatis elongatis venosis glabris, racemis axillaribus multifloris erectis. *Nov. Granat.*

longifolia Kunth. — 3. Th. foliis ovato-lanceolatis acuminatis elongatis coriaceis 3-5plinerviis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Granat.* (Th. macrophylla et falcata Kunth.)

rupestris Kunth. — 4. Th. foliis spathulato-lanceolatis reticulato-venosis subtus ramisque pubescentibus, racemis axillaribus. *Nov. Granat.*

nitida Kunth. — 5. Th. foliis oblongis utrinque rotundatis coriaceis supra nitidis subtus punctatis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Granat.*

melastomoides Kunth. — 6. Th. foliis subcordato-oblongis acutis supra glaberrimis subtus reticulato-5plinerviis punctatis, racemis axillaribus folio brevioribus bracteatis. *Nov. Granat.* (Th. strobilifera Kunth.)

Quereme Humb. — 7. Th. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis 5plinerviis, racemis elongatis laxis, bracteis nervosis. *Choco Amer. austr.*

ardisiaefolia Kunth. — 8. Th. foliis oblongis obtusis reticulato-costatis, racemis axillaribus pendulis. *Nov. Granat.*

** *Floribus pubescentibus.*

cordifolia Kunth. — 9. Th. foliis subcordato-oblongis obtusis coriaceis glaberrimis 5plinerviis, racemis terminalibus compactis bracteatis. *Nov. Granat.*

scabriuscula Kunth. — 10. Th. foliis subcordato-oblongis acuminatis 5plinerviis asperiusculis, nervis subtus pubescentibus, racemis terminalibus compactis bracteatis. *Nov. Granat.*

pubescens Bonpl. — 11. Th. foliis ovato-oblongis acuminatis 5plinerviis subtus pubescentibus, racemis axillaribus bracteatis. *Nov. Granat.*

1554. LUSSACIA *.

buxifolia * — *Nov. Granat.* Frutex ramosus, foliis confertis oblongis obtusis utrinque glanduloso-pubescentibus apice callosis, floribus racemosis bracteatis pilosis coccineis. (Gaylussacia Humb. Kunth.)

1555. POLYPHRAGMON Desf.

fericeum Desf. *Inf. Timor.* Frutex ramofus, foliis oppofitis oblongis utrinque attenuatis venofis fubtus fericeis, pedunculis axillaribus folitariis 1floris.

1556. MELASTOMA.

I. *Decandra.*

* *Foliis tri-triplinerviis.*

† *Floribus axillaribus.*

crenatum Vahl. 1. M. hifpidum, foliis fubcordatis oblongis acuminatis crenatis, racemis axillaribus paucifloris petiolos aequantibus. *Amer. auftr.* (M. pauciflorum Desrouff.)

ledifolium Desr. 2. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabriusculis fubtus flavido-tomentofis, pedunculis axillaribus 1floris 2bracteatis. *Peru. Brafil.* Sello.

feffilifolium 3. M. foliis oblongis bafi attenuatis feffilibus integerrimis fubtus tomentofis, pedunculis lateralibus aggregatis 1floris. *Jamaica.*

involucratum Desr. 4. M. foliis ellipticis ferrulatis glabris fubtus pallidis, floribus axillaribus pedunculatis involucratis. *Hifpaniola.*

marginatum Desr. 5. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis marginato-ciliatis fubtus purpurafcentibus hirfutiusculis, peduuculis brevibus paucifloris, calyce echinato. *Brafil.*

ramiflorum Sw. 6. M. foliis oblongis utrinque attenuatis fupra aureis laevibus fubtus ferrugineo-tomentofis, pedunculis 1floris confertis. *Jamaica. Hifpaniola.*

fuccofum Aubl. 7. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis fubtus tomentofis, floribus lateralibus confertis feffilibus, petalis denticulatis. *Guiana.*

arborefcens Aubl. 8. M. foliis ovatis acutis integerrimis glabris, cymis lateralibus bracteatis. *Guiana.*

†† *Floribus terminalibus.*

osbekioides Ker. 9. M. foliis oblongis ciliatis fubtus pallidis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus apice fetofis. *Inf. Mascaren.*

ftrigofum 10. M. caule fruticofo foliisque ovatis obfolete 3nerviis ftrigofo-lineatis, floribus terminalibus folitariis, calycibus hirtis. *Nov. Granat. Guadalupa in cacumine vulcani.* Bertero. *Martinic.*

† *groffularioides* 11. M. foliis fubrotundo-ovatis acuminatis denticulatis glabris, floribus racemofis. *Surinam.*

afperum 12. M. foliis ovato-lanceolatis acutis fcabris fubtus flavefcentibus, ramis afperis, floribus fubracemofis paucis terminalibus. *Ind. or.*

rigidum Sw. 13. M. foliis cordato-ovatis rigidis fubdenticulatis glabris fubtus fcabris, panicula terminali trichotoma ferrugineo-hirta. *Jamaica.*

decuffatum Vahl. 14. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ferrulatis ciliatis fupra glaberrimis, petiolis villofis, pani-

culae ramis ſpicato-glomeratis. *Guiana. Portorico.* (M. racemoſa Aubl.)

montanum Sw. 15. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis crenulatis glabris, panicula erecta trichotoma, calycibus truncatis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

procerum Sw. 16. M. foliis ovato-oblongis acuminatis elongatis glaberrimis ſubintegerrimis, panicula elongata diffuſa, calycibus truncatis. *Ind. occid.* (M. trichotomum Desr. Matuba N. E.)

aſcendens Sw. 17. M. caule fruticoſo ſcandente, foliis ovato-oblongis acuminatis denticulatis glabris, panicula compacta ovata ferruginea, antheris vaginatis. *Jamaica. Portorico.* (M. portoricenſe N. E.)

holoſericeum 18. M. foliis cordato-oblongis integerrimis ſupra lucidis ſubtus incano-ſericeis, ſpicis paniculatis 2partitis, floribus confertis 2ſeriatis. *Braſil.*

† *velutinum* W. 19. M. foliis ovatis acutis integerrimis ſeſſilibus villoſo-ſericeis, racemis brachiatis, ramis 2partitis, caule 4quetro. *Jamaica. Braſil.* (M. holoſericeum Sw.)

lanceolatum Desr. 20. M. foliis anguſte lanceolatis denticulatis ſubtus ramisque ferrugineo-tomentoſis, panicula terminali trichotoma. *Hiſpaniola.*

glabrum Forſt. 21. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris, nervis ſolis binis marginalibus, floribus racemoſis. *Inſ. Societ.* (Conoſtegia Don.)

chryſophyllum Desr. 22. M. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis ſubundulatis glaberrimis ſubtus auratis, panicula terminali. *Madagascar.*

quadrangulare Sw. 23. M. foliis late lanceolatis utrinque attenuatis elongatis integerrimis glaberrimis ſubtus pallidis, nervis ſanguineis, floribus ſpicato-verticillatis paniculatis. *Jamaica.* (M. trinervium Sw.)

punctatum Desr. 24. M. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus furfuraceo-ochroleucis foveolato-punctatis, panicula terminali, floribus ſecundis. *Hiſpaniola.*

cornifolium Desr. 25. M. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus reticulato-venoſis, panicula terminali, calycibus turbinatis circumſciſſis. *Martinica.*

myricoides Desr. 26. M. foliis ovatis acutis denticulatis villoſiusculis, panicula terminali trichotoma, fructibus granuloſis. *Inſ. Antill.*

pallens * 27. M. foliis oblongis acuminatis integerrimis incano-ſubtomentoſis, panicula trichotoma terminali, calycibus turbinatis truncatis. *Hiſpaniola.*

aſtrolaſion * 28. M. foliis ovato-oblongis coriaceis integerrimis ſtellato-pubeſcentibus ſupra nitidis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, paniculae terminalis ramis verticillatis tomentoſis. *Hiſpaniola.* Bertero.

parviflorum Aubl. 29. M. foliis oblongo-lanceolatis elongatis utrinque attenuatis denticulatis glabris, panicula terminali diffuſa, floribus exiguis. *Guiana. Braſil.*

longifolium Aubl. 30. M. foliis ſuperioribus quaternis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis elongatis integerrimis glabris, panicula ſupradecompoſita terminali. *Guiana.*

praſinum Sw. 31. M. foliis lato-lanceolatis utrinque glabris integerrimis lividis, panicula ramoſiſſima terminali. *Guiana. Ind. occid.* (M. laevigatum Aubl.)

mexicanum Humb. 32. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis glabris, panicula terminali, calycibus irregulariter fiſſis. *Mexico.*

reclinatum Humb. 33. M. foliis ovali-oblongis ſubintegerrimis glaberrimis patenti-reflexis, panicula terminali recurva. *Peru.*

loxenſe Humb. 34. M. foliis oblongis acutiuſculis ſerrulatis ſubtus floccoſo-pulverulentis, panicula racemoſa terminali. *Peru.*

ſemicrenatum Rich. 35. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis apice crenatis glabriuſculis, panicula terminali, calycibus circumſciſſis. *Guadalupa.* (M. acuminatum Desrouſſ.)

bracteolatum Humb. 36. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, ſpicis paniculatis terminalibus, bracteis linearibus elongatis. *Loxa.*

aſpergillare Humb. 37. M. foliis ovalibus utrinque attenuatis ſerrulatis ſubtus rufo-tomentoſis, pube aſpergilliformi, panicula rigida thyrſoidea, floribus ſubſeſſilibus. *Quito.*

tomentoſum Rich. 38. M. foliis amplis ovali-oblongis utrinque attenuatis ſubtus rufo-tomentoſis, panicula terminali, floribus ſubſeſſilibus aggregatis. *Guiana.*

caudatum Bonpl. 39. M. foliis oblongis longiſſime acuminatis integerrimis ſubtus rufo-pulverulentis, panicula terminali pyramidata, floribus faſciculatis. *Nov. Granat.*

caelatum Bonpl. 40. M. foliis oblongis crenulatis ſupra bulloſo-caelatis ſubtus rubiginoſo-lanatis, panicula thyrſoidea, floribus glomeratis. *Loxa.*

haploſtachy Bonpl. 41. M. foliis lanceolatis ſupra laevibus ſubtus rufo-tomentoſis, ſpica verticillata terminali. *Ad Orinocum.*

Lima Desr. 42. M. foliis ſubellipticis rigidis ſupra aſperrimo-hiſpidis ſubtus villoſis, panicula terminali hirſuta, floribus glomeratis bracteatis. *Braſil.* Sello.

braſilienſe * 43. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus ramis calycibusque incanis ſtellato-pubeſcentibus, paniculae terminalis ramis divaricatis. *Braſilia.* Sello.

cinnamomifolium Jacq. 44. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glaberrimis integerrimis, floribus umbellatis terminalibus, calycibus truncatis. *Inſ. Antill.*

** *Foliis quinque-quintuplinerviis.*

† *Floribus lateralibus.*

flaveſcens Aubl. 45. M. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis integerrimis ſupra flavidis ſubtus incanis, corymbis lateralibus. *Guiana.*

hirtum 46. M. ramis patentibus teretibus fuſco-hirtis, foliis ſubcordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis

membranaceis utrinque hirſutis, corymbis pauci-floris axillaribus abbreviatis hirtis. *Ind. occid.*

ſpicatum Aubl. 47. M. ramis 4gonis hirtis, foliis oblongis acuminatis ſubdenticulatis ferrugineo-hirſutis, racemis axillaribus ſubſpicatis fulvo-hirtis. *Guiana. Braſil.*

Acinodendron 48. M. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis aſperis membranaceis, pedunculis axillaribus ſubcymoſis paucifloris divaricatis. *Guadalupa. Martinica.*

elegans Aubl. 49. M. ramis hirtis, foliis cordato-ovatis duplicato-crenatis ferrugineo-villoſis, cymis axillaribus paucifloris. *Guiana.* (Clidemia Don.)

Mayeta Desr. 50. M. ramis villoſis, foliis ſubſeſſilibus, altero minori, oblongis acutis integerrimis piloſis, nervo medio ad baſin inflato, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus bracteatis. *Guiana.* (Tococa Aubl. Don.)

heterophyllum Desr. 51. M. ramis villoſis, foliis disparibus, altero petiolato oblongo acuminato, nervo medio ad baſin utrinque inflato, folio altero ſeſſili cordato, cymis lateralibus. *Peru.* (Tococa Aubl. Don.)

diverſifolium Humb. 52. M. foliis ovatis crenulatis ciliatis in petiolum decurrentibus, altero minori, ramis pulveraceis, floribus cymoſis axillaribus. *Ad fl. Magdalenae.*

nodoſum Desr. 53. M. foliis ellipticis coriaceis ſerrulatis glabris, corymbis trichotomis hiſpidis, ramis nodoſis. *Inſ. Antill.*

macrophyllum Desr. 54. M. foliis amplis cordato-oblongis denticulatis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, cymis axillaribus ferrugineis, floribus ſeſſilibus. *Ind. occ.* (M. impetiolare Sw.)

ſtrigilloſum Sw. 55. M. foliis ſubcordato-oblongis ſerrulatis ſupra ſtrigoſo-hiſpidiſſimis fulvidis ſubtus reticulato-venoſis tomentoſis, racemis axillaribus abbreviatis hirſutiſſimis, laciniis calycinis ſubulatis elongatis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

capitellatum Bonpl. 56. M. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis crenulatis papilloſo-hirtis, verticillis axillaribus pedunculatis multifloris remotis. *Nov. Granat.*

biglomeratum Humb. 57. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus reticulato-venoſis rufis, floribus verticillatis, verticillis binis remotis. *Ad Orinocum.*

†† *Floribus terminalibus,*

a. congeſtis, corymboſis.

groſſum Mut. 58. M. foliis cordato-ovatis integerrimis hiſpidis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus ſtrigoſis. *Nov. Granat.*

Cardinalis * 59. M. foliis orbiculatis ſubſeſſilibus integerrimis ſupra ſtrigoſo-hiſpidis ſubtus ſericeis luteſcentibus, floribus terminalibus ſeſſilibus congeſtis, calycibus hiſpidiſſimis. *Braſil.* (Rhexia Kunth.)

obvolutum Jack. 60. M. foliis ovatis ſtrigoſis, pedunculis terminalibus ternis, bracteis perſiſtentibus calycem ſquamoſum obtegentibus. *Sumatra.*

decemfidum Roxb. 61. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſpinuloſo-ciliatis piloſiuſculis, floribus terminalibus ſolitariis, calyce 10fido echinato-ſetoſo. *Inſ. ad oram Malaccae.*

Fontaneſii * 62. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſupra nitidis hiſpidiuſculis ſubtus pannoſo-lanatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis oblongis reflexis. *Braſil.* (M. granuloſum Desr. Rhexia Fontaneſii Kunth. Pleroma Don.)

malabathricum 63. M. foliis lanceolatis integerrimis ſtrigoſis, corymbis terminalibus, bracteis calycibusque appreſſis. *Ind. or. Inſ. Molucc.*

erectum Jack. 64. M. foliis oblongis utrinque attenuatis villoſis, corymbis terminalibus, calycibus hiſpidis. *Sumatra. Cochinchina?* (M. ſeptemnervium Lour.)

cymoſum Wendl. 65. M. foliis cordato-oblongis ſerrulatis piloſis, ramis rufeſcentibus, cyma terminali glabriuſcula, ſtaminibus 5 ſterilibus. *Portorico.* Bertero.

ſcandens Aubl. 66. M. caule ſcandente, foliis ovato-oblongis integerrimis hirſutis, corymbo paucifloro bracteato. *Guiana.*

rufeſcens Aubl. 67. M. caule ſtricto 4gono hirto, foliis cordatis crenulatis ſubtus rufo-villoſis, floribus terminalibus glomerato-ſpicatis. *Guiana.*

capitatum Vahl. 68. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis ſupra aſperis ſubtus glabris flavicantibus, capitulis terminalibus pedunculatis involucratis. *Ind. occid.*

β. *Floribus terminalibus paniculatis.*

agreſte Aubl. 69. M. foliis ovato-lanceolatis denticulatis ferrugineo-villoſis, panicula corymboſa. *Cayenn.* (Clidemia Don.)

alatum Aubl. 70. M. caule 4quetro alato, foliis ſeſſilibus oblongis acuminatis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, paniculae ramis patulis, floribus glomeratis. *Guiana.*

dichotomum Desr. 71. M. foliis cordatis acutis ſerrulatis hiſpidulis, paniculae folioſae ramis dichotomis. *Braſil.*

heteromallum Don. 72. M. foliis cordato-ovalibus integerrimis ſupra ſubſtrigoſis ſubtus flocculoſo-lanatis, panicula corymboſa, petalis emarginatis. *Braſil.* (Pleroma Don.)

Tococa Desr. 73. M. foliis ovato-oblongis acutis ſubcrenulatis fulvo-hirſutis, petiolis utrinque veſiculoſis, panicula ſtricta racemoſa. *Guiana.* (Tococa guianenſis Aubl., M. Phyſiphora Vahl.)

purpureum W. 74. M. foliis lanceolatis acuminatis ſubdenticulatis piloſis rufeſcentibus, paniculae ramis patentibus villoſis. *Guiana.* (M. purpuraſcens Aubl.)

argenteum Sw. 75. M. foliis ovato-oblongis acutis ſubdenticulatis glaberrimis ſubtus candidis tomentoſis, paniculae ramis oppoſitis, floribus minutis. *Ind. occid.*

elatum Sw. 76. M. foliis oblongis acutis coriaceis glabris ſubtus ferrugineo-tomentoſis ſerrulatis, paniculae ramis brachiatis, floribus ſeſſilibus confertis. *Ind. occid.* (M. ferrugineum Desr.)

fragile 77. M. foliis ovatis ſerrulato-ciliatis glabris fragilibus, paniculae ramis brachiatis 3fidis, floribus pedicellatis. *Braſil. Mexico.*

coriaceum Sw. 78. M. foliis ovatis acutis coriaceis flaveſcentibus glabris rugulofis cartilagineo-ſerrulatis, ramulis ſtrigoſis, paniculae ramis 4gonis, floribus ſubſeſſilibus. *Guadalupa.* (M. cymbifolium Rich.)

Swartzianum Rich. 79. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, paniculae ramis patentibus, calycibus bracteatis dentatis. *Inſ. Antill.* (M. Tamonea Sw.)

Fothergilla Rich. 80. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus rufeſcentibus, panicula diffuſa, calycibus bracteatis ſubcrenatis. *Amer. auſtr.* (Fothergilla mirabilis Aubl. M. rubiginoſum Humb. Chitonia Don.)

albicans Sw. 81. M. foliis oblongis acutis integerrimis ſubtus albo-tomentoſis, paniculae ramis ſtrictis rufeſcentibus, floribus ſeſſilibus ſubſecundis. *Ind. occid. Braſil.*

ſplendens Sw. 82. M. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris ſupra nitidis integerrimis, paniculae pyramidalis ramis ferrugineis ſubumbellatis. *Jamaica.*

laevigatum 83. M. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis laevibus, paniculae glabrae ramis horizontalibus. *Jamaica. Braſil.* (M. ſtamineum Desr.)

alpeſtre Jack. 84. M. foliis ovato-oblongis crenulatis glaberrimis, paniculae ramis divaricatis. *Sumatra.*

laxum Desr. 85. M. foliis cordato-ovatis ſerrulatis reticulato-rugoſis fuſco-piloſis, panicula laxa folioſa. *Peru.*

tunicatum Bonpl. 86. M. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, panicula pyramidali, dentibus calycis irregularibus. *Peru.*

pyramidale Desr. 87. M. foliis oblongis acuminatis denticulatis ſubtus villoſiuſculis, panicula pyramidali elongata, calycibus ſuperne conſtrictis. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

lacerum Bonpl. 88. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ramisque hirtis, racemis paniculatis terminalibus, floribus ſecundis, calycibus fimbriatis. *Nov. Granat.*

lappaceum Desr. 89. M. foliis cordatis acuminatis ſubtus reticulato-tomentoſis, paniculae trichotomae ramis divaricatis, calycibus uncinato-ſetoſis. *Patria?*

coronatum Humb. 90. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus ramisque pulverulentis, panicula trichotoma, fructu laciniis calycinis coronato. *Nov. Granat.*

favoſum Desr. 91. M. foliis cordato-ovatis ſubdenticulatis coriaceis ſupra aſpero-bullatis ſubtus foveolatis rufo-furfuraceis, panicula corymboſa, calycibus glabris. *Hiſpaniola.*

ſerrulatum * 92. M. foliis oblongis acutis ſerrulato-ciliatis utrinque ramisque fulvo-hirſutis, paniculae terminalis trichotomae ramis divaricatis, floribus glomeratis. *Braſil.* Sello.

papilloſum Desr. 93. M. foliis ſubcordato-oblongis crenulatis ſupra tuberculatis ſubtus foveolatis rufeſcentibus tomentoſis, paniculae ramis trichotomis. *Peru.*

theaezans Bonpl. 94. M. foliis oblongis acuminatis glaberrimis ſerratis utrinque concoloribus, paniculae terminalis floribus glomeratis. *Nov. Granat.*

nicotianaefolium Desr. 95. M. foliis longe petiolatis oblongis ſubdentatis glabriusculis, panicula brachiata terminali pubeſcente. *Hiſpaniola.*

xalapenſe Humb. 96. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus ramisque flavo-tomentoſis, panicula terminali, calycibus circumſciſſis. *Mexico.*

floribundum Humb. 97. M. foliis ſubellipticis integerrimis glabris 7plinerviis, panicula trichotoma elongata ſtricta, ſtigmate peltato. *Peru.*

obſcurum Humb. 98. M. foliis ovato-oblongis integerrimis tuberculoſo-hiſpidis 5plinerviis, panicula terminali, floribus glomeratis, calycibus tomentoſis. *Peru.*

guayaquilenſe Humb. 99. M. foliis cordato-oblongis 5plinerviis integerrimis glabris, panicula terminali thyrſoidea, calycibus pulverulentis. *Nov. Granata.* (Miconia Don.)

ibaguenſe Humb. 100. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis 5nerviis integerrimis rufo-hirſutis, panicula pauciflora terminali. *Nov. Granat.*

pendulifolium Rich. 101. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus discoloribus glabriusculis, panicula terminali pyramidata. *Guadalupa.*

ſtenobotryon Rich. 102. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſub-5nerviis denticulatis glaberrimis, paniculae terminalis ſtrictae ramis remotis, bracteis coloratis deciduis. *Hiſpaniola.*

ciliatum Rich. 103. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſub-5nerviis glabris ſerrulato-ciliatis, ſpicis paniculatis terminalibus. *Guiana.* (M. articulatum Desr. purpuraſcens Vahl.)

ambiguum Humb. 104. M. foliis oblongis utrinque attenuatis 5nerviis denticulato-ciliatis glabris, panicula terminali pauciflora, calycibus campanulatis brevidentatis. *Cumana.*

minutiflorum Humb. 105. M. foliis lanceolatis acuminatis 5nerviis glaberrimis integerrimis, panicula terminali, floribus exiguis. *Cumana.*

luteſcens Humb. 106. M. foliis oblongis acutis 5nerviis dentatis ſupra nitidis ſubtus vernicoſis, panicula terminali. *Loxa.*

fulvum Rich. 107. M. foliis lanceolatis acuminatis elongatis crenatis 5nerviis ſubtus fulvo-lepidotis, paniculae terminalis ramis filiformibus. *Guiana.*

granuloſum Humb. 108. M. foliis oblongis utrinque attenuatis revolutis ſubtus fulvis ramisque granuloſo-pulverulentis, paniculae terminalis floribus faſciculatis. *Nov. Granat.*

II. *Dodecandra, polyandra.*

calyptratum Vahl. 109. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis flaveſcentibus obſolete crenatis glaberrimis, panicula terminali laevi, calycibus circumſciſſis. *Martinica. Guadalupa.* (Conoſtegia Don.)

croceum Desr. 110. M. foliis oblongis utrinque attenuatis 3-5nerviis ſerrulato-ciliatis ſubtus flavis glabriuſculis, panicula terminali pyramidali. *Peru. Hiſpaniola.*

mucronatum Desr. 111. M. foliis ovalibus abrupte mucronatis 3-5nerviis ſubtus ferrugineo-tomentoſis integerrimis, panicula terminali, calycis truncati apice ciliato. *Cayenn.*

patens Sw. 112. M. foliis cordatis acuminatis ſubdenticulatis 5nerviis ſubtus incano-tomentoſis, racemis trichotomis paucifloris fructibusque hirtis. *Jamaica. Hiſpaniola.* (M. crotonifolium et niveum Desr.)

ſanguineum Ker. 113. M. foliis ovato-lanceolatis ſub-5nerviis aſperis ſubtus rufis, pedunculis terminalibus ſolitariis, fructibus hiſpidis. *China.*

ſetinode Bonpl. 114. M. foliis oblongo-lanceolatis 5nerviis ſpinuloſo-ſerratis, nodis ramorum barbatis, panicula terminali thyrſoidea, floribus 6petalis. *Nov. Granat.*

octonum Bonpl. 115. M. foliis cordato-ſubrotundis acutis 7nerviis crenulatis ſupra papilloſo-hiſpidis ſubtus bulloſo-reticulatis, paniculis axillaribus hirtis, floribus 8petalis. *Nov. Granat.*

Mutiſii Humb. 116. M. foliis cordato-ovatis denticulatis 7plinerviis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, ramis hirtis, calycibus circumſciſſis, pedunculis 3floris, floribus 6petalis. *Nov. Granat.*

exſtinctorium Humb. 117. M. foliis oblongis acuminatis 5plinerviis repando-dentatis ſupra nitidis ſubtus ramisque pulverulentis, panicula terminali, calyce circumſciſſo, floribus 6petalis. *Nov. Granat.*

III. *Octandra.*

* *Foliis 3-3plinerviis.*

† *Floribus lateralibus.*

rubrum Aubl. 118. M. foliis oblongis acuminatis ſerrato-ciliatis 3-5nerviis rufo-hirſutis, floribus lateralibus aggregatis. *Guiana. Cayenn.* Richard.

hirſutum Sw. 119. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis denticulatis rufo-hirſutiſſimis, pedunculis axillaribus 3fidis divaricatis. *Jamaica.*

microphyllum Sw. 120. M. caule fruticoſo humili, ramis ferrugineo-hirſutis, foliis ovatis obtuſis ſupra hiſpidis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis 3fidis axillaribus abbreviatis. *Jamaica. Braſil.* Sello.

micranthum Sw. 121. M. foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis glabris, racemis axillaribus reclinatis trichotomis. *Jamaica.*

capillare Sw. 122. M. foliis lanceolatis longe acuminatis integerrimis ſubtus pallidis glabris, pedunculis axillaribus capillaribus 3floris, fructibus hiſpidis. *Jamaica.*

hirtellum Sw. 123. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus ramisque hirſutiuſculis, pedunculis axillaribus 3floris. *Jamaica. Hiſpaniola.*

triflorum Vahl. 124. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus luteo-ſtrigoſis, pedunculis axillaribus breviſſimis 3floris. *Inſ. Carib.*

faſciculare Sw. 125. M. foliis ovatis acutis integerrimis ſubtus hiſpidiuſculis, pedunculis confertis abbreviatis 1floris. *Jamaica.*

purpuraſcens Sw. 126. M. foliis oblongis acutis integerrimis glaberrimis nervoſo-ſtriatis, racemis lateralibus trichotomis ſubpaniculatis. *Jamaica.*

verticillatum Vahl. 127. M. foliis oblongis acuminatis denticulatis ſupra ſcabris ſubtus villoſis, racemis axillaribus, floribus verticillatis. *Inſ. Carib.*

lateriflorum Vahl. 128. M. foliis obovatis acutiuſculis baſi attenuatis glabriuſculis denticulato-ſetaceis, pedunculis lateralibus aggregatis 1floris. *Inſ. Carib.*

multiflorum Desr. 129. M. foliis lanceolatis ſerratis ſupra nitidis ſubtus rufeſcentibus, paniculis lateralibus divaricatis. *Hiſpaniola.*

amygdalinum Desr. 130. M. foliis oblongo-lanceolatis complicatis ſerratis glaberrimis, cymis lateralibus breviuſculis. *Hiſpaniola. Portorico.*

ſtellulatum Jack. 131. M. foliis ovato-oblongis integerrimis ferrugineo-tomentoſis, pedunculis axillaribus paucifloris, calyce ſetis elongatis ſpineſcentibus apice ſtellato-multifidis. *Sumatra.*

rubicundum Jack. 132. M. foliis ovato-oblongis integerrimis glaberrimis, cymis axillaribus dichotomis, floribus glabris ſubpellucidis. *Sumatra.*

ſcabroſum 133. M. foliis ovatis denticulatis ſcabris ſubtus hirſutis, floribus axillaribus ſeſſilibus aggregatis. *Jamaica.*

virgatum Sw. 134. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decuſſatis diffuſis. *Jamaica.*

vaccinioides Bonpl. 135. M. foliis ovalibus parvis integerrimis ſubtus pallidis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis 1floris, calyce ſubtruncato. *Peru.* (Cremanium Don.)

ſeſſile * 136. M. foliis ſemiamplexicaulibus cordato-ſubrotundis acutis integerrimis obſolete triplinerviis utrinque glanduloſo-villoſis, ramis virgatis, floribus ſubſeſſilibus axillaribus. *Braſil.*

oxypetalum * 137. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis rufo-hirſutis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, petalis acutis. *Hiſpaniola.* (M. acutipetala Rich.)

†† *Floribus terminalibus.*

rubens Sw. 138. M. ramis, petiolis pedunculisque rubris, foliis ovato-lanceolatis denticulatis glaberrimis ſubcoloratis, floribus paniculatis confertis dioecis. *Jamaica.*

glabratum Sw. 139. M. caule fruticoſo humili, foliis ovatis utrinque attenuatis glaberrimis coriaceis, pedunculis terminalibus 1floris reflexis. *Jamaica.*

† *glanduloſum* Sw. 140. M. foliis ovatis acutis ſupra ſtrigoſis ſubtus glanduloſo-hiſpidis, panicula thyrſoidea. *Jamaica.*

octandrum 141. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis glabris, margine nervisque ſubtus hiſpidis, floribus terminalibus. *Ceylon.*

divaricatum W. 142. M. foliis ovatis acutis integerrimis ſupra nitidis ſubtus fuſco-tomentoſis, panicula terminali divaricata, calycibus truncatis. *Ind. or.*

anguſtifolium Sw. 143. M. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſupra rugoſis ſubtus incanis, ramis virgatis, panicula terminali. *Ind. occid.*

† *acuminatum* Vahl. 144. M. foliis ovatis acuminatis apice denticulatis ſubtus incanis, corymbis terminalibus faſtigiatis. *Inſ. Carib.*

elaeagnoides Sw. 145. M. foliis lato-lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis terminalibus trichotomis, floribus ſolitariis. *Ind. occ.*

gracile Jack. 146. M. foliis ovatis acuminatis glabris, ramis compreſſis, paniculae terminalis ramis gracilibus. *Sumatra.*

pulverulentum Jack. 147. M. foliis ovatis obtuſis baſi 2tuberculatis glabris, ramis furfuraceis, panicula terminali corymboſa, floribus pulverulentis. *Sumatra.*

** *Foliis 5nerviis.*

† *Floribus lateralibus.*

rariflorum Humb. 148. M. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris integerrimis, racemis axillaribus paucifloris hirſutiusculis. *Cumana.*

umbroſum Sw. 149. M. foliis ampliſſimis ovatis acuminatis crenatis utrinque hirtis, ramis patentiſſimis, cymis axillaribus, laciniis calycinis ſetaceis. *Inſ. Carib.* (M. latifolia Desr.)

ſeſſiliflorum Vahl. 150. M. foliis ovato-lanceolatis longe acuminatis denticulatis utrinque hirſutis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubverticillatis, laciniis calycinis ſubulatis incurvis villoſiſſimis. *Amer. auſtr. Jamaica.* (M. plumoſa Desr.)

piloſum Sw. 151. M. foliis oblongis acutis ſerrulatis piloſis, racemis 3partitis hirſutiusculis, floribus minutis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

discolor 152. M. foliis oblongis acuminatis denticulatis coriaceis glabris ſubtus flavicantibus, racemis corymboſis, calycibus obtuſe lobatis. *Inſ. Antill. Carib.*

nemoroſum Jack. 153. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis ſubtus ferrugineo-villoſis, pedunculis axillaribus 1-3floris. *Sumatra et inſ. finitimae.*

rotundifolium Jack. 154. M. foliis maximis ſubrotundis acutis 7nerviis ſubtus ferrugineis, capitulis axillaribus pedunculatis involucratis. *Sumatra.*

†† *Floribus terminalibus.*

calycopteron Rich. 155. M. foliis cordato-oblongis integerrimis ſubtus rufo-tomentoſis, floribus ternis terminalibus, calycibus dorſo alatis. *Hiſpaniola.*

156.

hispidum Sw. 156. M. foliis ovatis acuminatis denticulatis supra strigoso-hispidis subtus incano-tomentosis, panicula terminali divaricata. *Jamaica.*

corymbosum Sims. 157. M. foliis cordato-ovatis acutis serratis glabris, corymbo paniculato terminali. *Sierra Leone.*

coccineum Vahl. 158. M. foliis oblongis acuminatis glaberrimis integerrimis, panicula thyrsoidea, pedicellis nodosis hispidis. *Ins. Carib.*

bracteatum Jack. 159. M. foliis cordato-ovatis acuminatis subtus stellato-pilosis, paniculae terminalis bracteis magnis ovatis, calycibus subintegris. *Ins. ad oras Malacc.*

exiguum Jack. 160. M. foliis longe petiolatis ovatis acuminatis glabris integerrimis, panicula terminali, floribus exiguis, calycibus 4dentatis. *Ins. ad oras Malacc.*

pallidum Jack. 161. M. foliis subcordato-ovatis acuminatis integerrimis glabris subtus punctatis, paniculis axillaribus terminalibusque, antheris supra basin affixis. *Ins. ad oras Malacc.*

viminale Jack. 162. M. foliis cordato-oblongis supra glabris subtus stellato-pubescentibus, paniculis axillaribus terminalibusque corymbosis, bracteis oblongis ciliatis, staminibus alternis sterilibus. *Sumatra.*

eximium Jack. 163. M. foliis amplissimis subellipticis utrinque attenuatis coriaceis integerrimis glaberrimis, paniculae ramis verticillatis bracteatis. *Sumatra.*

IV. *Tetrandra.*

tetrandrum Sw. 164. M. foliis oblongis acutis integerrimis glabris 3nerviis subtus pallide ferrugineis, panicula terminali, calycibus fructiferis truncatis. *Jamaica. Hispaniola.*

glaucum Jack. 165. M. foliis cordato-oblongis acuminatis integerrimis glaberrimis stellato-pubescentibus, panicula terminali glauca, filamentis binis sterilibus. *Ins. ad oram Malacc.*

fallax Jack. 166. M. foliis cordato-ovatis acuminatis integerrimis subtus ferrugineo-tomentosis, panicula terminali, antheris erectis infra medium affixis. *Sumatra.*

1557. TRISTEMMA Juss.

mauritianum Juss. *Ins. Mascaren.* Herba foliis ovalibus, floribus axillaribus capitatis.

1558. RHEXIA.

I. *Decandrae.*

* *Fruticosae.*

† *Melastomoides, foliis latioribus nervosis.*

aquatica 1. Rh. foliis cordato-oblongis serrulatis 5nerviis petiolatis, ramis hirsutis, paniculae terminalis trichotomae aphyllae ramis filiformibus patentibus. *Ind. occid.* (Melastoma aquatica Aubl.)

cordata * 2. Rh. foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis glabriuſculis punctatis 5nerviis ciliatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, calycibus glanduloſo-piloſis, capſula 3loculari. *Braſil.* Sello.

viminea Don. 3. Rh. foliis petiolatis ſubcordato-oblongis 5nerviis utrinque hirſutiuſculis, ramis deorſum hiſpidis, floribus paniculatis, antheris armatis baſi 2tuberculatis. *Braſil.*

oxypetala R. et P. 4. Rh. foliis petiolatis lanceolatis acutis 5nerviis integerrimis ſubtus villoſis, ramis patulis hirſutis, pedunculis axillaribus 3floris, calycibus bracteatis, petalis mucronatis. *Peru.*

flexuoſa R. et P. 5. Rh. foliis lanceolatis ſerrulatis acutis 5nerviis, ramis flexuoſis divergentibus, pedunculis axillaribus dichotomo-corymboſis, petalis reflexis. *Peru.*

echinata R. et P. 6. Rh. foliis ovatis acutis integerrimis 5nerviis ſupra aſperrimis ſubtus lanatis, pedunculis axillaribus ſub-3floris, calycibus hirſutiſſimis, petalis cuneatis. *Peru.*

lepidota Bonpl. 7. Rh. foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis 5nerviis ſubtus lepidotis, floribus faſciculatis, calycibus obtuſis ſquamuloſis bracteatis. *Quito.*

leucantha Sw. 8. Rh. arboreſcens, ramis 4gonis, foliis petiolatis oblongis acuminatis 3nerviis cartilagineo-denticulatis lucidis, pedunculis 1floris, bracteis geminis lanceolatis petiolatis, laciniis calycinis baſi ſubdentatis. *Jamaica.* (Rh. ſpecioſa Berter. Meriania leucantha Sw. fl. ind. occ. M. roſea Tuſſ.)

purpurea Sw. 9. Rh. arboreſcens, ramis teretibus, foliis petiolatis ovali-oblongis utrinque glabris 3nerviis denticulatis, pedunculis 1floris axillaribus, bracteis quaternis ſeſſilibus lanceolatis. *Jamaica.* (Meriania Sw. Tuſſ.)

longifolia Vahl. 10. Rh. caule fruticoſo ramoſo foliisque lanceolatis 5nerviis integerrimis piloſis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis, petalis ciliatis. *Amer. auſtr.*

aſpera W. 11. Rh. caule fruticoſo ramoſo muricato-hiſpido, foliis ovatis 5nerviis ſquamato-aſperis, pedunculis terminalibus 3floris, calycibus ſquamatis bracteatis. *Guiana.* (Tibouchina aſpera Aubl.)

inconſtans Vahl. 12. Rh. caule fruticoſo ramoſo hiſpido, foliis ovatis acuminatis 3nerviis integerrimis ſupra hiſpidis ſubtus incanis, pedunculis terminalibus umbellatis, calycibus ſtrigoſis. *Inſ. Carib.* (Melaſtoma ornata Sw.)

ornata Rich. 13. Rh. foliis ovatis triplinerviis ſtrigoſis, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis, calycibus glabris, petalis fimbriatis. *Martinica.* (Osbekia ornata Sw.)

mollis Bonpl. 14. Rh. foliis ovato-oblongis acuminatis 5nerviis villoſiuſculo-tomentoſis, floribus paniculatis terminalibus, petalis cuſpidatis, antheris baſi nudis. *Peru.*

ſtricta Bonpl. 15. Rh. ramis ſtrictis gracilibus, foliis lanceolatis acutis coriaceis 3nerviis ſubtus piloſis, floribus ſubſeſſilibus cernuis, petalis ciliatis. *America auſtr.*

ſarmentoſa Bonpl. 16. Rh. ramis ſarmentoſis foliisque ſubcordato-oblongis acutis 7nerviis villoſis, floribus faſciculatis terminalibus, laciniis calycis villoſiſſimi lanceolatis. *Peru.*

reticulata Bonpl. 17. Rh. ramis teretibus pubeſcentibus, foliis oblongis acutis coriaceis ſerrulatis ſupra bulloſo-hiſpidis ſubtus reticulatis, floribus terminalibus ſolitariis, petalis ciliatis, appendiculis antherarum elongatis. *Amer. auſtr.*

caneſcens Bonpl. 18. Rh. ramis teretibus piloſis, foliis oblongis acutis 3nerviis ſubtus caneſcentibus, floribus terminalibus ſubternis, calycibus hiſpidis coloratis, antheris ſubindiviſis. *Nov. Granat.*

ſpecioſa Bonpl. 19. Rh. ramis decuſſatis, foliis oblongo-lanceolatis triplinerviis glabris ciliatis, floribus ſubſeſſilibus terminalibus cernuis, calycibus pubeſcentibus. *Nov. Granat.*

muricata Bonpl. 20. Rh. ramis decuſſatis hirſutis, foliis oblongis 5plinerviis ſupra bullato-muricatis ſubtus ſericeis, floribus terminalibus ſolitariis, calycibus hiſpidis. *Amer. auſtr.*

holoſericea Bonpl. 21. Rh. ramis 4angulis, foliis cordato-oblongis ſub-5nerviis utrinque ſericeo-tomentoſis ſubtus argenteis, floribus paniculatis terminalibus, pedicellis 3floris, calycibus clavatis ſericeis. *Braſilia.* (Melaſtoma Desr.)

diffuſa * 22. Rh. foliis oblongo-lanceolatis triplinerviis ſubdenticulatis utrinque ramisque fulvo-villoſis, floribus axillaribus polygamis, ♂ longe pedunculatis pendulis, ☿ ſeſſilibus. *Jamaica.* (Melaſtoma Desr.)

rotundifolia Bonpl. 23. Rh. ramis teretibus, foliis ſubrotundis obtuſis integerrimis venoſis glabris ſubtus pulverulentis, panicula terminali, calycibus truncatis. *Nov. Granat.*

Leuzeana Kunth. 24. Rh. caule fruticoſo ſimplici 4gono glabro, foliis obovato-oblongis 5nerviis reticulatis denticulatis ſubtus pallidis glanduloſis, floribus corymboſis, calycibus 10coſtatis, capſula 3loculari. *Braſil.*

princeps Kunth. 25. Rh. ramis 4gonis tomentoſis, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis 7nerviis ſerrulatis rigidis ſubtus fuſco-tomentoſis, pedunculis ſubcorymboſis, calycibus glanduloſo-hiſpidis. *Braſil.*

†† *Ericoides, foliis ſub-enerviis minoribus.*

Eſpora Hilar. 26. Rh. ramis ſtrictis glabris, foliis faſciculatis cordato-ovatis integerrimis enerviis, floribus racemoſis terminalibus, capſula 3valvi. *Braſil.*

Adamantum Hilar. 27. Rh. ramis glanduloſo-piloſis, floribus faſciculatis lanceolatis ſerrulato-ciliatis enerviis, floribus corymboſis terminalibus, capſula 3loculari. *Braſil.*

fasciculata * 28. Rh. foliis fasciculatis lineari-oblongis utrinque 1dentatis enerviis glaberrimis, racemis subdichotomis terminalibus, calycibus 10striatis strigillosis. *Brasil.* Sello.

setosa * 29. Rh. foliis subsessilibus lineari-oblongis punctatis glaberrimis sub-3nerviis subaristatis, floribus axillaribus terminalibusque solitariis pedunculatis, laciniis calycinis seta terminatis. *Brasil.* Sello.

suberosa * 30. Rh. foliis subsessilibus fasciculatis linearibus involutis glaberrimis, pedunculis terminalibus subcorymbosis glanduloso-pilosis, capsula 3loculari. *Brasil.* (Rh. Hilariana Kunth.)

scoparia Hilar. 31. Rh. foliis sessilibus linearibus acutis glabris, floribus terminalibus sessilibus solitariis, laciniis calycis glabri linearibus elongatis. *Brasil.*

armata * 32. Rh. foliis 4fariam imbricatis appressis linearibus glaberrimis margine nervoque incrassatis, calycibus terminalibus solitariis sessilibus apice setosis. *Brasil.* Sello.

fulva * 33. Rh. ramis dichotomis pubescentibus, foliis oblongis minutis subenerviis fulvo-hispidulis, floribus terminalibus solitariis, laciniis calycinis subulatis. *Brasil.* Sello.

conferta Bonpl. 34. Rh. foliis confertis petiolatis ellipticis sub-trinerviis strigillosis, floribus solitariis cernuis, calycibus bracteatis petala obtusa subaequantibus. *Peru.*

** *Herbaceae.*

uniflora Vahl. 35. Rh. caule 4gono alato glanduloso-viscoso, foliis ovatis sub-3nerviis glanduloso-ciliatis serrulatis, calycibus pilosis. *Cayenn.*

hypericoides W. 36. Rh. caule 4gono ramoso foliisque ovatis acutis nervosis villosissimis, floribus racemosis, appendiculis antherarum ascendentibus. *Cayenn.* (Rh. villosissima Rich. Melastoma villosa Aubl.)

trivalvis Vahl. 37. Rh. caule alato superne ramoso, foliis linearibus sessilibus supra punctatis integerrimis incanis, pedunculis corymbosis, laciniis calycinis subulatis elongatis, capsula 3valvi. *Guiana.* (Melastoma Aubl.)

bivalvis Vahl. 38. Rh. caule alato, foliis sessilibus ovalibus 3nerviis glabris, pedunculis terminalibus 1floris, capsula 2valvi. *Guiana.* (Melastoma Aubl.)

Acisanthera 39. Rh. caule angulato ramoso, nodis barbatis, foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis sub-3nerviis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Jamaica. Hispaniola.*

serrulata Rich. 40. Rh. foliis lanceolatis serrulatis 3nerviis subpubescentibus, ramis glutinosis, floribus axillaribus subsessilibus, staminibus alternis sterilibus. *Guiana.*

gracilis Kunth. 41. Rh. foliis lanceolatis subundulatis nervosis cauleque tereti hispidis, pedunculis axillaribus sub-3floris, laciniis calycinis antherisque aequalibus abbreviatis. *Brasil.*

ſtachyoides Kunth. 42. Rh. foliis oblongis acutis 5nerviis ramisque hirſutis, floribus faſciculato-verticillatis, antheris baſi 5ariſtatis, capſula 5loculari. *Braſil.*

nymphaeaefolia Kunth. 43. Rh. caule ſimplici humili, foliis cordato-orbiculatis crenulato-ciliatis 7-9nerviis ſubtus albidis glanduloſis, pedunculis terminalibus corymboſis, calycibus truncatis, capſula 3loculari. *Braſil.* (Bertolonia Radd.)

II. *Octandrae.*

* *Fruticoſae.*

villoſa Aubl. 44. Rh. caule 4gono decumbente hirſuto, foliis ſubrotundo-ovatis 5nerviis ſerrulatis utrinque rufo-villoſis, pedunculis aggregatis terminalibus. *Guiana.*

latifolia Aubl. 45. Rh. caule 4gono erecto, foliis ſubrotundo-ovatis 3nerviis ſerrulatis utrinque villoſis, pedunculis ſubſolitariis terminalibus. *Guiana.*

ſtrigoſa W. herb. 46. Rh. foliis ovatis 3nerviis ſtrigoſis, pedunculis axillaribus corymboſis, calycibus hirtis. *Cayenn.*

*incana** 47. Rh. foliis ovato-ſubrotundis 5nerviis caneſcentibus ciliatis, pedunculis axillaribus ſolitariis, laciniis calycinis abbreviatis. *Amer. auſtr.* (Rh. caneſcens 2. Bonpl.)

*helvola** 48. Rh. foliis confertis ſeſſilibus ovalibus integerrimis nervoſis utrinque helvolo-hiſpidis, pedunculis axillaribus cymoſis, calycibus hiſpidiſſimis. *Braſil.* Sello.

microphylla Bonpl. 49. Rh. foliis ſubrotundo-ovatis 3nerviis piloſis ſubtus flaveſcentibus, pedunculis axillaribus terminalibusque ſubternis, calycibus ciliatis, petalis mucronato-piliferis. *Nov. Granat.*

myrtoides Bonpl. 50. Rh. foliis oblongis 5nerviis glabris, ramis teretibus incanis, pedunculis axillaribus ſolitariis, calycibus laevibus. *Mexico.*

decumbens Poir. 51. Rh. caule aſcendente, ramis 4gonis, foliis ovato-lanceolatis ſub-5nerviis ſerrulatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Guinea.* (Melaſtoma P. B.)

campanularis Bonpl. 52. Rh. caule ramoſiſſimo, ramis teretibus piloſis, foliis oblongis integerrimis 5plinerviis ſubtus tomentoſis, pedunculis ſubternis terminalibus, corollis campanulatis. *Peru.*

quinquenervis R. et P. 53. Rh. foliis oblongo-lanceolatis acutis 5nerviis ſupra lucidis ſubtus flavido-villoſis, pedunculis axillaribus 3floris. *Peru.*

luteſcens R. et P. 54. Rh. foliis ovatis 3nerviis integerrimis rugoſis ſupra lucidis, pedunculis axillaribus 3floris pendulis, calycibus hiſpidis. *Peru.*

dicrananthera R. et P. 55. Rh. foliis ovatis 5nerviis integerrimis piloſis, pedunculis axillaribus 3floris, antheris furcatis. *Peru.*

Radula Kunth. 56. Rh. foliis ellipticis integerrimis coriaceis 5nerviis ſupra ſtrigoſo-hiſpidis ſubtus ramisque ferrugineo-hirſutis, floribus paniculatis, bracteis coloratis. *Braſil.*

berberifolia Kunth. 57. Rh. caule ramofiffimo, foliis obovato-oblongis 3nerviis ferrulato-ciliatis hifpidulis, floribus axillaribus folitariis, capfula 2loculari. *Brafil.*

nummularioides Bonpl. 58. Rh. caule ramofiffimo decumbente, foliis orbiculatis crenatis 5nerviis fubtus tomentofis, floribus axillaribus folitariis fubfeffilibus, calycibus obtufiusculis. *Ad Orinoc.*

rosmarinifolia R. et P. 59. Rh. foliis lineari-oblongis 3nerviis margine revolutis hirfutis, pedunculis fub-5floris pendulis, petalis convolutis. *Peru.*

ericoides * 60. Rh. foliis feffilibus oppofitis fubdecurrentibus linearibus complicatis ciliatis, floribus folitariis terminalibus feffilibus, calycibus apice fetofo-barbatis. *Brafil.*

taxifolia Hilar. 61. Rh. foliis feffilibus cordato-fagittatis lanceolatis revolutis incanis fubenerviis, ramis glandulofo-pilofis, floribus axillaribus folitariis pedunculatis erectis. *Brafil.*

juniperina Humb. in W. herb. 62. Rh. foliis feffilibus linearibus fubfagittatis incanis, ramis pubefcentibus, floribus axillaribus feffilibus glomeratis *Ad Orinoc. Brafil.* Sello.

** *Herbaceae.*

virginica 63. Rh. caule alato angulato, foliis oblongo-lanceolatis feffilibus nervofis ferrulato-ciliatis fupra hifpidis, pedunculis terminalibus folitariis, calycibus glandulofo-pilofis. *Amer. bor.* (Rh. 7nervia Walt., ferrulata Nutt.)

mariana 64. Rh. caule tereti fulcato, foliis fubpetiolatis lanceolatis 3nerviis ferrato-ciliatis, pedunculis terminalibus corymbofis. *Amer. bor.*

glomerata Rottb. 65. Rh. caule tereti hirfutiffimo, foliis fubpetiolatis ellipticis 3nerviis hirfutis, floribus terminalibus glomeratis, pilis calycis ramofo-ftellatis. *Surinam. Brafil.* (Rh. capitata Rich.)

trichotoma Rottb. 66. Rh. caule 4gono trichotomo, ramis ftrigofis, foliis lanceolatis integerrimis 3nerviis hirfutis, floribus pedunculatis e dichotomia ramorum, pilis calycis fafciculatis. *Surinam. Brafil.*

ciliofa Mx. 67. Rh. caule fub-4angulo glabro, foliis fubfeffilibus oblongis fupra hirfutiusculis ciliatis fubtus glabris, floribus terminalibus folitariis involucratis. *Carolin. auftr.*

anguftifolia Nutt. 68. Rh. caule tereti foliisque lineari-lanceolatis hirfutis, pedunculis 2fido-cymofis, calycibus glabris. *Georgia. Carolina.*

glabella Mx. 69. Rh. caule tereti glabro, foliis lanceolatis feffilibus laevibus obfolete ferrulatis 3nerviis, corymbi laxi pedicellis compreffis apice dilatatis, calycibus glandulofo-glutinofis. *Carolina. Georgia.*

ftricta Pursh. 70. Rh. caule 4gono alato ftricto, nodis barbatis, foliis feffilibus erectis lineari-lanceolatis acuminatis 3nerviis utrinque glabris, corymbo dichotomo, calycibus glabriusculis. *Georgia. Carolina.*

lutea Mx. 71. Rh. caule ſub-4angulo foliisque ſpathulato-linearibus 3nerviis hirſutiusculis, floribus ſubſolitariis terminalibus. *Carolina.* (Rh. linearifolia Poir.)

circaeaefolia Kunth. 72. Rh. foliis cordato-oblongis acuminatis 5nerviis ſerrulato-ciliatis nitidis, paniculae terminalis ramis divaricatis piloſis, capſula globoſa 2loculari. *Braſil.*

polyſtachya Kunth. 73. Rh. foliis cordato-ovatis acutis 5nerviis ſerrulato-ciliatis, ramis glanduloſo-piloſis, racemis terminalibus paniculatis, floribus minutis, capſula 2valvi. *Braſil.*

diverſifolia Domb. 74. Rh. foliis ovatis acutis 5nerviis ſerrulato-ciliatis glabro, altero minori, pedunculis terminalibus corymboſis divaricatis, calycibus glabris. *Peru.*

thymifolia Kunth. 75. Rh. foliis ovatis 3nerviis ſerrulato-ciliatis utrinque ramisque glanduloſo-piloſis, floribus racemoſis ſecundis, calycibus glutinoſis, capſula 3valvi. *Cayenn.*

indecora Kunth. 76. Rh. foliis cordato-ovatis 5nerviis utrinque ramisque hirſutis, paniculae ramoſiſſimae ramis divaricatis, calycibus pedicellatis glanduloſo-piloſis. *Braſil.*

ſileniflora Kunth. 77. Rh. foliis ſubcordato-oblongis 5nerviis ſerrulato-ciliatis glabris, paniculae terminalis ramis divaricatis, calycibus globoſis ſeſſilibus venoſis obſolete dentatis. *Braſil.*

ladanoides Rich. 78. Rh. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis 5nerviis utrinque hiſpidis, pedunculis terminalibus ternis. *Guiana.*

anguſturenſis Bonpl. 79. Rh. foliis lanceolatis acuminatis 3nerviis piloſis, ramis teretibus, pedunculis 1floris, calycibus ſtellato-pubeſcentibus. *Ad Orinocum.*

leptophylla Bonpl. 80. Rh. foliis linearibus enerviis calycibusque apice ſetoſo-denticulatis, pedunculis terminalibus. *Ad Orinocum.*

tenella Bonpl. 81. Rh. foliis ſubcordato-ovatis acuminatis 5nerviis hiſpidulis ciliatis, ramis gracilibus patentibus, calycibus glanduloſo-piloſis. *Nov. Granat.*

piloſelloides Bonpl. 82. Rh. caule ſubſcapiformi paucifloro, foliis radicalibus oblongis 7nerviis ciliatis, calycibus bracteatis campanulatis, petalis criſtatis. *Nov. Granat.*

lanceolata Lam. 83. Rh. caule ſimplici ſub-4angulo, foliis ſeſſilibus oppoſitis lineari-lanceolatis crenulatis 3nerviis, floribus ſolitariis axillaribus, calycibus glabris. *Amer. auſtr.*

recurva Poir. 84. Rh. caule 4angulo ramoſo apice recurvo, foliis ovatis crenulatis ſubpubeſcentibus ſubtus incanis, floribus terminalibus ſubſolitariis. *Cayenn.*

1559. Osbekia.

** Decandrae.*

*Aubletiana** 1. O. caule fruticoſo, foliis cordatis acuminatis multinerviis hirſutis, pedunculis axillaribus termina-

libusque bracteatis 2fidis paucifloris, ſtaminibus 5 ſterilibus. *Guiana.* (Melaſtoma Aubl. Vahl. Rhexia Bonpl.)

*cernua** 2. O. caule fruticoſo, ramis 4gonis ſtrigoſis, foliis oblongis ſubdentatis 5nerviis ſubtus hirſutis, floribus terminalibus ſubternis pedunculatis cernuis. *Peru.* (Rhexia Bonpl.)

*tortuoſa** 3. O. caule fruticoſo, ramis tortuoſis, foliis lanceolatis 3nerviis hirſutiuſculis, floribus ſparſis, calycibus hiſpidis. *Nov. Hiſpan.* (Rhexia Bonpl.)

*Langsdorffiana** 4. O. caule fruticoſo, ramis 4angulo-alatis, foliis oblongis 5nerviis ſubtus ſericeis, panicula terminali ampla, petalis ciliatis, capſula 5loculari. *Braſil.* (Rhexia Kunth.)

nepalenſis Hook. 5. O. caule ſuffruticoſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis 5nerviis, floribus corymboſis, calyce ciliato-ſquamoſo. *Nepal.*

chinenſis 6. O. caule ſuffruticoſo, foliis petiolatis oblongis 3nerviis hirſutiuſculis, floribus faſciculatis terminalibus, calycibus glabris. *China.*

*excelſa** 7. O. ramis 4gonis, foliis ovato-oblongis 5plinerviis crenulatis ſubtus diſcoloribus, pedunculis ſubcorymboſis terminalibus 3floris. *Loxa.* (Rhexia Bonpl.)

*lanceolata** 8. O. foliis lanceolatis acuminatis 5nerviis rufo-villoſis, floribus paniculatis, petalis ciliatis mucronatis. *Peru.* (Rhexia Bonpl.)

*divaricata** 9. O. ramis gracilibus 4gonis hiſpidis, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis ciliatis remotis, pedunculis terminalibus dichotomis divaricatis, calycibus angulatis, petalis ciliatis mucronatis. *Ad Orinoc.* (Rhexia Bonpl.)

*heteranthera** 10. O. caule repente, foliis obovatis 3nerviis ciliatis, floribus terminalibus, calycibus hiſpidiſſimis, antheris 5 heteromorphis. *China.* (Melaſtoma repens Lam. Rhexia Bonpl.)

grandiflora Sm. 11. O. foliis ſubſeſſilibus oblongis 5nerviis hirſutis, floribus terminalibus paniculatis bracteatis, calycibus faſciculato-ſetoſis, laciniis elongatis obtuſis. *Sierra Leone.* Afzel.

multiflora Sm. 12. O. foliis petiolatis ovatis acutis 5nerviis hiſpidis, floribus racemoſis, calycibus ſetoſis. *Sierra Leone.* Afzel.

tubuloſa Sm. 13. O. foliis ovatis acutis 5nerviis hirſutis, floribus ſubracemoſis, calycis collo tubuloſo elongato, ſetis duplicibus. *Sierra Leone.* Afzel.

rotundifolia Sm. 14. O. foliis ſubrotundo-ovatis 3nerviis, calycibus globoſis ſtellato-ſetoſis. *Sierra Leone.* Afzel.

antennina Sm. 15. O. foliis ovatis 5nerviis ſetoſis, pedunculis elongatis terminalibus, laciniis calycinis plumoſo-ariſtatis. *Sierra Leone.* Afzel.

** *Octandrae.*

zeylanica 16. O. caule fruticoſo ſtrigoſo, foliis oblongis 3nerviis, floribus ſubſolitariis axillaribus terminalibusque, pilis calycis multifido-ſtellatis. *Ind. or.*

ſtellata Hamilt. 17. O. caule fruticoſo, foliis oblongo-lanceolatis 5nerviis hiſpidis, floribus axillaribus terminalibusque ſubſolitariis, calycibus apice ſtellato-ſetaceis glanduloſis. *Nepal.*

glutinoſa * 18. O. caule fruticoſo ſulcato, foliis oblongis 3nerviis laevibus, floribus paniculato-congeſtis, ramis glutinoſis. *Nov. Granat.* (Rhexia Mut.)

Bonplandiana * 19. O. foliis lanceolatis 7nerviis utrinque piloſis, floribus paniculatis, antheris baſi ariſtatis. *Amer. auſtr.* (Rhexia Bonpl.)

1560. BOSWELLIA Colebr.

turifera Colebr. 1. B. foliolis glabris oblongis obtuſis ſerrulatis, racemis paniculatis. *Ind. or. Perſia auſtr. Arabia orient.* (B. glabra Roxb.)

balſamifera * 2. B. foliolis glabris ovatis acuminatis integerrimis, racemis abbreviatis paucifloris. *Inſ. Molucc.* (Canarium balſamiferum W.)

hirſuta * 3. B. foliolis hirſutis oblongo-lanceolatis integerrimis, racemis elongatis multifloris. *Inſ. Molucc.* (Canarium hirſutum W.)

1561. GARUGA Roxb.

pinnata Roxb. *Bengal.* Arbor magna, foliis pinnatis, foliolis oblongis glabris crenato-ſerratis, floribus paniculatis.

1562. BUCHANANIA Roxb.

anguſtifolia Roxb. *Ind. or. Cochinchina.* Arbor foliis oblongis obtuſis, floribus paniculatis. (Tolvifera cochinchinenſis Lour.?)

1563. BURSERA Jacq.

gummifera Jacq. 1. B. foliolis ovato-oblongis acuminatis nitidis, racemis axillaribus. *Ind. occ.* (B. acuminata W.)

paniculata Lam. 2. B. foliolis ovatis acutis, ramis tuberculoſis, racemis paniculatis terminalibus. *Inſ. Mascaren.*

obtuſifolia Lam. 3. B. foliolis ovato-oblongis obtuſis, racemis paniculatis terminalibus. *Inſ. Mascaren.*

† 1564. BARAULTIA Steud.

madagascarenſis * *Madagascar.* Frutex ramoſus, foliis glaberrimis ſubdentatis pellucido-punctatis, pedunculis ſubtrifloris, floribus parvis globuloſis. (Barraldeia Thuars.)

1565. FERONIA Corr.

Elephantum Roxb. 1. F. foliolis opacis, petiolo communi marginato glabro. *Ind. or.*

pellucida Roth. 2. F. foliolis punctato-pellucidis, petiolo communi tereti pubeſcente. *Ind. or.*

1566. GLYCOSMIS Corr.

arborea Corr. 1. Gl. foliolis oblongo-linearibus denticulatis. *Ind. or. Inſ. Mascaren.* (Limonia arborea Roxb.)

pentaphylla Corr. 2. Gl. foliolis ovatis integerrimis. *Ind. or.* (Limonia 5phylla Roxb.)

1567. LIMONIA.

* *Foliis pinnatis.*

acidiſſima 1. L. ſpinis axillaribus, foliis ſub-2jugis obovatis emarginatis crenulatis, petiolo communi alato, fructibus ovatis. *Ind. or.*

crenulata Roxb. 2. L. ſpinis axillaribus, foliis ſub-2jugis ellipticis crenulatis, petiolo communi alato, floribus 4fidis 8andris, fructibus globoſis. *Ind. or.*

minuta Forſt. 3. L. foliis 5jugis alternis, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, petiolo communi tereti pubeſcente, racemis corymboſis terminalibus. *Inſ. Amicorum.*

madagascarenſis Lam. 4. L. foliis 3jugis alternis, foliolis lanceolatis dentatis, paniculis axillaribus abbreviatis. *Madagascar.*

parviflora Sims. 5. L. foliis 2jugis elliptico-lanceolatis integerrimis, corollis campanulatis, fructibus ſubgloboſis obliquis. *China.*

** *Foliis ternatis.*

† *mauritiana* Lam. 6. L. foliis ſubternatis ovatis acutiusculis, paniculis axillaribus, floribus 4fidis 8andris. *Inſ. Mascaren.*

citrifolia W. 7. L. foliis ſimplicibus ternatisque, foliolis ovato-oblongis acuminatis, floribus axillaribus ſolitariis breviſſime petiolatis. *China.*

*** *Foliis ſimplicibus.*

lucida Forſt. 8. L. foliis oblongis nitidis, pedunculis axillaribus. *Nov. Hebrid.*

Laureola Wall. 9. L. foliis lanceolatis coriaceis glaberrimis, floribus terminalibus corymboſo-capitatis 5andris. *Nepal.*

1568. COOKIA Sonner.

punctata Sonner. 1. C. foliis pinnatis, foliolis ovatis acutis integerrimis, panicula diffuſa terminali. *China auſtr. Inſ. Molucc.* (Quinaria Lanſium Lour.)

falcata Cand. 2. C. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis falcatis crenatis, racemis terminalibus. *Cochinchina.* (Aulacia falcata Lour.)

1569. MURRAYA.

exotica 1. M. foliolis obovatis integerrimis, pedunculis corymbofis. *Ind. or. China.* (Chalcas japonenfis Lour.)

paniculata Cand. 2. M. foliolis ovato-lanceolatis undulatis, panicula terminali diffufa. *Cochinchina. China. Inf. Molucc.* (Chalcas paniculata Lour.)

*Burmanni** 3. M. foliolis ovato-oblongis acuminatis pubefcentibus, floribus paniculatis octandris. *Java.* (Claucena excavata N. L. Burm.)

*Königii** 4. M. foliolis ovato-lanceolatis ferratis, racemis corymbofis. *Ind. or.* (Bergera L.)

1570. LEDUM.

paluftre 1. L. foliis linearibus margine revolutis fubtus ramisque ferrugineo-tomentofis, floribus 10andris. *Europ., Afia* et *Amer. bor.*

latifolium Ait. 2. L. foliis elliptico-oblongis utrinque rotundatis fubtus ramisque ferrugineo-tomentofis, floribus fub-5andris. *Amer. bor.* (L. grönlandicum Retz.)

1571. LEIOPHYLLUM Perf.

thymifolium Perf. *Amer. bor.* Fruticulus foliis ellipticis utrinque glaberrimis nitidis integerrimis, floribus terminalibus fafciculato-corymbofis albido-rubris. (Ledum thymifolium Lam., buxifolium Berg., Ammyrfine Pursh., Fifchera Sw.)

1572. CLETHRA.

alnifolia 1. Cl. foliis obovatis acutis utrinque glabris concoloribus apice ferratis, racemis fpicatis fimplicibus bracteatis cano-tomentofis. *Amer. bor.*

tomentofa Lam. 2. Cl. foliis obovatis acutis apice ferratis fubtus racemisque villofo-tomentofis. *Amer. bor.* (Cl. pubefcens W.)

fcabra Perf. 3. Cl. foliis obovatis acutis uncinato-ferratis utrinque fcabris, racemo fpicato fubpaniculato bracteato fubtomentofo. *Georgia.*

acuminata Mx. 4. Cl. foliis ovato-oblongis acuminatis ferratis utrinque glabris fubtus glaucis, racemis fpicatis fubfolitariis bracteatis tomentofis. *Carolina.*

fagifolia Kunth. 5. Cl. foliis obovatis dentatis coriaceis glabris, racemis fafciculatis terminalibus tomentofis. *Amer. auftr.* (Cuellaria obovata R. et P.)

bicolor Kunth. 6. Cl. foliis oblongis obtufis undulato-crenatis glandulofo-denticulatis coriaceis fubtus albo-tomentofis, racemis fafciculatis ferrugineo-tomentofis. *Nov. Granat.*

fimbriata Kunth. 7. Cl. foliis oblongis obtufiusculis undulatis coriaceis fubtus incano-tomentofis, racemis fafciculatis

ferrugineo-tomentosis, petalis fimbriatis. *Nov. Granat.*

paniculata Ait. 8. Cl. foliis lanceolatis serratis utrinque glabris, paniculae terminalis elongatae ramis racemosis tomentosis. *Carolina.*

arborea Ait. 9. Cl. foliis oblongis utrinque attenuatis argute serratis subtus villosiusculis, racemis paniculatis ebracteatis pubescentibus. *Madera.*

tinifolia Sw. 10. Cl. foliis oblongis obtusis integerrimis subtus incano-tomentosis, racemis paniculatis elongatis pubescentibus. *Jamaica.*

† *ferruginea* Link. 11. Cl. foliis subcordato-oblongis acuminatis integerrimis subtus ferrugineis. *Peru.* (Cuellaria R. et P.)

† *revoluta** 12. Cl. foliis subcordato-oblongis denticulatis margine revolutis. *Peru.* (Cuellaria R. et P.)

1573. CLIFTONIA Banks.

ligustrina Sims. *Georgia.* Frutex ramosus foliis subspathulato-lanceolatis utrinque glabris subtus glaucis, floribus racemosis bracteatis albis. (Mylocaryum W.)

1574. PYROLA.

* *Stylo erecto.*

uniflora 1. P. scapo unifloro, foliis suborbiculatis dentatis. *Europ. Amer. bor.*

secunda 2. P. racemo secundo, foliis ovatis serratis. *Europ. Amer. bor.*

minor 3. P. racemo aequali, corollis campanulatis, foliis ovatis acutis dentatis. *Europ. Sibir. Amer. bor.* (P. rosea Sm.)

** *Stylo declinato.*

media Sw. 4. P. racemo aequali, corollis subglobosis, stylo declinato recto, staminibus conniventibus, foliis subrotundis crenato-dentatis. *German. med. Suecia. Anglia.* (P. rotundifolia fl. dan.)

rotundifolia 5. P. racemo aequali, laciniis calycinis lanceolatis, stylo recurvo elongato, staminibus ascendentibus, foliis subrotundis obtusis crenatis nitidis. *Europ. Amer. bor.* (P. grandiflora Rad.)

elliptica Nutt. 6. P. racemo paucifloro, laciniis calycinis ovatis, stylo recurvo elongato, stigmate tuberculato, foliis ellipticis mucronatis crenatis. *Pensylvan.*

asarifolia Mx. 7. P. racemo aequali, laciniis calycinis ovatis appressis, stylo recurvo clavaeformi germen duplo excedente, staminibus subascendentibus, foliis reniformibus repando-crenatis petiolo dilatato brevioribus. *Amer. bor.*

chlorantha Sw. 8. P. racemo paucifloro, laciniis calycis brevissimis obtusis, stigmate clavato, antheris tubulosis, foliis orbiculatis obsolete crenatis petiolo angusto

brevioribus. *Suecia. Canada super.* (P. convoluta Bart. minor Pursh.)

occidentalis R. Br. 9. P. racemo paucifloro, laciniis calycis oblongis obtusis, stigmate annulato 5lobo, antheris breviter foratis, foliis subrotundis membranaceis obsolete denticulatis petiolo brevioribus. *Ora occid. Amer. bor.*

dentata Sm. 10. P. racemo stricto, staminibus ascendentibus, stylo falcato, stigmate cylindrico 5fido, foliis obovatis obtusis dentatis. *Ora occid. Amer. bor.*

picta Sm. 11. P. racemo secundo, sepalis patulis, stylo incurvo, foliis ovatis obtusis subserratis maculatis. *Ora occid. Amer. bor.*

aphylla Sm. 12. P. scapo aphyllo squamato subracemoso, floribus globosis pendulis, laciniis calycis ovatis acutis crenulatis, antheris rostratis, stylo incurvo. *Ora occid. Amer. bor.*

1575. CHIMAPHILA Pursh.

umbellata Nutt. 1. Ch. floribus umbellatis, foliis spathulato-lanceolatis acutis serratis. *Europ. Asia* et *Amer. bor.* (Ch. corymbosa Pursh. Pyrola umbellata L.)

maculata Pursh. 2. Ch. scapo sub-2floro, staminibus basi villosis, foliis lanceolatis serratis albo-vittatis. *Amer. bor.* (Pyrola L.)

*Menziesii** 3. Ch. pedunculo sub-2floro gracili, bracteis subrotundis, laciniis calycis acutis, staminibus medio barbatis, stylo elongato, foliis lanceolatis acuminatis coriaceis serrulatis subtus discoloribus. *Ora occident. Amer. bor.* (Pyrola Menziesii R. Br. Don.)

1576. MONOTROPA.

Hypopitys 1. M. racemo multifloro, petalis villosis integerrimis stylum pubescentem superantibus. *Europ., Asia* et *Amer. bor.* (Hypopitys europaea Nutt. Monotropsis odorata Schweinitz. Elliott.)

*Hypoxya** 2. M. racemo paucifloro, petalis glabris laceris stylum glaberrimum subaequantibus. *Sylvae fageae Europ.* (M. hypophegea Wallr.)

lanuginosa Mx. 3. M. racemo laxo paucifloro, bracteis petalisque dentato-laceris fimbriato-barbatis stylo longioribus. *Amer. bor.*

Morisoniana Mx. 4. M. scapo elongato 1floro, squamis distantibus, flore erecto. *Amer. bor.*

uniflora 5. M. scapo brevi 1floro, squamis patentibus, flore cernuo campanulato. *Amer. bor.*

1577. GOMPHIA.

* *Foliis integerrimis.*

grandiflora Cand. 1. G. foliis ovato-oblongis acuminatis, panicula terminali stricta, petalis subrotundis calyce longioribus. *Brasil.* (Correia n. 2. Velloz. Vandell.)

aquatica Kunth. 2. G. foliis ovato-oblongis acutiusculis obsolete venosis, racemis subsimplicibus elongatis, petalis calycem subaequantibus. *Ad Orinocum.*

laurifolia Sw. 3. G. foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis, panicula diffusa, petalis subrotundis calycem aequantibus. *Ind. occid.*

oleaefolia Hilar. 4. G. foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis margine revolutis pubescentibus, floribus paniculatis. *Brasil.*

longifolia Lam. 5. G. foliis subcordato-oblongis acutis elongatis glaberrimis, panicula diffusa. *Guadalupa. Guiana?* (Ouratea guianensis Aubl.)

guianensis Rich. 6. G. foliis oblongis obtusis subemarginatis subintegerrimis, paniculae ramis fasciculatis, sepalis oblongis obtusiusculis. *Guiana.*

obtusifolia Cand. 7. G. foliis spathulato-oblongis obtusis, racemi subcompositi ramis 3fidis, sepalis lanceolatis acuminatis. *Madagascar.* (Ochna obtusifolia Lam., laevigata Vahl.)

cassinaefolia Cand. 8. G. foliis cordato-ovatis obtusis, racemo simplici terminali. *Brasil.*

** *Foliis subserratis, serratis, dentatis.*

parviflora Cand. 9. G. foliis lanceolatis utrinque attenuatis obsolete crenatis, floribus paniculatis, petalis calycem aequantibus. *Brasil.*

ceylanica Cand. 10. G. foliis oblongis utrinque attenuatis subdenticulatis, racemis elongatis terminalibus, drupis globosis. *Ceylon.* (Ochna ceylanica Lam.)

dependens Cand. 11. G. foliis oblongo-lanceolatis elongatis subdenticulatis, stipulis persistentibus lanceolatis, racemis simplicibus pendulis longissimis. *Madagascar.*

angulata Cand. 12. G. foliis obovato-oblongis basi attenuatis subcordatis serratis, racemi subcompositi elongati ramis angulatis. *Madagascar.*

† *malabarica* Cand. 13. G. foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis eveniis nitidis, racemis paniculatis. *Ind. or.*

angustifolia Vahl. 14. G. foliis lanceolatis subsessilibus apice serratis reticulato-venosis, floribus paniculatis. *Ind. or.*

glaberrima P. B. 15. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis apice serratis subeveniis nitidis, racemis simplicibus. *Guinea.*

mexicana Humb. 16. G. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis, racemis brevibus confertis. *Mexico.*

reticulata P. B. 17. G. foliis oblongo-lanceolatis acutis serratis reticulato-venosis, floribus paniculatis. *Guinea.*

cardiosperma Cand. 18. G. foliis oblongo-lanceolatis serrulatis venosis, panicula stricta, fructibus obcordato-2lobis. *Guiana.* (Ochna cardiosperma Lam.)

acuminata Cand. 19. G. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus pallidis apice serratis, floribus paniculatis. *Brasil.*

nitida Sw. 20. G. foliis ovali-oblongis acuminatis subserratis utrinque lucidis subtilissime venosissimis, panicula terminali stricta. *Jamaica.*

ſquamoſa Cand. 21. G. foliis oblongo-lanceolatis ſubſerratis venoſis, ſtipulis confertis perſiſtentibus ariſtatis, racemis ſubpaniculatis. *Inſ. Carib.*

Jabotapita 22. G. foliis oblongo-lanceolatis argute ſerrulatis nitidiuſculis venoſis, racemis ſimplicibus, petalis calyce triplo longioribus. *Braſil. Ind. occid.*

caſtaneaefolia Cand. 23. G. foliis oblongis acutis argute ſerratis, panicula ramoſiſſima, petalis calycem aequantibus. *Braſil.* (Correia 1. Vandell.)

ilicifolia Cand. 24. G. foliis ovali-oblongis ſpinoſo-dentatis glaberrimis, panicula pyramidata terminali. *Hiſpaniola.*

1578. QUASSIA.

amara 1. Qu. floribus ☿ racemoſis, foliis pinnatis 2jugis oblongis nitidis, petiolo communi alato. *Surinam.*

excelſa Sw. 2. Qu. floribus polygamis paniculatis 5andris, foliis oppoſite pinnatis 5jugis, petiolis teretibus ſtipulatis, foliolis oblongis acutis nervoſo-venoſis. *Jamaica. Inſ. Carib.*

Simaruba 3. Qu. floribus monoecis 10andris paniculatis, foliis alternatim pinnatis, petiolis teretibus, foliolis oblongis acutiuſculis ſubtus pubeſcentibus. *Guiana. Inſ. Carib.* (Simaruba amara Aubl. officinalis Cand.)

*glauca** 4. Qu. floribus monoecis 10andris paniculatis, foliis alternatim pinnatis, petiolis teretibus, foliolis oblnogis ſubtus glabris glaucis. *Cuba.* (Simaruba Kunth.)

1579. ZWINGERA Schreb.

*Aruba** 1. Zw. foliis ternatis lanceolatis acuminatis, racemis terminalibus. *Guiana.* (Aruba guianenſis Aubl.)

amara W. 2. Zw. foliis ternato-pinnatis bijugis, foliolis lanceolatis emarginatis, pedunculis lateralibus ſubracemoſis. *Guiana.* (Simaba guianenſis Aubl.)

*orinocenſis** 3. Zw. foliis ternato-pinnatis bijugis, foliolis oblongis obtuſis, racemis terminalibus. *Ad Orinoc.* (Simaba Kunth.)

*floribunda** 4. Zw. foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis obtuſiuſculis lucidis, panicula terminali pyramidata pubeſcente. *Braſil.* (Simaba Hilar.)

*ferruginea** 5. Zw. foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis obtuſiuſculis ſubtus ramisque ferrugineo-pubeſcentibus, panicula terminali ſubſeſſili. *Braſil.* (Simaba Hilar.)

*ſuaveolens** 6. Zw. foliis abrupte pinnatis, foliolis ellipticis obtuſiſſimis glabris, floribus paniculatis glanduloſo-pubeſcentibus. *Braſil.* (Simaba Hilar.)

*trichilioides** 7. Zw. foliis pinnatis ſub-4jugis, foliolis ellipticis obtuſis mucronatis ſupra pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, floribus paniculato-glomeratis rufo-tomentoſis. *Braſil.* (Simaba Hilar.)

1580. RUTA.

** Foliis decompoſitis.*

graveolens — 1. R. foliolis lateralibus oblongis terminali obovato glaberrimis, petalis ſubdentatis, germine glabro punctato. *Europ. auſtr.*

divaricata Tenor. — 2. R. foliolis obovatis aequalibus, petalis fimbriatis. *Italia. Graecia. Tauria.*

bracteoſa Cand. — 3. R. foliolis oblongis obtuſis ſubaequalibus, bracteis ſubcordatis maximis, petalis fimbriatis. *Sicilia. Inſ. maris aegei.*

corſica Cand. — 4. R. foliolis obovatis aequalibus, pedunculis elongatis racemoſis rigidis divaricatis, petalis integerrimis. *Corſica.* (R. divaricata Salzm.)

macrophylla Ker. — 5. R. foliolis inferioribus 3partitis, terminali maximo obovato, petalis fimbriatis. *Afric. bor. Syria.* (R. chalepenſis *α.* L.)

albiflora Hook. — 6. R. foliolis obovatis glaucis pubeſcentibus ſubauriculatis, terminali maximo obcordato, paniculae ramis bracteatis cernuis, ſtaminibus petala integerrima ſuperantibus, germine pedicellato. *Nepal.*

anguſtifolia Perſ. — 7. R. foliolis oblongo-linearibus ſubaequalibus, bracteis minimis, petalis ſubfimbriatis. *Europ. auſtr. Aſia minor.* (R. chalepenſis *β.* L., crithmifolia Moricand.)

montana — 8. R. foliolis linearibus acutis glaucis ſubdivaricatis, petalis oblongis obtuſis integerrimis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (R. legitima Jacqu. tenuifolia Desf.)

*** Foliis pinnatis.*

pinnata — 9. R. foliis pinnatis 3jugis, foliolis lanceolatis obtuſiusculis ſubdentatis ſubtus pallidis, pedunculis ſubcorymboſis, petalis undulatis. *Inſ. Canar.*

**** Foliis ternatis.*

patavina — 10. R. foliis lineari-lanceolatis acutis glabris petalisque integerrimis, corymbo conferto, calycibus villoſis. *Montes Euganei prope Patav.*

pubeſcens W. — 11. R. foliis ternatis ſimplicibusque lanceolatis pubeſcentibus, corymbo multifloro, calycibus germinibusque villoſis. *Hiſpan.* (R. patavina Poir.)

dichotoma Cand. — 12. R. foliis ternatis linearibus integerrimis, corymbo dichotome paniculato, ſtaminibus baſi dilatatis, calycibus ſubciliatis. *Perſia.*

***** Foliis ſimplicibus.*

acutifolia Cand. — 13. R. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubpetiolatis glabris, panicula dichotoma corymboſa, calycibus acutiſſimis ſubciliatis, capſulis glabris. *Perſia.*

glabra Cand. — 14. R. foliis lineari-oblongis integerrimis glabris ſubtus glandulοſis, calycibus laevibus, petalis oblongo-linearibus. *Perſia.*

15.

fruticulosa Labill. 15. R. foliis oblongis obtusiusculis calycibusque villosis, corymbo paucifloro, petalis oblongis, germinibus villosissimis. *Syria. Palaestina.* (R. villosa Sieb.)

villosa M. B. 16. R. foliis oblongo-linearibus pubescentibus, floribus racemosis parvis, calycibus germinibusque glanduloso-tuberculatis hirsutis, petalis oblongis. *Caucas. Bessarabia.*

tuberculata Forsk. 17. R. foliis lineari-lanceolatis pilosis subtus tuberculosis, panicula dichotoma corymbosa, capsulis tuberculatis pilosis. *Arabia. Aegypt.*

linifolia 18. R. foliis oblongo-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis, calycibus ciliatis, ovariis villosis. *Hispan. Africa bor.*

Buxbaumii Poir. 19. R. foliis lanceolatis basi attenuatis cauleque superne pubescentibus, floribus paniculato-corymbosis, staminibus calycibusque ciliatis, capsulis aspero-tuberculatis. *Tauria. Bessarabia. Asia minor.* (R. linifolia M. B., suaveolens Cand.)

linearis Cand. 20. R. foliis linearibus glabris subtus punctatis, corymbis paucifloris dichotomis, petalis lineari-oblongis, capsulis glabris 3lobis. *Sibir. austr.*

† *rosmarinifolia* Pers. 21. R. foliis linearibus subtus punctatis, caule ramosissimo. *Hispan.*

davurica Cand. 22. R. foliis lineari-lanceolatis glabris, corymbo coarctato, sepalis subrotundis staminibusque basi ciliatis, petalis ovatis, germinibus glabris. *Asia bor.* (Peganum dauricum β. L. R. thesioides Fisch.)

1581. DICTAMNUS.

albus *Europ. med.* Herba cubitalis et altior, foliis pinnatis ovatis serratis nitidis, racemo terminali glanduloso-resinoso, floribus roseis.

1582. ERIOSTEMON Sm.

buxifolius Sm. 1. E. foliis obovato-oblongis mucronatis crenato-glandulosis glabris, ramis teretibus pilosis, floribus axillaribus sessilibus glabris, filamentis hispidis. *Nov. Holl.*

salicifolius Sm. 2. E. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, ramulis 3quetris, floribus axillaribus subsessilibus bracteolatis solitariis, calycibus petalisque extus canescentibus, filamentis hispidis. *Nov. Holl.*

paradoxus Sm. 3. E. foliis simplicibus ternatis pinnatisque lanceolatis margine revolutis subtus hirsutis, floribus axillaribus 4petalis. *Nov. Holl.*

myoporoides Sm. 4. E. foliis lineari-lanceolatis integerrimis apice callosis glanduloso-punctatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis ciliatis. *Nov. Holl.* (E. linearifolius Cand.)

squameus Labill. 5. E. foliis lanceolatis integerrimis subtus rufo-lepidotis, ramulis angulatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis glabris. *Nov. Holl.*

lepidotus * 6. E. foliis lineari-oblongis acutis subtus floribusque lepidotis, staminibus glabriusculis exsertis. *Nov. Holl.* (Phebalium squamulosum Vent.)

anceps * 7. E. foliis spathulato-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis lepidotis, staminibus glabris corolla brevioribus. *Nov. Holl.* (Phebalium anceps Cand.)

1583. CROWEA Sm.

saligna Sm. *Nov. Holl.* Fruticulus foliis lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis roseis.

1584. CHOISIA Kunth.

ternata Kunth. *Mexico.* Frutex foliis ternatis glanduloso-punctatis, floribus fasciculatis albis.

1585. GUAIACUM.

dubium Forst. 1. Gu. foliis binatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis supra nitidis subtus pallidis, racemo paucifloro. *Ins. Amicorum.*

officinale 2. Gu. foliis 2jugis nitidis, foliolis aequalibus obovatis obtusis, pedunculis geminis. *Jamaica. Hispaniola.* (Flores subcoerulei.)

Breynii * 3. Gu. foliis 2-3jugis nitidiusculis, foliolis inaequalibus, extremis oblongo-ellipticis inaequilateris, mediis obovatis, infimis subrotundis, pedunculis umbellatis. *Ad fl. Magdalenae.* Bertero. (Flores flavi.)

verticale Ort. 4. Gu. foliis 5jugis opacis, foliolis oblongis obtusis mucronatis, pedunculis subgeminis, petalis verticalibus. *Nov. Hispan. Hispaniola.* (Flores coerulei.)

sanctum 5. Gu. foliis 5jugis nitidulis, foliolis obovatis aequalibus, pedunculis binis, petalis fimbriatis. *Brasil.*

arboreum Kunth. 6. Gu. foliis multijugis, foliolis subalternis lineari-oblongis obtusis mucronatis inaequilateris nervosis, petiolis ramulisque subpubescentibus, pedunculis subcorymbosis. *Amer. austr.* (Zygophyllum arboreum Jacq.)

1586. ZYGOPHYLLUM.

* *Foliis pinnatis.*

coccineum 1. Z. foliolis teretibus carnosis laevibus, pedunculis subsolitariis, petalis acuminatis, capsulis cylindricis. *Aegypt. Afric. bor.* (Z. desertorum Forsk.)

album — 2. Z. foliolis clavatis carnofis incano-lanatis, pedunculis fubfolitariis, petalis obtufis, capfulis 5gonis. *Aegypt. Afric. bor. Inf. Canar.* (Z. proliferum Forsk.)

fpinofum — 3. Z. foliolis linearibus carnofis feffilibus fupra planis, ftipulis quaternis fubulatis, petiolis fpinefcentibus. *C. B. S.*

maculatum Ait. — 4. Z. foliolis lineari-lanceolatis petiolatis, floribus maculatis. *C. B. S.*

feffilifolium — 5. Z. foliolis feffilibus quaternis obovatis margine fcabris, ftipulis breviffimis fcariofis, ramis angulatis, capfula 5gona. *C. B. S.*

decumbens Delil. — 6. Z. foliolis petiolatis fpathulatis carnofis, caule decumbente, ramis floriferis dichotomis, capfula turbinato-fphaerica. *Aegypt.*

foetidum Wendl. — 7. Z. foliolis petiolatis fubrotundo-obovatis, pedunculis nutantibus, petalis reflexis fubincifis maculatis. *C. B. S.* (Z. retrofractum Thunb.?)

Fabago — 8. Z. foliolis petiolatis obovatis inaequilateris, pedunculis geminis erectis, calycibus glabris, petalis integerrimis, capfulis 5gonis. *Syria. Tauria. Africa bor.*

Morgfana — 9. Z. foliolis petiolatis obovato-oblongis carnofis laevibus, ftipulis linearibus reflexis, pedunculis geminis nutantibus, capfulis inflatis alatis. *C. B. S.*

microphyllum Thunb. — 10. Z. foliolis feffilibus obovatis emarginatis glabris, capfulis alatis, caule fruticofo. *Afr. auftr.* (Z. capenfe Lam.)

proftratum Thunb. — 11. Z. foliolis fubpetiolatis ovatis mucronatis fcabris, caule decumbente ramofo, geniculis hirtis, pedunculis folitariis. *Afric. auftr.*

tridentatum Seff. — 12. Z. foliolis fubfeffilibus obovatis villofis, petalis ftaminumque fquamis apice 3dentatis, capfula hirfutiffima. *Nov. Hifpan.*

† *aeftuans* — 13. Z. foliolis feffilibus obovatis retufis, caule herbaceo. *Surinam.*

Billarderii Cand. — 14. Z. foliolis petiolatis oblongis carnofis, caule herbaceo decumbente, calycibus elongatis reflexis, capfulis turbinatis. *Nov. Holl. auftr.*

fruticulofum Cand. — 15. Z. foliolis petiolatis oblongis carnofis, caule fruticofo erecto, pedunculis breviffimis, ftaminibus exappendiculatis. *Nov. Holl.*

** *Foliis fimplicibus.*

fimplex — 16. Z. foliis feffilibus clavato-cylindricis, caule lignofo, capfulis angulatis ftylo perfiftente coronatis. *Aegypt. Arab.* (Z. portulacoides Forsk.)

cordifolium L. fuppl. — 17. Z. foliis feffilibus cordato-orbiculatis carnofis glabris, pedunculis filiformibus, caule fruticofo. *C. B. S.*

1587. LARREA Cav.

nitida Cav. 1. L. foliis impari-pinnatis 8jugis lucidis, foliolis ſpathulatis, ſtipulis linearibus, ramis glutinoſis hirſutis, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus glabris. *Buenos Ayres.*

divaricata Cav. 2. L. foliis oppoſitis 2lobis villoſis, lobis lanceolatis acutis nervoſis divaricatis, ſtipulis tuberculatis, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus hirſutis. *Buenos Ayres.*

cuneifolia Cav. 3. L. foliis oppoſitis cuneatis apice 2lobis medio mucronatis, lobis acutis, ſtipulis abbreviatis craſſis. *Buenos Ayres.*

1588. FAGONIA.

* *Foliis ternatis.*

cretica 1. F. foliolis lineari-lanceolatis cuſpidatis, ſtipulis abbreviatis recurvis rigidis, pedunculis pubeſcentibus ſolitariis, fructibus glabris. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (F. hiſpanica L. varietas.)

arabica 2. F. foliolis lineari-lanceolatis ſubtus convexis cuſpidatis ſcabris abbreviatis, ſtipulis ſpinoſis horizontalibus elongatis, caule lignoſo ramoſiſſimo, fructibus villoſis. *Arab. Aegypt.*

mollis Delil. 3. F. foliolis ovatis mucronatis villoſis, ſtipulis ſubulato-ſpinoſis horizontalibus foliola ſubaequantibus, caule fruticoſo diffuſo, fructibus hiſpidis. *Aegypt.*

glutinoſa Delil. 4. F. foliolis obovatis mucronatis villoſiuſculo-glutinoſis, ſtipulis ſubulatis rectis petiolo brevioribus, caule proſtrato dichotomo fructibusque viſcoſis. *Aegypt.* (F. ſcabra Forsk.)

latifolia Delil. 5. F. foliolis lateralibus ſpathulato-lanceolatis, medio maximo ſuborbiculato mucronato, ſtipulis ſubulatis abbreviatis, caule herbaceo piloſo. *Aegypt.*

** *Foliis ſimplicibus.*

perſica Cand. 6. F. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus ovali-oblongis glabris, ſtipulis ſubulatis erectis, caule herbaceo. *Perſia.* Garcin. (F. indica N. L. Burm. L. Oliverii Cand.)

Bruguieri Cand. 7. F. foliis oblongis cuſpidatis, ſtipulis ſpinoſis folio longioribus, ramis 4gonis, pedunculis breviſſimis, fructibus pubeſcentibus. *Ad Euphrat. et in Ind. or.* (F. myſorenſis Roth.)

1589. TRIBULUS.

ciſtoides 1. Tr. foliis ſub-8jugis ſubtus ſericeis, foliolis ſubaequalibus oblongis obtuſis mucronatis, pedunculis folia aequantibus, fructibus villoſis. *Ind. orient.*

albus Poir. 2. Tr. foliis ſub-8jugis utrinque villoſis, foliolis ſubaequalibus ovalibus, pedunculis folio brevioribus, fructibus villoſis. *Senegambia.*

terreſtris 3. Tr. foliis 6jugis ſubtus villoſis, foliolis ſubaequalibus oblongo-lanceolatis, pedunculis folio brevioribus, fructu 4corni. *Europ. auſtr. Aſia med. Africa.*

alatus Delil. 4. Tr. foliis ſub-6jugis utrinque albido-villoſiſſimis, pedunculis abbreviatis, fructu acerato alato. *Aegypt.*

lanuginoſus 5. Tr. foliis ſub-5jugis utrinque villoſiusculis, foliolis ſubaequalibus lineari-oblongis, pedunculis folio brevioribus, fructibus 2cornibus. *Ceylon.*

maximus 6. Tr. foliis ſub-3jugis exterioribus majoribus, pedunculis folio brevioribus, fructibus inermibus 10ſpermis. *Ind. occ.*

trijugatus Nutt. 7. Tr. foliis 3jugis ſubtus pubeſcentibus exterioribus majoribus, fructibus muricatis 5ſpermis. *Georgia.*

1590. ENTADA Adanſ.

Parrana * 1. E. foliis conjugato-pinnatis cirrho terminatis, pinnis 4jugis, ſpicis filiformibus, caule ſcandente. *Ind. or. et occid.* (Mimoſa ſcandens L. Acacia W.)

Rheedii * 2. E. foliis 2pinnatis cirrho terminatis, partialibus 2-propriis 4jugis emarginatis, ſpicis cylindricis, caule ſcandente. *Ind. or.* (Mimoſa Entada L.)

1591. DESMANTHUS W.

(Folia omnium 2pinnata.)

lacuſtris W. 1. D. foliis partialibus 3-propriis multijugis, foliolis linearibus obtuſis, ſpicis ovatis, pedunculis bracteatis, caule repente tereti. *Amer. auſtr.*

natans W. 2. D. foliis partialibus 3-propriis 13jugis, ſpicis oblongis interruptis, pedunculis nudis, caule repente tumido ſubcarnoſo. *Ind. or. Cochinchina.* (Mimoſa natans Vahl. Neptunia oleracea Lour.)

triquetrus W. 3. D. foliis partialibus 3-propriis 12jugis, ſpicis globoſis, pedunculo bracteato, caule proſtrato ſuperne 3quetro. *Ind. or.* (Mimoſa natans L., 3quetra Vahl.)

plenus W. 4. D. foliis partialibus 3-propriis 12jugis, ſpicis ovatis, pedunculo bracteato, caule proſtrato compreſſo. *Nov. Hiſpan.* (Mimoſa plena L.)

depreſſus Humb. 5. D. foliis partialibus 2-propriis 12jugis, ſpicis paucifloris globoſis, pedunculo nudo, caule diffuſo ſuperne 4gono. *Amer. auſtr.*

diffuſus W. 6. D. foliis partialibus 4-propriis 12jugis, ſpicis paucifloris capitatis 5andris, caule proſtrato. *Amer. auſtr.* (Mimoſa pernambucana L.)

virgatus W. 7. D. foliis partialibus 4-propriis 12jugis, ſpicis paucifloris capitatis, caule erecto angulato. *Ind. or.* (Mimoſa virgata L.)

punctatus W. 8. D. foliis partialibus 4-propriis multijugis, ſpicis ovatis, pedunculo baſi bracteato, legumine oblongo obtuſo, caule erecto calloſo-punctato. *Jamaica.* (Mimoſa punctata L.)

1592. PROSOPIS.

* *Inermes.*

ſpicigera 1. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis 8jugis linearibus obtuſis, ſpicis axillaribus elongatis. *Ind. or.*

cumanenſis Kunth. 2. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis 11jugis linearibus remotiuſculis, glandula baſilari ſeſſili, ſpicis filiformibus, caule erecto, ramis teretibus. *Cumana.* (Acacia cumanenſis W.)

dulcis Kunth. 3. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis multijugis glabris, petiolo glanduloſo, ſpicis filiformibus, caule erecto tuberculato. *Nov. Hiſpan.* (Acacia laevigata et edulis W.)

pallida Kunth. 4. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis 12jugis pubeſcentibus, petiolo glanduloſo, ſpicis filiformibus elongatis, caule erecto tuberculato. *Amer. auſtr.* (Acacia pallida W.)

** *Spinoſae.*

affinis * 5. Pr. foliis conjugato-pinnatis, foliolis multijugis remotiuſculis glaberrimis, petiolo eglanduloſo, ramis tuberculoſis, ſpinis rectis, ſpicis filiformibus conjugatis. *Monte Video.*

horrida Kunth. 6. Pr. foliis 2pinnatis partialibus ſub-3jugis, propriis ſub-10jugis oblongis pubeſcentibus, petiolo glanduloſo, ſpinis ſtipularibus geminis longiſſimis. *Amer. auſtr.*

Stephaniana Kunth. 7. Pr. foliis 2pinnatis, partialibus 5-propriis 10jugis ſubtus pubeſcentibus, ſpicis filiformibus elongatis, aculeis compreſſis ſparſis ſubuncinatis. *Perſia bor. Caucaſ.* (Mimoſa et Lagonychium MB. Acacia W.)

1593. SCHOTIA Jacqu.

ſpecioſa Jacq. 1. Sch. foliis ſub-8jugis ovali-lanceolatis mucronatis nitidis, ſtipulis ſubulatis. *Afric. auſtr.* (Guaiacum afrum L.)

tamarindifolia Afzel. 2. Sch. foliis ſub-8jugis ellipticis retuſis altero margine excavatis. *C. B. S.*

ſtipulata R. Br. 3. Sch. foliis 5jugis oblongis acutis cuſpidatis, ſtipulis dimidiato-ovatis falcatis mucronatis. *C. B. S.*

1594. OMPHALOBIUM Jacqu. fil.

Schotia Jacq. *C. B. S.* Frutex foliis 3jugis obovato-oblongis obtusissimis, floribus racemosis roseis. (Schotia latifolia Jacq.)

1595. CYNOMETRA.

cauliflora 1. C. foliis binatis oblongis inaequilateris, trunco florifero. *Ins. Molucc.*

ramiflora 2. C. foliis binatis lanceolatis acuminatis, ramis floriferis. *Ins. Molucc. Ind. or.*

polyandra Roxb. 3. C. foliis abrupte pinnatis 2jugis, ramulis floriferis, floribus polyandris. *Silhet, Ind. or.*

† *Agallocha* * 4. C. foliis simplicibus lanceolatis, pedunculis multifloris terminalibus, fructibus sublignosis. *Cochinchina.* (Aloëxylum Agallochum Lour.)

1596. GYMNOCLADUS Lam.

canadensis Lam. *Canada.* Arbor foliis 2pinnatis, foliolis sub-10jugis ovatis acutis subtus pubescentibus, floribus racemosis albis. (Guilandina dioeca L.)

1597. GUILANDINA.

Bonduc 1. Gu. foliis 2pinnatis, foliolis ovatis basi aculeatis, floribus subspicatis. *Ind. or. et occ.* (Gu. Bonduccella L. var.)

gemina Lour. 2. Gu. foliis pinnatis, foliolis ovatis obtusis basi aculeatis, floribus paniculatis, fructibus geminis echinatis. *Cochinchina.*

paniculata Lam. 3. Gu. foliis pinnatis, foliolis ovalibus basi aculeatis, floribus paniculatis, fructibus laevibus. *Malabar.*

axillaris Lam. 4. Gu. foliis pinnatis basi aculeatis, floribus axillaribus subsolitariis, fructibus villosis. *Malabar.*

echinata * 5. Gu. caule ramisque aculeatis, foliis 2pinnatis, foliolis ellipticis obtusis, racemis simplicibus, fructibus echinatis. *Brasil.* (Caesalpinia echinata Lam.)

1598. HYPERANTHERA Vahl.

decandra W. 1. H. floribus 10andris, foliis subbipinnatis, foliolis ovatis inferioribus ternatis, leguminibus sub-8gonis. *Ind. or.* (Anoma Moringa Lour.)

Moringa Vahl. 2. H. floribus semi-10andris, foliis subbipinnatis, foliolis subrotundis obtusis, inferioribus ternatis, leguminibus 3gonis. *Ind. or. et occid. Aegypt.* (Guilandina Moringa L. Moringa zeylanica Lam. Anoma Morunga Lour.)

peregrina Forsk. 3. H. floribus semi-10andris, foliis 2pinnatis, apice simpliciter pinnatis, leguminibus 6sulcis. *Arabia.*

(H. ſemi-10andra Vahl. Gymnocladus arabica Lam.)

† *cochinchinenſis* W. 4. H. floribus ſemi-10andris, foliis 2pinnatis tomentoſis, leguminibus 2valvibus, ſeminibus nudis. *Cochinchina.* (Anoma Lour.)

1599. ADENANTHERA.

pavonina 1. A. foliis decompoſitis utrinque glabris. *Ind. or.*

falcata 2. A. foliis decompoſitis ſubtus tomentoſis. *Ind. orient.*

† *ſcandens* Forſt. 3. A. foliis pinnatis 2jugis, foliolis ovatis obliquis glabris, cirrhis terminalibus 2fidis. *Nov. Hebrid.* (Entada Adanſ.?)

1600. CADIA Forsk.

purpurea Forsk. *Arabia.* Arbuscula foliis pinnatis oblongis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, floribus rubris.

1601. HAEMATOXYLON.

campechianum *Amer. tropic.* Arbor grandis ſpinoſa, foliis abrupte pinnatis 3jugis, foliolis obovatis retuſis oblique ſtriatis ſupra nitidis, floribus racemoſis flavis.

1602. BARYXYLON Lour.

rufum Lour. *Cochinchina.* Arbor magna, foliis pinnatis paucijugis, foliolis oblongis obtuſis integerrimis, floribus racemoſis luteis.

1603. ZUCCAGNIA Cav.

punctata Cav. *Chili.* Frutex foliis pinnatis glutinoſis punctatis, floribus racemoſis croceis.

1604. BUNCHOSIA Juſſ.

* *Foliis, petiolis pedicellisve glandulosis.*

glanduloſa Cand. 1. B. foliis ovato-ellipticis acuminatis glabris, petiolis apice 2glanduloſis, racemis ſimplicibus folio brevioribus. *Ind. occid.* (Malpighia glanduloſa Cav.)

glandulifera Kunth. 2. B. foliis elliptico-ovatis breviſſime petiolatis undulatis utrinque pubeſcentibus baſi ſubtus 4glanduloſis, racemis ſimplicibus, pedicellis uniglanduloſis. *Guadalupa. Caracas.* (Malpighia glanduloſa Jacq.)

cornifolia Kunth. 3. B. foliis oblongis utrinque attenuatis ſericeis baſi 2glanduloſis, racemis ſimplicibus, pedicellis uniglanduloſis. *Nov. Granat.*

polyſtachya Cand. 4. B. foliis oblongis acutis nitidis ſubtus baſi 2glanduloſis, racemis ſubpaniculatis, pedicellis 1glanduloſis, ſtigmate capitato 2lobo. *Ind. occ.* (Malpighia polyſtachya Andr.)

media Cand. 5. B. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, ſubtus medio ad coſtam 2glanduloſis, racemis ſimplcibus, pedicellis 1glanduloſis. *Ind. occ.* (Malpighia media R. Br.)

piloſa Kunth. 6. B. foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis acutis piloſis ſubtus caneſcentibus margine glanduloſis, racemis ſimplicibus, pedicellis 1glanduloſis. *Nov. Granat.*

tuberculata Cand. 7. B. ramis tuberculatis, foliis ovato-lanceolatis ſubpubeſcentibus, racemis folio 3plo brevioribus, pedicellis 1glanduloſis. *Caracas.* (Malpighia tuberculata Jacq.)

argentea Cand. 8. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus ſericeis margine glanduloſis, racemis oppoſitis pubeſcentibus, pedicellis 1glanduloſis. *Amer. auſtr.* (Malpighia argentea Jacqu. Bunchoſia glauca Kunth.)

** *Foliis, petiolis pedicellisque eglanduloſis.*

nitida Cand. 9. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glaberrimis, racemis ſimplicibus folio brevioribus. *Ind. occid.* (Malpighia nitida L.)

Armeniaca Cand. 10. B. foliis elliptico-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis axillaribus ſimplicibus folia aequantibus. *Peru.* (Malpighia Armeniaca Cav.)

odorata Cand. 11. B. foliis ovatis emarginatis utrinque tomentoſis, racemis oppoſitis, ſtigmate 2-3fido. *Amer. auſtr.* (Malpighia odorata Jacqu.)

1605. THRYALLIS.

braſilienſis *Braſil.* Fruticulus, ramis articulatis, foliis ovatis, ſtipulis bracteisque ſetaceis, floribus racemoſis luteis.

1606. HIPTAGE Gärtn.

Madablota Gärtn. 1. H. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis terminalibus. *Ind. or.* (Baniſteria bengalenſis L., 1capſularis Lam. Molina racemoſa Cav. Gärtnera racemoſa Roxb.)

obtuſifolia Cand. 2. H. foliis obovatis ſubmucronatis, racemis axillaribus terminalibusque. *China.* (Gärtnera obtuſifolia Roxb.)

1607. ZYMUM Nor. Juſſ.

madagascarenſe Juſſ. *Madagascar.* Frutex ſcandens, foliis inferioribus verticillatis ſuperioribus oppoſitis baſi glanduloſis, floribus racemoſis luteis. (Triſtellateia Aub. Thuar.)

1608. DIONAEA.

Muſcipula *Carolina bor.* Herba mirabilis. Folia radicalia, petiolis ſpathulato-alatis, laminis 2lobis ciliatis diſco ſpinuloſis, conduplicandis ut inſecta aut peregrina tangunt, ad lucem ſolarem mire irritabilibus: flores corymboſi albi.

1609. HYDROPITYON Gärtn.

ceylanicum Gärtn. *Ceylon.* Herba erecta, foliis verticillatis pinnatifidis linearibus, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis. (Hottonia indica L.)

1610. BALANITES Delil.

aegyptiaca Del. *Africa med.* Arbor ramis ſpinoſis, foliis conjugatis oblongis, floribus axillaribus cymoſis vireſcentibus. (Ximenia aegyptiaca L., ferox Poir. varietas forte ab Aethiopibus ſervis in Hiſpaniolam allata. Delil.)

1611. CHILMORIA Hamilt.

dodecandra Hamilt. 1. Ch. foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis 12andris. *Ind. or. transganget.*

pentandra Hamilt. 2. Ch. foliis oblongis ſerratis, floribus ſolitariis 5andris. *Malabar.*

1612. GODOYA R. et P.

obovata R. et P. 1. G. foliis obovatis crenatis, floribus 10andris. *Peru.*

ſpathulata R. et P. 2. G. foliis ſpathulatis crenatis, floribus polyandris. *Peru.*

1613. LEPTOCHLAENA Thuar.

multiflora Thuar. *Madagascar.* Arbuscula, foliis alternis oblongis undulatis glabris, floribus paniculatis albidis.

1614. HEISTERIA.

coccinea 1. H. foliis ovato-ellipticis lucidis, floribus axillaribus, calyce fructifero patente ſublobato. *Martinica.*

parvifolia Sm. 2. H. foliis ovatis acutis lucidis, floribus axillaribus, calyce fructifero patente profunde lobato. *Sierra Leone.*

cauliflora Sm. 3. H. foliis obovato-oblongis, caule ramisque floriferis, calyce fructifero clauſo profunde lobato. *Guiana.*

1615. CERATOPETALUM Sm.

gummiferum Sm. *Nov. Holl.* Arbor procera, foliis ſeſſilibus ternatis lanceolatis ſerratis, floribus paniculatis flavis.

1616. VIVIANIA Cav.

marifolia Cav. *Ad Acapulco.*

1617. PETALOMA Sw.

myrtilloides Sw. 1. P. pedunculis ſolitariis 1floris, foliis ſubſeſſilibus ovatis acuminatis baſi obliquis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

Muriri Sw. 2. P. pedunculis confertis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis. *Guiana.* (Mouriri guianenſis Aubl.)

1618. COMBRETUM.

* *Floribus decandris.*

laxum 1. C. foliis oblongis acuminatis baſi inaequalibus, racemis aggregatis ebracteatis aequalibus, calycibus interne villoſis. *Hiſpaniola. Amer. auſtr.*

purpureum Vahl. 2. C. foliis elliptico-oblongis acutis, racemis laxe paniculatis ebracteatis ſecundis, ſtaminibus elongatis, calycibus glabris. *Madagascar.* (C. coccineum Lam.)

Roxburghii * 3. C. foliis oblongis acuminatis, racemis laxe paniculatis bracteatis, bracteis flore longioribus, floribus diſtichis, ſtaminibus ſubexſertis. *Ind. or.* (C. decandrum Roxb.)

trifoliatum Vent. 4. C. foliis ternis oblongis acuminatis, racemis paniculatis bracteatis, bracteis villoſis flore brevioribus. *Java.*

alternifolium Jacq. 5. C. foliis ſubalternis ovatis pubeſcentibus, ramis aculeatis, floribus racemoſis. *Amer. auſtr. Senegambia.* (C. aculeatum Vent.)

** *Floribus octandris.*

ſecundum Jacq. 6. C. foliis oblongis acutis, ramis ſubverticillatis ſtrictis ſecundis ebracteatis, calycibus lepidotis, ſtaminibus longiſſimis. *Hiſpaniol. Amer. auſtr.* (C. laxum Aubl.)

1619. QUISQUALIS.

pubeſcens Burm. 1. Qu. foliis oblongis acutis bracteisque rhomboideis villoſis, floribus villoſiſſimis. *Inſ. Molucc. Java.* (Qu. indica L.)

villoſa Roxb. 2. Qu. foliis ſubcordato-oblongis bracteisque lineari-lanceolatis villoſis, floribus pubeſcentibus. *Pegu.*

glabra Burm. 3. Qu. foliis ovatis acutis bracteisque minutis glaberrimis, floribus corymbofis. *Amboina. Cochinchina. China auſtr.* (Qu. indica Lour.)

ebracteata P. B. 4. Qu. foliis ovato-oblongis acutis, floribus ſpicatis ebracteatis. *Guinea.*

1620. GUIERA Juſſ.

ſenegalenſis Juſſ. *Senegambia.* Frutex foliis oblongis obtuſis pubeſcentibus, floribus capitatis involucratis.

1621. SCHOUSBOA W.

coccinea W. 1. Sch. foliis cordato-oblongis acutis, floribus racemoſis bracteatis, ſtaminibus aequalibus. *Guiana.* (Cacoucia coccinea Aubl.)

commutata * 2. Sch. foliis oblongis obtuſis, floribus ſubſpicatis ebracteatis, ſtaminibus alternis incluſis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Conocarpus racemoſa L. Jacqu.)

1622. CHAMAELAUCIUM Desf.

ciliatum Desf. 1. Ch. foliis lineari-3quetris obtuſis glanduloſo-punctatis, floribus axillaribus breviter pedunculatis, calycibus ciliatis, ſtaminibus alternis brevioribus. *Nov. Holl. verſus Africum.*

plumoſum Desf. 2. Ch. foliis 3quetris acutiuſculis glanduloſo-punctatis, floribus terminalibus ſubcorymboſis, laciniis calycinis 5partitis plumoſis, ſtaminibus aequalibus. *Nov. Holl. ad Africum.*

Brownii Desf. 3. Ch. foliis oppoſitis 3quetris obtuſis punctatis appreſſis, floribus corymboſis terminalibus, pedunculis glanduloſis, laciniis calycinis multipartitis ſubulato-plumoſis, ſtaminibus aequalibus. *Nov. Holl. auſtr.*

1623. RHODORA.

canadenſis *Canada.* Frutex foliis alternis oblongo-lanceolatis margine revolutis, floribus umbellatis terminalibus violaceis.

1624. LACARA *.

triplinervia * *Braſil.* Frutex foliis alternis oblongis coriaceis 3plinerviis, floribus racemoſis.

1625. REICHARDIA Roth.

hexapetala Roth. 1. R. corolla 6petala, foliis 2pinnatis cauleque aculeatis. *Ind. or.*

decapetala Roth. 2. R. corolla 10petala, foliis abrupte pinnatis cauleque aculeatis. *Ind. or.*

1626. BAUHINIA.

** Foliis bilobis.*

† Inermes.

ſcandens 1. B. foliis cordatis ſubtus nitide rufis, lobis acutis, caule cirrhifero, floribus racemoſis 3andris. *Ind. or. Cochinchina.* (Phanera coccinea Lour.)

racemoſa Lam. 2. B. foliis cordatis ſubtus tomentoſis, lobis obtuſis, floribus racemoſis 3andris pubeſcentibus. *Ind. or.*

tomentoſa 3. B. foliis baſi truncatis ſubtus albido-villoſis, lobis obtuſis, pedunculis 2floris, petalis obovatis ſtriatis, caule erectiuſculo. *Ind. or.*

purpurea 4. B. foliis cordatis utrinque glabris, lobis obtuſis, floribus racemoſis 3andris. *Ind. or.* (B. retuſa Poir.)

variegata 5. B. foliis baſi truncatis ſubtus glabriuſculis, lobis ellipticis obtuſiſſimis conniventibus, floribus ſubracemoſis axillaribus 5andris, calyce lateraliter fiſſo. *Ind. or. et occ.* (B. candida Ait. var.)

parviflora Vahl. 6. B. foliis ſubrotundis utrinque glabris ſubtus glaucis, lobis rotundatis diſtantibus, floribus racemoſis 10andris. *Ind. or.* (B. ſpicata Rottl.)

ungulata 7. B. foliis ovatis glabris, lobis oblongis acutis parallelis, floribus corymboſis 10andris, petalis linearibus. *Amer. tropic.* (B. aurita Ait. Pauletia inermis Cav.)

porrecta Ait. 8. B. foliis cordato-oblongis ſubtus villoſis, lobis lanceolatis acutis, floribus corymboſis. *Ind. occid.*

acuminata 9. B. foliis baſi truncatis oblongis, lobis elongatis acutiuſculis, floribus racemoſis. *Ind. or. et occ.*

Anguina Roxb. 10. B. foliis cordatis acutis, floribus racemoſis 3andris, caule ſcandente plano. *Ind. or.*

divaricata 11. B. foliis ovatis glabris, lobis acuminatis divaricatis. *Amer. tropic.*

Lunaria Cav. 12. B. foliis ſubcordato-reniformibus glabris, lobis rotundatis diſtantibus, floribus racemoſis 1andris, reliquis filamentis ſterilibus coalitis, unguibus petalorum hirſutis. *Nov. Hiſpan.*

ſubrotundifolia Cav. 13. B. foliis baſi truncatis ſubrotundis ſubtus tomentoſis, lobis rotundatis, floribus racemoſis 1andris. *Manila. Nov. Hiſpan.*

latifolia Cav. 14. B. foliis cordatis ſubquadratis, lobis abbreviatis acutis divaricatis, floribus racemoſis 1andris. *Nov. Hiſpan.*

Pes capraе Cav. 15. B. foliis cordatis ſubtus glaucis, lobis oblongis porrectis diſtantibus, floribus corymboſis 1andris, unguibus petalorum elongatis hirſutis. *Nov. Hiſpan.*

latiſiliqua Cav. 16. B. foliis ſubcordato-oblongis, lobis porrectis acutis conniventibus, ſiliquis ellipticis. *Inſ. Philippin.* (B. macrophylla Juſſ. Poir.)

†† *Aculeatae s. spinosae.*

aculeata 17. B. foliis subcordato-subrotundis membranaceis utrinque glabris, lobis brevibus obtusissimis, aculeis ramorum geminis recurvis, floribus subsolitariis, petalis sinuatis. *Amer. tropic.*

panamensis * 18. B. foliis basi truncatis subrotundis glabris, lobis abbreviatis obtusiusculis, aculeis ramorum geminis, pedunculis 2floris, petalis linearibus elongatis, staminibus alternis abortientibus. *Panama.* (Pauletia aculeata Cav.)

forficata Link. 19. B. foliis basi subtruncatis subtus glabriusculis, lobis lanceolatis acutiusculis subdistantibus, aculeis ramorum sparsis solitariis rectis, ramis pubescentibus, pedunculis 3floris. *Brasil.*

grandiflora Juss. 20. B. foliis cordatis subrotundis subtus tomentosis, lobis obtusis, spinis ad basin petiolorum geminis, pedunculis 2floris. *Peru.*

** *Foliis conjugatis.*

heterophylla Link. 21. B. foliis inferioribus conjugatis, summis 2lobis cordatis subtus pubescentibus, ramulis calycibusque ferrugineo-sericeis, floribus racemosis. *Caracas.*

rufescens Lam. 22. B. foliis conjugatis semiorbiculatis obtusissimis glabris. *Africa.*

guianensis Aubl. 23. B. foliis conjugatis oblongis acutis conniventibus subtus subauratis. *Guiana.* (B. Outimouta Aubl. var.)

1627. CASSIA.

I. *Calyx obtusus.*

* *Semina horizontalia pulpa obducta.*

† *Legumen lignosum: antherae birimosae.*

brasiliana Lam. 1. C. foliis 12-20jugis, foliolis ovali-oblongis aequilateris villosiusculis, petiolo eglanduloso, racemis axillaribus, leguminibus compressis rugosis longissimis. *Ind. occ. Amer. austr.* (C. grandis L. suppl., mollis Vahl, javanica Aubl. Cathartocarpus Pers.)

javanica 2. C. foliis 12-15jugis, foliolis ovatis obtusis glabris, petiolis eglandulosis, racemis axillaribus, leguminibus subcylindricis longissimis subtorosis. *Java. Ins. Molucc.*

sulfurea Cand. 3. C. foliis 6jugis, foliolis ovato-lanceolatis obtusiusculis glabris, glandula tereti obtusa inter paria 4 inferiora, racemis axillaribus. *Amer. austr.*

Fistula 4. C. foliis 5jugis eglandulosis, foliolis oblongis utrinque attenuatis glabris, leguminibus teretibus rectis obtusiusculis laevibus. *Aegypt. Ind. or. Cochinchina.* (Cathartocarpus Pers. Bactyrilobium W.)

fiſtuloides Collad. 5. C. foliis conjugato-pinnatis, pinnis 5jugis eglandulofis, foliolis ovatis acutiusculis glabris, racemis erectis, leguminibus teretibus obtuſis. *Mexico.*

bacillaris 6. C. foliis 2jugis, foliolis ovato-oblongis acutis obliquis glabris, glandula obtuſa inter infima paria, racemis axillaribus. *Amer. tropic.* (Cathartocarpus Perſ.)

macrophylla Kunth. 7. C. foliis 2jugis oblongis obtuſis ſubtus hirſutiusculis, glandula ad baſin petioli, floribus racemoſis. *Nov. Granat.*

oxyphylla Kunth. 8. C. foliis 2jugis inaequilateris acuminato-cuſpidatis utrinque pubeſcentibus, ſuperioribus oblongis inferioribus ovatis, glandula inter infimum par, racemis paucifloris. *Nov. Granat.*

fruticeſcens Bert. 9. C. foliis 2jugis ovato-oblongis apice attenuatis obtuſiusculis utrinque glaberrimis, glandula tereti ſubelongata inter infimum par, racemis compoſitis terminalibus. *Jamaica.*

†† *Legumen membranaceum: antherae biporoſae.*

Sophera 10 C. foliis 10jugis lanceolatis cuſpidatis ſubaequalibus glabris, glandula oblonga ad baſin petioli. *Ind. or. China auſtr. Aegypt.*

coromandeliana Jacqu. 11. C. foliis 10jugis lanceolatis acutis glabris, glandula ovata craſſa ad baſin petioli, leguminibus teretibus laevibus. *Ora Coromandel.*

dumetorum Berter. 12. C. foliis ſub-6jugis ovali-oblongis utrinque rotundatis ramisque pubeſcentibus, petiolo eglanduloſo, leguminibus compreſſis laevigatis elongatis. *Ad fl. Magdalenae.*

toroſa Cav. 13. C. foliis ſub-6jugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad baſin petioli, leguminibus cylindricis toruloſis. *China bor.* (C. chinenſis Jacq., toruloſa et indica Poir.)

gigantea Bert. 14. C. foliis ſub-5jugis ellipticis ſubretuſis utrinque glaberrimis, petiolo eglanduloſo, racemis paniculatis, leguminibus compreſſis. *Jamaica.*

chinenſis Lam. 15. C. foliis ſub-4jugis ovato-oblongis acutiusculis margine pubeſcentibus, glandula ad baſin petioli, pedunculis paucifloris. *China.* (C. grandiflora Perſ.)

laevigata W. 16. C. foliis 4jugis ovato-oblongis acutis glaberrimis, glandula oblonga acuta inter omnia paria, leguminibus teretibus ſtylo perſiſtente terminatis. *Mexico.* (C. ſeptentrionalis Zucc.)

floribunda Cav. 17. C. foliis ſub-4jugis oblongo-lanceolatis glabris, glandula oblonga inter infima, pedunculis multifloris, leguminibus ſubcylindricis. *Nov. Hiſpan.* (C. corymboſa Ort.)

crotalarioides Kunth. 18. C. foliis ſub-4jugis oblongis acutis ſubtus ſericeis, petiolo glanduloſo, pedunculis axillaribus ſubracemoſis, leguminibus inflatis piloſis. *Mexico.*

corymboſa Lam. 19. C. foliis 3jugis oblongo-lanceolatis ſubfalcatis glabris, glandula oblonga inter infima, pedunculis 3-5floris, leguminibus cylindricis. *Buenos Ayres.* (C. craſſifolia Ort.)

inflata * 20. C. foliis ſub-3jugis obovato-ſubrotundis glaberrimis ſubtus glaucis, glandula clavata inter infima, racemis paniculatis, legumine inflato. *Ad fl. Magdalenae.* Bertero.

††† *Legumen utrinque alatum.*

alata 21. C. foliis ſub-10jugis obovato-oblongis utrinque glabris, ſummis majoribus, infimis ſeſſilibus, petiolis eglanduloſis, floribus racemoſis bracteatis. *Ind. occid.* (C. herpetica Jacq.)

bracteata 22. C. foliis 10jugis oblongis obtuſis ſubtus incano-villoſis, petiolis eglanduloſis. *Surinam.*

** *Semina verticalia pulpa deſtituta. Stamina inaequalia.*

α. Folia multijuga.

Richardiana Kunth. 23. C. foliolis oblongis mucronatis ſubtus pubeſcentibus, glandula inter infimum par, paniculis terminalibus, leguminibus compreſſis transverſe venoſis. *Ad Orinocum.*

Mutiſiana Kunth. 24. C. foliolis oblongo-linearibus obtuſis ſubtus pubeſcentibus, glandula inter omnia paria, racemis axillaribus ſolitariis. *Nov. Granat.*

marginata W. 25. C. foliolis lineari-oblongis cartilagineo-marginatis ciliatis, glandula ſubulata inter omnia paria. *Surinam.*

nigricans Vahl. 26. C. foliolis lineari-oblongis obtuſiſſimis mucronatis baſi obliquis glabris, glandula oblonga inter infimum par, ramulis hirtis, pedunculis breviſſimis axillaribus ſubgeminis. *Arabia.* (C. procumbens Forsk.)

Browniana Kunth. 27. C. foliolis oblongis mucronatis glabris ciliatis, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus, leguminibus compreſſo-planis margine membranaceis. *Mexico.* (C. polyantha Collad.)

callіantha Meyer. 28. C. foliolis oblongo-linearibus glabris mucronatis, glandula ſubulata inter infima, panicula terminali, leguminibus linearibus. *Surinam.*

β. Folia 10juga.

ſpectabilis Cand. 29. C. foliolis ovato-oblongis acutis mucronatis eglanduloſis glabris, panicula terminali pyramidata. *Caracas.* (C. cuſpidata Humb.)

reticulata W. 30. C. foliolis oblongis obtuſis ſubtus incano-pubeſcentibus eglanduloſis, extimis majoribus, leguminibus compreſſis. *Braſil.*

montana Roxb. 31. C. foliolis ellipticis ſubemarginatis glabris glauceſcentibus eglanduloſis, racemis axillaribus. *Ind. or.*

32.

anguſtiſiliqua Lam. 32. C. foliolis ovatis mucronatis ſubtus pubeſcentibus, petiolis incraſſatis breviſſimis, glandula ſtipitata inter infima paria, leguminibus linearibus compreſſis. *Hiſpaniola.*

auriculata 33. C. foliolis oblongis obtuſis mucronatis glabris, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipulis reniformibus. *Ind. or. Inſ. Molucc.*

polyphylla Jacq. 34. C. foliolis ellipticis ſubmucronatis glabris, glandula oblonga ſeſſili inter infimum par, pedunculis 2floris folio brevioribus. *Portorico.*

γ. *Folia 9juga.*

ſuffruticoſa Kön. 35. C. foliolis ovalibus ſubſericeis ſubtus glaucis, glandulis binis inter inferiora paria, ſtipulis linearibus ſubfalcatis, corymbis faſtigiatis. *Ind. orient.*

marilandica 36. C. foliolis oblongis utrinque rotundatis mucronatis ciliatis, glandula clavata ad baſin petioli, leguminibus linearibus hiſpidulis. *Amer. bor.*

robinioides W. 37. C. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, glandula ſeſſili ad baſin petioli. *Amer. auſtr.*

frondoſa Ait. 38. C. foliolis ellipticis ſubmucronatis glaberrimis, glandula ſubclavata inter infimum par, racemis axillaribus folio brevioribus. *Amer. tropic.* (C. Criſta Jacq.)

faſtigiata Vahl. 39. C. foliolis oblongis obtuſis glabris, glandula pedicellata inter omnia paria, racemis faſtigiatis, calycibus villoſis. *Ind. or.*

δ. *Folia 8juga.*

ſtipulacea Ait. 40. C. foliolis ovato-lanceolatis glabris, glandula inter inferiora, ſtipulis ovatis maximis, leguminibus oblongis oligoſpermis. *Chili.*

ſulcata Cand. 41. C. foliolis ovali-oblongis obtuſiusculis ſubtus margineque pubeſcentibus, glandula depreſſa ad baſin petioli, ramis ſulcatis. *Amer. auſtr.* (C. cernua Balb.)

ſiamea Lam. 42. C. foliolis ovato-oblongis emarginatis glabris, petiolis eglanduloſis, leguminibus compreſſis marginatis. *Ind. or. transganget.*

ε. *Folia 7juga.*

florida Vahl. 43. C. foliolis ovali-oblongis emarginatis glabris, petiolis eglanduloſis, panicula diffuſa terminali, bracteis ſpathulatis ariſtatis. *Ind. or.*

anguſtifolia Vahl. 44. C. foliolis lanceolatis mucronatis glabris ſupremis majoribus, petiolis eglanduloſis, floribus racemoſis, leguminibus rhombeo-oblongis oligoſpermis. *Arabia.*

liguſtrina 45. C. foliolis lanceolatis acuminatis ſubciliatis, glandula tereti ad baſin petiolorum. *Amer. trop. Virginia.*

mexicana Jacq. 46. C. foliolis ovali-oblongis obtuſiuſculis pubeſcentibus, glandula cylindrica inter infima. *Mexico.*

ζ. *Folia 6juga.*

ruſcifolia Jacq. 47. C. foliolis remotis lanceolatis glabris, glandula tereti appreſſa ad baſin petioli, pedunculis 3floris axillaribus, leguminibus compreſſis marginatis. *Madera.*

caracaſana Jacq. 48. C. foliolis ovato-lanceolatis acutis villoſis, glandula ovata ſeſſili ad baſin petiolorum, floribus corymboſis, leguminibus angulatis. *Amer. auſtr.* (C. Canca Cav.)

patula Ait. 49. C. foliolis oblongis acutiuſculis glabris, glandula ad baſin petiolorum, ramis laevibus. *Ind. occid.*

linearis Mx. 50. C. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, glandula ad baſin petioli, pedunculis ſubbifloris axillaribus terminalibusque, leguminibus linearibus compreſſis. *Carolina.*

aegyptiaca W. 51. C. foliolis lanceolatis acutis, ſupremis majoribus, glandula petiolari, pedunculis 2floris. *Aegypt.*

tomentoſa 52. C. foliolis oblongis mucronatis ſubtus ſulfureo-tomentoſis, glandulis ſubulatis inter omnia paria, leguminibus compreſſis villoſis. *Amer. auſtr.* (C. multiglanduloſa Jacq. albida Ort.)

biflora 53. C. foliolis obovato-oblongis glabriuſculis, glandula ſubulata inter infimum par, pedunculis abbreviatis ſubbifloris. *Ind. occ.* (C. Marimari Aubl. geminiflora Collad.)

obovata Collad. 54. C. foliolis obovatis retuſis glabriuſculis, petiolo eglanduloſo, leguminibus compreſſis arcuatis. *Aegypt.* (C. Senna var. *β.* L. Senna Lam.)

η. *Folia 5juga.*

dispar W. 55. C. foliolis oblongis obtuſis, ſupremis majoribus, glandulis elongatis inter omnia paria. *Amer. auſtr.*

glauca Lam. 56. C. foliolis obovato-ellipticis emarginatis glaberrimis ſubtus glaucis, glandulis binis oblongis inter infima paria, leguminibus compreſſis mucronatis. *Ind. or.* (C. arboreſcens Vahl. coluteoides Collad.)

occidentalis 57. C. foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ciliatis, glandula obtuſa ſeſſili ad baſin petioli, pedunculis brevibus paucifloris, leguminibus compreſſis marginatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

hirſuta 58. C. foliolis ovatis acuminatis hirſutis, glandula ad baſin petioli. *Amer. auſtr.*

planiſiliqua 59. C. foliolis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad baſin petioli, leguminibus compreſſis elongatis. *Amer. auſtr. Ind. occ.*

nutans Collad. 60. C. foliolis oblongis utrinque attenuatis glabris, infimis minoribus, petiolis eglanduloſis, ramis tuberculatis, racemis nutantibus. *Mexico.*

atomaria 61. C. foliolis ovatis tomentoſis, petiolis teretibus eglanduloſis ferrugineis. *Amer. tropic.*

ϑ. Folia 4juga.

pubeſcens Jacq. 62. C. foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus margineque pubeſcentibus, glandula ovata craſſa ad baſin petioli. *Patria?*

falcata 63. C. foliolis ovato-lanceolatis retro falcatis ſupremis majoribus, glandula ad baſin petioli. *Amer. auſtr.*

longiſiliqua 64. C. foliolis ovato-oblongis glabris ſupremis lineari-lanceolatis, glandula ſubulata inter ſuprema imaque. *Amer. tropic.*

pendula Humb. 65. C. foliolis obovatis ſupremis majoribus, glandula inter infima, leguminibus ſeſſilibus pendulis. *Amer. auſtr.*

emarginata 66. C. foliolis ellipticis obſolete retuſis ſubtus ramulisque villoſis, petiolis eglanduloſis, ſtipulis ſubulatis perſiſtentibus, racemis axillaribus paucifloris. *Ind. occid.*

ſericea Sw. 67. C. foliolis ovalibus ſericeo-hirſutis, glandulis ſubulatis inter omnia paria, leguminibus 4gonis articulatis, caule herbaceo. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (C. ſenſitiva Jacq. ornithopoides Lam.)

lanceolata Forsk. 68. C. foliolis ovali-lanceolatis acutis glabriusculis, petiolis glanduloſis, leguminibus plano-compreſſis medio tumidulis. *Aegypt. ſuper.* (C. Senna *α.* L., acutifolia Delil.)

ι. Folia 3juga.

obtuſifolia 69. C. foliolis obovatis obtuſis ſubtus pubeſcentibus, glandula ſtipitata inter par infimum, ſtipulis lineari-ſubulatis, leguminibus elongatis recurvis, caule herbaceo. *Cuba. Jamaica.*

gallinaria Cand. 70. C. foliolis obovatis mucronulatis glabris, glandula oblonga inter par infimum, pedunculis axillaribus 1floris, leguminibus rectis, caule herbaceo procumbente. *Inſ. Molucc. Cochinchina. China auſtr.* (C. obtuſifolia Lour.?)

humilis Collad. 71. C. foliolis obovatis obtuſis, glandula oblonga inter par infimum, petiolo apice mutico, leguminibus arcuatis compreſſis margine calloſis. *Amer. tropic.* (C. Tora Aubl., Tora *β.* L.)

Tora Ait. 72. C. foliolis obovatis obtuſis, glandulis oblongis inter duo paria inferiora, petiolo apice ariſtato, leguminibus rectis compreſſis margine calloſis. *Ind. or. Arabia. Japonia.*

† *limenſis* Lam. 73. C. foliolis obovatis obtuſiſſimis glabris, racemis axillaribus multifloris folium ſubaequantibus. *Peru.*

ciliaris Collad. 74. C. foliolis ſemiorbiculatis venoſis, duobus exterioribus majoribus, ſtipulis cordato-lanceolatis ciliatis, caule procumbente. *Ind. or.* (C. Tagera L.)

Tagera Lam. 75. C. foliolis obovatis, pedunculis breviffimis 1floris, leguminibus rectis linearibus. *Ind. or.*

Apoucouita Aubl. 76. C. foliolis ovatis acuminatis glabris, petiolo marginato apice ariftato glandulofo, racemis axillaribus. *Guiana.* (C. acuminata W.)

fennoides Jacq. 77. C. foliolis obovato-fubrotundis glabris, glandula oblonga feffili inter infimum par, ftipulis lineari-fubulatis patentibus. *Ind. or.*

bicapfularis 78. C. foliolis obovato-fubrotundis glabris, glandula globofa ftipitata inter par infimum, ftipulis lineari-fubulatis patentibus, leguminibus teretibus 2locularibus. *Amer. trop. Madera.*

x. Folia 2juga.

viminea 79. C. foliolis ovato-oblongis acuminatis, glandula inter infima, petiolo apice ariftato, fquama fubpetiolari callofa 3dentata. *Jamaica.*

chryfotricha Collad. 80. C. foliolis ovato-oblongis acutis, glandula oblonga inter infima, petiolo apice mutico, ftipulis fubulatis, fquama fubpetiolari 3dentato-fpinofa, leguminibus flavo-pubefcentibus. *Guiana.* (C. chryfocarpa Desv.)

macranthera Cand. 81. C. foliolis ovali-oblongis acutis glabris, glandula ovata inter infima, petiolo apice fetaceo, panicula ramofiffima, antheris craffis oblongis apice mucronatis. *Brafil.*

λ. Aphylla.

aphylla Cav. 82. C. caule fruticofo aphyllo, ramis fpinefcentibus, pedunculis corymbofis, leguminibus linearibus. *Buenos Ayres.*

*** *Stamina aequalia.*

cytifoides Cand. 83. C. foliis 3jugis obovato-orbiculatis glabris, glandula feffili inter duo paria inferiora, leguminibus compreffis incurvis. *Brafil.*

Abfus 84. C. foliis 2jugis obovatis glabris, glandula petioli fubnulla, ramis leguminibusque pilofis, racemis paucifloris petiolo infidentibus. *Ceylon. Afric. inter.*

II. *Calyx acutus. Chamaecriftae.*

* *Foliis conjugatis.*

diphylla 85. C. foliolis obovatis nervofis ramisque glabris, ftipulis cordato-lanceolatis bafi ciliatis appreffis, pedunculis 1floris elongatis apice bracteatis. *Ind. occid.*

bifoliolata Cand. 86. C. foliolis obovato-fubrotundis nervofis, ramis villofis, ftipulis cordato-lanceolatis ciliatis, pedunculis 1floris capillaribus. *Brafil. Monte Video.*

bauhinifolia Kunth. 87. C. foliolis obovatis emarginatis undulato-repandis pubefcentibus, ramis villofis, pedunculis 1floris elongatis apice 2bracteatis. *Ad Orinoc.*

** *Foliis 2jugis.*

hiſpida Collad. 88. C. foliolis obovatis obtuſis glabris, ramis leguminibusque hirtis, racemis elongatis aphyllis terminalibus. *Cayenn.* (C. Abſus Aubl.)

rotundifolia Perſ. 89. C. foliolis obovato-ſubrotundis pubeſcentibus, ramis procumbentibus villoſis, ſtipulis ovatis ciliatis, pedunculis 1floris capillaribus elongatis. *Braſil.*

Perſoonii Collad. 90. C. foliolis obovatis venoſis utrinque glabris, ſtipulis lanceolatis appreſſis folia aequantibus. *Cayenn.*

brevipes Cand. 91. C. foliolis oblongis glaberrimis baſi multinerviis, petiolis tomentoſis apice ariſtatis, ſtipulis cordatis nervoſis, pedunculis ſolitariis 1floris abbreviatis. *Panama.*

gracilis Kunth. 92. C. foliolis obovato-oblongis obtuſis glabris, glandula peltata ad baſin petioli, pedunculis ſolitariis 1floris 2bracteatis. *Ad Orinocum.* (C. uniflora N. E.)

*** *Foliis 3-5jugis.*

mucronata * 93. C. foliis 3jugis oblongo-ellipticis mucronatis glabris, glandula urceolata inter par infimum, pedunculis axillaribus 1floris. *Braſil.*

cuneata Cand. 94. C. foliis 5-6jugis obovato-oblongis mucronatis lineatis utrinque hiſpidis, glandula ſubſeſſili inter par infimum, pedunculis 1floris leguminibusque villoſis. *Cuba. Hiſpaniola.* (C. gramminica N. E.)

lineata Sw. 95. C. foliis 5jugis oblongis obtuſis mucronatis ſubtus pubeſcentibus, glandula ſeſſili ad baſin petioli, ramis glabris, pedunculis 1floris, leguminibus hirſutis. *Jamaica.*

proſtrata Humb. 96. C. foliis 5jugis linearibus obtuſis incanis, glandula petiolari ſtipitata, pedunculis axillaribus 1floris, caule proſtrato. *Amer. auſtr. Hiſpaniola.* Bertero.

piloſa 97. C. foliis 5jugis oblongis obtuſis mucronatis ciliatis, petiolo eglanduloſo apice ariſtato, ſtipulis falcatis, caule ſuperne hirſuto. *Jamaica.*

**** *Foliis 5-10jugis.*

venoſa Caſtigl. 98. C. foliolis obovatis retuſis lineato-venoſis glaberrimis, glandula ſeſſili infra par infimum, pedunculis ſupraxillaribus 3-5floris, caule fruticoſo. *Guadalupa.* Bertero.

ſerpens 99. C. foliolis ſubfalcatis oblongis mucronatis, glandulis ſeſſilibus infra foliola, floribus ſolitariis 5andris, caule proſtrato filiformi herbaceo. *Jamaica.*

faſciculata Mx. 100. C. foliolis oblongo-linearibus mucronatis, glandula petiolari ſeſſili, faſciculis multifloris lateralibus, leguminibus glabellis arcuatis. *Amer. boreal.*

***** *Foliis* 10-20*jugis.*

Otterbeinii Meyer. 101. C. foliolis oblongo-linearibus glabris mucronatis, glandula ſtipitata inter par infimum, ramis piloſis, pedunculis ſubbifloris, leguminibus nitidis. *Surinam.*

virgata Sw. 102. C. foliolis ovato-lanceolatis mucronatis ſubtus villoſiuſculis, glandula ſtipitata in medio petiolo, ſtipulis lanceolatis, pedunculis 1floris filiformibus elongatis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

calycioides Cand. 103. C. foliolis linearibus obliquis mucronatis ramisque glabriuſculis, glandulis ſtipitatis ad baſin petioli, ſtipulis linearibus cuſpidatis, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Cayenna. Portorico.* Bertero.

capenſis Thb. 104. C. foliolis linearibus acutis ſubtus nervoſis imbricatis, glandulis binis ad baſin petioli, ramis villoſis, pedunculis axillaribus folia aequantibus. *C. B. S.*

Patellaria Cand. 105. C. foliolis linearibus obliquis mucronatis ſubtus petiolis ramisque pubeſcentibus, glandulis binis ſcutellatis ad baſin petioli, ſtipulis lineari-ſubulatis, pedunculis 1floris abbreviatis, leguminibus hirtis. *Cuba. Amer. auſtr.*

pumila Lam. 106. C. foliolis linearibus mucronatis ciliatis, glandula pedicellata infra par infimum, pedunculis folio brevioribus, caule diffuſo herbaceo. *Ind. or. China. Japon.* (C. procumbens L. ſp. ed. 1.)

Aeſchynomene Cand. 107. C. foliolis linearibus mucronatis glabris, glandula ſubſeſſili infra par infimum, ſtipulis ſubulatis, pedunculis aggregatis folio brevioribus. *Hiſpaniola.*

nictitans 108. C. foliolis lineari-oblongis obtuſis mucronatis, glandula ſubſtipitata in medio petiolo villoſo, floribus 5andris, caule erectiuſculo herbaceo. *Amer. bor. Ind. occid.*

Chamaecriſta 109. C. foliolis oblongo-linearibus mucronatis, glandula ſubſtipitata infra par infimum, pedunculis geminis ſupraxillaribus, leguminibus hiſpidulis. *Amer. tropic.*

glanduloſa 110. C. foliolis oblongis mucronatis, glandulis ſtipitatis plurimis petiolaribus, pedunculis axillaribus abbreviatis, leguminibus glabris. *Ind. occ.*

brevifolia Lam. 111. C. foliolis oblongis obtuſis 3nerviis, petiolo eglanduloſo, ſtipulis ſemicordatis, pedunculis 1floris folia ſuperantibus. *Madagascar.*

****** *Foliis* 20-50*jugis.*

aſpera Mühlb. 112. C. foliolis lineari-lanceolatis ciliatis ramisque ſtrigoſis, glandula urceolata infra infimum par, pedunculis paucifloris, floribus 7andris, antheris inaequalibus. *Carolina.*

microphylla W. 113. C. foliolis linearibus anguſtiſſimis imbricatis, glandula ſeſſili baſilari, ſtipulis ſubulatis elongatis, ramis aſperis, pedunculis 1floris, leguminibus villoſis. *Inſ. Carib.*

mimosoides 114. C. foliolis linearibus nervosis glabris, glandula petiolari obsoleta, stipulis subulatis, pedunculis axillaribus geminis, leguminibus glabris. *Ind. or. Ceylon.*

flexuosa 115. C. foliolis linearibus 3nerviis, stipulis dimidiato-cordatis, pedunculis axillaribus solitariis, caule flexuoso herbaceo. *Brasil.*

angustissima Lam. 116. C. foliolis linearibus angustissimis imbricatis ramisque villosis, stipulis lanceolatis, pedunculis geminis, caule recto hirsuto. *Java.*

procumbens 117. C. foliolis linearibus, petiolis eglandulosis, caule procumbente herbaceo. *Virgin. Carolin.*

hecatophylla Cand. 118. C. foliolis oblongo-linearibus mucronatis, petiolo marginato aristato basi glanduloso, stipulis subulatis 3nerviis, pedunculis geminis 1floris supraxillaribus, caule erecto herbaceo pubescente. *Ins. Carib.*

1628. Caesalpinia.

* *Inermes.*

elata Sw. 1. C. foliis 2pinnatis, foliolis multijugis linearibus obtusis, corymbis compositis, calycibus tomentosis subaequalibus, petalis fimbriatis, staminibus longissimis. *Ind. or.*

glandulosa * 2. C. foliis 2pinnatis, foliolis 7jugis oblongis mucronatis punctatis, stipulis pinnatis, floribus racemosis, calycibus glanduloso-pilosis, staminibus corolla subbrevioribus. *Nov. Hispan.* (Pomaria Cav.)

punctata W. 3. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-3-propriis 3-4-jugis, foliolis ellipticis retusis subtus pallidis punctatis. *Brasil.*

thomaea * 4. C. foliis 2pinnatis, partialibus 6-propriis 12jugis, foliolis linearibus obtusis glabris punctatis, racemis compositis, calycibus glabris. *Ins. S. Thomae.* Bertero.

Coriaria W. 5. C. foliis 2pinnatis, partialibus 8-propriis 20jugis, foliolis linearibus obtusis glabris epunctatis, racemis compositis, calycibus glabris. *Hispaniola. Amer. austr.*

dubia * 6. C. foliis 2pinnatis, partialibus 12-propriis 24jugis, foliolis oblongis obliquis mucronatis subtus discoloribus, racemis paniculatis calycibusque ferrugineis, leguminibus 1spermis? *Brasil. Hispaniola.*

brasiliensis Sw. 7. C. foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis 12jugis, foliolis ovato-oblongis acutiusculis basi inaequalibus, petiolo fulvo-tomentoso, floribus racemosis, calycibus obtusissimis rufo-tomentosis, staminibus corolla brevioribus. *Brasil. Jamaic.*

procera Pöppig. 8. C. foliis pinnatis multijugis, foliolis oblongo-linearibus obtusis glabris, racemis paucifloris, staminibus corollam aequantibus. *Cuba.*

** *Aculeatae.*

bijuga Sw. 9. C. foliis duplicato-2jugis, foliolis obcordatis calycibusque glabris, ſtaminibus corollam aequantibus, leguminibus ſub-2ſpermis. *Jamaica.* (C. veſicaria et Poinciana 2juga L.)

inſignis * 10. C. foliis 2pinnatis 2jugis, foliolis obovatis, petiolo inermi, ramis teretibus aculeatis verrucoſis, racemis terminalibus compoſitis. *Ad fl. Amazonum.* Humb. (Poinciana Kunth.)

caſſioides W. 11. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis 6jugis, foliolis oblongis retuſis glabris, petiolis piloſiusculis, ſtipulis ſpineſcentibus. *Amer. auſtr.*

mucronata W. 12. C. foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis 7jugis, foliolis oblongis obtuſis mucronatis, petiolis aculeatis. *Braſil.*

bahamenſis Lam. 13. C. foliis 2pinnatis, partialibus 5-propriis 12jugis, foliolis obovatis emarginatis glabris, ramis aculeatis, floribus racemoſis. *Inſ. Baham.* (C. braſilienſis L. ?)

Criſta 14. C. foliis 2pinnatis, partialibus propriisque ſub-3jugis, foliolis ovato-ſubrotundis glaberrimis, aculeis ramorum confertis, racemis terminalibus, calycibus truncatis, ſtaminibus 5 elongatis. *Ind. occid. Japon.* (? Thunb.)

glanduloſa Bertero. 15. C. foliis 2pinnatis, partialibus 3-propriis 5jugis, foliolis oblique cordato-ovalibus obtuſis margine punctatis, petiolis ramisque retrorſum aculeatis, petalis glanduloſis calycem ſubaequantibus. *Hiſpaniola.*

Sappan 16. C. foliis 2pinnatis, partialibus propriisque ſub-7jugis, foliolis oblongis inaequilateris obtuſis, petiolis ramulisque inermibus, ramorum aculeis confertis, ſtaminibus elongatis. *Ind. orient. Inſ. Molucc.*

pulcherrima Sw. 17. C. foliis 2pinnatis, partialibus 6-propriis 10jugis, foliolis oblongis obtuſis mucronatis, ſtipulis ſubſpineſcentibus, floribus corymboſis, petalis fimbriatis, ſtaminibus longiſſimis. *Ind. or. et occid.* (Poinciana L.)

Nuga R. Br. 18. C. foliis 2pinnatis, foliolis oblongis acutis, petiolis aculeatis, racemis compoſitis, caule fruticoſo inermi, ramis decumbentibus. *Amboina.* (Guilandina Nuga L.)

† *mimoſoides* Lam. 19. C. foliis pinnatis partialibus propriisque 10jugis, foliolis oblongis obtuſis, petiolis ramisque racemi aculeatis, leguminibus lanatis. *Malabar.*

1629. HOFMANNSEGGIA Cav.

Falcaria Cav. 1. H. caule ſuffruticoſo erecto, foliis 2pinnatis, foliolis ovalibus glaucis, leguminibus arcuatis glabris. *Chili. Buenos Ayres.*

trifoliata Cav. 2. H. ſubacaulis, foliis ternatis, foliolis pinnatis incano-tomentoſis, leguminibus rectis villoſis. *Patagonia.*

1630. MEZONEVRON Desf.

glabrum Desf. 1. M. aculeatum, foliis 2pinnatis glabris, leguminibus applanatis membranaceis. *Timor.*

pubefcens Desf. 2. M. aculeatum, foliis 2pinnatis pubefcentibus, leguminibus medio inflatis reticulatis. *Java.*

1631. CUBAEA Scop.

bijuga * 1. C. foliis 2jugis oblongo-ellipticis fupra nitidis reticulatis fubtus glaucis, floribus racemofis, leguminibus villofis. *Brafil.* (Caffia 4phylla Desv. Desvauxii Collad.)

trigona W. 2. C. foliis pinnatis fub-6jugis, foliolis oblongis acutis glabris, ramulis petiolisque 3gonis, floribus paniculatis, leguminibus villofis. *Guiana.* (Tachigali paniculata et 3gona Aubl.)

emarginata * 3. C. foliis pinnatis fub-4jugis, foliolis ellipticis emarginatis coriaceis fubtus discoloribus, racemis compofitis pubefcentibus. *Brafil.* Sello.

1632. PARKINSONIA.

aculeata 1. P. fpinis ramorum validis, foliis pinnatis multijugis, petiolis applanatis elongatis, foliolis fupinis. *Ind. occid.*

inermis * 2. P. inermis, foliis 2pinnatis, petiolis teretibus glandulofo-vifcofis, foliolis oblongo-linearibus mucronatis. *Monte Video.* Sello.

1633. AFZELIA Sm.

africana Sm. *Afric. occid.* Frutex aut arbor foliis abrupte pinnatis, floribus racemofis rubris.

1634. HYMENAEA.

(Folia conjugata.)

Courbaril 1. H. foliolis coriaceis fubeveniis bafi inaequalibus, paniculae floribus pedunculatis. *Amer. auftr.*

venofa Vahl. 2. H. foliolis membranaceis venofis bafi fubaequalibus, paniculae floribus fubfeffilibus. *Cayenna.*

verrucofa Gärtn. 3. H. foliolis venofis bafi inaequalibus, panicula flexuofa divaricata, pedunculis multifloris, legumine verrucofo. *Madagascar.*

1635. MYROSPERMUM Jacqu.

tolviferum * 1. M. foliis impari-pinnatis 5jugis, foliolis alternis oblongis obtufis mucronatis, floribus axillaribus fafciculatis. *Amer. auftr.* (Tolvifera Balfamum L.)

pedicellatum Lam. 2. M. foliis impari-pinnatis 6jugis, foliolis alternis oblongis retusis reticulato-venosis pellucido-punctatis, pedunculis spicatis axillaribus. *Peru.* Jos. Jussieu.

frutescens Jacq. 3. M. foliis impari-pinnatis 7jugis, foliolis alternis oblongis retusis pellucido-punctatis, racemis terminalibus laxis. *Amer. austr.* (Myroxylon peruiferum L. suppl. ad mancum exemplar.)

1636. ANAGYRIS.

foetida 1. A. foliis ternatis, foliolis oblongis mucronatis subtus sericeis, pedunculis axillaribus sub-2floris. *Europ. austr.* (A. latifolia Brouss. W. var.)

chinensis * 2. A. foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis ovato-lanceolatis glabris, floribus paniculatis. *China austr.* (A. foetida Lour.)

inodora Lour. 3. A. foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis acuminatis glabris, floribus racemosis, calycibus inflatis coloratis. *Cochinchina.*

1637. CERCIS.

Siliquastrum 1. C. foliis cordatis orbiculatis utrinque glaberrimis. *Europ. austr. Tauria. Japon.*

canadensis 2. C. foliis cordatis acuminatis subtus ad axillas venarum pubescentibus. *Amer. bor.*

1638. ANTHONOTHA P. B.

macrophylla P. B. *Guinea.* Arbor foliis sub-2jugis oblongis acuminatis, floribus axillaribus paniculatis.

1639. SOPHORA.

tomentosa 1. S. arborea, foliolis subrotundis ovalibusve obtusissimis utrinque calycibusque tomentosis, racemo terminali elongato. *Ind. or. occid.* (S. occidentalis L.)

japonica 2. S. arborea, foliolis ovato-oblongis acutis leguminibusque glabris. *Japon. China.*

heptaphylla 3. S. arborea, foliolis ovatis margine revolutis subtus leguminibusque lanatis. *Ceylon. Ins. Molucc.*

alopecuroides 4. S. herbacea, foliolis oblongis incanis subtus sericeis, racemis spicatis terminalibus. *Asia minor. Caucas.*

sericea Nutt. 5. S. herbacea, foliolis obovato-ellipticis subtus sericeis, floribus spicatis axillaribus. *Ad fl. Missuri.* (Astragalus carnosus Pursh.)

flavescens Ait. 6. S. herbacea, foliolis ovato-oblongis glabris, racemis laxis terminalibus. *Sibiria.*

† *obliqua* Pers. 7. S. foliis abrupte pinnatis subtus ferrugineo-villosis, foliolis obliquis, pedunculis verrucosis. *Amer. austr.?*

1640. PODALIRIA Lam.

myrtillifolia W. 1. P. foliis obovato-oblongis retusis utrinque calycibus sericeis, pedunculis 1floris folia subaequantibus. *C. B. S.* (Sophora biflora L., myrtillifolia Retz., rotundifolia Thunb.)

sericea R. Br. 2. P. foliis obovato-oblongis utrinque calycibusque sericeis, pedunculis 1floris folio brevioribus. *C. B. S.* (Sophora sericea Andr. Podaliria cuneifolia Vent.)

styracifolia Sims. 3. P. foliis obovato-oblongis mucronatis ramisque sericeis, pedunculis 1floris folia subaequantibus, calycibus reflexis. *C. B. S.*

biflora W. 4. P. foliis ovalibus utrinque sericeis pedunculo 2floro brevioribus, calycibus tomentosis scabris. *C. B. S.* (Sophora biflora Retz. Hypocalyptus pedunculatus Thunb. Podaliria argentea Salisb.)

bracteata Roxb. 5. P. foliis ovalibus reticulato-venulosis glabris, pedunculis bracteatis, bracteis nervosis calycem occultantibus. *Silhet, prov. Ind. or.*

calyptrata W. 6. P. foliis obovato-ellipticis pubescentibus subtus reticulatis, pedunculis 1floris folia subaequantibus, calycibus villosis, limbo scarioso reflexo. *C. B. S.* (Sophora calyptrata Retz. Thunb. Hypocalyptus Thunb.)

hirsuta W. 7. P. foliis ovato-subrotundis petiolatis calycibusque villosis, pedunculis 1floris, laciniis calycinis lanceolatis alas aequantibus. *C. B. S.* (Sophora hirsuta Ait.)

cordata R. Br. 8. P. foliis cordatis subrotundis subsessilibus villosissimis, pedunculis 2floris, alis corollae lacinias calycis villosi superantibus. *C. B. S.* (Sophora cordata Thunb.)

buxifolia W. 9. P. foliis ovalibus supra glabris subtus sericeis, pedunculis 1floris calycibusque rufo-tomentosis folia aequantibus. *C. B. S.* (Sophora buxifolia Retz. Hypocalyptus glaucus Thunb.)

1641. BAPTISIA Vent.

* *Foliis simplicibus.*

perfoliata R. Br. 1. B. foliis perfoliatis cordato-ovatis, pedunculis 1floris axillaribus. *Carolina.* (Crotalaria L. Rafnia W.)

** *Foliis ternatis.*

uniflora Nutt. 2. B. foliis sessilibus lanceolatis obtusis pubescentibus, stipulis setaceis, pedunculis 1floris axillaribus. *Carolina. Georgia.* (Podaliria uniflora Mx. Sophora lanceolata Walt.)

australis R. Br. 3. B. foliis petiolatis spathulato-lanceolatis glabris, stipulis lanceolatis pet..lo longioribus, racemis terminalibus. *Carolina.* (Sophora australis L., Podaliria W., P. coerulea Mx. Pursh.)

tinctoria R. Br. 4. B. foliis petiolatis obovatis ſubemarginatis glabris, ſtipulis ſubnullis, racemis laxis ſubſecundis. *Amer. bor.* (Sophora L., Podaliria W. Mx.)

alba R. Br. 5. B. foliis petiolatis elliptico-oblongis mucronatis glabris, ſtipulis ſubulatis petiolo brevioribus, racemis terminalibus. *Amer. bor.* (Crotalaria et Sophora L., Podaliria W. Mx.)

leucophaea Nutt. 6. B. foliis ſeſſilibus rhomboideo-obovatis ramisque villoſiuſculis, ſtipulis ovatis latis foliaceis, racemis axillaribus multifloris ſecundis. *Georgia. Louiſiana.*

bracteata Ell. 7. B. foliis petiolatis lanceolatis obtuſiuſculis pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis petiolum ſuperantibus, ramis divaricatis, racemis axillaribus reclinatis, bracteis ovatis perſiſtentibus. *Georgia.*

villoſa Ell. 8. B. foliis ſubſeſſilibus ovali-oblongis obtuſis ſubtus ramisque villoſis, ſtipulis linearibus, racemo terminali ſubſpicato, calycibus ſemi-4fidis. *Carolina. Georgia.* (Sophora Walt. Podaliria Mx.)

1642. VIRGILIA Lam.

capenſis Lam. 1. V. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis mucronatis ſubtus ſericeis, racemis axillaribus, leguminibus tomentoſis. *C. B. S.* (Sophora L., Podaliria W.)

aurea Lam. 2. V. foliis pinnatis, foliolis ellipticis acutiuſculis ſubtus leguminibusque glabris. *Abyſſinia.* (Sophora Ait., Podaliria W., Robinia ſubdecandra Herit.)

ſecundiflora Cav. 3. V. foliis pinnatis, foliolis ovali-oblongis coriaceis laevibus, racemis denſis terminalibus, calycibus rufo-tomentoſis. *Nov. Hiſpan.* (Brouſſonetia ſecundiflora Ort.)

intruſa R. Br. 4. V. foliis ternato-pinnatis, foliolis obovato-ovalibus mucronatis glabris, racemo terminali, calycis baſi intruſa, leguminibus glabris. *C. B. S.* (Crotalaria cordifolia L.? Hypocalyptus obcordatus Thunb.)

1643. CYCLOPIA Vent.

geniſtoides Vent. *C. B. S.* Frutex ramis angulatis, foliis ſeſſilibus ternatis rigidis, foliolis linearibus margine revolutis glabris, floribus axillaribus pedunculatis purpureis. (Sophora geniſtoides L., galioides Berg. Podaliria W. Galega geniſtoides Thunb.)

1644. THERMIA Nutt.

lupinoides Nutt. 1. Th. foliis ternatis utrinque villoſis oblongo-lanceolatis, ſtipulis oblongis foliaceis petiolo longioribus, pedunculis verticillatis. *Sibir. Camtſchatca.* (Sophora L. Podaliria W. Thermopſis R. Br.)

rhombifolia Nutt. 2. Th. foliis ternatis rhombeo-ovatis ſubcuneatis ſubtus ſericeis, ſtipulis oblique ovatis petiolo brevioribus, verticillis racemoſis. *Louiſiana ſuper.* (Cytiſus rhombifolius Fraſ. Pursh.)

1645. EDWARDSIA Salisb.

grandiflora Salisb. 1. E. arborea, foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis glabris. *Nov. Zeeland.* (Sophora tetraptera Ait.)

microphylla Salisb. 2. E. arborescens, foliis pinnatis, foliolis obovato-subrotundis subemarginatis glabriusculis. *Nov. Zeeland.* (Sophora tetraptera Forst.)

chrysophylla Salisb. 3. E. arborescens, foliis pinnatis, foliolis ellipticis ciliatis. *Ins. Sandwich.*

1646. CHORIZEMA Labill.

ilicifolium Labill. 1. Ch. foliis oblongis sinuato-pinnatifidis dentato-spinosis subcoriaceis, pedunculis racemosis apice bracteatis. *Nov. Holl.*

nanum Sims. 2. Ch. foliis oblongis obtusis sinuato-dentatis spinosis, pedunculis racemosis basi bracteatis. *Nov. Holl. ad Africum.* (Pultenaea nana Andr.)

rhombeum R. Br. 3. Ch. foliis integerrimis planis mucronatis, inferioribus rhombeo-orbiculatis, summis elliptico-lanceolatis, pedunculis paucifloris. *Nov. Holl. ad Africum.* (Ch. scandens Sm.)

1647. PODOLOBIUM R. Br.

trilobatum R. Br. *Nov. Holl.* Fruticulus foliis 3lobis spinoso-dentatis, pedunculis racemosis. (Chorizema trilobum Sm. Pultenaea ilicifolia Andr.)

1648. OXYLOBIUM Andr.

arborescens R. Br. 1. O. foliis lineari-lanceolatis mucronatis ciliatis, floribus corymbosis, bracteis calyci proximis persistentibus, leguminibus calycem subaequantibus. *Terra Diemen.*

ellipticum R. Br. 2. O. foliis ovali-oblongis, floribus corymbosis, bracteis a calyce remotiusculis caducis, leguminibus calycem duplo superantibus. *Terra Diemen.* (Gompholobium Labill. Callistachys Vent.)

cordifolium Andr. 3. O. foliis cordato-ovatis pilosiusculis, umbellis terminalibus sessilibus. *Nov. Holl.*

1649. GOMPHOLOBIUM Sm.

* *Foliis ternatis.*

latifolium Sm. 1. G. foliolis oblongo-linearibus, ramulis angulatis glabris, carina fimbriata, calyce fructifero reflexo. *Nov. Holl.* (G. fimbriatum Sm., psoraleaefolium Salisb.)

marginatum R. Br. 2. G. foliolis obovatis marginatis, stipulis petiolum aequantibus, corolla calycem aequante. *Nov. Holl. ad Africum.*

polymorphum R. Br. 3. G. foliis ternatis quinatisque, foliolis linearibus margine revolutis, caule procumbente. *Nov. Holl. ad Africum.*

minus Sm. 4. G. foliolis linearibus aduncis, ramulis teretibus hirtis. *Nov. Holl.*

grandiflorum Sm. 5. G. foliolis lineari-ſubulatis ſtrictis, ramis angulatis glabris, calycibus margine lanatis. *Nov. Holland.*

** *Foliis pinnatis.*

tomentoſum Labill. 6. G. foliis ſub-4jugis lineari-ſubulatis ſcabris, pedunculis ſolitariis, calycibus hirſutis legumine brevioribus, carina ſericeo-ciliata. *Nov. Holland. bor.*

venuſtum R. Br. 7. G. foliis multijugis lineari-ſubulatis margine revolutis venoſis calycibusque glabris, pedunculis corymboſis. *Nov. Holl. auſtr.* (G. pinnatum Sm.)

1650. SPHAEROLOBIUM Sm.

vimineum Sm. 1. Sph. caule aphyllo ramoſo, ramis ſuperne ſquamatis, floribus flavis. *Nov. Holl. Terra Diemen.* (Sph. minus Labill.)

medium R. Br. 2. Sph. caule aphyllo ramoſo, ramis ſuperne nudis, floribus rubris. *Nov. Holl. ad Africum.*

1651. GASTROLOBIUM R. Br.

bilobum R. Br. *Nov. Holl. ad Africum.* Fruticulus foliis ſeſſilibus ſubverticillatis ſpathulatis emarginato-2lobis ſericeis, floribus racemoſis luteis.

1652. CALLISTACHYS Vent.

lanceolata Vent. *Nov. Holl.* Frutex ramoſus, foliis ternis ſubſeſſilibus lanceolatis acutis ſericeis ſubtus incanis, ſtipulis ſcarioſis, floribus racemoſis fulvis.

1653. EUCHILOS R. Br.

obcordatum R. Br. *Nov. Holl. ad Africum.* Fruticulus foliis oppoſitis obcordatis ciliatis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus fulvis.

1654. PULTENAEA Sm.

* *Capitulis terminalibus.*

daphnoides Sm. 1. P. foliis ſpathulatis mucronatis glabris. *Nov. Holland.*

obcordata Andr. 2. P. foliis obcordatis glaberrimis mucronato-pungentibus. *Terra Diemen.*

ſtricta Curt. 3. P. foliis obovatis mucronatis glaberrimis, caule ſtricto, calycibus leguminibusque piloſis. *Terra Diemen.*

biloba R. Br. 4. P. foliis cuneiformibus apice dilatato-2lobis mucronatis ſupra aſperis ſubtus ſericeis, capitulis paucifloris. *Nov. Holl.*

ſcabra R. Br. 5. P. foliis cuneiformibus truncatis ſetaceo-mucronatis margine revolutis ſupra ſcabris ſubtus villoſis, ſtipulis ſetaceis recurvis. *Nov. Holl.*

retuſa Sm. 6. P. foliis cuneato-linearibus retuſis glabris, capitulis paucifloris, bracteis ſubrotundis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

linophylla Sm. 7. P. foliis linearibus mucronatis margine revolutis ſubtus ſericeis, bracteis abbreviatis. *Nov. Holl.*

dentata Labill. 8. P. foliis linearibus punctato-aſperis, bracteis dentatis calycem ſubaequantibus. *Nov. Holl. ad Africum.* (P. paleacea W.)

tenuifolia R. Br. 9. P. foliis linearibus ſubtus convexis ramulisque piloſis, capitulis 2floris, fructibus lateralibus. *Terra Diemen.*

ſtipularis Sm. 10. P. foliis linearibus acutis junioribus ciliatis, ſtipulis imbricatis 2fidis, capitulis multifloris, bracteis calyces aequantibus. *Nov. Holl.*

** *Floribus axillaribus.*

villoſa Sm. 11. P. foliis oblongo-linearibus ſupra ſubconcavis ſubtus ramisque villoſis, pedunculis 1floris axillaribus, bracteis ovatis calyce brevioribus. *Nov. Holland.*

flexilis Sm. 12. P. foliis oblongo-linearibus mucronatis glaberrimis. *Nov. Holl.*

veſtita R. Br. 13. P. foliis lineari-lanceolatis mucronatis glabris, ſtipulis imbricatis ciliatis, calycibus bracteisque ariſtatis. *Nov. Holl. auſtr.*

ferruginea Rudg. 14. P. foliis obovatis punctatis piloſis, ſtipulis imbricatis ſubulatis, bracteis calycem ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

elliptica Sm. 15. P. foliis confertis elliptico-linearibus concavis ſupra glabris ſubtus punctatis ſericeis, ſtipulis villoſis, floribus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.*

polygalaefolia Rudg. 16. P. foliis lineari-oblongis mucronatis ferrugineis, ſtipulis ſparſis ſubulatis. *Nov. Holl.*

juniperina Labill. 17. P. foliis linearibus cuſpidato-ariſtatis, ſtipulis ſubulatis, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl. bor.*

1655. SCLEROTHAMNUS R. Br.

microphyllus R. Br. *Nov. Holl. auſtr.*

1656. DAVIESIA Sm.

juncea Sm. 1. D. caule aphyllo tereti ſulcato nudo, umbellis lateralibus, bracteis calyceque imberbibus. *Nov. Holl. auſtr.*

alata Sm. 2. D. caule aphyllo alato, umbellis lateralibus, bracteis calyceque fimbriatis. *Nov. Holl.* (Viminaria lateriflora Link.)

acicularis Sm. 3. D. foliis linearibus revolutis pungentibus denticulato - ſcabris, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.*

ulicina Sm. 4. D. foliis lineari - lanceolatis laevibus pungentibus, ramis ſpineſcentibus glabris patulis, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis imbricatis. *Nov. Holl.* (D. ulicifolia Andr.)

reticulata Sm. 5. D. foliis lanceolatis pungentibus utrinque reticulato - venoſis, ſtipulis intrafoliaceis geminis, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.*

umbellata Sm. 6. D. foliis lanceolatis pungentibus, pedunculis axillaribus umbelliferis 4floris, calyce truncato. *Nov. Holl.*

corymboſa Sm. 7. D. foliis lineari - oblongis muticis, pedunculis axillaribus geminis corymboſis multifloris, calyce regulari. *Nov. Holl.*

mimoſoides R. Br. 8. D. foliis lanceolatis elongatis cuſpidatis, corymbis axillaribus, bracteis appreſſis, labio calycis ſuperiori retuſo. *Nov. Holl.* (D. corymboſa Andr.)

incraſſata Sm. 9. D. foliis cuneato - linearibus compreſſis oblique verticalibus incraſſatis ſpinoſis, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.*

ſquarroſa Sm. 10. D. foliis cordatis pungentibus reflexis margine ſcabris, pedunculis axillaribus 1floris ſubſolitariis. *Nov. Holl.*

cordata Sm. 11. D. foliis cordatis amplexicaulibus reticulato - venoſis, pedunculis axillaribus aggregatis corymboſis multifloris, calyce truncato. *Nov. Holl.*

latifolia R. Br. 12. D. foliis obovato - ellipticis venoſis, racemis axillaribus multifloris. *Nov. Holl.*

1657. EUTAXIA R. Br.

myrtifolia R. Br. *Nov. Holl. auſtr.* Fruticulus foliis ſpathulato - lanceolatis mucronatis glabris, floribus axillaribus geminis fulvis. (Dillwynia obovata Labill., myrtifolia Sm.)

1658. DILLWYNIA Sm.

parvifolia R. Br. 1. D. foliis decuſſatim confertis linearibus patentibus, floribus ſubcapitatis, pedunculis 2bracteatis. *Nov. Holl.*

cineraſcens R. Br. 2. D. foliis filiformibus inermibus patentibus, ramulis calycibusque ſericeis, corymbis terminalibus. *Terra Diemen.*

ericaefolia Sm. 3. D. foliis ſubulatis pungentibus punctato - ſcabris divaricatis ſubtortis, ramulis pubeſcentibus, corymbis terminalibus ſeſſilibus. *Nov. Holl.* (Pultenaea retorta Wendl.)

glaberrima Sm. 4. D. foliis filiformibus laevibus apice recurvo - mucronatis, corymbis terminalibus pedunculatis. *Nov. Holl.*

floribunda Sm. 5. D. foliis ſubulatis mucronatis, floribus axillaribus geminis. *Nov. Holl.*

1659. AOTUS Sm.

villosa Sm. *Nov. Holl. Terra Diemen.* Frutex foliis petiolatis linearibus obtusis sparsis, ramis hirsutis, ramulis ferrugineis, floribus axillaribus solitariis fulvis. (A. ferruginea Labill. Pultenaea ericoides Vent.)

1660. VIMINARIA Sm.

denudata Sm. *Nov. Holl. Terra Diemen.* Fruticulus aphyllus, ramis filiformibus, floribus racemosis flavis. (Daviesia denudata Vent. Sophora juncea Schrad.)

1661. JACKSONIA R. Br.

scoparia R. Br. 1. J. arborescens inermis, ramulis angulatis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*

spinosa R. Br. 2. J. fruticosa, ramulis spinescentibus divaricatis dichotomis aphyllis, pedunculis solitariis lateralibus. *Nov. Holl. ad Africum.* (Gompholobium spinosum Labill.)

1662. BURTONIA R. Br.

scabra R. Br. *Nov. Holl. ad Afric.* (Gompholobium scabrum Sm.)

1663. BRACHYSEMA R. Br.

latifolium R. Br. 1. Br. foliis subcordato-ovatis mucronatis subtus albido-pubescentibus, vexillo oblongo obovato. *Nov. Holl.*

undulatum Ker. 2. Br. foliis subellipticis mucronatis undulatis subtus sericeis, vexillo oblongo apice convoluto. *Nov. Holl.*

1664. MIRBELIA Sm.

reticulata Sm. 1. M. foliis lineari-lanceolatis venosis, floribus axillaribus glomeratis. *Nov. Holl.* (Pultenaea rubiaefolia Andr.)

dilatata R. Br. 2. M. foliis cuneiformibus apice 3fidis. *Nov. Holl. ad Africum.*

1665. ORMOSIA Jacks.

dasycarpa Jacks. *Ind. occid.* Arbor ramis ferrugineo-tomentosis, foliis impari-pinnatis glabris, floribus paniculatis coeruleis. (Sophora monosperma Sw.)

1666. SAMYDA.

** Decandrae.*

glabrata Sw. 1. S. foliis ovato-oblongis integerrimis supra nitidis subtus glabris subtiliter punctatis, pedunculis 1floris solitariis axillaribus. *Jamaica.*

affinis * 2. S. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubintegerrimis opacis glabris, pedunculis axillaribus ſubaggregatis. *Hiſpaniola.*

ſpineſcens Sw. 3. S. foliis oblongis obtuſis crenatis glaberrimis, ramis ſpineſcentibus, floribus ſubſeſſilibus terminalibus. *Hiſpaniola.*

Selloi * 4. S. foliis ovato-oblongis baſi inaequalibus ſerratis ſupra nitidis ſubtus glabris, pedunculis aggregatis e pulvillis axillaribus, floribus polygamis. *Braſil.* Sello. (Bigelovia braſilienſis N. E.)

† *grandiflora* * 5. S. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſeſſilibus obſolete ſerratis ſupra opacis ſubtus nitidis discoloribus, floribus aggregatis axillaribus. *Braſil.* Sello.

decurrens * 6. S. foliis oblongis utrinque attenuatis in petiolum decurrentibus crenulatis glaberrimis opacis, cymis axillaribus pedunculatis paucifloris. *Braſil.* Sello.

ſpinuloſa Vent. 7. S. foliis ovali-oblongis coriaceis ſpinuloſo-ſerrulatis ſupra glaberrimis pellucido-punctatis, pedunculis pubeſcentibus ſubſolitariis e pulvillis axillaribus. *Inſ. Carib.*

villoſa Sw. 8. S. foliis ovato-oblongis baſi obliquis ſubſerratis ſubtus ferrugineo-villoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis. *Jamaica.*

** *Floribus dodecandris.*

pubeſcens 9. S. foliis obovato-ellipticis obtuſis ſupra opacis rugoſis ſubtus flavido-villoſis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis. *Hiſpaniola.*

ſerrulata 10. S. foliis ovato-oblongis acutis ſerrulatis coriaceis ſupra rugoſis nitidiuſculis ſubtus ferrugineo-villoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. occ.*

tinifolia Vent. 11. S. foliis obovatis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris petiolo longioribus. *Ind. or.*

*** *Floribus octandris.*

nitida 12. S. foliis cordatis crenatis nitidis, racemis axillaribus. *Jamaica.*

macrophylla W. 13. S. foliis ovatis acutis ſubcrenulatis utrinque glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, pedunculis corymboſis terminalibus. *Ind. or. et occid.* (Sam. viridiflora Poir.)

multiflora Cav. 14. S. foliis oblongis utrinque attenuatis dentatis ſubtus tomentoſis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Inſ. Carib.*

1667. CASEARIA.

* *Floribus decandris.*

Meliſtaurum * 1. C. foliis amplis ovato-oblongis obtuſis integerrimis coriaceis nitidis, floribus axillaribus ſeſſilibus minutis diclinis. *Nov. Caledon.* (Meliſtaurum diſtichum Forſt. Samyda polyandra W.)

sylvestris Sw. 2. C. foliis ovato-oblongis acuminatis basi subattenuatis integerrimis utrinque glaberrimis nitidis, pedunculis axillaribus confertissimis. *Ind. occid.*

fragilis Poir. 3. C. foliis ovato-lanceolatis crassiusculis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. orient.* (Samyda Vent.)

parviflora W. 4. C. foliis oblongis acuminatis crenatis utrinque glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris confertis. *Ind. occid.* (Samyda L.)

parvifolia W. 5. C. foliis ovatis acutis serratis utrinque glabris, pedunculis lateralibus 1floris subaggregatis. *Martinica.* (C. decandra Jacq.)

punctata * 6. C. foliis ovato-oblongis acuminatis serratis utrinque glaberrimis nitidis pellucido-punctatis, pedunculis axillaribus confertis. *Ind. occid. Peru.* (Chaetocrater fasciculatus R. et P. Crateria Pers.)

capitata * 7. C. foliis oblongis acuminatis serratis, floribus capitatis. *Peru.* (Chaetocrater capitatus R. et P. Crateria Pers.)

macrophylla Vahl. 8. C. foliis ellipticis utrinque attenuatis glabris obsolete crenatis, floribus axillaribus aggregatis tomentosis subsessilibus. *Ind. occ.* (Pitumba guianensis Aubl.)

obliqua * 9. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis inaequilateris serrulatis 3plinerviis utrinque glaberrimis supra nitidis pellucido-punctatis, floribus subsessilibus solitariis axillaribus minutis. *Brasil.* Sello.

serrulata Sw. 10. C. foliis oblongis obtusis serrulatis utrinque glaberrimis, ramulis flexuosis, pedunculis axillaribus confertissimis. *Ind. occid.*

incana Bert. 11. C. foliis lanceolatis acuminatis argute serrulatis subtus incano-tomentosis, pedunculis axillaribus subcymosis, floribus majusculis. *Portorico.*

elliptica W. 12. C. foliis oblongis elongatis obtusis obsolete serratis subtus subpubescentibus, pedunculis axillaribus confertis brevissimis. *Ind. or.* (Anavinga lanceolata Lam.)

hirsuta Sw. 13. C. foliis ovatis acuminatis dentato-serratis supra pubescentibus subtus villosis, pedunculis lateralibus confertis. *Ind. occid.*

stipularis Poir. 14. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis serrulatis subtus tomentosis, stipulis lanceolatis elongatis, pedunculis axillaribus multifloris. *Portorico.* (Samyda Vent.)

grewiaefolia Poir. 15. C. foliis cordato-oblongis serrulatis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus 1floris. *Java.* (Samyda Vent.)

** *Floribus octandris.*

multiflora * 16. C. foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis glabris, ramis spinescentibus, paniculis axillaribus divaricatis. *Ind. or.*

coriacea Poir. 17. C. foliis obovatis integerrimis coriaceis glabris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Java.* (Samyda Vent.)

ſpinoſa W. 18. C. foliis ovatis ſerratis glabris, ramis ſpinoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Hiſpaniola.* (C. aculeata Jacq. Samyda ſpinoſa L.)

nitida Jacq. 19. C. foliis ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillaribus. *Amer. auſtr.*

ramiflora Vahl. 20. C. foliis ellipticis oblongis crenato-ſerratis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus e tuberculis ramorum. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (Iroucana guianenſis Aubl. Athenaea Schreb.)

hirta Sw. 21. C. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus hirtis, pedunculis confertis 1floris. *Ind. occid.*

ovata W. 22. C. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. *Ind. orient.* (Anavinga ovata Lam.)

ilicifolia Poir. 23. C. foliis ovatis angulato-ſpinoſis coriaceis nitidis ſubtus tomentoſis, floribus faſciculatis 6andris. *Hiſpaniola.* (Samyda Vent.)

1668. AUGEA Thunb.

capenſis Thunb. *Afric. auſtr.* Herba ramoſa annua, foliis connatis teretibus obtuſis glabris, pedunculis axillaribus 1floris.

1669. AQUILARIA.

malaccenſis Lam. 1. A. foliis ovatis acuminatis glabris integerrimis venoſis, petiolis hirſutis, floribus axillaribus confertis. *Ind. or. transganget.* (A. ovata Cav.)

chinenſis * 2. A. foliis lanceolatis undulatis nitidis, floribus terminalibus ſolitariis. *China auſtr.* (Ophiſpermum ſinenſe Lour.)

1670. DAÏS.

cotinifolia 1. D. foliis obovato-oblongis, floribus 5fidis. *C. B. S.* (D. laurifolia Jacq.)

octandra 2. D. foliis ovato-lanceolatis venoſis acutis, floribus 4fidis. *Ind. orient.*

diſperma Forſt. 3. D. foliis ovato-lanceolatis eveniis, floribus 4-5fidis. *Inſ. Amicor.*

1671. RHYNCHOTHECA R. et P.

ſpinoſa R. et P. *Peru. Nov. Granat.* Frutex ramoſiſſimus, ramis ſpineſcentibus, foliis obovato-oblongis (interdum ſub-3fidis), floribus terminalibus faſciculatis nutantibus. (Rh. integrifolia et diverſifolia Kunth.)

1672. HETERODENDRON Deſf.

oleaefolium Deſf. *Nov. Holl.* Frutex foliis alternis oblongo-lanceolatis glaucis, floribus racemoſis axillaribus.

1673. STYLOBASIUM Desf.

ſpathulatum Desf. *Nov. Holl.?* Frutex foliis ſpathulatis, pedunculis axillaribus 1floris ſuperne racemoſis.

1674. CALPIDIA Thuar.

lanceolata Poir. *Madagascar.* Arbor trunco orgyali, diametri 3pedalis, foliis oblongo-lanceolatis, floribus rubentibus paniculato-umbellatis.

1675. DARWINIA Rudg.

faſcicularis Rudg. *Nov. Holl.* Frutex ramoſiſſimus, foliis confertiſſimis lineari-ſubulatis glanduloſo-aſperis, floribus terminalibus ſubcapitatis ſeſſilibus.

1676. HARDWICKIA Roxb.

binata Roxb. *Coromandel.* Arbor foliis binatis medio mucronatis, floribus paniculatis axillaribus terminalibusque flavis.

1677. COPAIFERA.

Jacquini Desf. 1. C. foliis ſub-4jugis alternis ovatis inaequilateris apice obtuſe attenuatis lucidis. *Nov. Granat.* (Copaiva officinalis Jacq.)

guianenſis Desf. 2. C. foliis 4jugis oppoſitis ovato-oblongis aequilateris acuminatis glabris. *Guiana.*

Langsdorffii Desf. 3. C. foliis ſub-4jugis ellipticis utrinque nitidiusculis pellucido-punctatis ciliatis, petiolis pedunculisque pubeſcentibus. *Braſil.*

1678. CRUDIA Schreb.

ſpicata W. 1. Cr. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Guiana.* (Apalatoa ſpicata Aubl.)

aromatica W. 2. Cr. foliis ſimplicibus oblongis. *Guiana.* (Touchiroa aromatica Aubl.)

1679. DIPLOCHLAENA R. Br.

Dampierii Desf. 1. D. foliis ſpathulatis emarginatis ſubtus incanis. *Nov. Holl. occid.*

grandiflora Desf. 2. D. foliis oblongo-ellipticis emarginatis utrinque incanis. *Nov. Holl. occid.*

1680. ADENOSTEMON Perſ.

nitidus Perſ. *Chili.* Arbor procera, foliis oblongo-lanceolatis nitidis, floribus axillaribus albidis, fructibus flavis ſapidis. (Gomortega R. et P. Keulia chilenſis Molin.)

1681. QUERIA.

hispanica — *Hispania.* Herba annua subcanescens ramosa, foliis oppositis filiformibus, floribus aggregatis terminalibus.

1682. TERMINALIA.

* *Foliis integerrimis.*

Vernix Lam. — 1. T. foliis lanceolatis acuminatis nitidis, racemis pendulis, fructibus depressis venoso-reticulatis. *Ins. Molucc.*

Benzoin L. suppl. — 2. T. foliis lineari-lanceolatis subrepandis subtus pubescentibus rubro-venosis, racemis abbreviatis, fructibus hinc gibbis. *Ind. or.* (T. angustifolia Jacq. Croton Benzoë L.)

rhomboidea * — 3. T. foliis lanceolatis acutiusculis glaberrimis coriaceis, racemis axillaribus, fructibus rhomboideis. *Madagascar.* (Mirobolanus [Myrobalanus] Poir.)

procera Roxb. — 4. T. foliis spathulato-lanceolatis acutiusculis glabris subtus basi glandulosis, racemis axillaribus, fructibus oblongis 5gonis. *Ins. Andaman.*

trifoliata * — 5. T. foliis ternatis lanceolatis obtusiusculis glabris subtus discoloribus, racemis paniculatis laevibus. *Brasil.* Sello.

macrostemon * — 6. T. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis coriaceis utrinque glaberrimis venosis, paniculae ramis verticillatis pubescentibus, staminibus elongatis. *Brasil.* Sello.

lanceolata Mart. — 7. T. foliis fasciculatis ovato-lanceolatis acutiusculis mucronatis sericeis. *Brasil.*

argentea Mart. — 8. T. foliis oppositis ovatis acuminatis supra pubescentibus subtus argenteo-sericeis. *Brasil.*

fagifolia Mart. — 9. T. foliis fasciculatis ovatis acutiusculis mucronatis sericeo-villosis, floribus spicato-glomeratis. *Brasil.*

lucida Hofmannsegg. — 10. T. foliis oppositis ovato-oblongis acutis coriaceis utrinque glabris basi eglandulosis, spicis plurimis aggregatis pubescentibus. *Brasil.*

firma Mart. — 11. T. foliis fasciculatis obovatis mucronatis coriaceis margine revolutis utrinque glabris reticulatis, spicis terminalibus aggregatis villosis. *Brasil.*

madagascarensis * — 12. T. foliis ovalibus subemarginatis coriaceis, spicis laxis axillaribus, fructibus obsolete angulatis. *Madagascar.* (Mirobolanus Fatraea Poir.)

discolor * — 13. T. foliis obovato-oblongis glabris coriaceis subtus rufis, paniculae terminalis ramis angulato-compressis glabris, floribus 8andris. *Brasil.* Sello.

elliptica W. — 14. T. foliis oblongo-ellipticis subtus pilosiusculis basi 2glandulosis, spicis terminalibus paniculatis. *Ind. or.*

Bellirica Roxb. — 15. T. foliis obovato-oblongis obtusis utrinque glabris, petiolis supra 2glandulosis, racemis axillaribus. *Ind. or.* (T. Chebula Retz.)

Chebula Roxb. 16. T. foliis elliptico-oblongis obtufis utrinque glabris margine petiolisque glandulofis, racemis terminalibus aggregatis. *Ind. or.*

intermedia Bert. 17. T. foliis amplis coriaceis obovato-oblongis bafi cordatis 2glandulofis acutiusculis utrinque glaberrimis, racemis fimplicibus. *Guadalupa.* Bertero.

moluccana Lam. 18. T. foliis membranaceis obovatis obtufis bafi eglandulofis utrinque glabris, racemis fimplicibus elongatis. *Inf. Molucc. et Societ.* (T. glabrata Forft.)

ciliata * 19. T. foliis obovato-oblongis obtufis bafi attenuatis ciliatis utrinque glaberrimis bafi eglandulofis, pedunculis racemofis elongatis bafi 2glandulofis. *Ind. or.*

** *Foliis fubferratis, dentatis.*

fubcordata Humb. 20. T. foliis obovatis obtufis fubrepandis bafi cordatis eglandulofis utrinque glabris, petiolis pubefcentibus. *Amer. auftr.*

Catappa 21. T. foliis obovato-oblongis acutiusculis obfolete denticulatis bafi rotundatis eglandulofis fubtus villofiusculis, racemis axillaribus fimplicibus. *Ind. or.*

latifolia Sw. 22. T. foliis obovato-oblongis acutis obfolete crenulatis bafi attenuatis eglandulofis utrinque glabris, racemis dichotomis villofis. *Ind. occ. America auftr.* (T. dichotoma Meyer.)

mauritiana Lam. 23. T. foliis verticillatis confertiffimis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris fubcrenatis, racemis axillaribus. *Inf. Mascaren. Guiana?* (Pamea guianenfis Aubl.)

villofa * 24. T. foliis oblongis utrinque attenuatis denticulatis fubtus villofis, paniculis axillaribus ferrugineo-villofis, floribus 8andris. *Brafil.* Sello.

brafilienfis * 25. T. foliis oblongis membranaceis crenato-glandulofis venofis glabriusculis, floribus fafciculato-racemofis. *Brafil.* Sello.

1683. BUCIDA.

Buceras 1. B. racemis fpicatis elongatis, foliis fpathulatis glabris. *Jamaica. Cuba.*

capitata Vahl. 2. B. racemis capitatis, foliis fpathulatis retufis ciliatis. *Hifpaniola. Portorico. Inf. Carib.*

1684. GIMBERNATIA R. et P.

obovata R. et P. 1. G. foliis obovatis acuminatis, racemis fpicatis pendulis, fructibus 5alatis. *Peru. Guiana?* (Chuncoa Juff. Poir. Tanibouca guianenfis Aubl.?)

oblonga R. et P. 2. G. foliis oblongis, racemis fpicatis confertiffimis, fructibus 2alatis. *Peru.*

1685. GETONIA Roxb.

floribunda Roxb. *Ind. or. Madagascar.* Arbuscula ſcandens, foliis oppoſitis ovatis acutis glabris, floribus paniculatis. (Calycopteris Lam.)

DIGYNIA.

1686. ROYENA.

lucida 1. R. foliis ovatis nitidis ciliatis venisque ſubtus villoſis. *C. B. S.*

glabra 2. R. foliis oblongo-lanceolatis glabris ciliatis, ramis hirſutis. *C. B. S.*

pallens Thunb. 3. R. foliis ovato-oblongis obtuſis margine revolutis ramisque tuberculatis glabris. *C. B. S.*

pubeſcens W. 4. R. foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis pubeſcentibus, floribus 1gynis, ſtigmatibus 5. *C. B. S.* (R. cuneata Poir., hirſuta Jacq.)

hirſuta 5. R. foliis lanceolatis utrinque attenuatis hirſutis ſubtus rugoſo-venoſis. *C. B. S.*

villoſa 6. R. foliis cordato-oblongis obtuſis ſubtus tomentoſis. *C. B. S.*

anguſtifolia W. 7. R. foliis lineari-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *C. B. S.*

1687. TURARIA Molin.

chilenſis Molin. *Chili.* Frutex foliis alternis oblongis integerrimis, floribus terminalibus pedunculatis flavis.

1688. ADRASTEA Cand.

ſalicifolia Cand. *Nov. Holl.* Frutex foliis linearibus calloſo-denticulatis ſubtus ſericeis, floribus ſubſolitariis ſeſſilibus.

1689. RECCHIA Seſſ.

mexicana Seſſ. *Mexico.* Frutex ramoſus foliis oblongis alternis, floribus ſubracemoſis flavis.

1690. HYDRANGEA.

arboreſcens 1. H. cymis nudis, foliis oblongo-ovatis acuminatis ſerratis glabris. *Virginia.* (H. vulgaris Pursh.)

cordata Mx. 2. H. cymis ſubradiatis, foliis ſubcordato-ovatis acuminatis groſſe dentatis ſubtus glabris. *Carolina.*

hortenſis Sm. 3. H. cymis radiatis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis dentatis glabris. *China. Japon.* (Viburnum virens et ſerratum Thunb. Primula mutabilis Lour. Hortenſia opuloides Lam., ſpecioſa Perſ.)

nivea Mx. 4. H. cymis radiatis, foliis ovatis acuminatis mucronato-dentatis ſubtus niveo-tomentoſis. *Carolina. Louiſiana.* (H. radiata Walt., glauca Hortul.)

quercifolia Bartr. 5. H. cymis radiatis thyrſoideo-paniculatis, foliis oblongis ſinuato-lobatis dentatis ſubtus tomentoſis. *Georgia. Florida.* (H. radiata Sm.)

1691. CUNONIA.

capenſis *C. B. S.* Arbor foliis pinnatis glabris, foliolis lanceolatis coriaceis glabris glanduloſo-ſerratis, floribus faſciculato-racemoſis albis.

1692. TIARELLA.

cordifolia 1. T. foliis cordatis acute lobatis mucronato-dentatis hirſutis, ſcapo racemoſo pubeſcente. *Amer. bor.*

Menzieſii Pursh. 2. T. foliis cordato-ovatis acutis ſublobatis dentatis, caulinis alternis diſtantibus, racemo filiformi ſubſpicato, calycibus tubuloſis. *Ora Amer. ad Caurum.*

trifoliata 3. T. foliis ternatis, foliolis ſubrhomboideis ſerratis piloſis, racemis terminalibus, corymbulis alternis, calycibus campanulatis. *Aſia ad Caeciam. Ora Amer. ad Caurum.*

biternata Vent. 4. T. foliis 2ternatis, foliolis cordato-ovatis obliquis inciſo-lobatis dentatis, caule folioſo, panicula terminali divaricata, floribus ſubſeſſilibus. *Carolina auſtr.*

1693. MITELLA.

diphylla 1. M. caule erecto ſuperne diphyllo, foliis ovatis angulato-dentatis hirſutiusculis, racemo ſpicato. *Amer. bor.*

cordifolia Lam. 2. M. ſcapo ſetaceo nudo, foliis orbiculato-reniformibus ſubduplicato-crenatis lucidis. *Amer. bor.*

reniformis Lam. 3. M. foliis reniformibus repandis ciliatis, ſcapo nudo. *Amer. bor.* (M. nuda L.)

proſtrata Mx. 4. M. radice repente, caule proſtrato, foliis alternis cordato-ſubrotundis acutiusculis ſublobatis. *Amer. bor.*

grandiflora Pursh. 5. M. hirſutiſſima, foliis cordato-ſubrotundis obtuſe lobatis dentatis, ſcapo racemoſo ſubfoliato, calycibus campanulatis. *Ora occid. Amer. bor.*

1694. SAXIFRAGA.

**Bergenia* Mönch. Cal. campanulato-lobatus. Capſ. baſi coalita, ſtyli ſubnulli.

craſſifolia 1. S. foliis ovalibus baſi attenuatis vel ſubcordatis ſubdenticulatis glaberrimis coriaceis, paniculae

coarctatae ramis nutantibus. *Sibir.* (Megafea Haw. Geryonia Schrank. S. cordifolia Haw. var.)

ligulata Wall. 2. S. foliis obovato-ellipticis fubretufis ciliatis glabris, petiolis ligulatis, panicula cymofa patula. *Nepal.* (Megafea ciliata Haw.)

** *Gymnopera* Don. Cal. reflexus. Stamina hypogyna. Styli divaricati, ftigmatibus glabris.

Geum 3. S. foliis orbiculato-reniformibus dentato-crenatis utrinque pilofiusculis, petiolis elongatis fcapoque paniculato hirfuto. *Hibernia. Helvetia. Sibir.* (Robertfonia polita, crenata et dentata Haw. var.)

hirfuta 4. S. foliis elliptico-fubrotundis cartilagineo-crenatis utrinque pilofis, petiolis longiffimis hirfutis, fcapo paniculato vifcofo-villofo. *Hibernia. Pyren.* (Robertfonia fphaeroidea Haw. S. hybrida Vill. Sternb. var.)

umbrofa 5. S. foliis obovatis cartilagineo-crenatis glabris in petiolum brevem dilatatum ciliatum decurrentibus, fcapo paniculato fuperne glandulofo. *Hibernia. Lufitania? Pyren.* (S. fpathularis Brot. ?)

punctata 6. S. foliis obovato-oblongis argute profundeque cartilagineo-ferratis glaberrimis in petiolum longum ciliatum decurrentibus, fcapo paniculato hirfutiffimo, ramis paniculae bracteatis. *Hibernia.* (S. ferrata Ott.)

cuneifolia 7. S. foliis fubrotundo-obovatis crenatis laevibus in petiolum glabrum attenuatis, caule bafi ftolonifero, fcapo paniculato. *Alp. Europ. med.*

fpicata Don. 8. S. foliis cordato-orbiculatis argute ferratis venofis pilofis, petiolis bafi dilatatis, racemo elongato fpicaeformi. *Ora occid. Amer. bor.* (S. Geum Pursh.)

Nelfoniana Don. 9. S. foliis cordato-orbiculatis fubpeltatis incifo-ferratis, petiolis filiformibus longiffimis, thyrfo ovato. *Ora occid. Amer. bor.* 60°.

arguta Don. 10. S. foliis fubreniformibus incifo-ferratis glabris, petiolis filiformibus, fcapo gracili racemofo. *Ora occid. Amer. bor.*

ftellaris 11. S. foliis oblongis apice dilatatis dentatis bafi integerrimis feffilibus hirfutiusculis, fcapo paniculato glandulofo. *Alp. Europ.* et *Afiae.* (S. Bellardi All. var. acaulis.)

leucanthemifolia Lapeyr. 12. S. foliis fpathulatis inaequaliter dentatis hirfutiusculis in petiolum attenuatis, fcapo dichotomo villofo, ramis divaricatis 1floris, petalis inaequalibus. *Pyrenaei* et *montes Carolinae.* (S. Clufii Gouan.)

farmentofa 13. S. ftolonibus reptantibus, foliis cordato-orbiculatis lobato-crenatis fubtus rufis utrinque hirfutis, fcapo paniculato fubvifcido, petalis inaequalibus, exterioribus maximis. *China. Japon.* (S. chinenfis Lour., ftolonifera Jacqu., ligulata Murr. Diptera Borkh. Link.)

erofa Pursh. 14. S. foliis lanceolatis acutis erofo-denticulatis ciliatis glabris, fcapo ftricto villofo paniculato, pedicellis filiformibus. *Virginia. Carolina.*

*****Leiogyne* Don. Cal. patulus. Stamina calyci inferta. Stigmata glabra.

† *Folia lobata.*

rotundifolia 15. S. foliis reniformi-cordatis lobato-crenatis longe petiolatis hirfutis, panicula foliata, petalis acutis. *Alp. Europ.* et *Afiae.* (S. repanda Sternb.)

granulata 16. S. foliis inferioribus reniformibus incifo-lobatis crenatis petiolatis hirfutis, caule paniculato, laciniis calycinis obtufis, petalis fpathulatis, radice granulata. *Europ.*

bulbifera 17. S. foliis radicalibus cordato-reniformibus crenatis, caulinis feffilibus ovatis dentatis cauleque multifloro hirfutis, axillis foliorum fubbulbiferis, laciniis calycinis acutis. *Italia. Hifpania.* (S. veronicaefolia Bertol. Ruffi Presl.)

cernua 18. S. foliis radicalibus fuborbiculatis incifo-lobatis, caulinis incifis glabris, caule fimpliciffimo uni-paucifloro, laciniis calycinis obtufis, petalis obovatis unguiculatis. *Alpes Helvet. Arverniae. Pyren. Lappon. Scotia.* (S. vivipara Veft., penduliflora Bâtard. Cand.)

fibirica 19. S. foliis omnibus petiolatis cordato-reniformibus palmatis hirfutis, caule gracili ramofo, pedunculis capillaribus, petalis ovatis. *Afia.* (S. grandiflora Sternb.? granulata et Cymbalaria M. B.?)

nudicaulis Don. 20. S. foliis radicalibus petiolatis reniformibus palmatis glabris, fcapo paniculato fuperne glandulofo, laciniis calycinis acutis. *Ora occid. Amer. bor.*

bracteata Don. 21. S. foliis radicalibus caulinisque longe petiolatis reniformibus incifo-lobatis glabriusculis, petiolis villofis, floribus congefto-corymbofis bracteatis. *Sibir. orient.*

rivularis 22. S. caule debili fimpliciffimo bafi radicante, foliis reniformibus palmatis glabris, fummis fpathulatis indivifis, floribus fubternis bracteatis. *Alp. dinar. Scotia. Norvegia. Islandia. Sibiria. Amer. bor.*

nutans Don. 23. S. caule erecto pubefcente 1folio, foliis petiolatis reniformibus incifo-dentatis hirfutis, racemo nutante paucifloro, laciniis calycinis lanceolatis acutis. *Inf. Aleut.*

orientalis Jacqu. 24. S. caule erecto foliofo, foliis petiolatis cordato-fubrotundis 5lobis glabris reticulato-venofis, pedunculis 1floris, laciniis calycinis acutis. *Afia minor* et *media.* (S. reticulata Sternb.)

Cymbalaria 25. S. caule procumbente flaccido, foliis inferioribus longiffime petiolatis reniformibus obtufe 5lobis, fummis 3lobis integrisque, laciniis calycinis obtufis. *Graecia. Afia minor* et *media. Carinthia?* (S. hederacea M. B., paradoxa Sternb. var.?)

mollis Sm. 26. S. caule procumbente, foliis petiolatis reniformibus 5lobis carnosis glabris ciliatis, summis indivisis, pedunculis pubescentibus, petalis obovatis nervosis calycem superantibus. *Mons Ararat.* Tournef. *Montes Siciliae.* (S. parviflora Bivon.)

arachnoidea Sternb. 27. S. caule debili prostrato ramosissimo, ramis petiolisque villosissimis, foliis cuneato-lobatis pilosis, pedunculis subdichotomis filiformibus, petalis calycem subaequantibus. *Alp. rhaetic.*

hederacea 28. S. caule filiformi flaccido, foliis subovatis 3lobis glaberrimis, summis ovatis acutis, pedunculis 1floris. *Creta. Cyprus.*

†† *Folia indivisa.*

Hirculus 29. S. foliis spathulato-linearibus glabris, ramis 1floris foliosis pubescentibus, petalis oblongis nervosis calycem multo superantibus. *Europ.* et *Asiae bor. paludes.*

spinulosa Adam. 30. S. caule nudiusculo multifloro, foliis imbricatis erectis lineari-lanceolatis ciliatis spinulosis. *Alpes ad lacum Baical.*

myosotifolia Pall. 31. S. caule erecto 3floro hispido, foliis confertis patentibus ovatis acutis hispidis, laciniis calycinis late ovatis. *Sibir.*

flagellaris Sternb. 32. S. caule foliato sub-1floro, sarmentis capillaribus elongatis, foliis confertis spathulatis aristatis cartilagineo-ciliatis, petalis obovatis calycem longe superantibus. *Regio arctica Asiae* et *Amer. Caucas.* (S. setigera Pursh. aspera M. B., prorepens Fisch. cuscutaeformis Loddig.)

aizoides 33. S. foliis lineari-lanceolatis acutis spinuloso-ciliatis glabris, floribus corymbosis, petalis oblongis calycem subsuperantibus. *Alp. Europ.* (S. autumnalis L., atrorubens Bertol.)

laevis M. B. 34. S. foliis oblongis acutiusculis glaucescentibus margine cartilagineis, capitulo paucifloro. *Caucas.*

bronchialis 35. S. caule rigido suffrutescente, foliis confertis triquetro-subulatis glabris spinuloso-ciliatis, floribus paniculatis parvis. *Regio arctica Asiae* et *Amer. bor.*

tenella Wulff. 36. S. foliis lineari-subulatis pungentibus ciliatis, caule gracili oligophyllo paucifloro, laciniis calycinis lineari-lanceolatis cuspidatis. *Alp. carn.* et *jul.* (S. arenarioides Brignol. nitida et Vandelli Sternb.?)

brachypoda Wall. 37. S. foliis linearibus pungentibus 3nerviis margine spinulosis, flore terminali solitario. *Emodi montes.*

juniperina Adam. 38. S. caule suffruticoso caespitoso, foliis imbricatis lineari-subulatis rigidis margine scabris patentibus, floribus racemoso-congestis. *Caucas.*

aspera 39. S. caule basi procumbente, foliis alternis lineari-lanceolatis spinuloso-ciliatis pallidis, ramis sub-3floris, petalis ramoso-nervosis. *Alp. rhaetic. noric. pennin. Pyren.*

hiſpidula Don. 40. S. caule filiformi hiſpido, foliis ovatis mucronatis ſtrigoſis utrinque 1dentatis, flore terminali ſolitario, calyce ſetoſo-ariſtato. *Emodi montes.*

bryoides 41. S. caulibus caeſpitoſis globoſis 1floris, foliis imbricatis erectis lineari-ſubulatis ciliatis glaueſcentibus, laciniis calycinis obtuſis. *Alp. noric. carn. dinar. pennin. Pyren.*

cherlerioides Don. 42. S. caulibus ſterilibus caeſpitoſis globoſis, caule florifero filiformi multifloro, foliis denſe imbricatis ſpathulatis mucronatis ciliatis, laciniis calycinis obtuſis. *Camtſchatca.*

**** *Micranthes* Don. Cal. patens. Petala parva ſeſſilia. Filamenta breviſſima. Stigmata glabra.

hieracifolia Kit. 43. S. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubdenticulatis ciliatis glabris, petiolis dilatatis, ſcapo ſimpliciſſimo glanduloſo-piloſo, floribus racemoſo-ſpicatis bracteatis, petalis calyce brevioribus. *Carpathi montes. Alp. dinar.*

penſylvanica 44. S. foliis lanceolatis ſeſſilibus ſinuato-denticulatis utrinque piloſiſſimis, ſcapo elongato villoſo-viſcoſo, floribus corymboſis, petalis linearibus calyce longioribus. *Amer. bor.*

ſemipubeſcens Sweet. 45. S. foliis ſeſſilibus ovali-oblongis glabris denticulatis ſupra nitidis, ſcapo ramoſo glanduloſo-piloſo, floribus corymboſo-capitatis, petalis calycem aequantibus. *Amer. bor.* (S. marilandica Hortul., paluſtris Link.)

virginienſis Mx. 46. S. foliis ovatis acutiuſculis dentatis petiolatis utrinque piloſis, ſcapo paniculato pubeſcente, petalis calyce longioribus. *Amer. bor.* (S. vernalis W., elongata Sternb.)

melaleuca Fiſch. 47. S. foliis ovato-ſubrotundis acutiuſculis utrinque 2dentatis in petiolum longum attenuatis ſcapoque paucifloro glaberrimis, laciniis calycinis ovatis acutis, petalis unguiculatis. *Montes Sibir.*

nivalis 48. S. foliis obovatis crenatis ſubtus villoſis in petiolum attenuatis, ſcapo ſimpliciſſimo villoſo-viſcoſo, floribus congeſtis breviſſime pedicellatis, petalis minimis germine colorato brevioribus. *Sudet. Scotia. Lappon. Island. Spitzberg. Sibir.* (S. longiſcapa Don.)

davurica W. 49. S. foliis rhombeis dentatis venoſis glabris in petiolum longum attenuatis, ſcapo ſubpaniculato glutinoſo, petalis acutis. *Alp. Davuriae.* (S. punctata Pall.)

pyrolifolia Don. 50. S. foliis ovalibus crenatis utrinque glabris ſupra nitidis coriaceis, ſcapo glanduloſo, floribus ſubthyrſoideis, petalis linearibus. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.*

***** *Saxifragae verae.* Stigmata barbata. Capsula cum calyce arcte connata.

† *Foliis indivisis subsessibilibus.*

Cotyledon 51. S. foliis radicalibus rosaceo-congestis spathulatis cartilagineo-serrulatis, caule folioso paniculato multifloro glanduloso-piloso, petalis amplis spathulatis. *Alp. helvet. pyren. Regio arctica Europ.* (S. pyramidalis Lapeyr. Sternb.)

longifolia Lapeyr. 52. S. foliis radicalibus rosaceo-congestis lineari-lingulatis cartilagineo-serrulatis crustaceo-porosis, caule folioso paniculato glanduloso, petalis ovalibus. *Alp. pyren. cott. pennin. nor. rhaet. dinar.* (S. lingulata Bellard., crustata Vest.)

Aizoon 53. S. foliis radicalibus rosaceo-congestis spathulato-lingulatis cartilagineo-serrulatis, caule folioso corymboso, calycibus glaberrimis. *Alp. Europ. med.*

recta Lapeyr. 54. S. foliis radicalibus rosaceo-congestis lanceolato-lingulatis glaucis cartilagineo-serratis, caule foliato racemoso glanduloso, petalis haud maculatis. *Alp. rhaet. Pyren. Caucas.* (S. intacta et cartilaginea W.)

mutata 55. S. foliis omnibus spathulatis apice obtusissimis cartilagineo-pellucidis integerrimis lateribus ciliato-villosis, floribus pyramidato-racemosis fusco-glandulosis, petalis linearibus acutis. *Alp. helvet. noric. dinar. pyren.*

marginata Sternb. 56. S. foliis obovato-lingulatis margine cartilagineo integerrimis glabris, floribus subcymosis, petalis calyce duplo majoribus. *Calabria.*

Merkii Fisch. 57. S. foliis radicalibus ovatis integerrimis ciliatis glabris, caule paucifloro, petalis unguiculatis calyce duplo longioribus. *Sibiria.*

media Gouan. 58. S. foliis radicalibus rosaceo-congestis lanceolatis glaucis rigidis integerrimis margine cartilagineis supra punctatis, caule subfoliato ferrugineo-villoso, petalis obtusis calyce brevioribus. *Pyren. Apennin. Asia minor.* (S. calyciflora Lapeyr., caesia L., porophylla Bertol., ambigua Cand.)

Lapeyrousii Don. 59. S. foliis radicalibus rosaceo-congestis lanceolatis integerrimis supra punctatis, caule folioso glanduloso-piloso, floribus racemosis, petalis calycem excedentibus. *Pyren. Alp. dinar.* Baumgarten. (S. luteo-purpurea Lapeyr.)

aretioides Lapeyr. 60. S. caulibus caespitosis globosis, foliis imbricatis erectis linearibus mucronatis cartilagineo-marginatis glaucis, caule glutinoso tomentoso, petalis obovatis crenatis. *Pyren.*

Burseriana 61. S. foliis triquetro-subulatis rigidis patulis laevibus glaucis, caule pubescente sub-1floro oligophyllo, petalis nervosis oblongis. *Alp. noric. lepont. dinar. Apennin. Pyren.*

retusa Gouan. 62. S. caule repente caespitoso, foliis imbricatis ovato-3gonis acutis apice recurvatis glaberrimis, pedunculis erectis bracteatis villosis, petalis lan-

ceolatis, ſtylis elongatis. *Alp. cott. pennin. Pyren.* (S. purpurea All., oppoſitifolia γ.W.)

oppoſitifolia 63. S. caule repente caeſpitoſo, ramis erectis unifloris, foliis confertis ſubrotundis obtuſis ciliatis, petalis obovatis genitalia ſuperantibus. *Alp. omnes Europ.* et *Amer. bor.* (S. coerulea Perſ.)

biflora All. 64. S. caulibus erectiusculis ſub-3floris, foliis obovatis oppoſitis remotiusculis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Alp. cott. pennin. Pyren.* (S. oppoſitifolia β. W.)

caeſia 65. S. caulibus caeſpitoſis, foliis aggregatis lineari-oblongis rigidis cretaceo-glaucis poroſis recurvis, floribus racemoſis pubeſcentibus. *Alp. carn. noric. dinar. Pyren.*

diapenſioides Bellard. 66. S. caulibus caeſpitoſis, foliis imbricatis linearibus ſtrictis carinatis cretaceo-glaucis, ramis erectis paucifloris glanduloſo-piloſis, petalis obovatis elongatis. *Alp. grai. pennin.* (S. valdenſis Cand.? S. muſcoides All. icon.)

compacta Sternb. 67. S. foliis radicalibus confertiſſimis lingulatis leproſis integerrimis, caulinis ſub-3dentatis, caule hirſuto paniculato. *Helvet.*

fimbriata Don. 68. S. caulibus caeſpitoſis globoſis, foliis obovatis 3nerviis pellucido-punctatis margine ſcarioſo fimbriatis, pedunculo ſolitario 1floro. *Ora occid. Amer. bor.* (S. Eſcholzii Sternb.)

ſerpyllifolia Pursh. 69. S. ſurculis repentibus, foliis confertis ovatis obtuſis petiolatis ſquarroſis integerrimis glabris, ramis erectis 1floris, petalis orbiculatis. *Ora occid. Amer. bor.*

parnaſſifolia Wall. 70. S. caule erecto folioſo 3floro, foliis cordatis obtuſis amplexicaulibus glanduloſo-ciliatis ſubtus nervoſis, petalis obovatis 5nerviis. *Emodi montes.*

amplexifolia Sternb. 71. S. foliis obovato-oblongis ſerratis glabris, radicalibus in petiolum latum decurrentibus, caulinis amplexicaulibus, floribus paniculatis minutis, petalis lanceolatis calycem excedentibus. *Inſ. Aleut.*

pauciflora Sternb. 72. S. foliis radicalibus ſubrotundis dentatis in petiolum decurrentibus glabris, ſcapo piloſo paucifloro. *Sibir. Camtſchatca.*

gracilis Steph. 73. S. foliis radicalibus cordato-orbiculatis profunde dentatis, ſcapo ſubnudo racemoſo, petalis ſublanceolatis, calycibus fructiferis reflexis. *Sibir.*

neglecta Sternb. 74. S. foliis radicalibus cuneatis longe petiolatis apice profunde dentatis glabris, ſcapo ramoſo multifloro, petalis calycem ſubaequantibus. *Sibir.*

androſacea 75. S. foliis ſpathulato-lanceolatis nervoſis piloſis ciliatis 3dentatis, caule oligophyllo ſub-2floro. laciniis calycinis obtuſis. *Alp. helvet. rhaet. nor. dinar.* (S. depreſſa Sternb.)

magellanica Commerſ. 76. S. foliis roſaceo-congeſtis obovatis viſcoſo-pubeſcentibus tridentatis, caule 1floro. *Magellan.* (Excl. ſyn. Poir.)

ſpathulata Desf. 77. S. foliis confertis ſpathulatis obtuſis ciliatis in petiolum decurrentibus, pedunculis 1floris, petalis obovatis. *Atlas.*

ſedoides 78. S. caulibus caeſpitoſis erectiusculis, foliis lineari-lanceolatis acutis patulis ciliatis, pedunculis 1floris elongatis, petalis linearibus calycem aequantibus. *Alp. Europ. med.* (S. Hohenwarthii et Seguierii Sternb., trichoides Scop.)

planifolia Lapeyr. 79. S. caulibus caeſpitoſis, foliis imbricatis obovato-oblongis obtuſis glanduloſo-piloſis, petalis obovatis calycem ſuperantibus. *Alp. cott. pennin. grai. Pyren.* (S. tenera Suter.?)

†† *Foliis 3partitis.*

aphylla Sternb. 80. S. foliis cuneatis 3fidis integrisque glabris in petiolum decurrentibus, pedunculis elongatis 1floris, petalis linearibus calycem aequantibus. *Alp. carn. noric.*

muſcoides Wulff. 81. S. foliis cuneatis 3fidis integrisque linearibus obtuſiusculis glabris, caule paucifloro, petalis linearibus calycem aequantibus. *Alp. Europ.* (S. pygmaea Haw. Don., moſchata Engl. bot. atropurpurea Sternb., caeſpitoſa Hudſ., pyrenaica Vill.)

tricuſpidata Rottb. 82. S. foliis cuneatis 3cuſpidatis ciliatis confertis erectis, caule aſcendente foliato racemoſo, petalis lanceolatis calycem multo ſuperantibus. *Grönlandia: Terra nova.*

Chamiſſoi Sternb. 83. S. foliis radicalibus cuneatis cuſpidato-3fidis ciliatis, caulinis confertis lineari-lanceolatis integerrimis, caule aſcendente paucifloro, floribus minutis. *Inſ. Aleut.*

Pavonii Don. 84. S. foliis 3partitis acutis nervoſis, petiolis dilatatis ſubtus coſtatis, caule oligophyllo ſub-3floro glanduloſo-pubeſcente, laciniis calycinis lineari-lanceolatis acutis, petalis obovatis. *Alp. Peruv.*

andicola Don. 85. S. villoſiſſima denſiſſime caeſpitoſa, foliis radicalibus 3fidis acutis ſubtus 3nerviis, petiolis dilatatis, foliis ſuperioribus integris lanceolatis, floribus corymboſis, laciniis calycinis acutis, petalis obovatis. *Alp. Peruv.*

obtuſifida Don. 86. S. ſurculis lignoſis, foliis 3partitis linearibus obtuſiſſimis glabris rigidis petiolatis, caule ſub-5floro ſuperne pubeſcente, laciniis calycinis obtuſis, petalis obovatis. *Hiſpan.*

ciliaris Lapeyr. 87. S. caule caeſpitoſo, foliis ſparſis ciliatis, infimis ſpathulatis papilloſis, ſuperioribus cuneatis 3lobis, ſcapo ſubnudo, floribus capitatis, petalis obovatis calyce duplo longioribus. *Pyren.*

Schraderi Sternb. 88. S. caule folioſo paniculato piloſo, foliis longe petiolatis 3partitis, lobis lateralibus 2fidis linearibus, medio cuneato 3dentato, petalis calycem excedentibus. *Patria?*

ceratophylla Dryand. 89. S. ſurculis lignoſis rigidiſſimis glaberrimis, foliis ſub-3partitis carnoſis, laciniis anguſtiſſimis recurvo-mucronatis, caule glutinoſo paniculato, laciniis calycis viſcoſi recurvo-mucronatis, petalis oblongis obtuſis. *Hiſpania.* (S. 3furcata Schrad.)

moſchata Wulff. 90. S. pubeſcens caeſpitoſa, foliis confertis 3fidis baſi attenuatis, laciniis linearibus acutiusculis, cau-

caule erecto ſubcorymboſo, petalis lineari-oblongis calycem ſubſuperantibus. *Alp. carn. nor. rhaet. helvet. Pyren.* (S. caeſpitoſa Scop. exarata All., muſcoides et flaveſcens Sternb.)

tridactylites 91. S. radice annua, caule ramoſo glanduloſo-piloſo, foliis radicalibus ſpathulatis indiviſis, ſuperioribus 3fidis cuneatis, calycibus urceolatis petala ſubaequantibus. *Europ.*

††† *Foliis radicalibus 5fidis, ſuperioribus 3partitis.*

controverſa Sternb. 92. S. radice perenni, caule ſtricto ſubramoſo, foliis omnibus cuneiformibus ſeſſilibus glanduloſo-pubeſcentibus, infimis 5-ſuperioribus 3fidis, petalis nervoſis calycem longe ſuperantibus. *Alp. Europ.* (S. aſcendens L. petraea Gunn., hypnoides Scop.?)

laete-virens Don. 93. S. caeſpitoſa, foliis radicalibus 5-, reliquis omnibus 3partitis, laciniis linearibus acutis apice recurvis, ſummis indiviſis linearibus, caule glabro ſub-3floro, petalis ſpathulatis emarginatis. *Scotia. Hibernia.* (S. laevis Donn. affinis Don.)

leptophylla Perſ. 94. S. caeſpitoſa, ſurculis diffuſis procumbentibus, foliis radicalibus 5-reliquis 3partitis, laciniis lineari-lanceolatis cuſpidatis divaricatis, caule glabriuſculo multifloro, petalis ſpathulatis. *Helvetia. Cambria. Scotia.* (S. denudata Don.)

elongella Sm. 95. S. caule aſcendente breviuſculo, foliis radicalibus paucis 5fidis, plerisque 3partitis baſi attenuatis ciliatis, ſummis indiviſis confertis, laciniis ovatis mucronatis, pedunculis 1floris elongatis aphyllis rectis. *Scotia.*

hypnoides 96. S. caeſpitoſa procumbens gemmifera, foliis inferioribus 5-3partitis, ſuperioribus 3partitis vel indiviſis, laciniis linearibus cuſpidatis ciliatis, caule paucifloro ſuperne pubeſcente, laciniis calycinis cuſpidatis. *Europ. omnis.* (S. condenſata et ſponhemica C. C. Gmel. varr.)

globulifera Desf. 97. S. caeſpitoſa gemmifera, foliis inferioribus 5-3partitis, laciniis lanceolatis ariſtatis, petiolis ciliatis, floribus paniculatis, laciniis calycinis obtuſis. *Atlas.*

petraea 98. S. caule erecto ramoſo glanduloſo-piloſo, foliis omnibus nervoſis hirſutiuſculis apice dilatatis, lobis late ovatis acutiuſculis, radicalibus petiolatis 5lobo-palmatis, ſuperioribus 3fidis ſeu indiviſis, pedunculis 1floris viſcidis, laciniis calycinis linearibus acutis, petalis obovatis ſubemarginatis. *Alp. rhaet. lepont. carn.* (S. rupeſtris W., Ponae Sternb.)

exarata Vill. 99. S. caule erecto viſcoſo-pubeſcente, foliis inferioribus 5-ſuperioribus 3partitis, laciniis linearibus obtuſis ſupra ſulcatis, caule multifloro, laciniis calycinis obtuſis. *Pyrenaei. Delphinat. Alp. cott. grai. Caucaſ. Terra Nova.* (S. nervoſa, mixta, intricata et 5dactylis Lapeyr., hypnoides All., pubeſcens Poir., caeſpitoſa Vill., pulchella Don.?)

Bonplandii Don. 100. S. caule erecto ramoſo folioſo glanduloſo-piloſo, foliis 5fidis 3fidisque, laciniis linearibus obtuſis, floribus ſubſeſſilibus aggregatis, laciniis calycinis lanceolatis. *Alp. peruv.* (S. peruviana Bonpl. in Sternb., andicola Kunth.)

ſtellata Don. 101. S. caule abbreviato caeſpitoſo glanduloſo-pubeſcente 2floro, foliis denſe imbricatis appreſſis 5-3fidis, laciniis linearibus obtuſis carnoſis, laciniis calycinis ovatis acutis. *Alp. peruv.*

platypetala Sm. 102. S. caule aſcendente villoſo, foliis 5-3partitis, laciniis linearibus patentibus mucronatis, pedunculis elongatis ſubcorymboſis foliatis, petalis amplis ſuborbiculatis. *Cambria. Scotia.*

caeſpitoſa 103. S. villoſiſſima, foliis radicalibus aggregatis, ſuperioribus ſeſſilibus cuneatis 5-3fidis, laciniis foliorum calycisque oblongis obtuſiusculis, caule paucifloro, petalis obovatis. *Europ.* (S. grönlandica L., decipiens Ehrh., petraea Roth., palmata Sm., hirta Donn. Sm., villoſa W.)

latifida Don. 104. S. glaberrima, caule erecto multifloro, foliis omnibus late cuneatis 5-3fidis, laciniis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis ſub-2floris, calycibus glabris, petalis ſpathulatis. *Hiſpania.*

incurvifolia Don. 105. S. glabriuscula dein villoſa, foliis radicalibus 5-ſuperioribus 3fidis, laciniis lanceolatis obtuſis incurvis, caule ſub-3floro, calycibus glanduloſo-piloſis acutis, petalis ſubrotundis emarginatis. *Hibernia. Norvegia?* (S. caeſpitoſa fl. dan. 1388.?)

Sternbergii W. 106. S. glabra, foliis radicalibus palmatis 5-ſuperioribus 3partitis, laciniis ovatis acutis, caule ſubcorymboſo ſuperne glanduloſo-piloſo, laciniis calycinis ovatis mucronatis, petalis obovatis. *Franconia.* (S. palmata Panz., 3dentata Don.)

†††† *Foliis omnibus 5fidis ſ. multifidis.*

exilis Steph. 107. S. foliis radicalibus palmato-5lobis, caulinis bracteiformibus integerrimis, caule filiformi paucifloro, petalis calyce triplo longioribus. *Sibir.*

cuneata W. 108. S. glabra, foliis inferioribus longe petiolatis ſubrotundo-cuneatis 5lobis, lobis ovatis acutiusculis, ſummis linearibus integerrimis, caule paniculato, petalis oblongo-linearibus. *Hiſpania.* (S. cuneifolia Cav.)

ajugifolia 109. S. villoſo-viſcoſa, foliis omnibus longe petiolatis 5partitis, laciniis lanceolatis divaricatis recurvo-mucronatis ciliatis, caule ramoſo, petalis obovatis. *Alp. Europ. auſtr.*

pedatifida Ehrh. 110. S. villoſo-glutinoſa, foliis radicalibus longe petiolatis 3fido-pedatis, laciniis lineari-lanceolatis ſub-3fidis, panicula faſtigiata, laciniis calycinis mucronatis, petalis ſpathulato-linearibus. *Helvet. Pyren. Scotia. Hiſpania.* (S. ladanifera Sternb., dichotoma W. Sternb. varr.)

geranioides 111. S. piloſo-glutinoſa, foliis inferioribus longe petiolatis 3-5partito-pedatis, laciniis cuneatis in-

cifis obtufiusculis, floribus paniculatis, petalis oblongis calycem obtufiusculum fuperantibus. *Pyren.* (S. 5fida Lam.)

irrigua Fifch. 112. S. pilofiffima flaccida, foliis radicalibus longe petiolatis 3partitis cucullatis, laciniis bis 3partitis nervofis lanceolatis obtufis, caulinis palmatis feffilibus, floribus paniculatis, petalis fpathulato-linearibus calyces obtufos longe fuperantibus. *Tauria. Sibir.* (S. aquatica M. B. petraea Pall.)

aquatica Lapeyr. 113. S. glandulofo-pubefcens, foliis 3-5partitis in petiolum attenuatis, laciniis cuneatis acutiusculis multifido-incifis, floribus paniculatis, petalis obovatis ftriatis calycem fubfuperantibus. *Pyren.* (S. petraea Gouan., afcendens Vahl.)

pedemontana All. 114. S. glutinofo-pilofa, foliis aggregatis cuneatis 5-3fidis, laciniis fub-trifidis lanceolatis fulcatis, floribus corymbofis, laciniis calycinis linearibus elongatis. *Alp. grai. carn. dinar.* (S. cymofa Kit., heterophylla Sternb. Allionii Baumgart.)

maderenfis Don. 115. S. glandulofo-pilofa fuffruticofa, foliis confertis longe petiolatis cuneiformibus palmatis inaequaliter incifis, laciniis foliorum calycisqua ovatis acutis, caule paucifloro. *Madera.*

Stephaniana Sternb. 116. S. foliis petiolatis palmato-multilobis, caule foliofo pilofo, petalis calycem fuperantibus. *Sibir.*

† *uniflora* Sternb. 117. S. foliis fub-7fidis cuneatis, lobis obtufis, caule foliofo unifloro, petalis calycem fuperantibus. *Suevia.*

1695. GYPSOPHILA.

* *Floribus fparfis.*

† *grandiflora* Poir. 1. G. caule tereti glabro, foliis lineari-fubulatis fubhirfutis, inferioribus fafciculatis, panicula pauciflora, petalis emarginatis. *Patria?*

Vaccaria Sm. 2. G. caule tereti glabro, foliis ovato-lanceolatis connatis, floribus corymbofis, calycibus pyramidatis laevibus, petalis emarginatis erofis. *Europ. med. et auftr. Ind. or.* (Saponaria L., S. perfoliata Roxb. W.)

elegans M. B. 3. G. caule paniculato, ramis dichotomis fubdivaricatis foliisque lanceolatis fubcarnofis glabris, pedicellis filiformibus, petalis emarginatis calyce duplo longioribus, radice annua. *Caucaf.*

vifcofa Murr. 4. G. caule dichotomo, ramis medio vifcofis, foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus laevibus, petalis retufis calyce obtufo longioribus, radice annua. *Afia minor.*

dichotoma Beff. 5. G. caule dichotomo, ramis compreffis paniculato-faftigiatis, foliis linearibus carinatis connatis, petalis oblongis patentibus calyce obtufiusculo duplo longioribus, ftylis ftamina aequantibus. *Galicia. Sibiria.* (G. dubia W. fuppl.)

altiſſima 6. G. caule dichotomo, ramis patentibus diffuſis viſcoſis, foliis oblongo-lanceolatis nervoſis amplexicaulibus, petalis exiguis ſtamina aequantibus. *Sibir.*

ſabuloſa Stev. 7. G. caule dichotomo baſi pubeſcente, ramis paniculae viſcoſis. petalis oblongis calyces acutos multo ſuperantibus, foliis lanceolatis amplexicaulibus 3nerviis villoſiuſculis. *Tauria. Caucaſ.* (G. perfoliata M. B.)

perfoliata 8. G. caule laevi paniculato, paniculae ramis umbellatis, foliis oblongo-lanceolatis nervoſis, petalis retuſis calyces ſuperantibus. *Aſia minor.*

acutifolia Fiſch. 9. G. caule paniculato, panicula trichotoma villoſo-viſcoſa, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſub-3nerviis, petalis emarginatis calycem ſtaminaque longe ſuperantibus. *Caucaſ.*

glauca Stev. 10. G. caule diffuſo paniculato, ramis divaricatis pubeſcentibus viſcoſis, foliis lineari-lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis glaucis, petalis ſpathulatis integris. *Caucaſ. Armenia. Aſia minor.* (G. repens M. B., Stevenii Fiſch., armerioides Ser.)

repens 11. G. radice repente, caule erecto paniculato, pedunculis 2floris, petalis emarginatis ſtamina ſuperantibus, foliis lineari-lanceolatis glaucis ſecundis. *Europ. med. auſtr. Sibir.* (G. rigida L.)

paniculata 12. G. caule erecto ramoſo, ramis paniculae divaricatis filiformibus pubeſcentibus 1floris, floribus dioecis exiguis, calycibus obtuſiuſculis, petalis revolutis, foliis linearibus margine villoſiuſculis. *Sicil. Sibir.*

aſcendens Jacqu. 13. G. caule aſcendente paniculato, pedunculis filiformibus laevibus divaricatis, calycibus obtuſiuſculis petala ſtaminaque aequantibus, foliis lanceolato-linearibus. *Patria?*

proſtrata 14. G. caulibus diffuſis, panicula trichotoma brachiata, ſtylis petala obtuſa longe excedentibus, foliis lanceolatis laevibus. *Aſia med.* (G. theſiifolia Ser.)

Rokeika Delil. 15. G. caule dichotomo ramoſiſſimo, ramis divaricatis filiformibus glabris 1floris, petalis ſubtus colorato-ſtriatis genitalia aequantibus, foliis radicalibus ovatis ſuperioribus linearibus abbreviatis. *Aegypt.*

cretica Sm. 16. G. caule ramoſo dichotomo villoſiuſculo, foliis lineari-ſubulatis glabris patentibus, pedunculis 1floris ſtrictis, petalis lanceolatis calycem excedentibus. *Creta.* (Saponaria L.)

illyrica Sm. 17. G. caule ſtricto ramoſo pubeſcente, foliis linearibus acutis erectis, calycibus viſcoſo-villoſiuſculis, petalis ſpathulatis baſi punctatis. *Dalmatia. Sicilia. Inſ. maris aegei.* (Saponaria L.)

ochroleuca Sm. 18. G. caule dichotomo, ramis divaricatis, foliis lineari-ſubulatis flaccidis, petalis ſpathulatis baſi punctatis. *Attica.*

thymifolia Sm. 19. G. caule diffuſo ſubdichotomo, foliis ſpathulatis utrinque tomentoſis, petalis obovatis. *Parnaſſus.*

compreſſa Desf. 20. G. caule erecto, ramis compreſſis glabris, foliis lineari-lanceolatis rigidulis, calycibus viſcoſo-pubeſcentibus, petalis ſpathulatis. *Afric. bor.*

graminea Sm. 21. G. caule nudiuſculo paniculato paucifloro, calycibus pubeſcentibus, petalis emarginatis, foliis radicalibus aggregatis linearibus margine ſpinuloſo-ſcabris. *Peloponneſ.*

tenuifolia M.B. 22. G. caule gracili paniculato, foliis radicalibus linearibus aggregatis, caulinis ſubulatis, petalis obovatis emarginatis genitalia calycemque duplo ſuperantibus. *Caucaſ.*

muralis 23. G. caule dichotomo paniculato, pedunculis 1floris capillaribus, petalis crenatis, foliis lineari-ſubulatis abbreviatis. *Europ.* (G. ſerotina Heyn.)

Saxifraga 24. G. caule ramoſiſſimo, ramis angulatis 1floris, calycibus baſi ſquamatis, foliis linearibus ſtrictis. *Europ. med.* et *auſtr.* (Dianthus ſaxifragus L. ſp. 1. filiformis Lam. G. multicaulis Poir.)

** *Floribus faſciculatis, capitatis.*

faſtigiata 25. G. caulibus caeſpitoſis ſtrictis, foliis linearibus obtuſis glabris ſubſecundis, pedunculis corymboſis viſcoſo-pubeſcentibus, floribus aggregatis, genitalibus exſertis. *Germania med. Boruſſ. Suecia. Hungar. Transſylvan. Sibir.* (G. arenaria Kit. var.)

collina Stev. 26. G. caule ramoſo, foliis linearibus acutis ſcabriuſculis, pedunculis corymboſis laevibus, floribus aggregatis, calycibus obtuſiuſculis, ſtaminibus exſertis. *Podolia. Beſſarabia.*

Struthium 27. G. caule baſi ſuffruticoſo ſimpliciuſculo ſcabro, foliis linearibus acutis ſemiteretibus ſubfaſciculatis, floribus faſciculatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Hiſpania. Tauria.* (G. capitata M. B.?)

capitata Pall. 28. G. caule baſi ſuffruticoſo ramoſiſſimo, ramis dichotomis ſcabris compreſſo-angulatis, floribus capitatis involucratis, ſtaminibus exſertis, foliis lanceolatis glabris. *Aſia med.*

glomerata Pall. 29. G. caule herbaceo ſtricto ſimplici, foliis linearibus acutis carinatis ſcabris elongatis, floribus capitatis, bracteis ſcarioſis. *Tauria. Caucaſ.*

dianthoides Sm. 30. G. caule baſi ſuffruticoſo ſimplici ſtricto compreſſo, foliis linearibus anguſtiſſimis margine ſcabris flaccidis, floribus glomeratis, bracteis lineari-ſubulatis elongatis. *Creta.*

ocellata Sm. 31. G. caule diffuſo, foliis ſpathulatis utrinque tomentoſis, floribus capitatis, petalorum laminis ovatis zona notatis. *Euboea.*

*hirſuta** 32. G. caule aſcendente paucifloro, floribus ſubcapitatis ſeſſilibus, calycibus foliiſque lanceolatis hirtis, petalis integerrimis. *Syria.* (Saponaria Labill.)

1696. SAPONARIA.

* *Floribus aggregatis.*

officinalis 1. S. floribus fasciculato-corymbosis, calycibus glabris, petalis fauce coronatis, foliis oblongis nervosis laevibus. *Europ. omnis.*

glutinosa M. B. 2. S. floribus fasciculato-corymbosis, calycibus glanduloso-hispidis viscosis striatis, petalis fauce coronatis apice 2dentatis, foliis ovatis nervosis. *Tauria.*

elegans Lapeyr. 3. S. floribus corymbosis, calycibus villosis, petalis emarginatis fauce coronatis, caule nudiusculo, foliis linearibus glabris subintegerrimis. *Pyren.* (S. caespitosa Cand.)

depressa Bivon. 4. S. floribus maximis subternis, calycibus cylindrico-subangulatis viscido-pubescentibus, petalis 2fidis fauce coronatis, foliis subspathulatis mucronatis glabris margine cartilagineo-ciliatis, radice lignosa. *Aetna* et *montes nebrod. Sicil.* (S. sicula Rafin.)

prostrata W. 5. S. floribus confertissimis corymbosis, calycibus glanduloso-hirsutis, caule prostrato, ramis ascendentibus, foliis spathulatis ciliatis. *Asia minor.*

lutea 6. S. floribus subcapitatis involucratis, calycibus lanatis, petalis obovatis integerrimis, caulibus caespitosis diphyllis, foliis radicalibus lineari-lanceolatis ciliatis. *Alp. cott. grai. pennin.*

bellidifolia Sm. 7. S. floribus dense capitatis involucratis, calycibus hirtis, petalis linearibus emarginatis, caule erecto 2phyllo, foliis spathulatis mucronatis. *Calabriae montes.*

** *Floribus solitariis.*

ocimoides 8. S. pedunculis axillaribus terminalibusque erectis, calycibus villosis, petalis spathulatis integerrimis, caule procumbente dichotomo, foliis subellipticis utrinque attenuatis basi ciliatis. *Europ. austr.*

orientalis 9. S. pedunculis axillaribus erectis, calycibus glanduloso-hirsutis, petalis emarginatis fauce nudis, caule dichotomo glabriusculo, foliis oblongis utrinque attenuatis sub-3nerviis. *Carniolia. Asia minor.*

porrigens 10. S. pedunculis axillaribus capillaribus fructiferis elongatis cernuis, calycibus viscido-hirsutis, petalis emarginatis fauce nudis, caule erecto ramoso villosissimo, foliis lanceolatis acuminatis nervosis. *Asia minor.*

caespitosa Sm. 11. S. caule nudiusculo simplici 1floro, calycibus clavatis glabris, floribus radicalibus spathulatis aggregatis. *Euboea.*

1697. DIANTHUS.

**Floribus aggregatis.*

† Suffruticosi.

arboreus 1. D. floribus fasciculatis, calycis squamis quaterna serie imbricatis appressis brevissimis acutiusculis, petalis dentatis subbarbatis longe unguiculatis, foliis linearibus carnosis obtusiusculis connatis. *Creta.*

fruticosus 2. D. floribus fasciculatis, calycis squamis quaterna serie imbricatis acutis, petalorum unguibus calyces aequantibus, foliis spathulatis obtusis. *Ins. maris aegei.*

rupicola Bivon. 3. D. floribus subaggregatis bracteatis, calycis squamis triplici serie imbricatis cuspidatis ciliatis subappressis, petalis dentatis barbatis, foliis linearibus glaucis rigidis connatis. *Sicilia. Calabria.* (D. Bisignani Tenor.)

giganteus Urvill. 4. D. floribus congesto-capitatis bracteatis, calycis squamis quaternis acutis tubo duplo brevioribus, petalis crenatis, foliis linearibus elongatis connato-vaginantibus. *Moesia infer.*

juniperinus Sm. 5. D. floribus subcorymboso-aggregatis, calycis squamis subquaternis obovatis aristatis tubo duplo brevioribus, petalis inciso-crenatis, foliis subulatis pungentibus. *Creta.* (D. aciphyllus Sieber.)

pinifolius Sm. 6. D. floribus capitatis bracteatis, bracteis obcordatis aristatis capitulum aequantibus, calycis squamis bracteiformibus tubo brevioribus, foliis subtriquetro-setaceis. *Thracia. Lemnos.*

suffruticosus W. 7. D. floribus subaggregatis, calycis squamis ovato-oblongis mucronatis tubo triplo brevioribus, petalis dentatis barbatis, foliis lineari-lanceolatis cauleque scabris. *Patria?*

spinosus Desf. 8. D. floribus capitatis sessilibus, calycis squamis obtusis tubum aequantibus, petalis linearibus, foliis subulatis spinescentibus. *Persia.*

†† Herbacei.

Libanotis Labill. 9. D. floribus aggregatis, calycis squamis senis acuminatis patentibus tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis. *Libanus.*

collinus Kit. 10. D. floribus aggregatis, calycis squamis ovato-lanceolatis cuspidatis patulis tubo brevioribus, petalis dentatis barbatis subtus discoloribus, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis cauleque scabris. *Europ. austr.* (D. scaber Schleich. asper W., umbellatus Cand., serratus Lapeyr., ruthenicus Röm. W., patens Horn., montanus M. B., discolor Sims. varr.)

Armeria 11. D. floribus fasciculatis, calycis squamis lanceolatis subulatis tubum aequantibus foliisque lineari-lanceolatis hirsutiusculis, petalis crenatis imberbibus. *Europ. Amer. bor.* (D. armerioides Rafin. carolinianus Walt.)

Pſeudarmeria M. B. 12. D. floribus aggregato-faſciculatis, calycis ſquamis ovato-ſubulatis tubum ſuperantibus foliisque lineari-lanceolatis aſperis, petalis crenatis barbatis. *Tauria.*

corymboſus Sm. 13. D. floribus aggregatis, calycis ſquamis lanceolatis villoſis tubo brevioribus, ramis divaricatis pubeſcentibus. *Aſia minor.*

barbatus 14. D. floribus aggregato-faſciculatis, calycis ſquamis lanceolatis ſubulatis calycem aequantibus, petalis dentatis barbatis, foliis lanceolatis nervoſis. *German. et Gallia auſtr.* (D. latifolius W., aggregatus Poir.)

chinenſis 15. D. floribus ſubaggregatis, calycis ſquamis lanceolatis cuſpidatis tubum aequantibus erecto-patulis, foliis lato-lanceolatis. *China.* (D. pulchellus Schrad. var.)

Fiſcheri * 16. D. floribus aggregato-corymboſis, calycis ſquamis ovatis cuſpidatis erectis calyce colorato brevioribus, petalis dentato-fimbriatis ſubimberbibus, foliis lanceolatis ſerrulatis. *Ruſſia auſtr.*

japonicus Thb. 17. D. floribus aggregatis, calycis ſquamis lanceolatis ariſtatis ciliatis tubo brevioribus, petalis crenatis, foliis ovatis glabris enerviis. *Japon.*

Carthuſianorum 18. D. floribus ſubcapitato-faſciculatis involucratis, calycis ſquamis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, petalis crenatis rotundatis barbatis, foliis linearibus nervoſis. *Europ. Aſia minor.* (D. atrorubens All.)

ferrugineus 19. D. floribus faſciculatis involucratis, calycis ſquamis ariſtatis tubum aequantibus, petalis bifidis, laciniis 3dentatis, foliis linearibus ſubtus carinatis. *Calabria.*

atrorubens M. B. 20. D. floribus faſciculato-capitatis involucratis, involucro ovato ariſtato ſubſcarioſo capitulum aequante, calycis ſquamis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, foliis linearibus glaucis. *Tauria. Caucaſ.* (D. capitatus Cand.)

polymorphus M. B. 21. D. floribus faſciculatis, calycis ſquamis ſcarioſis ovatis abbreviatis, petalis anguſtis dentatis villoſis, foliis linearibus acuminatis ſcabris. *Hungar. Transſylvan. Ruſſia auſtr.* (D. diutinus Kit.)

prolifer 22. D. floribus aggregato-capitatis, calycis ſquamis ovato-oblongis tubum ſuperantibus, petalis emarginatis, foliis linearibus ſerrulatis. *Europ. Aſia med.* (D. diminutus L.)

** *Floribus ſparſis.*

† *Petalis dentatis, crenatis.*

Caryophyllus 23. D. calycis ſquamis quaternis breviſſimis ovatis mucronatis, petalis imberbibus, foliis linearibus canaliculatis glaucis. *Gallia bor. Anglia. Italia.* (D. corſicus Link., clavatus *, longicaulis Tenor., grandiflorus Poir. Arroſti Presl. varr.)

crenatus Thb. 24. D. caule ramoſo, ramis ſub-1floris, calycis ſquamis ſubſenis lanceolatis acutis appreſſis tubo elongato brevioribus, petalis cuneatis inciſo-ſerratis imberbibus, foliis linearibus anguſtiſſimis patentiſſimis ſcabris. *C. B. S.*

pallidiflorus Ser. 25. D. caule ramoſiſſimo laevi, ramis elongatis 1floris, calycis ſquamis ovato-lanceolatis cuſpidatis tubo brevioribus, petalis crenatis barbatis, foliis ſubulatis rectis margine ſcabris. *Ad Volgam et Tanaim.* (D. pallens M. B. ramoſiſſimus Poir.)

diffuſus Sm. 26. D. caule diffuſo glabriuſculo, floribus ſubcorymboſis, calycis ſquamis mucronatis tubo duplo brevioribus. *Cyprus.*

longiflorus Lam. 27. D. caule ſuffruticoſo, ramis multifloris, calycis ſquamis ſubquaternis lanceolatis cuſpidatis tubo triplo brevioribus, petalis longe unguiculatis ſerratis ſubbarbatis, foliis lineari-ſubulatis margine ſcabris. *Gallia auſtr. orient. Hiſpania. Luſitania.* (D. attenuatus Sm., inodorus Gärtn., luſitanicus Brot., hirtus Vill.)

pallens Sm. 28. D. caule paniculato multifloro, calycis ſquamis ovatis acuminatis abbreviatis, petalis inciſo-ſerratis, foliis laxis acutis. *Aſia minor. Macedonia.*

nazaraeus Clark. 29. D. caule ramoſo, ramis 1floris, calycis ſquamis ovatis acutis appreſſis tubo dimidio brevioribus, petalis dentatis, foliis elongatis lineari-ſubulatis 3nerviis margine ſcabris. *Palaeſtina.*

divaricatus Urv. 30. D. caule ramoſo divaricato, ramis ſtrictis 1floris, calycis ſquamis quaternis ſcarioſis ſubulatis patulis tubo apice attenuato ſubbrevioribus, petalis ſerratis punctatis, foliis lineari-ſubulatis flaccidis. *Inſ. Samos. Cyprus.* (D. tripunctatus Sm.)

pubeſcens Sm. 31. D. viſcido-pubeſcens, ramis ſub-1floris, calycis ſquamis ovato-ſubulatis tubo ſtriato villoſo dimidio brevioribus, foliis laxis ſtriatis. *Inſ. maris aegei.*

deltoides 32. D. caule decumbente ramoſo ſcabro ſubpubeſcente, calycis ſquamis ſubbinis ovato-lanceolatis acutis, foliis linearibus pubeſcentibus, inferioribus obtuſiuſculis. *Europ. Japon.* (D. glaucus L. var.)

rigidus M. B. 33. D. caule ramoſiſſimo ſuffruticoſo, calycis ſquamis ovatis acutis breviſſimis appreſſis, petalis anguſtis dentatis, foliis lineari-ſubulatis patulis ſcabris. *Ad Volgam.*

campeſtris M. B. 34. D. caule paniculato pubeſcente, ramis erectis 1floris, calycis ſquamis lanceolatis acuminatis tubo brevioribus, petalis dentatis ſubtus discoloribus, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis hirſutiuſculis. *Podolia. Tauria.* (D. bicolor Adam.)

caucaſicus M. B. 35. D. caule ramoſo laevi, floribus ſubſeſſilibus, calycis ſquamis lanceolatis acuminatis erectis tubo duplo brevioribus, petalis dentatis ſubtus discoloribus, foliis linearibus ſubulatis margine ſca-

bris. *Caucaſ.* (D. ibericus W. Willdenowii Link.)

guttatus M. B. 36. D. caule paniculato laevi, calycis ſquamis lanceolatis cuſpidatis tubum aequantibus, petalis dentatis albo-maculatis, foliis linearibus ſubulatis nervoſis ſcabris. *Litus Ponti eux. inter Tyrae et Hypanis oſtia.*

pratenſis M. B. 37. D. caule ſuffruticoſo ramoſo glabro, calycis ſquamis exterioribus lanceolatis foliaceis tubum ſubaequantibus, interioribus ovatis brevibus, petalis dentatis ſubbarbatis, foliis lanceolatis inferioribus obtuſiuſculis ſub-3nerviis. *Ad Volgam.* (D. verſicolor Fiſch.)

furcatus Balb. 38. D. caule flexuoſo ſubramoſo paucifloro glabro, pedunculis 2fidis, calycis ſquamis exterioribus lanceolatis interioribus ovatis mucronatis remotiuſculis tubo brevioribus, petalis ſerratis, foliis linearibus elongatis laevibus. *Pedemont.* (D. geminiflorus Loiſ.?)

nitidus Kit. 39. D. caule paucifloro ſcabro, calycis ſquamis ovatis acutis erecto-appreſſis tubo brevioribus, petalis inciſo-ſerratis, foliis abbreviatis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis. *Carpathi. Alp. dinar.*

biflorus Sm. 40. D. caule ſtricto glabro paucifloro, floribus geminatis ſubpedunculatis, calycis ſquamis lanceolatis longe cuſpidatis patulis tubo brevioribus, petalis inciſo-ſerratis, foliis linearibus elongatis flaccidis margine ſcabris. *Hungar. Carniol. Italia ſuper. Euboea.* (D. furcatus Hornem. Hornemanni Ser., geminatus Kit. in lit.)

monadelphus Vent. 41. D. caule procumbente paucifloro, calycis ſquamis lanceolatis acuminatis patulis tubo brevioribus, petalis crenatis, foliis lanceolatis acuminatis glabris. *Syria.* (D. procumbens Perſ.)

incurvus Thb. 42. D. caule ramoſo, ramis incurvis, calycis ſquamis quaternis ovatis breviſſimis, petalis integris, foliis lineari-ſetaceis inferioribus elongatis ſuperioribus breviſſimis. *C. B. S.* (D. Burchellii Ser., albens Ait.)

pungens 43. D. caule paucifloro, floribus ſolitariis, calycis ſquamis breviſſimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petalis integris, foliis caeſpitoſis ſubulatis. *Hiſpan.* (D. hiſpanicus Aſſo.)

bicolor M. B. 44. D. caule paniculato, calycis ſquamis breviſſimis truncato-obtuſiſſimis mucronatis, petalis dilatatis crenatis ſubtus diſcoloribus, foliis lineari-ſubulatis nervoſis inferioribus tomentoſis. *Tauria. Thracia. Aſia minor. Peloponneſ.* (D. cinnamomeus Sm. emarginatus Ser.)

leptopetalus W. 45. D. caule paucifloro, calycis ſquamis breviſſimis ovatis acutis, petalis lineari-lanceolatis elongatis ſubintegerrimis, foliis ſubulatis. *Ad Volgam et Hypanim.* (D. pomeridianus M. B., cretaceus Adam., bicolor Hornem.)

pomeridianus 46. D. caule paucifloro, calycis ſquamis ſubbinis ovatis acutis breviſſimis, petalis calycem ſubae-

quantibus obtuſiſſimis ſubintegerrimis, foliis linearibus. *Palaeſtina.*

virgineus 47. D. caule paucifloro, calycis ſquamis obtuſiſſimis breviſſimis, petalis crenatis, foliis linearibus acuminatis. *Europ. auſtr.* (D. rupeſtris L.)

†† *Petalis multifido-laciniatis.*

ſuperbus 48. D. caule herbaceo multifloro glabro, calycis ſquamis ovatis mucronatis ſubappreſſis tubo multo brevioribus, petalis multifido-laciniatis fimbriatis baſi barbatis, foliis lanceolato-linearibus. *Europa a Transſylvania inde ad Lapponiam arcticam. Caucaſ.* (D. plumarius Gunn.)

proſtratus Jacq. 49. D. caule fruticoſo paniculato, calycis ſquamis lanceolatis tubo elongato triplo brevioribus, petalis fimbriatis imberbibus, foliis linearibus integerrimis. *C. B. S.*

fimbriatus M. B. 50. D. caule ſuffruticoſo ramoſo, ramis 1floris, calycis ſquamis ſenis lanceolatis calyce brevioribus, petalis oblongis dentato-fimbriatis imberbibus, foliis ſubulatis rigidis ſcabris. *Iberia. Sibiria.* (D. orientalis Sims. contortus Sm.)

monſpeſſulanus 51. D. caule herbaceo paucifloro, calycis ſquamis ovato-lanceolatis cuſpidatis tubo parum brevioribus erectis, petalis multifidis ſubimberbibus, foliis linearibus margine ſcabris. *Gallia auſtr. Italia ſuper.* (D. monspeliacus Cand. et plumoſus *.)

crinitus Sm. 52. D. caule herbaceo paucifloro, calycis ſquamis ovalibus mucronatis patulis tubo triplo brevioribus, petalis multifido-capillaribus imberbibus, foliis linearibus obtuſiuſculis laevibus. *Inſ. maris aegei. Cyprus.* (D. elegans Urv. ?)

ſuaveolens * 53. D. caule erecto glabro, floribus ſubcorymboſis, calycis ſquamis ovato-lanceolatis acutis erectis calyce brevioribus, petalis inciſo-multifidis barbatis maculatis, foliis lineari-lanceolatis glaucis margine ſcabris. *Patria?*

punctatus * 54. D. caule erecto paucifloro, calycis ſquamis quaternis obtuſis breviſſimis, petalis imberbibus multifidis punctatis, foliis linearibus glaucis laxis. *Patria?*

plumarius 55. D. caule erecto paucifloro, calycis ſquamis ovatis mucronatis breviſſimis appreſſis, petalis laciniato-multifidis barbatis, foliis linearibus glaucis margine ſcabris. *Helvet. Hungar. Transſylvan. Podolia.* (D. hortenſis Schrad. moſchatus Hortul. dubius Horn. varr.)

ſerrulatus Deſf. 56. D. caule erecto paucifloro, pedunculis ſquamatis, calycis ſquamis imbricatis ovatis mucronatis appreſſis, petalis laciniato-multifidis imberbibus, foliis lineari-lanceolatis ſerrulatis. *Afric. boreal.*

*** *Caule unifloro.*

† *Petalis dentatis.*

ſylvaticus Hopp. 57. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis imbricatis ovatis acutis appreſſis, petalis dilatatis inaequaliter dentatis barbatis, foliis linearibus margine ſcabris. *German. med.*

ſylveſtris Wulff. 58. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis imbricatis ovatis acutis appreſſis, petalis dilatatis denticulatis imberbibus, foliis confertis ſubulatis rigidis. *Alp. noric. carn. dinar.*

repens W. 59. D. radice repente, caule ſimpliciſſimo 1floro, calycis ſquamis binis ovatis acuminatis patulis tubum ſubaequantibus, petalis longe unguiculatis dentatis imberbibus. *Sibir.*

caeſius Sm. 60. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis ovatis acutiusculis brevibus appreſſis, petalis duplicato-crenatis barbatis, foliis lineari-lanceolatis glaucis ſerrulatis obtuſiusculis. *Anglia. German. med.* (D. glaucus Hudſ. ſuavis W.)

caeſpitoſus Thunb. 61. D. caule 1floro glabro, calycis ſquamis quaternis lanceolatis acutis tubo duplo brevioribus, petalis ſubintegerrimis, foliis faſciculatis lineari-3gonis ſcabris. *C. B. S.*

ſcaber Thunb. 62. D. caule 1floro ſcabro-pubeſcente, calycis ſquamis quaternis ovato-lanceolatis tubo dimidio brevioribus, petalis abbreviatis crenatis, foliis lineari-ſubulatis villoſis ſubſerrulatis. *C. B. S.* (D. micropetalus Ser.)

bracteatus W. herb. 63. D. caule ſub-1floro glabro, calycis ſquamis ovato-acuminatis tubo ſubbrevioribus, petalis crenatis imberbibus, foliis ſubulatis ſtrictis margine ſcabris. *Armenia.* (D. petraeus M. B. Liboſchizianus Ser.)

ſerratifolius Sm. 64. D. radice lignoſa, caule 1floro, calycis ſquamis quaternis, petalis dentatis imberbibus, foliis ſerratis pungentibus. *Attica.*

ſtrictus Sm. 65. D. caule 1floro, calycis ſquamis quaternis, petalis crenatis imberbibus, foliis planis obtuſiusculis margine ſcabris. *Athos mons.*

gracilis Sm. 66. D. caule 1floro, calycis ſquamis ſubſenis mucronatis, petalis crenatis barbatis, foliis acuminatis margine ſcabris. *Athos mons.*

leucophaeus Sw. 67. D. caule 1floro, calycis ſquamis quaternis, petalis 3dentatis imberbibus, foliis ovato-lanceolatis baſi 5nerviis. *Olympus Aſiae minor.*

alpinus 68. D. caule 1floro abbreviato folioſo, calycis ſquamis exterioribus foliaceis tubum ſubaequantibus, petalis crenatis, foliis linearibus obtuſiusculis. *Alp. Europ. Sibir.* (D. glacialis Hänk. var. foliis acutiusculis.)

pumilus Vahl. 69. D. ſcapo breviſſimo 1floro, calycis ſquamis oblongis acuminatis exterioribus brevioribus, petalis dentatis, foliis radicalibus linearibus acutis glabris. *Arabia.* (D. 1florus Forsk.)

multipunctatus Ser. 70. D. caule ſtricto ſub-1floro elongato, calycis verrucoſi punctati ſquamis ovatis cuſpidatis tubum aequantibus, petalis 3-4dentatis barbatis maculatis, foliis linearibus acutis longiſſimis. *Inſ. Cos.* Urville.

† *purpureus* Lam. 71. D. caule ſub-1floro, calycis abbreviati ſquamis lanceolatis acutis tubo dimidio brevioribus, petalis integerrimis, foliis linearibus acutis glaucis ciliolatis. *Patria?*

†† *Petalis fimbriatis.*

alpeſtris Sternb. 72. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis cuſpidatis tubo triplo brevioribus, petalis fimbriatis ſubbarbatis, foliis linearibus glabris. *Loca alpeſtr. German. auſtr. Sicilia?* (D. ſiculus Presl.)

petraeus Kit. 73. D. caule ſub-1floro, calycis elongati ſquamis ovatis cuſpidatis appreſſis tubo brevioribus, petalis multifidis imberbibus, foliis ſubulatis rigidis patentiſſimis glabris. *Hungar. Transſylvan. Arvernia?* (D. ſaxatilis Perſ. ?)

fragrans M. B. 74. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis mucronatis appreſſis tubo triplo brevioribus, petalis inciſo-ſerratis imberbibus, foliis lineari-ſubulatis rigidulis ſcabriuſculis. *Caucaſ.*

ſquarroſus M. B. 75. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis breviſſimis, petalis multifidis, foliis ſubulatis canaliculatis abbreviatis recurvis. *Ad Volgam.* (D. arenarius Pall. Muſſini Hornem.)

arenarius 76. D. caule 1floro, calycis ſquamis ovatis obtuſiuſculis, petalis lacero-multifidis barbatis, foliis linearibus ſubciliatis. *Europ.* (D. praecox W., dubius Hornem., gallicus Cand.)

ſerotinus Kit. 77. D. caule ſub-1floro, calycis ſquamis ovatis acutiuſculis appreſſis abbreviatis, petalis multifidis imberbibus, foliis linearibus abbreviatis glaucis. *Hungar. Transſylvan.*

1698. TRIANTHEMA.

* *Decandra.*

triquetrum W. 1. Tr. caule herbaceo dichotome ramoſo, ramis compreſſo-3quetris, foliis ſubſpathulatis petiolatis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Ora Coromandel.*

decandrum 2. Tr. caule herbaceo ramoſo, foliis oblongis petiolatis, floribus axillaribus pedunculatis aggregatis. *Ind. or.* (Zaleya Burm.)

humifuſum Thunb. 3. Tr. caule ſuffruticoſo proſtrato ramoſo, foliis lanceolatis acutis, floribus axillaribus breviter pedunculatis. *C. B. S.*

anceps Thunb. 4. Tr. caule fruticoſo, ramis ancipitibus, foliis lanceolatis acuminatis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

fruticosum Vahl. 5. Tr. caule fruticoso, ramoso, ramis articulatis, foliis sessilibus teretibus mucronatis, floribus terminalibus sessilibus semi-10andris. *Aegypt.* (Gymnocarpus Forsk. Delil.)

** *Pentandra.*

pentandrum 6. Tr. caule erecto herbaceo, foliis ellipticis integerrimis, floribus axillaribus subsessilibus congestis. *Arabia.* (Rocama Forsk.)

monogynum 7. Tr. caule prostrato herbaceo, foliis subrotundis obtusis petiolatis, altero minori, floribus axillaribus aggregatis pedunculatis 1gynis. *Aegypt. Ind. occid.*

crystallinum Vahl. 8. Tr. caule fruticoso procumbente, foliis ovalibus petiolatis ramisque papulosis, floribus axillaribus 1gynis. *Arabia. Ind. orient.* (Papularia Forsk.)

1699. SCLERANTHUS.

perennis 1. Scl. calycibus fructiferis clausis obtusis marginatis, caule antherisque glabris, radice perenni. *Europ.*

hirsutus Presl. 2. Scl. calycibus fructiferis conniventibus obtusis, caule pubescente, antheris hirsutis, radice annua. *Aetna.*

annuus 3. Scl. calycibus fructiferis patulis acutis inermibus. *Europ. Amer. bor.* (Scl. polycarpos L.)

pungens R. Br. 4. Scl. calycibus fructiferis patentibus semi-10andris, foliis 3quetris subulatis pungentibus asperis. *Nov. Holl.*

diandrus R. Br. 5. Scl. calycibus fructiferis erectis diandris, foliis carinatis subulatis glabriusculis. *Terra Diemen.*

1700. CHRYSOSPLENIUM.

alternifolium 1. Chr. foliis alternis. *Europ. Japon.*

oppositifolium 2. Chr. foliis oppositis. *Europ.* (Chr. repens Link.)

1701. PACHYNEMA R. Br.

complanatum R. Br. *Nov. Holl. bor.* Suffrutex ramosus, ramis dichotomis compressis aphyllis, floribus lateralibus subsolitariis pedicellatis, bractea squamaeformi sub pedicello.

TRIGYNIA.

1702. BEMBIX Lour.

tectoria Lour. *Cochinchina.* Frutex scandens ramosus, foliis oppositis obovatis petiolatis coriaceis amplis, floribus terminalibus racemosis pallidis.

1703. DEUTZIA Thunb.

scabra Thb. *Japon.* Arbor ramosissima, foliis oppositis ovato-oblongis acuminatis stellato-hirsutiusculis serrulatis, floribus terminalibus paniculatis albis.

1704. MALPIGHIA.

* *Foliis glabris.*

† *Pedunculis axillaribus uni-multifloris.*

coccifera 1. M. foliis subovatis spinoso-dentatis nitidis venosis, pedunculis axillaribus solitariis medio bracteatis. *Ind. occ.*

punicifolia 2. M. foliis oblongis acutiusculis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus aggregatis, ramis tuberculosis. *Cayenn.*

biflora Poir. 3. M. foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis, pedunculis 2floris. *Amer. austr.* (M. punicifolia Cav.)

Berteriana * 4. M. foliis obovatis subemarginatis membranaceis opacis, pedunculis axillaribus aggregatis sub-1floris. *Guadalupa.* Bertero.

glabra 5. M. foliis ovato-oblongis acutiusculis integerrimis opacis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Amer. tropic.*

† *faginea* Sw. 6. M. foliis ovato-oblongis acuminatis subtus sericeo-nitidis, pedunculis axillaribus 3partito-umbellatis. *Ins. Carib.*

†† *Floribus racemosis.*

spicata Cav. 7. M. foliis lanceolatis integerrimis supra nitidis subtus ferrugineis glabris, racemis terminalibus spicatis ferrugineo-subvillosis. *Ins. Carib.*

densa Poir. 8. M. foliis ovato-lanceolatis coriaceis utrinque lucidis, racemis dense spicatis, pedicellis pilosis. *Guiana.*

coriacea Sw. 9. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis supra lucidis subtus opacis concoloribus, racemis terminalibus spicatis ferrugineis. *Jamaica.*

brachystachya * 10. M. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glabris, racemo terminali spicato abbreviato rufo-velutino. *Brasil.* (Byrsonima Cand.)

guadalupensis * 11. M. foliis elliptico-oblongis integerrimis supra nitidis subtus ferrugineis glabris, racemis terminalibus laxe corymbosis. *Guadalupa.* Bertero.

reticulata Poir. 12. M. foliis oblongis utrinque subattenuatis reticulatis supra nitidiusculis, racemis terminalibus paniculatis, pedicellis superioribus reflexis, bracteis pedicellatis ovatis. *Cayenn. Cuba.* (Byrsonima spicata Pöppig.)

pallida Poir. 13. M. foliis ovatis coriaceis supra lucidis, racemis spicatis glabris. *Cayenn.*

† *volubilis* Sims. 14. M. foliis oblongis acuminatis glaberrimis, ramis volubilibus tuberculatis, racemis corymbofis terminalibus. *Ind. occ.*

mollis Poir. 15. M. foliis ovato-oblongis coriaceis laevibus, racemo paniculato abbreviato glabro. *Cayenn.*

elegans Meyer. 16. M. foliis oblongo-lanceolatis membranaceis glaberrimis, racemis elongatis nutantibus, pedicellis glandulofis. *Surinam.*

lucida Sw. 17. M. foliis obovatis eveniis nitidis, racemis terminalibus corymbofis. *Ind. occ.*

laevigata Poir. 18. M. foliis fpathulatis fupra opacis fubtus ferrugineis glabris, racemis terminalibus fimplicibus glabris. *Cayenna. Guadalupa.* Bertero.

*coccolobaefolia** 19. M. foliis fubcordato-rotundis obtufis feffilibus, racemis fimplicibus glabris. *Caracas.* (Byrfonima Kunth.)

pruinofa * 20. M. foliis fpathulatis retufis fubtus pruinofis, racemis compofitis terminalibus. *Ad Orinocum.* (Byrfonima anguftifolia Kunth.)

** *Foliis appreffo-fetofis urentibus.*

fucata Ker. 21. M. foliis oblongis fupra nitidis fubtus appreffo-fetofis, pedunculis axillaribus umbellato-corymbofis. *Ind. occid.?*

urens 22. M. foliis oblongis utrinque attenuatis fupra ramisque glabris fubtus appreffo-fetofis, pedunculis axillaribus 1floris aggregatis. *Ind. occ.* (M. cubenfis Kunth.?)

Cnide * 23. M. foliis ovato-oblongis acuminatis rigidis fupra ramisque hifpidis fubtus appreffo-fetofis, gemmis floriferis villofiffimis, pedunculis 1floris aggregatis. *Hifpaniola.* Bertero.

fetofa * 24. M. foliis elliptico-oblongis undulatis obtufis fupra laevibus fubtus appreffo-fetofis ciliatis, pedunculis fub-1floris axillaribus apice incraffatis. *Hifpaniola.* Bertero.

anguftifolia 25. M. foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque appreffo-fetofis, ramis glabris, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Amer. trop.* (M. linearis Jacq.)

aquifolia 26. M. foliis lanceolatis fpinofo-dentatis fubtus appreffo-fetofis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Amer. trop.*

*** *Foliis pubefcentibus, tomentofis.*

montana * 27. M. foliis oblongis utrinque attenuatis fupra glabris fubtus pubefcentibus, racemis compofitis ferrugineo-tomentofis. *Cumana.* (Byrfonima Kunth.)

† *obovata* Kunth. 28. M. foliis cordato-obovatis acutis integerrimis coriaceis fupra nitidis fubtus pubefcentibus, umbellis axillaribus geminis 4floris. *Ad fl. Magdalenae.*

verbascifolia 29. M. foliis obovato-oblongis integerrimis utrinque cinereo-tomentosis, racemis terminalibus simplicibus, trunco crasso nodoso humili. *Guiana.*

phlomoides * 30. M. foliis obovato-subrotundis basi 2glandulosis supra scabro-subtus cinereo-tomentosis venosis, racemis compositis axillaribus. *Brasil.* Sello.

rhopalaefolia * 31. M. foliis ellipticis complicatis glabris, junioribus subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, racemis simplicibus. *Cumana.* (Byrsonima Kunth.)

laurifolia * 32. M. foliis oblongis utrinque attenuatis subcomplicatis supra pubescentibus subtus incano-tomentosis, racemis simplicibus. *Cumana. Brasil. Mexico?* (Brysonima Kunth. B. sericea Cand? M. pulcra Sess.?)

rufa Poir. 33. M. foliis elliptico-subrotundis coriaceis supra nitidis subtus rufo-tomentosis, racemis spicatis ferrugineis. *Cayenna. Brasil.* (M. macrophylla Juss. Byrsonima eriopoda nervosa Cand. B. nitidissima Kunth.)

altissima Aubl. 34. M. foliis elliptico-oblongis utrinque subattenuatis supra appresso-setosis subtus rufo-tomentosis, racemis simplicibus hirsutis. *Guiana.*

crassifolia 35. M. foliis obovatis coriaceis supra glabriusculis subtus rufo-villosis, racemis elongatis hirsutis. *Amer. austr.* (M. Moureila Aubl. Byrsonima ferruginea Kunth.)

cotinifolia * 36. M. foliis obovatis membranaceis supra glabriusculis subtus rufo-villosis, racemo subspicato piloso, glandulis calycis continuis. *Mexico.* (Byrsonima Kunth.)

1705. GALPHIMIA Cav.

Cauca * 1. G. foliis orbiculatis subemarginatis glaberrimis, pedunculis corymbosis terminalibus. *Arabia.* (Caucanthus Fork.)

glauca Cav. 2. G. foliis ovatis obtusis basi utrinque 1dentatis subtus glaucis, racemis terminalibus simplicibus. *Mexico.*

glandulosa Cav. 3. G. foliis oblongis glabris, petiolis apice 2glandulosis, racemis terminalibus. *Mexico.*

longifolia Kunth. 4. G. foliis oblongo-lanceolatis acutis basi angulatis glabris, petiolis 1-2glandulosis, racemis compositis. *Nov. Granat.*

chrysophylla * 5. G. foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis margine revolutis supra glabris subtus aureo-sericeo-tomentosis, racemis simplicibus. *Ad Orinoc.* (Byrsonima Kunth.)

mollis Kunth. 6. G. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis supra nitidis subtus incano-pubescentibus, petiolis 2glandulosis, umbellis axillaribus paucifloris. *Mexico.*

hirsuta Cav. 7. G. foliis ovatis acutis utrinque hirsutis, racemis terminalibus. *Mexico.*

1706. BANISTERIA.

* *Foliis lobatis, angulatis.*

palmata Cav. 1. B. foliis 5fido-palmatis cordatis fubtus albido-tomentofis, laciniis lanceolatis acuminatis, petiolis apice 2glandulofis. *Hifpaniola.*

angulofa 2. B. foliis cordatis finuato-angulatis obtufis, fummis fubintegerrimis, petiolis apice 2glandulofis, floribus umbellatis. *Ind. occ.*

varia * 3. B. foliis fubcordato-3fidis integrisque ovatis acutis fubtus albido-lanatis, umbellis proliferis bracteatis. *Ad fl. Magdalen.* (B. diverfifolia Bertero.)

fagittata Cav. 4. B. foliis cordato-haftatis acutis angulatis fubtus tomentofis, petiolis apice 2glandulofis. *Hifpaniola.*

** *Foliis cordatis integris.*

auriculata Cav. 5. B. foliis profunde cordatis acutiusculis glabris integerrimis, petiolis fub apice 2glandulofis, floribus umbellatis. *Brafil.*

ciliata Lam. 6. B. foliis cordato-ovatis acutis denticulato-ciliatis, petiolis apice 2glandulofis, floribus umbellatis. *Brafil.*

fplendens Cand. 7. B. foliis cordato-fubrotundis obtufis fubtus fericeo-tomentofis, petiolis apice 2glandulofis, ramis divaricatis, floribus umbellatis. *Ind. occid.* (B. fulgens Lam., heterophylla W.)

Humboldtiana Cand. 8. B. foliis cordato-fubrotundis acuminatis membranaceis fubtus villofo-tomentofis bafi 2glandulofis, umbellis axillaribus feffilibus. *Nov. Granat.* (B. tiliaefolia Kunth.)

dichotoma 9. B. foliis cordatis acuminatis utrinque glabris bafi 2glandulofis, umbellis axillaribus pedunculatis proliferis. *Inf. Carib. Molucc.* (B. convolvulifolia Cav., timorenfis Cand.)

emarginata Cav. 10. B. foliis fubcordato-ellipticis apice retufis fubtus fericeis, petiolis apice 2glandulofis, racemis corymbofis terminalibus. *Guadalupa.*

*** *Foliis ovatis, oblongis.*

† *Petiolis foliisve glandulofis.*

microphylla Jacq. 11. B. foliis ellipticis retufis reticulatis fupra nitidis fubtus glabris, petiolis apice 2glandulofis, racemis corymbofis. *Hifpaniola. Carolina auftr.?* (B. umbellulata Cand.)

purpurea 12. B. foliis ellipticis utrinque glabris opacis, petiolis medio 2glandulofis, racemis corymbofis terminalibus. *Martinica.*

fericea Cav. 13. B. foliis amplis ellipticis mucronatis fubtus tomentofis, petiolis medio 2glandulofis, ramis compreffis, racemis paniculatis terminalibus. *Brafil.*

tiliaefolia Vent. 14. B. foliis subrotundis acuminatis subtus tomentosis, petiolis elongatis apice 2glandulosis, umbellis axillaribus compositis, petalis subsessilibus. *Java.*

chrysophylla Lam. 15. B. foliis oblongis acutiusculis subtus aureo-tomentosis nitidis, petiolis basi 2glandulosis, floribus corymbosis terminalibus. *Brasilia. Nov. Granat.*

periplocaefolia Desf. 16. B. foliis ovato-oblongis mucronatis coriaceis utrinque glabris, petiolis apice 2glandulosis, corymbis terminalibus. *Portorico.* Bertero.

fulgens 17. B. foliis ovato-oblongis acutis subtus sericeis basi 2glandulosis, ramis dichotomis, floribus corymbosis umbellatis. *Guadalupa.* Bertero. *Peru.* Humb. (B. elliptica Kunth.)

picta Kunth. 18. B. foliis ovato-oblongis acuminatis supra glabris subtus sericeis, glandulis baseos binis patelliformibus, umbellis terminalibus. *Nov. Granat.*

salicifolia Cand. 19. B. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus sericeo-tomentosis, petiolis apice 2glandulosis, racemis axillaribus compositis folia aequantibus. *Brasilia.*

diversifolia Kunth. 20. B. foliis ovato-oblongis lanceolatisve coriaceis supra glabris subtus pubescentibus basi 2glandulosis, pedunculis terminalibus geminis multifloris. *Cuba.*

pauciflora Kunth. 21. B. foliis ovato-oblongis cuspidatis utrinque pubescentibus basi subtus glandulis 2 stipitatis, umbellis terminalibus. *Cuba.*

ovata Cav. 22. B. foliis ovato-lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus basi subtus 2glandulosis, pedunculis ternis. *Hispaniola.*

†† *Petiolis foliisque eglandulosis.*

brachiata 23. B. foliis elliptico-oblongis utrinque glabris coriaceis, ramis brachiatis, floribus paniculatis. *Ind. occid.* (Heteropteris platyptera Cand.)

coerulea Lam. 24. B. foliis ovato-oblongis glabris opacis, racemis terminalibus paniculatis. *Ind. occid.*

laurifolia 25. B. foliis ovato-oblongis acutis coriaceis, racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-tomentosis. *Jamaica. Hispaniola.*

Quapara Aubl. 26. B. foliis elliptico-oblongis supra appresso-setosis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Amer. austr. Ind. occid.*

sinemariensis Aubl. 27. B. foliis ovatis acuminatis supra glabris subtus appresso-setosis, corymbis axillaribus pedunculatis compositis. *Amer. austr. Ind. occid.*

muricata Cav. 28. B. foliis ovato-oblongis acutiusculis subtus sericeo-tomentosis, cymis axillaribus terminalibusque, fructibus hinc aculeatis. *Peru. Brasilia.*

Leona Cav. 29. B. foliis oblongis acutis glaberrimis reticulatis, panicula terminali foliata. *Sierra Leone. America tropic.* (B. multiflora, bracteata et pubiflora Cand.)

ferruginea Cav. 30. B. foliis ovato-oblongis acuminatis ſupra nitidis ſubtus ferrugineis, racemis paniculatis foliatis. *Amer. auſtr.*

longifolia Sw. 31. B. foliis ovato-oblongis acuminatis ſupra nitidis, paniculae terminalis ramis patentiſſimis glabris. *Inſ. Carib.*

ledifolia Kunth. 32. B. foliis lineari-oblongis utrinque rotundatis mucronatis coriaceis ſupra nitidis, pedunculis axillaribus terminalibusque multifloris. *Cuba.*

macradena Cav. 33. B. foliis ovalibus coriaceis utrinque glaberrimis opacis eveniis, racemis terminalibus compoſitis rufo-tomentoſis, glandulis calycinis maximis. *Ind. occid.*

floribunda Cand. 34. B. foliis ovalibus ſubemarginatis coriaceis, racemis axillaribus corymboſis. *Portorico.* Bertero. (Heteropteris appendiculata Cand.)

parvifolia Vent. 35. B. foliis ſubrotundis rigidis pubeſcentibus, floribus terminalibus corymboſis. *Inſ. Carib.*

argentea * 36. B. foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis ſupra pubeſcentibus ſubtus ſericeis, paniculae ramis faſciculatis. *Nov. Granat.* (Heteropteris Kunth.)

nitida Lam. 37. B. foliis ovato-oblongis acuminatis ſupra nitidis ſubtus ſericeis, panicula terminali folioſa. *Braſilia.*

cornifolia * 38. B. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis ſupra nitidis ſubtus ſericeis glaucis, floribus axillaribus corymboſo-paniculatis. *Nov. Granat.* (Heteropteris Kunth.)

1707. VARGASIA Bert.

glabra Bert. 1. V. foliis ternatis obovatis acutis ſerratis utrinque glaberrimis venoſis, racemis ſpicatis aggregatis reflexis. *Hiſpaniola.*

tomentoſa Bert. 2. V. foliis ternatis ſpathulato-oblongis ſerrulatis ſubtus albido-tomentoſis, racemis aggregatis erectis. *Hiſpaniola.*

1708. TRIOPTERIS.

** Fructibus 3alatis.*

jamaicenſis 1. Tr. foliis ovato-oblongis utrinque glaberrimis venoſo-reticulatis, paniculis ramoſiſſimis. *Jamaica. Hiſpaniola. Braſil.* (Tr. floribunda Bilb.? braſilienſis Poir.)

lucida Kunth. 2. Tr. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, paniculis axillaribus terminalibusque ſimplicibus. *Cuba.*

rigida Sw. 3. Tr. foliis ovatis acutis complicatis utrinque glaberrimis parallele venoſiſſimis, racemis paniculatis filiformibus. *Hiſpaniola.*

ovata Cav. 4. Tr. foliis ſubcordato-ovatis obtuſiuſculis coriaceis utrinque glabris, petiolis apice 2glanduloſis, paniculis terminalibus. *Hiſpaniola.*

** *Fructibus 4alatis.*

citrifolia Sw. 5. Tr. foliis oblongis venoſo-nervoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus dichotomis. *Jamaica.* (Tetrapteris inaequalis Cav.)

acuminata W. 6. Tr. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, umbellis paniculatis terminalibus. *Cayenn.* (Tetrapteris mucronata Cav. Triopteris pauciflora Meyer.)

acutifolia W. 7. Tr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, panicula terminali. *Cayenn.* (Tetrapteris acutifolia Cav.)

discolor Meyer. 8. Tr. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris ſubtus discoloribus, umbellis paniculatis axillaribus terminalibusque. *Surinam.*

buxifolia W. 9. Tr. foliis elliptico-oblongis glabris, umbellis terminalibus pedunculatis. *Hiſpaniola. Cuba. Mexico.* (Tetrapteris Cav. Tetr. acapulcenſis Kunth.)

1709. HIRAEA Jacq.

* *Calycibus eglanduloſis.*

reclinata Jacq. 1. H. foliis obovato-oblongis baſi ſubcordatis ſupra pubeſcentibus ſubtus glabris, ramis reclinatis, pedunculis congeſtis abbreviatis 4floris bracteatis. *Nov. Granat.*

glabra * 2. H. foliis ovato-oblongis utrinque glaberrimis nitidis, panicula terminali trichotoma appreſſo-piloſa. *Braſil.* Sello.

odorata W. 3. H. foliis ovatis acutis ſuperne glabris ſubtus flavido-tomentoſis, racemis paniculatis pubeſcentibus. *Guinea.*

hypericoides Burch. 4. H. foliis linearibus utrinque glabris. *Africa auſtr.*

indica Roxb. 5. H. foliis ſubcordato-ovatis acuminatis utrinque glabris ſupra nitidis, panicula terminali. *Ora Coromandel.* (Triopteris indica W.)

nutans Roxb. 6. H. foliis ovatis acuminatis ſupra glabris ſubtus appreſſo-ſetoſis. *Ind. or.*

** *Calycibus glanduloſis.*

oblongifolia Cand. 7. H. foliis ovato-oblongis acutis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, floribus paniculatis. *Ad fl. Magdalen.* (Maſcagnia oblongifolia et americana Bertero.)

ovatifolia Kunth. 8. H. foliis ovatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus glabris, paniculis axillaribus folia ſubaequantibus. *Cumana.*

divaricata Kunth. 9. H. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſub-5plinerviis, petiolis glanduloſis, racemis paniculatis axillaribus folia ſuperantibus. *Cumana.*

1710. ERYTHROXYLON.

** Foliis ſubtus 3lineatis: venis nimirum binis nervo medio parallelis.*

areolatum 1. E. foliis obovato-oblongis membranaceis glabris mucronatis ſubtus glaucis, ramis divaricatis, pedunculis aggregatis 1floris. *Ind. occid.* (E. carthagenenſe Jacq.)

Coca Lam. 2. E. foliis oblongis obtuſiusculis membranaceis, ramis verrucoſo-ſquamoſis, pedunculis ſparſis abbreviatis. *Peru.*

lineolatum Cand. 3. E. foliis oblongis utrinque ſubattenuatis mucronatis membranaceis ſubtus glaucis, pedunculis ſubaggregatis. *Cayenn.*

rigidulum Cand. 4. E. foliis obovato-oblongis obtuſis coriaceis opacis ſubtus pallidis glabris, ramis tuberculoſis, pedunculis aggregatis abbreviatis. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

mexicanum Kunth. 5. E. foliis obovato-oblongis ſubretuſis coriaceis glabris, ſtipulis petiolos ſtipantibus, pedunculis ſolitariis. *Mexico.*

*** Foliis venoſis.*

† Pedunculis lateralibus aggregatis.

nitidum * 6. E. foliis obovatis obtuſis integerrimis glaberrimis nitidis, pedunculis axillaribus aggregatis flores aequantibus. *Braſil.* Sello.

ſubcordatum Cand. 7. E. foliis ſubcordato-orbiculatis emarginatis rigidis reticulato-venoſis glabris, ramis divaricatis. *Hiſpaniola.* Bertero.

rufum Cav. 8. E. foliis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis ſubtus rufis, ramulis ſquamoſis, pedunculis flore longioribus. *Hiſpaniola. Guadalupa.*

ſquamatum Vahl. 9. E. foliis oblongis utrinque attenuatis obtuſiusculis glaberrimis, ſtipulis diſtiche imbricatis, pedunculis flore longioribus. *Cayenn. Guiana.*

laurifolium Lam. 10. E. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, ſtipulis ſparſis, pedunculis terminalibus ſubumbellatis flore longioribus. *Inſ. Mascaren.*

macrophyllum Cav. 11. E. foliis oblongo-lanceolatis elongatis glabris, ſtipulis lanceolatis confertis, pedunculis aggregatis flore longioribus. *Cayenn.*

popayanenſe Kunth. 12. E. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubmucronatis membranaceis glabris, ſtipulis 2fidis ſubulatis, pedunculis aggregatis petiolos aequantibus. *Nov. Granat.*

obtuſum Cand. 13. E. foliis obovato-oblongis obtuſis membranaceis glabris ſubtus glaucescentibus, ſtipulis petiolo brevioribus, pedunculis aggregatis ſubelongatis. *Cuba.* (E. havanenſe Kunth. Humb.)

†† *Pedunculis ſubgeminis.*

longifolium Lam. 14. E. foliis lanceolatis obtuſiuſculis rigidis nitidis, ſtipulis acutis deciduis, pedunculis ſubternis flore longioribus. *Madagascar. Mascaren.*

ſideroxyloides Lam. 15. E. foliis oblongis baſi attenuatis lucidis, ſtipulis acutis ſparſis, ramulis compreſſis, pedunculis ſubgeminis flores aequantibus. *Inſ. Mascaren.*

havanenſe Jacq. 16. E. foliis obovato-oblongis rigidiusculis glabris nitidis, ſtipulis ramorum ſubimbricatis, pedunculis geminis flores ſubaequantibus. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (E. ovatum Cav., cumanenſe et orinocenſe Kunth., Steudelia braſilienſis N. E.)

hondenſe Kunth. 17. E. foliis obovato-ellipticis retuſis membranaceis glabris ſubtus glaucis, ſtipulis petiolum aequantibus, pedunculis petiolos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

liguſtrinum Cand. 18. E. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis flore duplo longioribus. *Cayenn.*

lucidum Kunth. 19. E. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis lucidis, ſtipulis pedunculos petiolosque excedentibus. *Nov. Granat.*

††† *Pedunculis ſolitariis.*

monogynum Roxb. 20. E. foliis obovato-oblongis glabris, pedunculis petiolos ſuperantibus. *Ora Coromandel.*

ferrugineum Cav. 21. E. foliis obovato-ellipticis ſupra lucidis ſubtus ferrugineis, ſtipulis confertis, pedunculis petiolos floresque ſuperantibus. *Madagascar.*

buxifolium Lam. 22. E. foliis obovatis mucronatis ſubtus glaucis, ſtipulis deciduis, pedunculis flores aequantibus, fructu 1loculari. *Madagascar.*

brevipes Cand. 23. E. foliis obovatis mucronatis ſubtus pallidis, ſtipulis ſparſis deciduis, ramis lineato-tuberculoſis, pedunculis breviſſimis. *Portorico. Hiſpaniola.* Bertero.

hypericifolium Lam. 24. E. foliis obovatis emarginatis ſubmembranaceis, ſtipulis ſparſis deciduis, ramis ſcabris, pedunculis ſubſolitariis flore longioribus, fructu 3loculari. *Inſ. Mascaren. Hiſpaniola.* Bertero.

1711. SCHINUS.

Molle 1. Sch. foliis pinnatis, foliolis ſerratis, impari longiſſimo petiolato. *Braſil. Peru.*

Huigan Molin. 2. Sch. foliis pinnatis, foliolis ſubdentatis, impari breviſſimo ſubſeſſili. *Chili.*

Areira 3. Sch. foliis pinnatis, foliolis linearibus aequalibus integerrimis. *Peru.*

† *dentata* Andr. 4. Sch. foliis ſimplicibus lanceolatis ſerratis, racemis axillaribus folia ſuperantibus. *Inſ. Sandwich.*

1712. STELLARIA.

** Petalis 2partitis.*

† Foliis cordatis, ovatis, oblongis.

nemorum 1. St. foliis ovato-oblongis acutis, inferioribus cordatis petiolatis, panicula terminali dichotoma pubefcente. *Europ.*

cufpidata W. 2. St. foliis petiolatis fubcordato-oblongis acuminatis cauleque laxo glabris, pedunculis axillaribus. *Quito.*

media Sm. 3. St. caule debili fubdecumbente, linea laterali pilofa alterna, foliis ovatis, pedunculis fructiferis reflexis, floribus fub-5andris, petalis calyce brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (Alfine media L. Varietas 10ftemon Oed. et Hornem. eft St. Cerastium et latifolia Perf. Cand.)

ciliata Perf. 4. St. caule ramofiffimo laevi, foliis exiguis cordato-ovatis acuminatis ciliatis petiolatis, floribus axillaribus, petalis calycem glabrum fubfuperantibus. *Peru.*

dichotoma 5. St. caule dichotomo foliisque feffilibus cordato-ovatis pubefcentibus, pedunculis folitariis fructiferis reflexis, calyce acuto corollam fuperante. *Sibir.*

Pallafiana Ser. 6. St. caule dichotomo foliisque ovatis feffilibus pubefcentibus, pedunculis fructiferis folio duplo longioribus reflexis. *Sibir.* (St. dichotoma Schlechtend.)

rufcifolia Pall. 7. St. caule ftricto, foliis cordato-ovatis acutis amplexicaulibus glabris nervofo-marginatis, floribus axillaribus folitariis, terminalibus fubaggregatis longe pedunculatis. *Sibir.*

cordata Schlechtend. 8. St. foliis cordato-fubrotundis obtufis glaberrimis petiolatis, caule flaccido glabro, pedunculis axillaribus paucifloris elongatis reflexis. *Nov. Granat.* Humb.

villofa Poir. 9. St. caule pedunculisque hirfutis, foliis feffilibus ovato-lanceolatis acuminatis pubefcentibus, floribus terminalibus fubpaniculatis, corolla calycem excedente. *Inf. Mascaren.*

puber Mx. 10. St. pubefcens, foliis feffilibus ovatis ciliatis, pedunculis erectis, corolla calycem excedente. *Amer. bor.*

ferpyllifolia W. 11. St. caule ramofo repente, foliis ovatis mucronatis breviffime petiolatis venofis ciliatis, pedunculis axillaribus folia fuperantibus. *Peru.*

domingenfis * 12. St. caule erecto fuperne pubefcente, foliis ovatis acuminatis glaberrimis feffilibus, pedunculis terminalibus corymbofis calycibusque pilofiusculis, petalis calyce minoribus. *Hifpaniola.* Bertero.

ovata W. 13. St. caule diffufo pilofiusculo, foliis fubrhombeo-ovatis mucronatis petiolatis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, fructiferis reflexis, calycibus bafi pilofiusculis. *Nov. Granat.*

elegans Ser. 14. St. caule aſcendente, foliis ellipticis glabris, pedunculis paniculatis pubeſcentibus, petalis calycem glabriuſculum ſuperantibus. *Sibir.*

undulata Thb. 15. St. caule decumbente ramoſo glabro, foliis ſeſſilibus oblongis acutis undulatis, pedunculis 1floris axillaribus ſubgeminis folia ſuperantibus. *Japon.*

ceraſtoides 16. St. caule aſcendente paucifloro, foliis oblongis obtuſiuſculis glabris, pedunculis geminatis pubeſcentibus divaricatis, petalis calycem ſuperantibus. *Alp. Europ. med. Anglia. Regio arctica Europ.* (St. multicaulis W. Ceraſtium 3gynum Vill. refractum All.)

** *Foliis lanceolatis, linearibus.*

uliginoſa Sm. 17. St. caule decumbente ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque corymboſis, petalis calyce brevioribus. *Europ. paludes.* (St. Alſine Hofm. W., fontana Wulff., aquatica Poll., Dilleniania Leers., hypericifolia Wigg. All., graminea γ. L.)

holoſtea 18. St. caule erecto 4gono, foliis lanceolatis acuminatis ſerrulatis, pedunculis terminalibus aggregatis ſcabris, calycibus enerviis acutis corolla brevioribus. *Europ.*

† *lanceolata* Poir. 19. St. caule erecto ſimpliciuſculo ſuperne pubeſcente, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis integerrimis, floribus paniculatis, corolla calycem pubeſcentem ſuperante. *Ad fretum Magellan.*

bulboſa Wulff. 20. St. radice repente bulbifera, caule ſimpliciuſculo paucifloro, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus eveniis, petalis calycem ſuperantibus. *Carinthia.*

craſſifolia Ehrh. 21. St. caule aſcendente 4quetro, foliis lanceolatis craſſiuſculis glaucis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris folia ſuperantibus, petalis calycem excedentibus. *Europ. paludes.* (St. humifuſa Rottb. et Vahl. in fl. dan. Ceraſtium 4gonum Baumg.)

florida Fiſch. 22. St. foliis lanceolatis acutis firmis ciliatis, pedunculis axillaribus terminalibusque longiſſimis ſolitariis ſtrictis, petalis ſepala 3nervia ſuperantibus. *Camtſchatca.*

davurica W. 23. St. caule pubeſcente, foliis lanceolatis acutis ſeſſilibus integerrimis, pedunculis axillaribus ſolitariis folia ſuperantibus. *Davuria.*

recurvata W. 24. St. caule proſtrato, foliis lanceolatis acutis ciliatis recurvatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Granat.*

elongata Nutt. 25. St. caule elongato diffuſe ramoſo pubeſcente, foliis lanceolatis glabris calloſo-mucronatis, pedunculis ſolitariis longiſſimis, floribus apetalis. *Carolina. Georgia.*

ſcapigera Ait. 26. St. caule abbreviato folioſo, foliis lineari-lanceolatis acutiuſculis margine ſcabris, pedunculis

aggregatis elongatis ſtrictis, petalis ſepala nervoſa ſubaequantibus. *Scotia. Sibiria.?* (St. Fiſcheriana Ser.)

longipes Gold. 27. St. glaberrima, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis terminalibus dichotome ramoſis bracteatis, pedicellis elongatis, petalis ſepala obtuſa trinervia ſubaequantibus. *Canada.*

graminea 28. St. caule diffuſo 4gono, foliis lineari-lanceolatis margine laevibus, floribus terminalibus paniculatis, petalis ſepala 3nervia ſubaequantibus. *Europ. Amer. bor.* (St. longifolia Mühl. Spergulaſtrum gramineum Mx.)

longifolia Fries. 29. St. caule debili 4quetro, foliis ſublinearibus elongatis margine carinaque ſcabris, pedunculis axillaribus ſolitariis, petalis ſepala enervia aequantibus. *Suecia. Ducat. Lauenburg.*

glauca Wither. 30. St. caule erecto 4gono, foliis lineari-lanceolatis margine laevibus glaucis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis, petalis calycem ſuperantibus. *Europ. humida.* (St. paluſtris Retz. W.)

viſcida M. B. 31. St. caule dichotomo ramoſo villoſo-viſcido, foliis lineari-lanceolatis ciliatis, petalis calycem ſuperantibus, capſulis oblongo-cylindricis. *Hungar. Transſylvan. Andegavum et Nannetum in Gallia. Tauria. Perſia.* (St. dubia Cand. ſabuloſa Fiſch. Ceraſtium anomalum Kit. arvenſe 3gynum Bâtard. var. glabreſcens.)

Laxmanni Fiſch. 32. St. caule erecto paucifloro, foliis linearibus acutis glabriuſculis, pedunculis filiformibus elongatis, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir. or.*

falcata Ser. 33. St. caule ramoſo pubeſcente, foliis confertis linearibus falcatis rigidis, pedunculis corymboſis elongatis incraſſatis, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

diffuſa W. 34. St. caule repente ramoſo diffuſo, foliis linearibus acutiuſculis glabris, panicula dichotoma axillari. *Sibir.*

ſubulata W. 35. St. caule caeſpitoſo, foliis linearibus obtuſiuſculis, floribus corymboſis, ſepalis ſubulatis petala duplo ſuperantibus. *Sibir.*

† *moſcovienſis* M. B. 36. St. foliis faſciculatis lineari-ſubulatis abbreviatis, floribus paniculatis. *Moſcovia.*

** *Petalis bilobis.*

radicans Lapeyr. 37. St. caule proſtrato multifloro, foliis ovalibus nitidis ſubſecundis, pedunculis divaricatis, petalis ſepala obtuſa excedentibus, capſula pyriformi. *Pyren.*

velutina Ser. 38. St. villoſa, foliis oblongo-linearibus, pedunculis filiformibus elongatis, petalis ſepala oblonga ſuperantibus. *Sibiria?*

Saxifraga Bertol. 39. St. caule diffuſo pubeſcente, foliis ovatis acutis ſeſſilibus, panicula dichotoma, petalis ſepala lanceolata ſuperantibus. *Apennin.*

**** Petalis 5partitis.*

radians 40. St. caule erecto pubeſcente, foliis ſeſſilibus lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis ſepala acuta ſuperantibus. *Sibir.*

1713. ARENARIA.

** Foliis planis exſtipulatis,*

† latioribus, ſubrotundis, oblongis ſ. lanceolatis,

α. oppoſitis vel ſparſis.

1. *Pedunculis ſolitariis.*

trinervia 1. A. caule gracili ſubramoſo, foliis ovato-oblongis acutis 3nerviis, pedunculis axillaribus elongatis, ſepalis anguſtis acuminatis petala ſuperantibus. *Europ. nemora.*

lateriflora 2. A. caule ſimpliciusculo erecto, foliis ellipticis ciliatis ſub-3plinerviis, pedunculis axillaribus elongatis erectis 2floris, corolla calycem ſuperante. *Sibir. or. Amer. bor.* (Americana ſubramoſior magis pubeſcit.)

ceraſtiifolia Ram. 3. A. ſuffruteſcens caeſpitoſa ramoſa, foliis ovato-oblongis 3nerviis hirſutis, pedunculis terminalibus 1floris glanduloſo-piloſis, corolla calycem obtuſum ſuperante. *Pyren.* (A. Ramondi Poir.)

peploides 4. A. caule dichotomo aſcendente, foliis ovatis acutis carnoſis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus breviſſimis, corolla calycem ſubaequante, ſeminibus paucis grandibus. *Litora marium boreal.* (Holoſteum ſucculentum L. Polycarpon 1florum Walt. Honkenia peploides Ehrh.)

tetragyna W. 5. A. caule ramoſiſſimo repente, foliis confertis oblongo-lanceolatis ſubcarnoſis, corolla calycem ſuperante ſub-4gyna, ſeminibus paucis tuberculatis. *Alp. peruv.* Humb.

biflora 6. A. caule procumbente, foliis elliptico-ſubrotundis glaberrimis, pedunculis lateralibus ſubbifloris, corolla calycem ſuperante. *Alp. Europ. med.* (A. apetala Vill. var.)

balearica 7. A. caule repente, foliis petiolatis ovatis nitidis, pedunculis longiſſimis 1floris piloſiusculis, corolla calycem ſuperante. *Inſ. balear. Corſica.*

rotundifolia M. B. 8. A. caule procumbente, foliis orbiculatis glaberrimis, pedunculis ſubdichotomis paucifloris, ſepalis ſubulatis petala aequantibus. *Caucaſ.*

calycantha Ledeb. 9. A. foliis oblongis acutis ſeſſilibus baſi ciliatis, floribus nutantibus apetalis, calycibus acutis. *Sibir. orient.*

humifuſa Wahlenb. 10. A. caule proſtrato ramoſiſſimo, foliis oblongis ſubcarnoſis, floralibus latioribus confertis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus conniventibus. *Regio arctica Scandinaviae.* (A. norvegica Gunn. Hornem. Stellaria humifuſa Sw.)

Raddiana Ser. 11. A. caule proſtrato 4angulari, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, pedunculis axillaribus paucifloris, floribus apetalis. *Madera.* (A. alſinoides Radd.)

ſerpens Kunth. 12. A. caule ramoſiſſimo repente, foliis ſpathulato-oblongis ſubcarnoſis baſi ciliatis, petalis calycem ſubaequantibus. *Alp. peruv.*

ciliata 13. A. caule aſcendente caeſpitoſo, foliis oblongis ſubnervoſis ciliatis, pedunculis terminalibus erectis ſubſolitariis, corolla calycem acutum nervoſum ſuperante. *Alp. Europ. med. Hibernia. Islandia.* (A. multicaulis Wulff. L.)

cretica * 14. A. caule caeſpitoſo, foliis confertis oblongis acutis rigidiusculis glabris, pedunculis terminalibus elongatis viſcoſo-pubeſcentibus ſub-1floris, ſepalis carinatis acutiusculis corolla brevioribus. *Montes ſphaciot. Cretae.* (A. hirta Sieb.)

pubeſcens Urv. 15. A. caule ramoſo elongato foliisque ovatis acutis utrinque pubeſcentibus, calycibus villoſis acutis corolla brevioribus. *Inſ. Cos.*

hiſpanica * 16. A. caule erecto viſcoſo, foliis ſpathulatis ſubconnatis ſuperioribus lanceolatis, pedunculis elongatis lanatis, petalis ſubemarginatis calycem multo ſuperantibus. *Hiſpania.* (Stellaria Arenaria L.)

ſerpyllifolia 17. A. caule ramoſiſſimo ſcabro ſubpubeſcente, foliis ovatis acutis ſeſſilibus ciliatis, ſepalis nervoſis acutis petala ſubaequantibus. *Europ. Amer. boreal.*

uralenſis * 18. A. caule ramoſiſſimo ſcabro, foliis ovatis acutis ſeſſilibus nervoſis calloſo-piloſiusculis, pedunculis aggregatis glanduloſo-piloſis, ſepalis acuminatis corollam ſuperantibus. *Ural.* Pall. in W. herb.

buxifolia Poir. 19. A. caule ramoſo repente foliisque oblongis obtuſis pubeſcentibus, pedunculis 2floris bracteatis, corolla calycem obtuſum ſubſuperante. *Canada.* (A. thymifolia Pursh.?)

Wallichiana Ser. 20. A. caule ramoſiſſimo foliisque ovato-lanceolatis glaberrimis, ſepalis lanceolatis acutis corollam excedentibus. *Nepal.*

repens Ser. 21. A. caule repente foliisque ovatis ſubſeſſilibus piloſis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, ſepalis acutis corollam aequantibus. *Patria?*

modeſta Duf. 22. A. caule erecto ſubdichotomo viſcoſo-pubeſcente, foliis inferioribus ovalibus ſuperioribus oblongo-linearibus, pedunculis filiformibus ſubdivaricatis, ſepalis acutis petala aequantibus. *Hiſpan. auſtr.*

muſcorum Fiſch. 23. A. caule abbreviato 1floro pubeſcente, foliis oblongis obtuſis ſtriatis ciliatis, corolla calycem obtuſum ſuperante. *Camtſchatca.*

nemoroſa Kunth. 24. A. caule procumbente ramoſo foliisque oblongis mucronatis venoſis petiolatis pubeſcentibus, petalis calyce acuminato brevioribus, ſeminibus paucis nitidis. *Quito. Nov. Granat.* (A. alſinoides et Stellaria pubeſcens W. herb.)

2. *Pedunculis multifloris.*

thymifolia Sm. 25. A. foliis ſpathulato-linearibus, floribus paniculatis, petalis unguiculatis calyce 3nervi longioribus. *Creta.*

ſpathulata Desf. 26. A. foliis inferioribus ſpathulatis ſuperioribus lanceolatis cauleque ramoſo pubeſcentibus, floribus corymboſo-paniculatis, petalis obovatis calycem ovatum ſuperantibus. *Afric. bor.*

† *molluginifolia* Pourr. in W. herb. 27. A. foliis obovatis acutiusculis ſubcarnoſis glaberrimis, pedunculis corymboſis divaricatis, ſepalis ovatis acutiusculis corolla brevioribus, ſeminibus paucis maximis ſolidis. *Hiſpan.*

muralis Sieb. 28. A. foliis ſpathulatis acutiusculis ſubcarnoſis cauleque ramoſiſſimo glanduloſo-pubeſcentibus viſcoſis, floribus racemoſis, petalis emarginatis calycem acutum aequantibus. *Creta.*

oxypetala Sm. 29. A. foliis ovatis acutis petiolatis, calycibus hirſutis ſub-5nerviis, petalis acuminatis. *Peloponneſ.*

cinerea Cand. 30. A. foliis oblongis acutis hirſutis, floribus paniculatis, pedicellis 2fidis glabriusculis, petalis obtuſis ſepala carinata acuta ſuperantibus. *Gallia provinc. Sicilia.* (A. Bartolotti Tin.)

ruſcifolia Poir. 31. A. foliis ovatis mucronatis coriaceis marginatis glabris, floribus ſubpaniculatis, ſepalis ovatis acutis ſtriatis corolla brevioribus. *Patria?*

β. Foliis imbricatis.

tetraquetra 32. A. foliis ovatis carinatis recurvis 4fariam imbricatis, floribus capitatis, ſepalis carinatis acutis corollam aequantibus. *Gallia auſtr. Hiſpania.* (A. amabilis Bory. imbricata Lag. armerina Bory. Gypſophila aggregata L.)

brevicaulis Sternb. 33. A. foliis ſubimbricatis oblongo-lanceolatis 3nerviis ciliatis, pedunculis ſubſolitariis, ſepalis lanceolatis ſtriatis petala ſuperantibus, caule proſtrato. *Alp. rhaet.*

bryoides W. herb. 34. A. caule caeſpitoſo glabro, foliis ovatis obtuſis concavis craſſis ciliatis 4fariam imbricatis, flore terminali ſeſſili, petalis calyce brevioribus. *Mexico.*

nana W. herb. 35. A. caule repente glabro, foliis oblongis obtuſis laxe imbricatis carnoſis, calycibus obtuſis petala aequantibus. *Alp. peruv.* (A. muſcoides Kunth.)

dicranoides Kunth. 36. A. caule caeſpitoſo, foliis ovato-lanceolatis convolutis rigidis ciliatis imbricatis, flore ſeſſili terminali ſubdigyno. *Alp. peruv.* (Lobelia bryoides W. herb.)

†† *Foliis anguſtis.*

procumbens Vahl. 37. A. caule proſtrato diffuſe ramoſo pubeſcente, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis ſubpaniculatis elongatis, calycibus glanduloſis corollam excedentibus. *Afric. bor. Aegypt. Hiſpan. auſtr.*

(A. geniculata Poir., herniariaefolia Desf., extensa Dufour.)

scopulorum Kunth. 38. A. caule procumbente ramosissimo, foliis lineari-lanceolatis acutis ciliatis, pedunculis pubescentibus, corolla digyna calycem superante, capsula sub-3sperma. *Alp. peruv.* (A. digyna W. herb.)

scabra Poir. 39. A. caule simplici brevissimo foliisque lanceolatis acutis complicatis hispidiusculis, pedunculis subdichotomis, corolla calycem striatum superante. *Alp. Europ.*

conimbricensis Brot. 40. A. caule erecto dichotome ramoso viscoso-pilosiusculo, foliis lineari-lanceolatis patulo-recurvis, pedunculis terminalibus 2fidis, corolla calycem obtusiusculum superante. *Lusitan.*

montana 41. A. pubescens, foliis lanceolatis, caule sterili longissimo procumbente, pedunculis terminalibus 1floris elongatis, fructiferis nutantibus, petalis sepala acuminata multo superantibus. *Gall. occ. et Hispan.*

lanceolata All. 42. A. caule caespitoso, foliis lanceolato-linearibus rigidiusculis nervosis, pedunculis sub-1floris terminalibus pubescentibus, petalis mucronatis sepala acuminata aequantibus. *Alp. cott. carn.* (Stellaria rupestris Scop.)

densa Kit. 43. A. caule erecto simpliciusculo glabro, foliis lanceolatis margine scabris, pedunculis terminalibus elongatis sub-3floris, petalis calycem superantibus. *Alp. Croat.*

purpurascens Ram. 44. A. caule suffruticoso ascendente, foliis lanceolatis acuminatis glabris, pedunculis terminalibus pubescentibus, petalis sepala acuminata superantibus. *Pyrenaei.* (A. cerastoides Pers.)

violacea Ledeb. 45. A. foliis lanceolatis glabriusculis, pedunculis terminalibus corymbosis viscoso-pilosis, petalis obovatis sepala obtusa superantibus. *Sibir. or.*

Giesekii Hornem. 46. A. foliis lanceolato-linearibus 3nerviis glanduloso-ciliatis, pedunculis longissimis 1floris, sepalis acutis corollam superantibus. *Grönland.*

laricifolia 47. A. caule erecto subramoso, foliis lineari-subulatis margine scabris nervosis, panicula dichotoma pubescente, calycibus acutiusculis 3striatis corolla brevioribus. *Alp. Europ. med. Caucas.*

decussata W. herb. 48. A. caule ramosissimo repente, foliis lineari-lanceolatis acutis margine incrassatis rigidis ciliatis decussatis, floribus terminalibus solitariis, petalis calycem superantibus. *Mexico.*

cherlerioides Vill. 49. A. caule repente ramosissimo, ramis ascendentibus 1floris, foliis lineari-lanceolatis acutis carinatis pubescentibus, infimis decussatis, pedunculis solitariis terminalibus brevissimis, petalis unguiculatis. *Delphinat.*

davurica * 50. A. caule caespitoso brevissimo, foliis subimbricatis linearibus, floribus subaggregatis, sepalis obtusis petala angusta superantibus. *Sibir. orient.* (A. Cherleriae Fisch.)

lycopodioides W. herb. 51. A. caule denſe caeſpitoſo, foliis appreſſis lanceolato-ſubulatis convolutis baſi ciliato-denticulatis, petalis calyce brevioribus. *Mexico.*

arctica Stev. 52. A. caule caeſpitoſo abbreviato 1floro, foliis linearibus obtuſis, pedunculis piloſo-glanduloſis, corolla calycem obtuſiusculum ſuperante. *Sibir.* (A. ſajanenſis W. herb.)

villoſa Fiſch. 53. A. caule ramoſo villoſo, foliis linearibus 3nerviis ciliatis, ſepalis acuminatis petala excedentibus. *Sibir.*

rubicunda * 54. A. caule erecto ramoſo foliisque lanceolato-linearibus pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis 1floris elongatis, ſepalis acuminatis hirſutis corolla brevioribus. *Sibir.* (A. purpurea W. herb.)

†*polygonoides* Wulff. 55. A. caule procumbente, foliis linearibus obtuſiusculis, pedunculis 2floris terminalibus erectis, ſepalis ſubviſcidis enerviis corolla brevioribus capſulam ſubgloboſam 6valvem aequantibus. *Alp. lepont. nor. carn.* (A. obtuſa All. Bellard.)

pendula Kit. 56. A. caule diffuſo radicante, ramis erectis ſub-1floris, foliis linearibus ſubfaſciculatis, ſepalis cuſpidatis corolla brevioribus. *Hungar.*

hiſpida 57. A. caule flaccido hirſuto, foliis linearibus acutis ſubrecurvis ſubtus calloſo-hiſpidis, pedunculis capillaribus, ſepalis acuminatis petala aequantibus. *Gallia narbon.*

uliginoſa Cand. 58. A. caule caeſpitoſo erecto, ramis floriferis ſuperne nudis, foliis linearibus obtuſiusculis, pedunculis geminis, petalis ſubemarginatis ſepala acutiuscula excedentibus, capſula 3valvi. *Juraſſus.* Chaillet.

hirta Wormsk. 59. A. caule ſub-2floro glanduloſo-piloſo, foliis linearibus obtuſiusculis 3nerviis ſulcatis, petalis oblongis calyce brevioribus. *Regio arctica Scandinaviae. Grönland.* (Alſine rubella Wahlb. Arenaria ſulcata W. herb.)

glabra Mx. 60. A. caule glaberrimo filiformi, foliis lineari-ſubulatis patulis, pedunculis 1floris elongatis divaricatis, petalis ſepala obtuſa ſuperantibus. *Carolin. bor.* (Stellaria 1flora Walt.)

calycina Poir. 61. A. caule erecto paucifloro glabro, foliis linearibus acutis connatis, pedunculis longiſſimis ſetaceis 1floris, petalis lanceolatis hyalinis calyce acuto multo brevioribus. *Afric. bor. Dalmatia?* (A. clandeſtina Portenſch.)

macrocarpa Pursh. 62. A. caule caeſpitoſo, foliis linearibus ciliatis confertis, pedunculis terminalibus folioſis 1floris, petalis ovatis capſulisque oblongis calycem ſuperantibus. *Ora occid. Amer. bor.*

Helmii Fiſch. 63. A. glanduloſo-piloſa, foliis linearibus obtuſiusculis 3nerviis, pedunculis longiſſimis 1floris, petalis capſulisque calycem ſuperantibus. *Ural.*

†*grandiflora* 64. A. foliis linearibus ſub-3nerviis ciliatis faſciculatis, caule paucifloro, pedunculis longiſſimis, ſepalis cuſpidatis corolla brevioribus capſulam aequantibus. *Helvet. Gall. Ital.* (A. 3flora L., juniperina Vill., mixta Lapeyr., abietina Presl., liniflora W. herb., elongata Balb.)

austriaca 65. A. caule caespitoso, foliis linearibus cuspidatis 3nerviis, pedunculis terminalibus geminis elongatis, petalis emarginatis calycem subsuperantibus. *Alp. Austriae et Italiae.* (A. 3flora Vill., stellarioides Pers., elongata W. herb. Stellaria 2flora Wulff.)

globosa Labill. 66. A. caule ramoso glanduloso-piloso, foliis linearibus acutis nervosis, floribus subracemosis, sepalis inaequalibus corollam excedentibus. *Syria.*

imbricata M. B. 67. A. caule repente hirsuto, foliis confertis linearibus ciliatis rigidis patentibus, pedunculis 1floris terminalibus, petalis capsulisque calycem obtusiusculum pubescentem superantibus. *Caucas.*

** *Foliis succulentis, s. filiformibus plerumque stipulatis: floribus sub-5andris: capsulis 3valvibus.* *Alsine L. Wahlenb.* *Spergularia Pers.* *Lepigonum Fries.*

succulenta Ser. 68. A. caule prostrato glabro dichotome ramoso, foliis spathulatis, pedunculis subcorymbosis, sepalis obtusis corollam aequantibus. *Aegypt.* (Alsine succulenta Delil.)

mollugine Ser. 69. A. caule dichotome ramoso glabro, foliis spathulato-linearibus succulentis glaucis, pedunculis axillaribus demum deflexis, sepalis obtusis corollam subaequantibus. *Nov. Hispan.* (Alsine mollugine Lag.)

prostrata Ser. 70. A. caule dichotome ramosissimo, foliis linearibus obtusis subverticillatis, floribus paniculatis, sepalis inaequalibus corollam aequantibus. *Aegypt.* (Alsine prostrata Forsk. Delil.)

glutinosa M. B. 71. A. caule erecto paucifloro villoso-viscoso, foliis oblongis obtusiusculis, petalis obovatis calycem excedentibus. *Ad Volgam.*

rubra 72. A. caule procumbente ramoso, foliis filiformibus, stipulis scariosis latis vaginantibus, pedunculis axillaribus demum deflexis calycibusque glanduloso-pilosis, seminibus solidis rugulosis. *Europ. Afric. bor.*

marina Sm. 73. A. caule prostrato inferne glabro, foliis semiteretibus obtusis elongatis, stipulis ovatis abbreviatis, capsulis oblongis calycem glandulosum superantibus, seminibus pellucido-marginatis glabris. *Europ.* (A. media L., glandulosa Jacqu., marginata Cand., Spergula Duf.)

radicans * 74. A. caule prostrato radicante glabro, foliis semiteretibus obtusis, stipulis ovatis scariosis, floribus axillaribus, capsulis calycem aequantibus, seminibus compressis. *In arena vulcanica Aetnae.* (Spergularia Presl.)

canadensis Pers. 75. A. caule prostrato glabriusculo, foliis filiformibus elongatis, floribus 5andris, capsula globosa, seminibus compressis. *Canada.* (A. rubra β. Mx.)

76.

grandis Kunth. 76. A. caule erecto, ramis cylindricis glabris, foliis ſubulatis verticillatis, ſtipulis ſcarioſis, pedunculis paniculatis, ſeminibus alatis. *Monte Video.* (Spergula grandis Perſ.)

purpurea Perſ. 77. A. caule erecto hiſpido, ramis divaricatis, foliis ſetaceis abbreviatis, pedunculis demum deflexis, petalis obtuſiſſimis calyce brevioribus, ſeminibus ſolidis. *Hiſpania.*

ſegetalis Lam. 78. A. caule erecto ramoſiſſimo, foliis filiformi-ſetaceis, ſtipulis ſcarioſis laceris, floribus paniculatis, petalis calyce brevioribus. *Europ. med.* (Alſine ſegetalis L.)

*** *Foliis filiformi-ſubulatis*

† *elongatis; caule elato: Orientales.*

juniperina 79. A. foliis ſubtriquetro-ſubulatis rigidis, ramorum ſterilium faſciculatis patentiſſimis, floribus paniculatis, petalis obtuſis calycem ſtriatum acutum glabrum ſuperantibus. *Armenia.*

graminifolia W. Schrad. 80. A. foliis filiformi-ſubulatis complicatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula pubeſcente, petalis calyces obtuſiſſimos margine ſcarioſos ſuperantibus. *Sibir. Ucrania. Tranſſylv. Caucaſ.* (A. filifolia M. B.)

longifolia M. B. 81. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, inferioribus longiſſimis, caule erecto ſimplici, panicula conferta glabra, petalis calyces obtuſos carinatos ſuperantibus. *Ad Volgam. Sibir.* (A. capillaris Poir.)

juncea M. B. 82. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula pauciflora glutinoſo-villoſa, ſepalis linearibus nervoſis petala aequantibus. *Sibir.* (A. davurica Fiſch.)

cucubaloides Sm. 83. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, floribus corymboſis, calycibus viſcoſis acutis corolla brevioribus. *Armenia.*

otitoides Adam. 84. A. foliis filiformi-ſubulatis ſerrulato-ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula congeſta, multiflora, floribus minimis, ſepalis lanceolatis petala aequantibus. *Sibir.*

holoſtea M. B. 85. A. foliis filiformi-ſubulatis elongatis margine ſcabris, caule erecto ſimplici, panicula pauciflora pubeſcente, calycibus acuminatis corolla brevioribus. *Caucaſ.*

rigida M. B. 86. A. foliis lineari-filiformibus margine ſerrulatis, caule ſimplici folioſo, floribus paniculato-faſtigiatis, bracteis ſepaliſque ſcarioſis elongatis acuminatis, corolla calycem ſubaequante. *Podolia. Ucrania.*

gypſophiloides Schreb. 87. A. foliis radicalibus ſetaceis, caulinis linearibus, panicula dichotoma pubeſcente, petalis lanceolatis calycem mucronatum ſuperantibus. *Aſia minor.*

formofa Fifch. 88. A. foliis lineari-fetaceis ciliato-fcabris, caule erecto fimplici pedunculisque pilofo-vifcidis, floribus paniculatis, calyce obtufo incraffato petalis amplis breviori. *Sibir. orient.*

lychnidea M. B. 89. A. foliis triquetro-fubulatis laevibus flexuofis, caule fimpliciffimo 3floro, calycibus acuminatis ftriatis corolla brevioribus. *Caucaf.*

Gmelini Fifch. 90. A. caule geniculato flexuofo, foliis linearibus obtufis, floribus paniculatis, petalis obovatis calycem fuperantibus. *Sibir.*

cephalotes M.B. 91. A. caule erecto firmo nodofo, foliis lineari-filiformibus elongatis, floribus paniculato-congeftis, calycibus acuminatis glabris corollam fubaequantiibus. *Tauria. Beffarabia.*

dianthoides Sm. 92. A. caule erecto fimplici, foliis filiformi-fubulatis fcabris, floribus fubcapitatis, bracteis fcariofis acuminatis pedunculos fuperantibus, calycibus obtufis corolla triplo brevioribus. *Armenia.*

verticillata W. 93. A. caule fuffruticofo ramofo, ramis nodofis pubefcentibus, foliis fafciculato-verticillatis fubulatis rigidis, pedunculis fubverticillatis axillaribus 4floris. *Armenia.*

pharnaceoides Ser. 94. A. caule ramofo glandulofo-pilofo, foliis fafciculatis filiformibus mucronulatis, floribus fubumbellatis, calycibus obtufis corolla brevioribus. *Afia minor.*

picta Sm. 95. A. caule dichotomo aphyllo fuperne pilofo, foliis fubulatis fafciculatis, petalis emarginatis fubtus venofis. *Cyprus.*

filiformis Labill. 96. A. caule fimplici filiformi fuperne nudo, foliis fetaceis, floribus paniculatis, calycibus glabris corolla brevioribus. *Cyprus.*

†† *Foliis filiformi-fetaceis abbreviatis.*

*fcandinavica** 97. A. caule afcendente paucifloro, foliis lineari-fubulatis bafi vaginantibus, pedunculis fubunifloris, petalis capfulisque calycem obtufum fuperantibus. *Regio arctica Scandinav.* (Stellaria biflora L. Alfine Wahlenb.)

*lapponica** 98. A. caule caefpitofo, foliis femiteretibus obtufis fubfecundis, fcapo unifloro glaberrimo, petalis capfulaque calycem laeviffimum aequantibus. *Alp. lappon.* (Spergula ftricta Sw. Alfine Wahlenb.)

*grönlandica** 99. A. caule decumbente paucifloro, foliis lineari-filiformibus fubcarnofis, petalis emarginatis calycem obtufiffimum fuperantibus. *Grönland.* (Stellaria Retz. Vahl.)

bavarica 100. A. caule erectiusculo caefpitofo glabro, foliis filiformibus fubcarnofis obtufiusculis, pedunculis terminalibus fructiferis curvatis, fepalis lanceolatis acutis margine fcariofis corolla brevioribus. *Bavaria.* Jungermann (1590.) *Mons Baldus.* Pona. Seguier.

fafciculata Gouan. 101. A. caule erecto ftricto, foliis fubulatis erectis, floribus fafciculatis, fepalis acuminatis margine

membranaceis corolla duplo longioribus, seminibus muricato-serrulatis. *Europ. med.* (A. fastigiata Sm., *mucronata Cand. Alsine mucronata Lam.)

tenuifolia 102. A. caule ramosissimo, foliis lineari-subulatis, floribus paniculatis, sepalis acuminatis corollam superantibus capsula brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (A. viscosa Pers., patula Mx., emarginata Brot. Alsine viscosa Schreb. Aren. hybrida Vill.) Stamina plura abortiunt.

setacea Thuill. 103. A. caule caespitoso ramosissimo inferne pubescente, foliis setaceis fasciculatis subsecundis basi ciliatis, floribus paniculato-fastigiatis, calycibus acutis margine membranaceis corollam aequantibus. *Gallia. Tauria.*

rupestris Labill. 104. A. caule ascendente superne hirsuto, foliis filiformibus obtusis confertis, floribus paniculatis, calycibus 3nerviis pubescentibus corolla brevioribus. *Libanus.*

filifolia Forsk. 105. A. caule suffruticoso elongato, foliis filiformi-setaceis confertis patulis, pedunculis 1floris elongatis, sepalis subulatis corollam aequantibus. *Arabia.*

recurva Wulff. 106. A. caule declinato paucifloro superne subpubescente, foliis lineari-subulatis sulcatis, inferioribus imbricatis recurvis, calycibus acutis nervosis corollam subaequantibus. *Alp. Europ. med. Caucas.*

hirsuta M. B. 107. A. caule declinato hirsuto, panicula multiflora, foliis lineari-subulatis, inferioribus imbricatis incurvis, calycibus acutis hirsutis corolla subbrevioribus. *Tauria. Caucas.*

verna 108. A. caule caespitoso erecto superne pubescente, foliis lineari-subulatis nervosis omnibus erectis, pedunculis sub-3fidis, calycibus acutis petala aequantibus. *Europ.* (A. caespitosa Ehrh.)

striata 109. A. caule erecto superne pubescente, foliis filiformibus subsubulatis patulis, pedunculis sub-2floris, sepalis oblongis obtusis striatis corolla capsulaque brevioribus. *Europ. med.* (A. liniflora Jacqu., saxatilis L., rostrata Kit., capillacea Allion. ?)

liniflora 110. A. caule suffruticoso distorto, foliis filiformimibus erecto-appressis, pedunculis subgeminis terminalibus abbreviatis, sepalis lanceolatis striatis corolla brevioribus. *Austria. Hungar. Caucas.* (A. pinifolia M. B.)

condensata Presl. 111. A. caule suffruticoso caespitoso, foliis 4fariam imbricatis triquetro-subulatis glabris, pedunculis solitariis, sepalis 5nerviis acutis corolla brevioribus. *Sicilia. Lusitania.* (A. Juressi W. herb.)

squarrosa Mx. 112. A. caule suffruticoso erecto, foliis imbricatis subulatis patentibus glabris, ramis floriferis elongatis erectis pubescentibus subaphyllis, calycibus ovatis corolla capsulaque brevioribus. *Amer. bor.*

ſtricta Mx. 113. A. caule caeſpitoſo erecto glabro, foliis lineari-ſubulatis erectis, panicula pauciflora, ſepalis lanceolatis corolla brevioribus. *Canada.*

ramoſiſſima W. 114. A. caule ramoſiſſimo procumbente, foliis ſubulatis recurvis, pedunculis calycibusque hiſpidis, petalis ſepala acuminata aequantibus. *Hungar.*

† *glomerata* M. B. 115. A. caule baſi ramoſo incano-pubeſcente, foliis e latiore baſi ſubulatis ſtrictis ſubappreſſis, floribus capitato-glomeratis, calycibus acuminato-cuſpidatis ſcarioſis ſtriatis petala longe ſuperantibus. *Tauria.* (Minuartae dichotomae ſimillima.)

pungens Steph. 116. A. foliis radicalibus aggregatis filiformi-ſetaceis elongatis rigidis patulis, caule paucifloro ſtricto viſcoſo-pubeſcente, petalis calyces obtuſiusculos ſuperantibus. *Sibir.*

1714. CUCUBALUS.

bacciferus *Europa.* Herba brachialis et altior ramoſa pubeſcens, foliis ovato-oblongis ſubſeſſilibus, pedunculis axillaribus, floribus albis, baccis nigris.

1715. SILENE.

* *Caule unifloro.*

† *Calycibus clavatis.*

valleſia 1. S. caule procumbente, foliis tomentoſis, radicalibus ſpathulatis, ſuperioribus lanceolatis, calycibus amplis ſtriatis coloratis. *Alp. pennin. cott. lepontin.*

corſica Cand. 2. S. caule ſuffruticoſo erectiusculo ramoſo, foliis ſubfaſciculatis obovatis viſcoſo-tomentoſis, pedunculo terminali erecto calycibus breviori. *Corſica. Hiſpania?* (S. aſcendens Lag.?)

elegans Brot. 3. S. caule erectiusculo abbreviato, foliis lineari-lanceolatis acutis aggregatis, pedunculis elongatis capillaribus, calycibus glabris ſtriatis erectis. *Luſitania.*

depreſſa M. B. 4. S. caule ſimplici procumbente, foliis lanceolatis ciliatis ſcabris, floribus ſubſeſſilibus terminalibus, calyce viſcido, dentibus obtuſis. *Armenia. Caucaſ.*

noduloſa Viv. 5. S. caule erecto nodoſo, foliis hiſpidis, radicalibus ſpathulatis, ſupremis lanceolatis breviſſimis, calycibus glabris. *Corſica.*

falcata Sm. 6. S. caule erectiusculo, foliis falcatis ſubulatis piloſis. *Olympus Aſiae minoris.*

Saxifraga 7. S. caule erecto foliisque linearibus acutis glabris, pedunculis elongatis, calycibus laevibus erectis. *Europ. med.*

petraea Kit. 8. S. caule erecto filiformi, foliis lineari-ſetaceis elongatis ſcabris, pedunculis elongatis, calycibus laevibus erectis. *Hungar.*

†† *Calycibus campanulatis.*

acaulis 9. S. caule abbreviato caeſpitoſo, foliis linearibus acutis, pedunculis erectis, calycibus glabris, petalis integris emarginatis. *Alp. Europ.* (S. exſcapa All.)

*dinarica** 10. S. caule caeſpitoſo, foliis linearibus elongatis glabris, pedunculis erectis pubeſcentibus, calycibus hirſutis nigreſcentibus, petalis 2fidis. *Alp. dinar.* (S. depreſſa Baumg.)

auriculata Sm. 11. S. caule erecto, foliis lanceolatis fimbriatis, calyce pubeſcente, petalis utrinque auriculatis. *Euboea.*

††† *Calycibus inflatis.*

Pumilio Wulff. 12. S. caule breviſſimo ſub-2phyllo, foliis lineari-lanceolatis laevibus, calyce maximo hirſuto, petalis repandis. *Alp. carn. nor. rhaet.* (Cucubalus L.)

** *Caule paucifloro.*

† *Calycibus clavatis.*

Siegeri Baumg. 13. S. caule erecto ſimpliciſſimo foliisque oblongo-lanceolatis glabris ciliatis, floribus terminalibus ſubternis bracteatis, calycibus ſtriatis coloratis, petalis obcordatis crenulatis. *Alp. dinar.*

aegyptiaca 14. S. caule erecto tomentoſo, foliis obovatis acutiusculis, floribus pedunculatis terminalibus paucis, calycibus pubeſcentibus, petalis obcordatis utrinque appendiculatis. *Aegypt.*

ſpathulata M. B. 15. S. caule aſcendente ſubdichotomo, foliis villoſis, radicalibus ſpathulatis, caulinis obovatis ovatisque, floribus terminalibus pedunculatis paucis, calycibus hirtis. *Caucaſ.* (S. pygmaea Adam.)

penſylvanica Mx. 16. S. caule humili ramoſo lanato, foliis ſpathulato-lanceolatis elongatis pubeſcentibus, pedunculis folia aequantibus paucifloris ſubcorymboſis, petalis emarginatis crenatis. *Amer. bor.*

repens Patrin. 17. S. radice repente, caule ſimpliciusculo, foliis linearibus acutis, floribus corymboſis, petalis bifidis, genitalibus exſertis. *Sibir.*

cretacea Fiſch. 18. S. caule ſuffruticoſo erecto ramoſo, foliis teretiusculis ſubulatis patentibus, pedunculis unifloris elongatis, calycibus glabris. *Sibir.*

caeſpitoſa Stev. 19. S. radice lignoſa, caule caeſpitoſo, foliis confertis linearibus acutis, floribus terminalibus ſub ternis, petalis 2lobis. *Caucaſ.*

dianthoides Perſ. 20. S. radice lignoſa, caule erecto filiformi ſuperne viſcoſo, foliis linearibus integerrimis, floribus ſubpaniculatis ternis bracteatis, petalis emarginatis. *Armenia.* (Cucubalus ſaxifragus Schreb.)

linifolia W. 21. S. caule erecto debili, foliis linearibus, infimis ſpathulatis, calycibus ſubſecundis pubeſcentibus ſtriatis. *Hiſpania. Afric. bor.* (S. arenarioides Deſf.?)

flavescens Kit. 22. S. caule simplici superne subaphyllo foliisque spathulato-lanceolatis incano-villosiusculis, calycibus subangulatis, petalis 2fidis. *Bannatus.*

†† *Calycibus cylindricis.*

cordifolia All. 23. S. caule suffruticoso erecto simpliciusculo foliisque subcordato-ovatis acuminatis viscido-pubescentibus, floribus terminalibus subsessilibus. *Alp. cott. pennin.*

foetida Link. 24. S. caule erecto simpliciusculo foliisque ovatis acutis villoso-tomentosis viscosis, floribus subterminalibus pedunculatis erectis. *Lusitan.*

halophila W. herb. 25. S. caule humili subramoso, foliis spathulato-lanceolatis piloso-glandulosis, floribus pedunculatis axillaribus erectis. *Hispan. austr.* (S. prostrata W. herb., hispanica Otth., parviflora Zea apud Poir.)

cryptantha Viv. 26. S. caule humili ramoso, foliis obovatis acutiusculis connatis hirsutis, floribus axillaribus subsessilibus. *Ager tripolit.* Cella.

rotundifolia Nutt. 27. S. caule decumbente diffuso, foliis oblongis utrinque attenuatis margine pilosis, pedunculis terminalibus 3fidis, calycibus hirsutis, petalis 4fidis. *Ad Ohio.*

††† *Calycibus inflatis.*

procumbens Murr. 28. S. caule procumbente, foliis lanceolatis acutis glabris, floribus pedunculatis axillaribus, petalis emarginatis. *Sibir.* (Cucubalus polyphyllus Fisch.)

fabaria Sm. 29. S. caule humili, foliis subrotundo-obovatis glaberrimis carnosis glaucis, pedunculis subumbellatis, petalis linearibus 4fidis. *Creta. Sicilia?* (Cucubalus fabarius L.)

*** *Floribus sparsis subsolitariis.*

† *Calycibus clavatis.*

canopica Delil. 30. S. caule herbaceo erecto glanduloso-piloso viscoso, ramis angulatis, foliis inferioribus spathulatis superioribus lanceolatis villosis, pedunculis axillaribus remotis demum reflexis. *Aegypt. super.*

angustifolia M. B. 31. S. caule simplici ascendente, ramis alternis 1floris, foliis linearibus elongatis glabris, calycibus pubescentibus. *Caucas.*

xeranthema Viv. 32. S. caule ascendente foliisque lanceolatis hirsutis, pedunculis axillaribus oppositis sub-1floris, calycibus glanduloso-hirsutis albicantibus, petalis elongatis. *Corsica.*

chloraefolia Sm. 33. S. caule erecto, foliis ovatis mucronatis glaucis glaberrimis, calycibus laevissimis. *Armenia. Caucas.*

Urvillii Schott. 34. S. caule suffruticoso ramosissimo, ramis superne nudis sub-1floris, foliis brevibus fasciculatis mucronatis, calycibus laevibus striatis. *Ins. Cos.*

†† *Calycibus campanulatis.*

quadridentata Cand. 35. S. caule gracili erecto ſubramoſo, ramis 1floris, foliis linearibus patentibus, calycibus glaberrimis, petalis 4dentatis. *Europ. med.* (Silene 4fida et Cucubalus 4fidus L. Lychnis 4dentata Murr. Silene puſilla Kit. var.)

rupeſtris 36. S. caule erecto ſubdichotomo foliisque ovato-oblongis acutis glaberrimis, pedunculis elongatis 1floris ſubcorymboſis, petalis emarginatis. *Alp. Europ. med. et bor.* (S. Kaulfuſsii *.)

caryophylloides Cand. 37. S. caule ſtricto nodoſo, foliis linearibus ſubulatis ſub-3nerviis pubeſcentibus, ramis 1floris, calycibus glabris, petalis 2lobis. *Aſia minor.* (Cucubalus Poir.)

ſedoides Jacqu. 38. S. caule erecto dichotomo glanduloſo-piloſo, ramis patentibus, foliis ſpathulato-oblongis villoſiusculis, pedunculis axillaribus demum reflexis, petalis obcordatis. *Gallia auſtr. Sicilia. Graecia.* (S. ramoſiſſima Sibth., divaricata Clem.)

††† *Calycibus cylindricis.*

noctiflora 39. S. caule erecto hirſuto ſuperne viſcoſo, foliis inferioribus ſpathulatis ſuperioribus lanceolatis, pedunculis axillaribus abbreviatis, calycis coſtati dentibus elongatis, petalis 2fidis crenulatis. *Europ. med.*

ornata Ait. 40. S. caule ramoſo viſcoſo pubeſcente, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus, calycibus coſtatis, petalis 2lobis. *C. B. S.*

laciniata Cav. 41. S. caule herbaceo tereti pubeſcente, foliis lanceolatis ſubvilloſis, calycibus pedunculatis terminalibus coſtatis, petalis longe unguiculatis 4fidis. *Mexico.*

†††† *Calycibus conicis ventricoſis.*

conica 42. S. caule erecto ſuperne 2partito, foliis lineari-lanceolatis pubeſcentibus, calycibus 30ſtriatis, petalis ſubintegris emarginatis. *Europ. med.* (S. conoidea L.)

††††† *Calycibus inflatis.*

pendula 43. S. caule erecto ramoſo pubeſcente, foliis oblongis acutis, pedunculis axillaribus remotis demum reflexis, calycibus coſtatis. *Europ. auſtr.* (S. ſcabriflora Brot. var. capſulis erectis?)

** ** *Floribus racemoſis ſecundis.*

† *Calycibus clavatis.*

ſericea All. 44. S. foliis ſpathulato-lanceolatis ſericeo-villoſis (villoſiſſimis et glabris), calycibus ſtriatis glabris, petalis longe unguiculatis. *Europ. auſtr.* (S. caneſcens Tenor., decumbens Bivon., pubeſcens Loiſ., litorea Brot., ciliata et geminiflora W.)

bellidifolia Jacqu. 45. S. erecta pubeſcens, foliis ſpathulato-lanceolatis acutis, racemis 2partitis, calycibus glabriusculis, petalis 2lobis. *Luſitania. Afric. bor. Inſ. maris aegei.* (S. veſpertina Retz., bipartita Desf., diſtachya Brot.)

Pourretii Poir. 46. S. erecta pubeſcens, foliis inferioribus lanceolatis acutis, ſuperioribus linearibus ciliatis, racemo ſpicato ſecundo ſimplici, calycibus glabris. *Hiſpan.* (S. ciliata Pour., arvatica et legionenſis Lag.)

nicaeenſis All. 47. S. caule erecto hirſuto ſuperne viſcoſo, foliis lanceolatis obtuſiusculis hirſutis, calycibus coloratis ſtriatis viſcoſis. *Liguria. Corſica. Hiſpan. Sicil. Afric. bor.* (S. viſcoſiſſima Tenor., arenaria Desf., Pſammitis Link.)

laxiflora Brot. 48. S. caule dichotome ramoſo hirſuto, foliis lanceolatis pubeſcentibus, calycibus remotis ſtriatis hirſutiſſimis breviter pedunculatis. *Luſitania. Hiſpania.* (S. ſabuletorum Link., eriophora W. herb.)

ſupina M. B. 49. S. caule ſuffruticoſo ramoſo aſcendente, foliis linearibus mucronatis incano-pubeſcentibus, calycibus breviter pedunculatis tomentoſis. *Tauria. Caucaſ.*

obtuſifolia W. 50. S. caule ramoſo villoſo ſublanato, foliis ſpathulatis obovatis obtuſis glabriusculis, calycibus ſubſeſſilibus hirſutis coſtatis. *Nepal.* (S. colorata Fiſch.)

hiſpida Desf. 51. S. caule ramoſo hiſpido, foliis lanceolatis ſubtus ſub-3nerviis ciliatis, calycibus erectis hirſutiſſimis confertis. *Ager romanus. Atlas.* (S. trinervia Sebaſt., diſticha W.)

imbricata Desf. 52. S. caule ramoſo hiſpido, foliis lanceolatis villoſis, racemis elongatis ſecundis, floribus confertis ſubſeſſilibus, calycibus glabris. *Afric. bor.*

craſſifolia 53. S. caule ramoſo hirſuto, foliis obovato-orbiculatis carnoſis utrinque piloſis, racemo terminali, calycibus hirſutis, petalis emarginatis. *C. B. S.*

cernua Thunb. 54. S. caule filiformi foliisque lineari-lanceolatis villoſis, calycibus hirſutiusculis ſubſeſſilibus. *C. B. S.* (S. Burchellii Otth.)

† *pernoctans* Link. 55. S. caule ſuperne nudo 2fido foliisque radicalibus ſpathulatis villoſiusculis, racemis virgatis, calycibus glabriusculis eſtriatis erectis pedunculatis. *Luſitania?*

†† *Calycibus cylindricis ſ. ovato-cylindricis ſtriatis.*

anglica 56. S. caule ramoſo piloſo ſubviſcido, racemo foliato laxo, foliis ſpathulato-lanceolatis, calycibus hirſutis alternis, petalis emarginatis. *Anglia.*

gallica 57. S. caule ramoſo hirſuto viſcoſo, foliis oblongo-lanceolatis, calycibus hirſutis, petalis integerrimis. *Gallia.*

luſitanica 58. S. caule ramoſo dupliciter glanduloſo-piloſo, foliis ſpathulatis lanceolatisque, calycibus hirſutiſſimis, petalis integris crenulatis. *Europ. auſtr.*

ceraſtoides 59. S. caule ſimpliciusculo, foliis inferioribus ſpathulatis ſuperioribus lanceolatis villoſiusculis, racemo ſpicato terminali nudo, calycibus ſubſeſſilibus confertis, petalis emarginatis. *Italia. Hiſpania.* (L. rigidula L., micropetala Lag., micrantha Link.)

quinquevulnera 60. S. caule ramoſo piloſo ſubviſcido, foliis lanceolatis, racemo foliato laxo, calycibus hirſutis alternis, petalis integerrimis. *Anglia. Europ. med.* (S. ocimoides Desf. et pedicellata Poir.)

tridentata Desf. 61. S. caule ramoſo hirſuto, foliis ſpathulato-lanceolatis, calycibus ſubſeſſilibus, dentibus elongagatis, petalis 3dentatis. *Afric. bor.*

brachypetala Cand. 62. S. caule ramoſo ſubſtrigoſo, ramis divaricatis foliisque obovatis lanceolatisque incano-ſubtomentoſis, floribus breviter pedicellatis, petalis bifidis calyce brevioribus. *Ad Maſſiliam.*

*chia** 63. S. caule erecto ſimplici piloſo, foliis inferioribus ſpathulatis, ſuperioribus lanceolatis acutis nitidis, calycibus ſubſeſſilibus, petalis obcordatis. *Inſ. Chios.* (S. ſciotica Otth.)

nocturna 64. S. caule elato hirſuto, foliis inferioribus ſpathulatis ſubdentatis ſuperioribus lineari-lanceolatis, calycibus ſubſeſſilibus ſtriatis, petalis 2fidis calycem ſuperantibus. *Europ. auſtr. Amer. bor.* (S. ſetacea Otth.)

mutabilis 65. S. caule erecto hirſuto, foliis omnibus lineari-lanceolatis, calycibus pedunculatis 10ſulcatis, petalis 2fidis calycem ſubſuperantibus. *Italia. Hiſpan.* (S. micropetala Cand., hirſuta Lag.)

clandeſtina Jacqu. 66. S. caule ramoſo, foliis inferioribus ovato-oblongis cinereo-pubeſcentibus, calycibus ſubſeſſilibus, petalis 2fidis calycem ſubſuperantibus. *Afric. bor.* et *auſtr.* (S. cinerea Desf., nyctantha W.)

apetala W. 67. S. caule ramoſo, calycibus foliisque lanceolatis pubeſcentibus, ramis patulis racemoſis, floribus apetalis. *Patria?*

ſetacea Viv. 68. S. caule erecto ſubhirſuto, foliis lineari-lanceolatis, ſummis latioribus, racemo paucifloro, calycibus incanis, petalis lineari-ſetaceis 2partitis calycem longe ſuperantibus. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.*

articulata Viv. 69. S. caule erecto nodoſo, foliis oblongis ſubhirſutis ciliatis, racemo paucifloro, calycibus ſtriatis hiſpidis, petalis 2fidis calycem ſubſuperantibus. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.*

ligulata Viv. 70. S. caule erecto hirſutiusculo, foliis linearibus ciliatis, racemo paucifloris, calycibus pedunculatis hiſpidis, petalis 2partitis obtuſis, ſquamis coronae faucis ſpathulatis. *Ager Tripolit.*

† *discolor* Sm. 71. S. caule diffuſo, foliis obovatis, calycibus villoſis, ſquamis coronae faucis emarginatis. *Cyprus.*

† *thymifolia* Sm. 72. S. caule ſuffruticoſo procumbente ramoſiſſimo, foliis ovato-oblongis, calycibus hirtis glutinoſis, ſquamis coronae faucis emarginatis. *Cyprus. Aſia minor.*

iberica M. B. — 73. S. caule ramoſo, ramis divaricatis, foliis lanceolatis pubeſcentibus, racemis 2partitis, calycibus glabris. *Iberia. Aſia minor.* (S. divaricata Sm.)

††† *Calycibus ovato-conicis ſubventricoſis ſtriatis.*

dichotoma Ehrh. — 74. S. caule erecto piloſiuſculo, foliis ſpathulatis oblongo-lanceolatis, racemo ſpicato 2partito, calycibus ſubſeſſilibus nutantibus 10coſtatis villoſo-viſcoſis, petalis 2partitis. *Hungar. Macedonia. Moeſia infer. Tauria. Aſia minor.* (S. 3nervis Soland. apud Ruſſel. ſeſſiliflora Desf. apud Poir.)

†††† *Calycibus inflatis.*

jeniſeenſis W. — 75. S. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis laevibus, pedunculis geminis erectis racemoſis ſecundis, calycibus 10angulatis apice bracteisque ſcarioſis, ſquamis coronae faucis 4partitis. *Sibir.* (S. graminifolia Otth., altaica Perſ. Cucubalus fruticuloſus Pall. ab ipſo auctore accept.)

***** *Floribus paniculatis,*

† *erectis.*

α. Calycibus clavatis.

Armeria — 76. S. panicula corymboſa, bracteis obſoletis, caule erecto foliisque ſubcordato-ovatis glaberrimis, calycibus coloratis, petalis integris. *Europ.*

compacta Hornem. M.B. — 77. S. panicula compacta, bracteis dilatatis pedicellos ſuperantibus, caule elato foliisque ovato-oblongis glaberrimis, calycibus coloratis, petalis integris. *Caucaſ. Transſylvan.*

Atocion Jacqu. — 78. S. panicula ſimplici corymboſa, petalis 2lobis utrinque ſubulato-dentatis, caule erecto pubeſcente ſuperne viſcoſo, foliis ſpathulato-lanceolatis ciliatis. *Cyprus. Aſia minor.* (S. orchidea L. ſuppl.)

Pſeudatocion Desf. — 79. S. panicula ſubfaſciculata, calycibus pubeſcentibus, petalis integerrimis, caule erecto foliisque oblongis obtuſiuſculis pubeſcentibus. *Sicil. Afric. bor.*

Lerchenfeldiana Baumg. — 80. S. panicula ſimplici corymboſa pauciflora, calycibus glaberrimis, petalis emarginatis, caule filiformi foliisque oblongo-lanceolatis ſubcrenulatis glaberrimis. *Alp. dinar.*

caeſpitoſa Stev. — 81. S. panicula ſubcapitata, calycibus tomentoſis, caule ſimpliciſſimo elongato foliisque ſubulatis carnoſis glabriuſculis. *Caucaſ.*

congeſta Sm. — 82. S. panicula congeſta, bracteis ellipticis ciliatis, calycibus hirtis, fauce petalorum nuda, caule foliisque ſpathulatis pubeſcentibus. *Attica.*

† *ſtaticifolia* Sm. — 83. S. panicula ſimplici corymboſa, foliis ſpathulato-linearibus glaberrimis. *Peloponneſ.*

velutina Pourr. 84. S. caule elato foliisque lanceolatis obtufis incano-tomentofis, panicula corymbofa terminali, calycibus villofo-tomentofis. *Corfica.*

canarienfis W. herb. 85. S. caule fimplici ftricto angulato, foliis pubefcentibus, radicalibus fpathulatis, caulinis lanceolatis acutis, paniculae congeftae terminalis ramis fubfecundis. *Teneriffa.* Brouffonet.

Gypfophila Desf. 86. S. caule ramofo incano-pubefcente, foliis lineari-lanceolatis acuminatis, paniculae ramis verticillatis, calycibus angulatis hirfutiufculis. *Patria?*

fibirica Perf. 87. S. caule fimpliciufculo foliisque oblongis utrinque attenuatis pubefcentibus, paniculae ramis verticillatis fubvifcofis, petalis emarginatis. *Sibir.* (Cucubalus L.)

virginica 88. S. caule erecto fublanato fuperne vifcofo, foliis oblongo-lanceolatis acutis ciliatis, panicula corymbofa, calycibus villofo-vifcofis, petalis 2fidis utrinque 1dentatis. *Amer. bor.* (S. Catesbaei Walt. W., cheiranthoides Poir.)

regia Sims. 89. S. caule erecto, foliis oblongo-lanceolatis, panicula corymbofa, calycibus pubefcentibus, petalis lanceolatis acutis indivifis. *Ad Miffifippi.*

† *Baldwini* Nutt. 90. S. caule erecto foliisque lanceolatis pilofis, panicula trichotoma, petalis divaricato-laciniatis. *Florida.*

Bergeri Schott. 91. S. caule fimplici bafi foliisque lanceolatis pilofiusculis, panicula fubcorymbofa pauciflora, calycibus hifpidis, petalis obcordatis. *Italia.*

fruticofa 92. S. caule fuffruticofo foliisque fpathulato-lanceolatis acutis ciliatis glabris, panicula trichotoma, calycibus vifcidis, petalis 2lobis. *Sicil.*

bupleuroides 93. S. caule herbaceo foliisque fpathulatis acutis fubcoriaceis glabris, paniculae fimplicis bracteis pedicellos fuperantibus, calycibus villofo-vifcidis, petalis 2lobis reticulatis. *Armenia. Perfia.*

molliffima Sm. 94. S. caule herbaceo foliisque fubcarnofis fericeo-villofis, radicalibus ovato-fpathulatis, panicula corymbofa fubtrichotoma, petalis 2fidis fauce nudis. *Afia minor.* (Cucubalus L.)

*pilofa** 95. S. caule erecto fuperne vifcofo, foliis incano-fubvillofis, radicalibus fpathulatis, caulinis lanceolatis, panicula trichotoma diffufa, petalis 2partitis fauce fubcoronatis. *Italia. Hungar. Transfylvan.* (Cucubalus pilofus W., molliffimus Kit., Vifcago molliffima Baumg.)

patula Desf. 96. S. caule fimplici pilofo fuperne vifcofo, foliis radicalibus ovato-oblongis acutis petiolatis, caulinis lanceolatis, paniculae ramis oppofitis, floribus congeftis, calycibus glabriusculis, petalis 2partitis coronatis. *Germania. Hungar. Afric. bor.* (S. nemoralis Kit. Cucubalus floccofus Ficin.)

longiflora Ehrh. 97. S. caule elato colorato foliisque lineari-lanceolatis glaberrimis, panicula elongata fimplici, calycibus coloratis laevibus, petalis 2fidis. *Hungar. Transfylvan.*

caesia Sm. 98. S. caule ramoso superne viscoso foliisque radicalibus obovatis acutis glauco-villosis, panicula corymbosa, petalis 2partitis linearibus. *Graecia.*

laevigata Sm. 99. S. foliis ellipticis, panicula patula, calycibus laevissimis enerviis, petalis angustis fauce nudis. *Cyprus.*

juncea Sm. 100. S. foliis spathulatis scabris, panicula patula, petalis angustis, squamis coronae 3dentatis. *Asia minor.*

ramosissima Sm. 101. S. caule ramosissimo foliisque spathulatis recurvis hirsutis, panicula patula, calycibus 10gonis, squamis coronae faucis 4fidis. *Creta.*

leucophaea Sm. 102. S. foliis oblongo-linearibus recurvis glutinosis, calycibus 10gonis, petalis angustis 2partitis, squamis coronae 2fidis. *Cyprus.*

rigidula Sm. 103. S. caule ramoso, foliis lanceolatis glabris, petalis acutis 2partitis, squamis coronae 4dentatis. *Attica.*

spinescens Sm. 104. S. caule suffruticoso, ramis oppositis horizontalibus spinescentibus, foliis spathulatis pubescentibus, panicula patula. *Asia minor.*

paradoxa 105. S. caule herbaceo erecto superne viscoso, foliis glabris lanceolatis, paniculae ramis oppositis patentibus sub-3floris, floribus polygamis (☿ et ♀), squamis coronae serratis. *Italia.*

italica Cand. 106. S. caule herbaceo erecto pubescente, foliis spathulato-lanceolatis, paniculae ramis viscosis sub-1floris, calycibus pubescentibus, petalis fauce nudis. *Italia. Gallia.* (Cucubalus italicus L., silenoides Vill. Silene Salzmanni Otth.)

catholica Otth. 107. S. caule erecto ramosissimo superne viscoso, foliis infimis spathulatis superioribus lanceolatis glabris, paniculae ramis laxis diffusis, calycibus coloratis glabris, petalis angustis fauce nudis, genitalibus exsertis. *Sicilia.* (Cucubalus catholicus L., glutinosus Retz., Silene Mussini Horn.)

reticulata Desf. 108. S. caule erecto superne viscoso ramoso, ramis virgatis, foliis lineari-lanceolatis glabris, paniculae ramis laxis unifloris, calycibus coloratis glabris, petalis obcordatis venosis basi utrinque 1dentatis. *Afric. bor.* (S. picta Pers., anastomosans Lag., grata Henckel.)

portensis 109. S. caule ramosissimo glabriusculo, foliis linearibus, ramis paniculae 1floris elongatis patulis, calycibus striatis glabris, petalis 2fidis. *Gallia. Lusitania.* (S. bicolor Thor.)

polyphylla 110. S. caule ramoso erecto, foliis fasciculatis lineari-setaceis glaucis, paniculae ramis 3floris, petalis bifidis calyces longe superantibus. *Transsylvan.*

stricta 111. S. caule stricto ramoso glabriusculo, foliis lanceolatis, paniculae simplicis ramis foliatis, pedunculis abbreviatis, petalis emarginatis calycem subexcedentibus. *Franconia. Gallia austr.* (S. linaccola Wibel.)

Muscipula 112. S. caule superne viscoso dichotomo, foliis lanceolatis subfasciculatis glabriusculis, paniculae

ramis dichotomis, calycibus glabris mediis breviter pedicellatis, petalis 2fidis. *Hiſpania. Italia. Afric. bor.*

inaperta 113. S. caule ramoſo glabro, foliis lineari-lanceolatis, paniculae ramis laxis 1floris, floribus ſub-5andris, petalis breviſſimis emarginatis. *Europ. auſtr.*

β. Calycibus campanulatis.

alpeſtris Jacq. 114. S. caule laevi dichotomo, foliis lineari-lanceolatis, paniculae ſimplicis ramis erectis glutinoſis, calycibus laevibus, petalis 4fidis. *Alp. Auſtr. Hungar.* (Lychnis alpeſtris L.)

rubella 115. S. caule ſimpliciusculo glabriusculo, foliis obovato-oblongis ſerrulato-ciliatis, panicula ſimplici, calycibus glabris tenuibus ſtriatis, petalis emarginatis breviſſimis conniventibus, corona faucis coalita. *Aegypt. Luſitania.* (S. micropetala Cand.?)

ſucculenta Delil. 116. S. caule diffuſo ramoſo, foliis obovatis carnoſis ramisque ſubpaniculatis villoſo-viſcoſis, petalis 2fidis involutis longe unguiculatis, ovario apice 3corni. *Aegypt.*

Otites Perſ. 117. S. caule ſtricto pubeſcente ſuperne oligophyllo, foliis inferioribus ſpathulatis villoſiusculis, paniculae ramis verticillatis, floribus dioecis, petalis linearibus indiviſis fauce nudis. *Europ.* (Cucubalus Otites L.)

volgenſis * 118. S. caule elato glabriusculo folioſo, foliis lanceolatis ſcabris ciliatis, paniculae decompoſitae ramis verticillatis, calycibus ſtriatis glabris, floribus hermaphroditis, petalis linearibus genitalia aequantibus. *Ad Volgam.* (Cucubalus W.)

parviflora Perſ. 119. S. caule erecto pubeſcente folioſo, foliis lineari-lanceolatis acuminatis glabriusculis, paniculae decompoſitae ramis verticillatis, calycibus ſtriatis, genitalibus longe exſertis, petalis linearibus ciliatis fauce nudis. *Hungar. Transſylvan.* (Cucubalus parviflorus Kit., effuſus Fiſch., caeſpitoſus Poir.)

multiflora Perſ. 120. S. caule ſimpliciſſimo viſcoſo, foliis ſcabris, radicalibus ſpathulatis, caulinis linearibus, paniculae ramis verticillatis, calycibus ſtriatis coloratis, petalis 2fidis planis. *Hungar. Transſylvan.*

fuſcata Link. Brot. 121. S. caule ſimplici glanduloſo-pubeſcente, foliis lanceolatis, floribus paniculatis breviter pedicellatis, calycibus viſcidis ſtriatis ſubcoloratis, petalis ſubemarginatis. *Luſitan.*

γ. Calycibus ovatis.

antirrhina 122. S. caule ramoſo foliisque lanceolatis pubeſcentibus, paniculae ſimplicis corymboſae ramis 3fidis, petalis emarginatis. *Virginia.*

ovata Pursh. 123. S. caule fimplici, foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabriusculis, panicula fimpliciuscula, genitalibus exfertis. *Georgia. Carolina.*

cretica 124. S. caule elato foliisque oblongo-lanceolatis fcabriusculis, paniculae diffufae foliatae ramis vifcidis, calycibus 10gonis glabris, petalis 2fidis. *Creta.*

indica Roxb. 125. S. caule altiffimo ramofo pubefcente, foliis late lanceolatis, calycibus ftriatis reticulatis, dentibus longis obtufiusculis, petalis 2fidis bafi utrinque 1dentatis. *Nepal.*

δ. *Calycibus inflatis.*

fpergulifolia M. B. 126. S. caule herbaceo foliisque fafciculatis linearibus incano-villofiusculis, ramis divaricatis fubpaniculatis, pedunculis ternis, calycibus bracteatis 10angulis hirfutis, petalis 2fidis. *Caucaf. Armenia.* (Silene polyphylla M. B. Cucubalus fpergulifolius Desf. fruticulofus Pall. it. 2. app. T. *)

lanuginofa Bertol. 127. S. caule fuffruticofo ramofo pubefcente, foliis lanceolato-linearibus fubcarnofis 3nerviis margine lanatis, panicula dichotoma, calycibus reticulato-venofis, petalis 4fidis. *Alp. apuan.*

†† *Floribus paniculatis nutantibus.*

α. *Calycibus clavatis.*

faxatilis M. B. 128. S. caule fimpliciusculo oligophyllo foliisque lanceolato-linearibus glabris, paniculae ramis oppofitis 3floris, calycibus ftriatis, petalis anguftis 2fidis. *Caucaf.*

macropetala * 129. S. caule glabro vifcofo, foliis lanceolatis cartilagineo-ciliatis fcabris, paniculae ramis dichotomis glutinofis, petalis 2fidis reflexis elongatis. *Syria.* (S. longipetala Vent.)

longicilia Otth. 130. S. caule pubefcente fuperne vifcofo, foliis lanceolatis cufpidatis pubefcentibus margine lanato-ciliatis, calycibus glabriusculis ftriatis, petalis fauce 2callofis. *Lufitania.* (Cucubalus longicilius Brot.)

nutans 131. S. caule fimplici afcendente villofo, foliis oblongis acutis pubefcentibus, floribus pendulis, calycibus vifcofo-villofiusculis, petalis 2partitis. *Europ. nemora.*

livida W. 132. S. caule hirfuto flexuofo infracto fuperne vifcofo, foliis oblongo-lanceolatis pubefcentibus, paniculae ramis fecundis, calycibus vifcidis, petalis 2partitis lividis. *Carniolia.*

infracta Kit. 133. S. caule infracto foliisque lanceolatis glaberrimis, paniculae ramis fubfecundis, calycibus laevibus ftriatis, petalis 2partitis. *Hungar.*

amoena 134. S. caule afcendente, ramis divaricatis, foliis lanceolatis fubtus pubefcentibus, paniculae diffufae ramis fubfecundis 3floris, calycibus villofis, fquamis coronae fubcoalitis. *Tataria.*

β. Calycibus cylindricis.

viridiflora 135. S. caule foliisque ovato-oblongis hirſutis, paniculae ramis brachiatis viſcoſis, calycibus villoſis, petalis 2fidis. *Luſitania. Tauria.*

chlorantha Ehrh. 136. S. caule foliisque oblongis acutis glabris, paniculae ramis ſecundis bracteatis, calycibus glabriuſculis, petalis anguſtis 2fidis. *Marchia Brandeb. Sileſia.* (Cucubalus chloranthus W.)

gigantea 137. S. caule erecto villoſo ſuperne glutinoſo, foliis inferioribus obovatis concavis carnoſis pubeſcentibus, paniculae ramis ſubverticillatis abbreviatis, calycibus pubeſcentibus, corona faucis obſoleta. *Africa?*

viſcoſa Perſ. 138. S. caule ſimplici villoſiſſimo villoſo, foliis lanceolatis undulatis, panicula ſubſpicata ſtricta, pedicellis ſub-3floris, petalis fauce nudis. *Dania. Suecia. Lithuania. Caucaſ. Ad Volgam.* (Cucubalus viſcoſus L.)

tatarica Perſ. 139. S. caule ſimpliciſſimo folioſo glabro, foliis lanceolatis, panicula ſpicata ſtricta, pedunculis oppoſitis ſecundis decumbentibus, petalis fauce nudis. *Neomarchia. Lithuania. Ruſſia. Sibir.* (Cucubalus L.)

latifolia Horn. 140. S. caule ramoſo elato foliisque ovato-oblongis ſubtus hirſutis, paniculae diffuſae ramis viſcoſiſſimis, pedicellis calycibusque coloratis villoſiuſculis, petalis longe unguiculatis 2partitis fauce coronatis. *Patria?*

γ. Calycibus inflatis.

inflata Sm. 141. S. caule ramoſo foliisque ovato-oblongis glabris ſ. pubeſcentibus, calycibus ovato-globoſis reticulatis laevibus, petalis fauce nudis 2fidis. *Europ.* (Cucubalus Behen L. . . S. maritima W. 1flora Roth. ſaponariae folia Schott. Cucubalus anguſtifolius Tenor. ? niveus Nutt. varr.)

Behen 142. S. foliis obovato-lanceolatis, panicula corymboſa, calycibus reticulatis, petalis obcordatis fauce coronatis. *Graecia. Aſia minor.*

ſtellata Ait. 143. S. caule erecto pubeſcente, foliis quaternis lanceolatis ſcabris ciliatis, panicula racemoſa, calycibus campanulatis glabris, petalis profunde crenato-fimbriatis fauce nudis. *Amer. bor.* (Cucubalus ſtellatus L.)

fimbriata Sims. 144. S. caule ramoſo foliis ovato-oblongis ſubtus pubeſcentibus, calycibus ampliſſimis pubeſcentibus, petalis fimbriatis fauce nudis. *Caucaſ.* (Cucubalus M. B.)

lacera Sims. 145. S. caule aſcendente foliisque ſpathulatis hirſutis, calycibus ampliſſimis campanulatis, petalis multifidis. *Caucaſ.* (Cucubalus Stev.)

colorata Schousb. 146. S. caule ramoſo declinato pubeſcente, foliis oblongis acutis 3nerviis, panicula trichotoma, calycibus venoſis, petalis 2partitis utrinque 1dentatis, ſquamis coronae denticulatis. *Mauritania.*

1716. CHERLERIA.

ſedoides 1. Ch. foliis 3gonis obtuſis ſub-3nerviis, floribus terminalibus pedunculatis 5partitis, pedunculis glabris. *Alp. Europ. med. et Scotiae.*

ſtellata Clark. 2. Ch. foliis 3gonis obtuſis apice ſtellato-patentibus, floribus terminalibus pedunculatis 5partitis, pedunculis hiſpidis. *Parnaſſus.*

octandra Sieb. 3. Ch. foliis planiusculis concavis ſubtus 3coſtatis, floribus ſeſſilibus 4partitis. *Alp. rhaet.*

1717. GARIDELLA.

Nigellaſtrum 1. G. floribus ſub-10andris, nectariis ſeſſilibus patentibus. *Gallia auſtr.*

unguicularis Lam. 2. G. floribus polyandris, nectariis longe unguiculatis cordatis erecto-conniventibus. *Syria.*

1718. DIAPHORA Lour.

cochinchinenſis Lour. *Cochinchina.* Gramen culmo 3quetro foliis ſubulatis, paniculis ſpicatis.

TETRAGYNIA.

1719. MICROPETALON Perſ.

lanceolatum Perſ. 1. M. caule foliisque lanceolatis glaberrimis, floribus paniculatis corollatis. *Amer. bor.* (Spergulaſtrum Mx.)

lanuginoſum Perſ. 2. M. caule foliisque lanceolatis ſublanatis, floribus ſubſolitariis longe pedunculatis apetalis. *Carolin. Louſiana.* (Spergulaſtrum Mx.)

PENTAGYNIA.

1720. CERASTIUM.

* *Fructibus ovato-globoſis.*

aquaticum 1. C. caule dichotomo piloſo ſuperne viſcoſo, foliis cordatis ſeſſilibus, pedunculis axillaribus ſolitariis fructiferis reflexis, denticulis capſulae 5, 6 rectis. *Europ. aquoſa.* (Stellaria aquatica Scop. Larbrea Hilar.)

maximum 2. C. caule diffuſo foliisque lanceolatis pubeſcentibus, floribus corymboſis, petalis 2lobis crenatis, capſula calycem aequante. *Sibir.*

rupeſtre Fiſch. 3. C. caule proſtrato ramoſo foliisque ovato-lanceolatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus ſolitariis, petalis 2lobis calycem obtuſum longe ſuperantibus, capſula calycem aequante. *Sibir.*

fontanum Baumg. 4. C. caule repente ſub-4gono hirſuto, foliis piloſis, radicalibus ſpathulatis caulinis ovatis, floribus

bus paniculatis, petalis 2fidis calyce brevioribus. *Transſylvan.*

manticum 5. C. caule erecto ſtricto foliisque lineari-lanceolatis glaberrimis, pedunculis elongatis rectis, ſepalis oblongis margine membranaceis corolla brevioribus, capſula calycem ſubaequante. *Italia. Helvetia. Hungar.*

dioecum Ait. 6. C. caule erecto villoſo-viſcoſo, foliis linearibus patentibus, floribus corymboſis, ſepalis acutis corolla brevioribus. *Hiſpan.*

incanum Ledeb. 7. C. caule erecto foliisque oblongo-linearibus acutis incano-pubeſcentibus, pedunculis trichotomis, calycibus corolla brevioribus capſulam ſuperantibus. *Sibir.*

heterophyllum Viv. 8. C. foliis glabriusculis, inferioribus ovatis ſuperioribus lineari-lanceolatis, calycibus hirſutis corollam ſuperantibus. *Corſica.*

elongatum Pursh. 9. C. hirſutum, foliis linearibus elongatis divaricatis, panicula terminali trichotoma longe pedunculata, calycibus acutis corolla brevioribus. *Ora occid. Amer. bor.*

ciliatum Kit. 10. C. caule ſtricto, foliis faſciculatis linearibus ſupra ſcabris ſubtus revolutis glabris, pedunculis terminalibus elongatis ſubcorymboſis, petalis 2fidis calyces obtuſos multo ſuperantibus. *Croatia.* (C. matrenſe Kit. *)

ſerpyllifolium M. B. 11. C. caule aſcendente pubeſcente ſuperne aphyllo, foliis oblongis obtuſis glabriusculis, ſepalis obtuſis glanduloſis corolla brevioribus. *Sibir.*

Searani Tenor. 12. C. caule diffuſo lanato, foliis oblongo-lanceolatis acutis utrinque ſubtomentoſis, pedunculis fructiferis horizontalibus, corolla calycem duplo excedente. *Neapol.*

fimbriatum Ledeb. 13. C. caule diffuſo angulato piloſo, foliis lanceolatis acuminatis glabris ciliatis, petalis multifidis. *Sibir.*

** *Fructibus oblongo-cylindricis.*

† *Corolla calycem ſuperante.*

grandiflorum Kit. 14. C. caule repente foliisque linearibus margine revolutis incano-tomentoſis, paniculae ramis patentibus, petalis ſepala margine ſcarioſa ſub-3plo ſuperantibus. *Hungar. Iberia.* (C. argenteum M. B.)

tomentoſum 15. C. caule repente, foliis lineari-oblongis obtuſiusculis lanato-tomentoſis, panicula dichotoma, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Europ. med. et auſtr. Tauria.* (C. repens M. B.)

arvenſe 16. C. caule declinato, foliis lineari-oblongis obtuſiusculis pubeſcentibus, petalis calyce longioribus, capſulis apice obliquo inaequaliter dentatis. *Europ. Aſia. Afric. Amer. bor.* (C. repens L. hirſutum Tenor.)

lanatum Lam. 17. C. caulibus caeſpitoſis, ſterilibus proſtratis floriferis erectiusculis, foliis ovali-ſubrotundis lanatis, pedunculis ſubbifloris, petalis emarginatis. *Pyren. et alp. Europ. auſtr.* (C. villoſum Baumg.)

latifolium 18. C. caulibus caeſpitoſis aſcendentibus ſubbifloris, foliis ovalibus hirſutis, petalis obcordatis, capſula apice 10dentata. *Alp. Europ. med.*

alpinum 19. C. caule erecto paucifloro, foliis ovatis acutiusculis ſubhirſutis, petalis obcordatis, capſula elongata. *Alp. Europ.* (C. glabratum Hartm.)

ovatum Hopp. 20. C. caule erecto, foliis ovatis acutis glabris ſubciliatis, floribus terminalibus ſubcorymboſis. *Carinthia.* (C. carinthiacum Veſt.)

glaciale Gaud. 21. C. caule caeſpitoſo villoſo-viſcoſo ſubbifloro, foliis ſpathulato-lanceolatis, pedunculis fructiferis divaricatis, capſula cylindrica calycem duplo excedente. *Mons Gotthard.*

davuricum Fiſch. 22. C. caule erecto foliisque cordato-oblongis amplexicaulibus glaberrimis, pedunculis terminalibus aggregatis divaricatis, petalis obcordatis ſepala oblonga ſuperantibus. *Davuria.*

campanulatum Viv. 23. C. caule erecto ramoſo villoſo, foliis radicalibus ſpathulatis, caulinis oblongis, panicula dichotoma, petalis 2fidis calyce duplo longioribus. *Italia. Hungar.* (C. praecox Tenor. ſylvaticum Kit.)

frigidum M. B. 24. C. caule ramoſo aſcendente, foliis hirſutis, radicalibus ſpathulatis, caulinis lanceolatis acutis, ramis ſub-3floris, calycibus acutis coloratis corolla brevioribus. *Caucaſus.* (C. purpuraſcens Adam.)

ſtrictum 25. C. caule ſtricto baſi ſuffruticoſo, foliis lineari-lanceolatis glabriusculis, pedunculis terminalibus ſub-3floris. *Alp. Europ. med.* (C. ſuffruticoſum L., molle et laricifolium Vill., lineare All.)

Colsmanni Lehm. 26. C. caule ſtricto, foliis verticillato-faſciculatis reflexis oblongo-linearibus glabriusculis, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis, petalis integris calyces obtuſiusculos 3plo ſuperantibus. *Ad fretum Magellan.*

penſylvanicum Horn. 27. C. caule aſcendente pubeſcente ſuperne viſcido, foliis linearibus acutis elongatis, panicula terminali dichotoma, calycibus acutis. *Penſylvania.* (C. tenuifolium Pursh. glutinoſum Nutt. nutans Rafin.)

piloſum Ledeb. 28. C. caule erecto piloſo, foliis oblongis obtuſis ſubtus glaucis, floribus terminalibus ſubternis demum nutantibus, capſulis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

rigidum Ledeb. 29. C. caule elato apice dichotomo foliisque oblongis acutis hirſutis, pedunculis capſulisque elongatis. *Sibir.*

molliſſimum Poir. 30. C. caule ſubſimplici foliisque lanceolatis acuminatis villoſiusculis, floribus corymboſis, corolla calycem acutum ſubſuperante. *Peru.*

Willdenovii Kunth. 31. C. caule erecto apice dichotomo, foliis oblongo-lanceolatis acutis lanatis, capſulis calycem ſubaequantibus. *Quito.* (Stellaria mollis W. herb.)

glutinoſum Kunth. 32. C. caule aſcendente apice dichotomo foliisque lanceolatis acuminatis villoſo-viſcoſis, petalis 2lobis, capſulis calycem ſuperantibus. *Nov. Granat.*

lithoſpermifolium Fiſch. 33. C. caule ramoſo foliisque lanceolatis acutis pubeſcentibus, floribus ſolitariis, petalis emarginatis, ſepalis ellipticis. *Sibir.*

imbricatum Kunth. 34. C. caule ramoſiſſimo repente, foliis 4fariam imbricatis obovato-oblongis obtuſis villoſis, capſulis calycem piloſum ſuperantibus. *Alp. peruv.*

†† *Corolla calycem aequante vel minore.*

vulgatum 35. C. caule erecto hirſuto ſubviſcoſo, foliis ovatis acutis, floribus pedicellos ſuperantibus. *Europ. Aſia. Africa. Amer. bor.* (C. barbulatum Wahlenb., ovale Perſ.)

viſcoſum 36. C. caule procumbente hirſuto ſubviſcoſo, foliis oblongo-lanceolatis, pedicellis flores ſuperantibus. *Europ.* (C. vulgatum Hudſ. Curt.)

† *ſtrigoſum* Fries. 37. C. caule erecto foliisque oblongis obtuſis ſtrigoſis, floribus ſubcapitatis, ſepalis lanceolatis hiſpidis petala longe ſuperantibus. *Suecia auſtr. Inſ. Mön.*

holoſteoides Fries. 38. C. caule alternatim hinc piloſo, foliis radicalibus obovato-oblongis, caulinis lanceolatis glabris, pedunculis ſubumbelliferis, petalis calyce brevioribus. *Suecia. Dania.*

ſemidecandrum 39. C. caule erecto humili incano-pubeſcente viſcido, foliis ovato-oblongis, floribus ſubumbellatis 5andris, petalis emarginatis calyce brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (C. pumilum Curt. alſinoides Perſ. gracile Duf.)

macilentum Aſpegren. 40. C. caule diffuſo glaberrimo, foliis ovato-lanceolatis acutis, panicula dichotoma congeſta, petalis 2partitis calyce brevioribus. *Blekinga, prov. Sueciae. Corſica?* (C. tenue Viv.?)

divaricatum Herbich. 41. C. caule dichotomo incano-villoſo, foliis oblongis, pedunculis elongatis erectis, petalis emarginatis calycem aequantibus. *Neapol.*

pentandrum 42. C. caule humillimo ſubviſcido, foliis ſubrotundis obtuſis, floribus paniculatis 5andris, petalis 2dentatis calyce brevioribus. *Hiſpan. Tauria.*

brachypetalum Perſ. 43. C. caule erecto tomentoſo dichotomo, foliis ovatis, floribus longe pedunculatis ſubpaniculatis, calycibus villoſis petala ſuperantibus capſulas aequantibus. *Gallia. Alſatia.* (C. murale Desport.)

tauricum * 44. C. caule erecto ramoſo villoſo-viſcoſo, foliis oblongis villoſiſſimis, racemis terminalibus flavido-hirſutis, pedicellis nutantibus elongatis, capſulis cylindricis calycem ſubſuperantibus, denticulis rectis. *Tauria.*

† *diffusum* Pers. 45. C. caule ramosissimo villoso, foliis ovato-lanceolatis hispidiusculis, floribus dichotomo-paniculatis pedicellos aequantibus, petalis emarginatis calyce brevioribus, capsula obovata calycem aequante. *Patria?*

spathulatum Pers. 46. C. caule erecto foliisque spathulato-oblongis villosissimis, floribus subglomeratis terminalibus. *Jamaica.*

ruderale M. B. 47. C. caule erecto dichotomo foliisque oblongis obtusis hirsutis, petalis calycem aequantibus, capsulis pendulis incurvis elongatis. *Tauria.*

dichotomum 48. C. caule dichotome ramoso foliisque lanceolatis piloso-viscosis, floribus aggregatis breviter pedunculatis, sepalis lanceolatis petala aequantibus, capsulis denticulisque erectis calycem superantibus. *Hispan. Afric. bor.*

nemorale M. B. 49. C. caule erecto superne dichotomo foliisque lanceolatis hirsutis, floribus longe pedunculatis, petalis calycem aequantibus, capsulae elongatae denticulis revolutis. *Caucas.*

caucasicum Fisch. 50. C. caule elato dichotomo, ramis elongatis, foliis lanceolatis glabris margine scabris, paniculae ramis patentissimis 2fariam pilosis, petalis calycem glaberrimum aequantibus, capsulae cylindricae denticulis revolutis. *Caucas.* (C. elongatum M. B.)

longifolium W. 51. C. caule erecto dichotomo piloso-viscoso, foliis lineari-lanceolatis hirsutis, pedunculis fructiferis patentissimis, capsulis calycem aequantibus. *Armenia.*

Commersonii Ser. 52. C. caule dichotomo angulato pubescente viscido, foliis linearibus elongatis obtusis amplexicaulibus glabriusculis, pedunculis umbellatis, petalis capsulisque calycem aequantibus. *Monte Video.* (C. longifolium Juss. apud Poir.)

perfoliatum 53. C. caule erecto foliisque lanceolatis connatis glaucis glaberrimis, pedunculis terminalibus aggregatis, capsulis calycem multo superantibus. *Graecia. Sibir.*

1721. LYCHNIS.

* *Floribus solitariis.*

coronaria Desr. 1. L. tomentosa, caule dichotomo, foliis oblongis calycibusque costatis coriaceis, petalis emarginatis serratis fauce coronatis. *Europ. med. Tauria.* (Agrostemma L.)

Githago Scop. 2. L. hirsuta, foliis linearibus, calycibus elongatis subcoriaceis, petalis integerrimis fauce nudis. *Europ.* (Agrostemma L.)

Coeli rosa Desr. 3. L. glabriuscula, foliis linearibus, calycibus subcoriaceis clavatis 10costatis, laciniis cuspidatis, petalis bilobis fauce coronatis. *Europ. austr.* (Agrostemma L.)

laeta Ait. 4. L. glabra, caule dichotomo, foliis lanceolatis ciliatis, calycibus 10angulatis breviter dentatis, petalis emarginatis fauce coronatis. *Luſitania. Hiſpania. Corſica.* (L. paluſtris Brot. corſica Loiſ. L. diclinis Lag. var. pubeſcens.)

nivalis Kit. in lit. 5. L. glabra, foliis radicalibus oblongis ciliatis in petiolos longos attenuatis, ſcapo 1floro bracteato, bracteis linearibus elongatis ciliatis, calyce campanulato aequali obtuſe dentato, petalis amplis lobatis fauce coronatis. *Alp. carpath. ad Caeciam.* (Maramaros.)

apetala 6. L. caule ſub-1floro pubeſcente, foliis lineari-lanceolatis glabris, calyce nutante inflato ſtriato petala ſuperante. *Scandinavia arctica.* (L. brachypetala Fiſch. pauciflora Ledeb. var.)

** *Floribus aggregatis: pedunculis multifloris.*

grandiflora Jacq. 7. L. caule ramoſo foliisque oblongis nervoſis glabris, floribus terminalibus ſubternis, calycibus clavato-coſtatis, petalis amplis laciniato-dentatis. *China. Japon.* (L. coronata Thb. Hedona ſinenſis Lour.)

variegata Desf. 8. L. caule ſimplici glabro, foliis ſubrotundis carnoſis glauco-pruinoſis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus cylindricis coloratis, petalis emarginatis variegatis. *Creta.*

ſibirica 9. L. caule ſimplici foliisque linearibus villoſiuſculis, pedunculis terminalibus erectis aggregatis, calycibus campanulatis ſtriatis, petalis bifidis. *Sibir.*

pyrenaica Berger. 10. L. caulibus caeſpitoſis flaccidis glabris, foliis glauceſcentibus, radicalibus ſpathulatis, caulinis cordatis ſeſſilibus, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis, calycibus campanulatis glabris, petalis ſubemarginatis. *Pyren.* (L. nummularia Lapeyr.)

dioeca 11. L. caule erecto foliisque oblongis hirſutis, pedunculis aggregatis, floribus dioecis, calycibus inflatis coſtatis, petalis bifidis. *Europ.* (L. ſylveſtris et pratenſis Schk., diurna et veſpertina Sibth. varr. e ſolo. In Tauria et Graecia ſemper fl. albo.)

Flos Cuculi 12. L. caule ſuperne viſcido, foliis lanceolatis glabris, floribus paniculatis, calycibus campanulatis, petalis 4fidis. *Europ. prata.*

fulgens Fiſch. 13. L. caule erecto piloſiſſimo, foliis oblongis hirſutis, florum faſciculis terminalibus 3fidis, petalis 2fidis amplis baſi utrinque dente lineari elongato auctis. *Sibir.*

chalcedonica 14. L. caule erecto foliisque lanceolatis hirſutiuſculis, floribus terminalibus denſe faſciculatis, petalis 2fidis baſi utrinque ſubdentatis calycem ſubſuperantibus. *Aſia minor.*

Flos Jovis Desr. 15. L. tomentoſa, foliis lanceolato-linearibus, floribus umbellato-capitatis, calycibus clavatis co-

ſtatis, petalis 2lobis. *Helvetia. German. occid. Italia ſuper.* (Agroſtemma L.)

alpina — 16. L. glabra, caule ſtricto caeſpitoſo, foliis lineabus, floribus capitatis bracteatis, petalis bifidis. *Alp. Europ. méd. Scandinav. arctica. Amer. bor.*

magellanica Desr. — 17. L. ſubvilloſa, foliis linearibus acutis, floribus faſciculatis terminalibus, petalis emarginatis baſi utrinque dentatis calycem ſubaequantibus. *Ad fretum Magellan.*

Viſcaria — 18. L. caule viſcoſo, foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus faſciculatis, petalis ſubintegerrimis, capſula 5loculari. *Europ.*

1722. SPERGULA.

arvenſis — 1. Sp. foliis verticillatis, floribus paniculatis 10andris, ſeminibus ſolidis hiſpidis. *Europ. Amer. bor. auſtr.* (Sp. geniculata et villoſa Perſ. maxima Weih. viſcoſa Lag.)

pentandra — 2. Sp. foliis verticillatis, floribus paniculatis 5andris, ſeminibus margine alatis. *Europ.*

nodoſa — 3. Sp. foliis ſubulatis, imis oppoſitis ſuperioribus faſciculatis, ramis ſub-1floris, corolla calycem ſuperante. *Europ.* (Sp. glanduloſa Beſſ.)

laricina — 4. Sp. caule decumbente, foliis oppoſitis faſciculatis ſubulatis rigidis ciliatis, petalis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

glabra W. — 5. Sp. caule aſcendente ramoſo, foliis oppoſitis faſciculatis ſubulatis flaccidis, pedunculis terminalibus elongatis 1floris, corolla calycem ſuperante. *Alp. cott.* (Sp. ſaginoides All.)

pilifera Cand. — 6. Sp. caule repente ramoſo, foliis oppoſitis faſciculatis linearibus rigidiuſculis apice piliferis, pedunculis axillaribus 1floris, corolla calycem ſuperante. *Corſica. Auſtria.* (Sp. laricina Wulff.)

ſaginoides — 7. Sp. caule aſcendente ramoſo, foliis oppoſitis linearibus, pedunculis terminalibus ſolitariis, corolla calycem aequante. *Sudetes. Anglia. Suecia. Helvetia. Sibiria. Carolina.*

ſubulata Sw. — 8. Sp. caule aſcendente, foliis linearibus ciliatis apice ſetiferis, pedunculis ſolitariis elongatis, corolla calycem ſubaequante. *Europ.* (Sp. ſaginoides Retz. laricina Lightf.)

† *apetala* Labill. — 9. Sp. caule humili ſubramoſo, foliis lineari-ſubulatis pedunculos 1floros axillares ſubaequantibus, floribus apetalis 5andris. *Terra Diemen.*

1723. BERGIA.

verticillata W. — 1. B. foliis oblongo-lanceolatis apice ſerrulatis, floribus ſubſeſſilibus verticillatis confertiſſimis. *Ind. or. Aegypt.* (B. capenſis L. Elatine luxurians Delil.)

glomerata Thb. — 2. B. foliis obovatis crenulatis, floribus ſubaggregatis quaternis ſeſſilibus. *Afric. auſtr.*

ammannioides Roth. 3. B. foliis oblongis argute ferratis fupra cauleque hifpidis fubtus tomentofis, floribus axillaribus fafciculatis 5andris. *Ind. or.*

1724. OXALIS.

* *Foliis fimplicibus.*

† *acaules.*

monophylla 1. O. foliis ellipticis obtufis, fcapo 1floro, filamentis glabris. *C. B. S.*

lepida Jacq. 2. O. foliis obovatis fubretufis, fcapo 1floro, filamentis fimplicibus glandulofo-pilofis. *C. B. S.*

roftrata Jacq. 3. O. foliis obovatis retufis, fcapo 1floro, filamentis interioribus apice roftratis pilofo-glandulofis, antheris lateralibus. *C. B. S.*

primulaefolia Radd. 4. O. foliis obovato-oblongis, fcapo multifloro afcendente. *Brafil.*

†† *caulefcentes.*

aliena * 5. O. foliis cordato-ovatis acutis villofis, pedunculis compreffis alatis multifloris, ftaminibus exterioribus ftylos fuperantibus. *Brafil.* (O. Mandioccana Radd.)

ciliata * 6. O. foliis cordato-orbiculatis obtufis ciliatis, petiolis pedunculisque multifloris hirfutis, ftylis ftamina fuperantibus. *Brafil.*

** *Foliis binatis: acaules: fcapo unifloro.*

afinina Jacq. 7. O. foliis lanceolatis margine cartilagineo-denticulatis, petiolis alatis, fcapo folia fuperante. *C. B. S.*

lanceaefolia Jacq. 8. O. foliis lanceolatis margine cartilagineo-fcabris, petiolis alatis, fcapo folia aequante. *C. B. S.*

leporina Jacq. 9. O. foliis ellipticis emarginatis cartilagineo-denticulatis, petiolis alatis, fcapo folia fuperante. *C. B. S.*

crifpa Jacq. 10. O. foliis obovato-fubrotundis emarginatis undulatis, petiolis fubrotundo-alatis, fcapo folia fuperante. *C. B. S.*

*** *Foliis ternatis.*

α. *Acaules.*

† *Scapo unifloro folia fuperante.*

fabaefolia Jacq. 11. O. foliolis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. *C. B. S.*

laburnifolia Jacq. 12. O. foliolis oblongis obtufis, petiolis femiteretibus compreffis, calycibus margine glandulofo-pilofis, ftylis ftamina interiora fuperantibus. *C. B. S.*

rubro-flava Jacq. 13. O. foliolis lanceolato-oblongis retuſis pubeſcentibus, intermedio cuneiformi, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

flaccida Jacq. 14. O. foliolis oblongis retuſis pubeſcentibus, intermedio cuneiformi, ſcapo nutante folia duplo ſuperante, ſtaminibus exterioribus ſtylos excedentibus. *C. B. S.*

exaltata Jacq. 15. O. foliolis ellipticis emarginatis ſubtus villoſis, intermedio cuneiformi, ſcapo ſtricto folia duplo ſuperante, ſtaminibus exterioribus ſtylos excedentibus. *C. B. S.*

tricolor Jacq. 16. O. foliolis oblongis obtuſis calycibusque piloſis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

variabilis Jacq. 17. O. foliolis ſubrotundis piloſis, intermedio cuneiformi, ſcapo flaccido, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

purpurea Jacq. 18. O. foliolis ſubrotundo-obovatis ciliatis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. humilis Thunb.)

Acetoſella 19. O. foliolis obcordatis ſcapoque piloſiuſculis, petalis ſtriatis, radice articulato-ſquamata. *Europ. nemora. Japon. Amer. bor.* (O. americana Bigel.)

obtuſa Jacq. 20. O. foliolis obcordatis denſe piloſis, calycibus obtuſiſſimis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

lanata 21. O. foliolis obcordatis villoſis ſubtus albo-lanatis, calycibus acutis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

truncatula Jacq. 22. O. foliolis truncato-cuneatis margine villoſis ſubtus lividis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

punctata 23. O. foliolis obcordatis utrinque punctatis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

fallax Jacq. 24. O. foliolis obcordatis piloſiuſculis ciliatis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

tenella Jacq. 25. O. foliolis obcordatis glabris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

tenera * 26. O. foliolis obcordatis glabris, ſcapo flaccido laevi ſubbifloro, ſtylis ſtamina omnia ſuperantibus. *Monte Video.* Sello.

minuta Jacq. 27. O. foliolis lineari-lanceolatis acutis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

filifolia Jacq. 28. O. foliolis filiformi-linearibus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

†† *Scapo unifloro folia aequante vel breviori.*

puſilla Jacq. 29. O. ſubcauleſcens, foliolis cuneiformi-linearibus emarginatis glaucis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ſanguinea Jacq. 30. O. foliolis oblongis obtuſis pubeſcentibus, petiolo ſemitereti compreſſo, calycibus piloſis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ambigua Jacq. 31. O. foliolis oblongis obtufis pilofiusculis, fepalis aequalibus pilofis apice bimaculatis, ftylis ftamina fuperantibus. *C. B. S.*

undulata Jacq. 32. O. foliolis oblongis obtufis undulatis, fepalis inaequalibus pilofis punctatis, ftylis ftamina fuperantibus. *C. B. S.*

fufcata Jacq. 33. O. foliolis oblongis obtufis pilofis maculatis, fepalis aequalibus interrupte biftriatis, ftylis ftamina fuperantibus. *C. B. S.*

glandulofa Jacq. 34. O. foliolis oblongis obtufis, petiolis calycibusque glandulofis, ftaminibus interioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

grandiflora Jacq. 35. O. foliolis fubrotundis fubcuneatis, petalis truncatis, ftaminibus exterioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

fulfurea Jacq. 36. O. foliolis fubrotundis fubtus punctatis fanguineis, fepalis reflexis clavato-pilofis glandulofis, ftaminibus exterioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

laevigata W. 37. O. foliolis fubrotundis glaberrimis, ftaminibus ftylos fuperantibus. *C. B. S.?*

brevifcapa Jacq. 38. O. foliolis fubrotundis fubtus punctatis fanguineis, petiolis plano-compreffis, ftaminibus interioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

fpeciofa Jacq. 39. O. foliolis fubrotundis ciliatis, ftylis ftamina interiora fuperantibus. *C. B. S.* (O. purpurea L. Thunb., fugillata et rigidula Jacq. varr.)

cruentata Jacq. 40. O. foliolis obovatis emarginatis hirfutis, ftaminibus interioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

magellanica Forft. 41. O. foliolis obcordatis carnofis glabris, ftylis ftamina interiora aequantibus, radice fibrofa. *Chili. Ad fretum Magellan.* (O. carnofa Molin.)

ferruginata Jacq. 42. O. foliolis obcordatis punctato-maculatis villofo-ciliatis, ftaminibus interioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

marginata Jacq. 43. O. foliolis obcordatis ciliatis fubtus fanguineis, fepalis reflexis clavato-ciliatis, ftaminibus interioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

pulchella Jacq. 44. O. foliolis obcordatis fubtus fanguineis punctatis, fcapo abbreviato, fepalis reflexis clavato-ciliatis, ftylis ftamina interiora fuperantibus. *C. B. S.*

ftrumofa Jacq. 45. O. foliolis obcordatis fupra fufco-maculatis fubtus fanguineis, ftylis breviffimis fub apice tuberculatis. *C. B. S.*

luteola Jacq. 46. O. foliolis obcordatis pilofis, ftaminibus exterioribus ftylos fuperantibus. *C. B. S.*

macrogonya Jacq. 47. O. foliolis obcordatis ciliatis, ftylis ftamina interiora fuperantibus. *C. B. S.*

††† *Scapo multifloro.*

virgofa Molin. 48. O. foliolis cuneiformibus emarginatis, fcapo longiffimo, floribus verticillatis. *Chili.*

megalorrhiza Jacq. 49. O. foliolis obovatis emarginatis, fcapo foliis breviori umbellifero, radice craffiffima ramofa. *Chili.*

articulata Savign. 50. O. foliolis obcordatis ſericeo-tomentoſis, ſcapo folia ſubaequante umbellifero, calycibus apice glanduloſis. *Monte Video.*

compreſſa 51. O. foliolis obcordatis ſubtus hirſutis, petiolis plano-compreſſis, ſcapo 2floro folia ſuperante, ſtylis ſtamina interiora excedentibus. *C. B. S.*

ſericea 52. O. foliolis obcordatis ſericeis, ſcapo umbellifero folia ſuperante, floribus nutantibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

violacea 53. O. foliolis obcordatis glabris, ſcapo 2fido umbellifero folia ſuperante, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Amer. bor.*

caprina 54. O. foliolis obcordato-2lobis glabris, ſcapo longiſſimo umbellifero paucifloro, floribus erectis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. macrophylla Horn.)

cernua Thunb. 55. O. foliolis obcordato-2lobis glabris ciliatis, ſcapo umbellifero longiſſimo, floribus cernuis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

libyca Viv. 56. O. foliolis obcordatis hirſutis, ſcapo umbellifero multifloro folia ſuperante. *Ager cyrenaic.*

dentata Jacq. 57. O. foliolis obcordatis, ſcapo paucifloro, floribus nutantibus, ſepalis apice 3dentatis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *C. B. S.*

livida Jacq. 58. O. foliolis obcordato-2partitis ſubtus violaceis, ſcapo ſubbifloro, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

purpurata Jacq. 59. O. foliolis obcordatis ciliatis ſubtus ſanguineis, ſcapo umbellifero, ſtylis longiſſimis. *C. B. S.*

corymboſa Cand. 60. O. foliolis obcordatis latiſſimis utrinque rotundatis glabriuſculis, ſcapo 2fido ramoſo corymboſo multifloro. *Inſ. Maſcaren.*

macrophylla Kunth. 61. O. foliolis obcordatis pubeſcentibus, ſcapo multifloro, ſepalis obtuſis apice maculatis, ſtylis longiſſimis. *Nov. Granat.*

latifolia Kunth. 62. O. foliolis latiſſimis emarginato-2lobis ciliatis, ſcapo ſub-6floro, ſepalis obtuſis apice maculatis, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *Mexico.*

Schraderiana Kunth. 63. O. foliolis ſubrotundo-obovatis emarginatis glabris, ſcapo multifloro, ſepalis obtuſis apice maculatis, ſtylis ſtamina breviora ſubaequantibus. *Nov. Granat.*

Jacquiniana Kunth. 64. O. foliolis ſubrotundo-obovatis 2lobis petiolisque glabris, ſcapo paucifloro, ſepalis obtuſis apice bimaculatis, ſtylis longiſſimis. *Mexico.*

debilis Kunth. 65. O. foliolis obcordatis ſubtus pubeſcentibus, ſcapo 2fido 6floro, ſepalis obtuſiuſculis apice maculatis, ſtylis longiſſimis. *Nov. Granat.*

elegans Kunth. 66. O. foliolis obovatis emarginatis ſubtus violaceis petiolisque glabris, ſcapis longiſſimis paucifloris, ſepalis acuminatis apice bimaculatis, ſtylis longiſſimis. *Peru.*

β. Caulescentes.

† *Pedunculis unifloris.*

aa. Caule inferne nudo.

ciliaris Jacq. 67. O. caule erecto, foliolis oblongis emarginatis ciliatis, pedunculo petiolos ſuperante, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

† *longiflora* 68. O. foliolis ſemi-2fidis, lobis lanceolatis, floribus elongatis. *C. B. S.*

natans 69. O. foliolis obcordatis laevibus, pedunculis folia aequantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Afric. auſtr. aquae.*

convexula Jacq. 70. O. foliolis ſubrotundis punctatis, ſtipulis dilatatis acuminatis, pedunculis folia excedentibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

bifida Jacq. 71. O. foliolis cuneiformibus 2lobis glabris, pedunculis folia excedentibus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

filicaulis Jacq. 72. O. caule filiformi elato ſubramoſo, foliis cuneiformibus 2lobis glabris, pedunculis elongatis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

cuneata Jacq. 73. O. caule decumbente, foliis cuneiformibus emarginatis piloſis, pedunculis petiolo brevioribus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

cuneifolia Jacq. 74. O. caule decumbente, foliis cuneiformi-linearibus emarginatis piloſis, pedunculis petiolo brevioribus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

glabra Thunb. 75. O. caule breviſſimo, foliolis cuneiformi-linearibus emarginatis ciliatis, pedunculis folia ſuperantibus, ſtylis ſtamina interiora excedentibus. *C. B. S.*

arcuata Jacq. 76. O. caule decumbente, foliolis cuneiformi-linearibus emarginatis ciliatis, pedunculis petiolos aequantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

linearis Jacq. 77. O. caule decumbente, foliolis linearibus emarginatis ciliatis, pedunculis petiolo brevioribus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

verſicolor 78. O. caule erecto, foliolis cuneiformi-linearibus apice 2punctatis glabris, pedunculis folia ſuperantibus, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *C. B. S.* (O. gracilis Jacq.)

elongata Jacq. 79. O. caule erectiusculo, foliolis linearibus elongatis divaricatis emarginatis apice 2punctatis glabris, petiolis longiſſimis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. miniata et amoena Jacq.)

reclinata Jacq. 80. O. caule reclinato, foliolis linearibus emarginatis apice 2punctatis, pedunculis folia excedentibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

polyphylla Jacq. 81. O. caule erecto ſubramoſo, foliolis confertis linearibus emarginatis apice 2punctatis, pedunculis folia excedentibus, ſepalis apice reflexis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ββ. Caule folioſo.

tenuifolia Jacq. 82. O. caule erecto ſimplici, foliolis linearibus emarginatis breviter petiolatis, pedunculis elongatis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

macroſtylis Jacq. 83. O. caule erecto ramoſo villoſo, foliis ſeſſilibus, foliolis oblongo-linearibus emarginatis, pedunculis elongatis, corolla ſubhypocrateriformi, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

hirta 84. O. caule ramoſo pubeſcente, foliis ſubſeſſilibus, foliolis ſpathulato-linearibus retuſis, pedunculis elongatis, corolla campanulata, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.* (O. hirtella Jacq., ſeſſilifolia L., venoſa Savign.)

tubiflora Jacq. 85. O. caule ſubramoſo villoſo, foliis ſubſeſſilibus ſpathulatis, pedunculis folia multo ſuperantibus, corolla ſubhypocrateriformi, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. caneſcens Jacq.)

ſecunda Jacq. 86. O. caule declinato ramoſo, ramis ſecundis, foliis ſubſeſſilibus ſpathulatis, pedunculis folia aequantibus, corolla hypocrateriformi, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

multiflora Jacq. 87. O. caule erecto ramoſo villoſo, foliis ſubſeſſilibus ſpathulato-oblongis, pedunculis folia multo ſuperantibus, corolla campanulata, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

rubella Jacq. 88. O. caule erecto, foliis ſubſeſſilibus ſpathulato-linearibus pubeſcentibus, pedunculis folia multo ſuperantibus, corolla campanulata, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

roſacea Jacq. 89. O. caule decumbente ſimpliciuſculo villoſo, foliis ſubſeſſilibus ſpathulato-oblongis, pedunculis elongatis, corolla campanulata, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

repens Thunb. 90. O. caule decumbente radicante ramoſo, foliolis obcordatis hirſutis, pedunculis ſubbifloris petiolos aequantibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S. Madagascar. Ceylon.*

reptatrix Jacq. 91. O. caule ſimplici, foliis longe petiolatis, foliolis obovatis ciliatis, pedunculis folia ſuperantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

diſticha Jacq. 92. O. caule aſcendente ramoſo, foliolis obcordatis glabris, ſtipulis amplis obtuſis, pedunculis folia aequantibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.* (O. ebracteata Sav.)

conorrhiza Jacq. 93. O. caule erecto ramoſo pubeſcente, foliis obcordatis, pedunculis petiolo brevioribus, radice craſſa fuſiformi. *Ad fluv. Platae.*

incarnata 94. O. caule erecto ramoſo glabro, foliolis obcordatis ſubtus discoloribus, pedunculis petiolos aequantibus, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

virginea Jacq. 95. O. caule erecto, foliolis obovato-oblongis, pedunculis folio brevioribus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

nematodes * 96. O. caule filiformi repente glabro, foliolis obovato-ſubrotundis emarginato-2lobis ſubtus pubeſcentibus, calyce ciliato, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Nov. Granat.* (O. filiformis Kunth.)

†† *Pedunculis multifloris.*

αα. *Caule herbaceo.*

ſtricta 97. O. caule erecto ramoſo, foliolis obcordatis, pedunculis paucifloris folio brevioribus, ſtylis ſtamina interiora aequantibus. *Europ. Amer. bor.* (O. corniculata Flor. dan. Roth.)

corniculata 98. O. caule decumbente radicante ramoſo pubeſcente, foliolis obcordatis, pedunculis umbelliferis petiolo brevioribus, ſtylis ſtamina interiora aequantibus. *Europ. Aſia. Amer. bor. et tropic.* (O. puſilla Saliſb. villoſa M. B. piloſiuscula Kunth.)

Lyoni Pursh. 99. O. caule ramoſo decumbente foliisque obcordato-2lobis piloſis, pedunculis paucifloris petiolos ſuperantibus, fructibus tomentoſis. *Georgia. Nov. Granat.* (O. mollis Kunth.)

microphylla Poir. 100. O. caule decumbente glabriusculo, foliolis obcordato-2lobis, pedunculis paucifloris petiolos ſuperantibus, ſtylis ſtamina interiora aequantibus. *Nov. Holl.* (O. rubens Haw.)

crenata Jacq. 101. O. caule erecto, foliolis obcordatis, pedunculis umbelliferis folia ſuperantibus, petalis crenatis. *Chili.*

*pedunculari*s Kunth. 102. O. caule erecto carnoſo, foliolis ſubrotundo-ellipticis, pedunculis longiſſimis apice 3fidis multifloris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Quito.*

pubeſcens Kunth. 103. O. caule erecto pubeſcente, foliolis obovatis emarginatis, pedunculis apice 2fidis multifloris, ſtylis ſtamina longiora aequantibus. *Peru.*

lotoides Kunth. 104. O. caule procumbente hirſuto, foliolis obovatis emarginatis margine villoſis, pedunculis paucifloris petiolos ſuperantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

ſcandens Kunth. 105. O. caule ramoſo ſcandente glabro, foliolis obovatis emarginatis ſubtus hirſutis, pedunculis elongatis multifloris, calycibus glabris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Nov. Granat.*

medicaginea Kunth. 106. O. caule ramoſo procumbente glabro, foliolis obovatis emarginatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis longiſſimis multifloris, calycibus glabris, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

lupulina Kunth. 107. O. caule filiformi procumbente ſubramoſo glabriusculo, foliolis obcordatis glabris, pedunculis 1-3floris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Nov. Granat.*

albicans Kunth. 108. O. caule caeſpitoſo ramoſo repente, foliolis obcordato-2lobis violaceo-marginatis ſubtus ſericeo-pubeſcentibus, pedunculis 1-3floris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Mexico. Quito.*

Barrelieri 109. O. caule erecto ramoſo, foliolis obovato-lanceolatis, pedunculis 2fidis racemoſis folia aequantibus, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. *Amer. auſtr.*

roſea Jacq. 110. O. caule erecto, foliolis obcordatis, pedunculis longiſſimis corymbiferis. *Chili.*

† *tuberoſa* Molin. 111. O. caule erecto, foliolis ovatis, pedunculis umbelliferis. *Chili.*

rhombifolia Jacq. 112. O. caule erecto ramoſo, foliolis rhombeo-ovatis pubeſcentibus, pedunculis umbelliferis paucifloris folia aequantibus, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Caracas. Braſil.* (O. hedyſarifolia Radd.)

pentantha Jacq. 113. O. caule erecto ramoſo, foliolis obovatis emarginatis piloſis, pedunculis umbelliferis paucifloris folio brevioribus, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *Caracas. Mexico.* (O. Neaei Cand.)

Dillenii Jacq. 114. O. caule erecto debili foliolisque obcordatis piloſiusculis, pedunculis paucifloris folia ſuperantibus, petalis emarginatis. *Carolina. Inſ. Carib.*

lateriflora Jacq. 115. O. caule baſi nudo aſcendente ſubramoſo, foliolis obcordato-2lobis, pedunculis lateralibus longiſſimis umbelliferis, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

ββ. *Caule fruticoſo.*

Plumerii Jacq. 116. O. caule erecto, foliolis oblongis, pedunculis paucifloris folia aequantibus. *Ind. occid.* (O. fruteſcens L.)

pſoraleoides Kunth. 117. O. ramis foliolisque obovato-ellipticis tomentoſis, pedunculis apice 2fidis multifloris petiolos ſuperantibus, ſtaminibus exterioribus ſtylos excedentibus. *Nov. Granat.*

hedyſaroides Kunth. 118. O. ramis foliolisque ovato-oblongis emarginatis ſubtus glaucis glabris, pedunculis apice 2fidis multifloris. *Quito. Nov. Granat.*

fruticoſa Radd. 119. O. foliolis ſubrotundo-ovatis ciliatis, petiolis foliaceis lanceolatis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Braſil.*

parvifolia Cand. 120. O. caule repente lignoſo, foliolis obcordatis piloſis, pedunculis paucifloris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Quito.* (O. microphylla Kunth.)

anguſtifolia Kunth. 121. O. foliolis oblongo-linearibus glaucis glabris, pedunculis paucifloris. *Nov. Hiſpan.*

glauca Kunth. 122. O. foliolis ſubrotundo-ellipticis glabris glaucis ciliatis, pedunculis folia aequantibus apice

2fidis ſub-8floris, ſepalis apice maculatis. *Ad fl. Amazonum.*

borjenſis Kunth. 123. O. foliolis ſubrotundis glabris glaucis, pedunculis apice 2fidis multifloris folia aequantibus, ſepalis pubeſcentibus emaculatis. *Ad Orinocum.*

**** *Foliis quaternatis.*

tetraphylla Cav. 124. O. acaulis, foliolis obcordato-2lobis glabris ſubtus glaucis, ſcapo umbellifero petiolos ſubaequante, ſtylis ſtamina omnia ſuperantibus. *Mexico.*

***** *Foliis digitatis.*

quinata Sav. 125. O. caule aſcendente ſuperne folioſo, foliis quinatis piloſis, foliolis cuneiformibus ſubemarginatis, pedunculis 1floris petiolos ſuperantibus. *C. B. S.*

pentaphylla Sims. 126. O. caule erectiuſculo inferne nudo, foliis quinatis glabris, foliolis linearibus apice glanduloſis, pedunculis folia ſuperantibus 1floris, ſtylis ſtamina interiora ſuperantibus. *C. B. S.*

mallobolba Cav. 127. O. acaulis, foliis quinatis, foliolis ſpathulatis ſeſſilibus, ſcapo 1floro folia ſuperante, ſtaminibus internis ſtylos ſuperantibus, bulbo lanato. *Buenos Ayres.*

Burmanni Jacq. 128. O. acaulis, foliis quinato-ſenatis oblongis carnoſis glabris, ſcapo umbellifero folia ſuperante. *Afric. auſtr.*

pectinata Jacq. 129. O. acaulis, foliis quinato-ſeptenatis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, ſcapo 1floro petiolos aequante, ſepalis appreſſis aequalibus, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *C. B. S.*

flabellifolia Jacq. 130. O. acaulis, foliis ſubſeptenatis linearibus emarginatis, ſcapo 1floro petiolos ſuperante, ſepalis apice reflexis inaequalibus, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

lupinifolia Jacq. 131. O. ſubacaulis, foliis ſubſeptenatis lanceolatis acutiuſculis, ſcapo unifloro petiolos aequante, ſtaminibus exterioribus ſtylos ſuperantibus. *C. B. S.*

Commerſonii Perſ. 132. O. caule breviſſimo piloſo, foliis ſenatis obovatis tomentoſis, ſcapo 1floro folia ſubſuperante, calycibus obtuſis. *Monte Video.* (O. ſexenata Sav.)

flava 133. O. ſubacaulis, foliis 7-9atis ſpathulato-linearibus canaliculatis mucronatis, ſcapo 1floro foliis breviori, ſtylis breviſſimis. *C. B. S.*

enneaphylla Cav. 134. O. ſubacaulis, foliis ſubnovenis villoſiuſculis obcordatis, ſcapo 1floro folia ſubaequante, calycibus acutis, ſtylis longiſſimis. *Inſ. Falkland.*

laciniata Cav. 135. O. acaulis, radice ſquamoſa, foliis ſubduodenis linearibus acutis glaucis, ſcapo 1floro foliis breviori, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Patagonia.*

decaphylla Kunth. 136. O. acaulis, foliis ſubdenis cuneatis 2fidis ciliatis, ſcapo multifloro folia ſuperante, ſepalis obtuſis apice 2maculatis, ſtaminibus ſubaequalibus ſtylos duplo ſuperantibus. *Mexico.*

tomentoſa Thb. 137. O. acaulis, foliis ſubvicenatis ſpathulatis emarginatis tomentoſis, ſcapo 1floro folia aequante, ſtylis longiſſimis. *C. B. S.*

****** *Foliis pinnatis.*

dendroides Kunth. 138. O. caule herbaceo ſimplici apice folioſo, foliis abrupte pinnatis ſub-12jugis oblongis inaequilateris acutis ciliatis, ſummis majoribus, petiolo piloſo, pedunculis 1floris. *Nov. Granat.*

ſenſitiva 139. O. ſubacaulis, foliis abrupte pinnatis ſub-14jugis oblongis acutiuſculis, ſcapo umbellifero folia aequante. *Ind. orient.* (Todda vaddi Zanon. t. 131.)

1725. LEDOCARPON Desf.

chilenſe Desf. *Chili.* Frutex ramoſus, foliis 3partitis ſubulatis ſericeis, floribus terminalibus ſolitariis. (Balbiſia verticillata Cav. anal. n. 19. p. 61.)

1726. LANCRETIA Delil.

ſuffruticoſa Delil. *Aegypt. ſuper. Nubia.* Frutex ramoſus, foliis parvis faſciculatis oblongis dentatis incano-hiſpidis, floribus terminalibus aggregatis albis.

1727. DROSOPHYLLUM Link.

luſitanicum Link. *Luſitan.* Herba ſuffruticoſa ſubſpithamea foliisque lineari-ſubulatis apice ſpiratim tortis glanduloſo-piloſis, floribus terminalibus corymboſis flavis. (Droſera luſitanica L. Spergula droſeroides Brot.)

1728. GRIELUM.

tenuifolium *C. B. S.* Herba decumbens, foliis 2pinnatifidis linearibus albido-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris, floribus flavis. (Gr. humifuſum Thb. Geranium grandiflorum L. ſp. 1.)

1729. PENTHORUM.

ſedoides *Amer. bor.* Herba pedalis foliis oblongo-lanceolatis duplicato-ſerratis glabris, racemis paniculatis axillaribus terminalibus pubeſcentibus.

1730.

1730. SEDUM.

* *Planifolia.*

† *Foliis crenatis, dentatis, ſerratis.*

latifolium Bertol. 1. S. foliis oppoſitis cordato-ovatis obtuſiſſimis, corymbis longe pedunculatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Helvetia. Italia.* (S. Telephium ε. maximum L. S. maximum Link. Anacampſeros maxima Haw.)

Telephium 2. S. foliis ovato-oblongis obtuſe ſerratis, corymbis compactis axillaribus, ſtaminibus corolla brevioribus. *Europ. Amer. bor.* (S. telephioides Mx. Anacampſeros vulgaris, albicans et Sphylla Haw.)

verticillatum 3. S. foliis quaternis lanceolatis ſerratis glabris, racemis axillaribus. *Sibir.*

oppoſitifolium Sims. 4. S. foliis oppoſitis ſpathulatis dentatis ciliatis, panicula terminali. *Caucaſ.*

populifolium 5. S. caule fruticoſo, foliis alternis cordatis dentatis petiolatis, floribus ſubcorymboſis. *Sibir.*

involucratum M. B. 6. S. foliis obovatis obtuſiſſimis crenatis pubeſcentibus ciliatis, corymbo conferto involucrato, petalis acuminatis. *Caucaſ.*

ſpurium M. B. 7. S. foliis obovatis antice crenatis pubeſcentibus ciliatis, radicalibus faſciculatis, corymbo compoſito, petalis lanceolatis. *Caucaſ.* (S. ibericum Stev. Anacampſeros ciliaris Haw.)

hybridum 8. S. caule baſi radicante, foliis confertis cuneiformibus concavis ſubdentatis, cyma terminali. *Sibir.*

Aizoon 9. S. foliis alternis lanceolatis ſerratis, cyma ſeſſili terminali. *Sibir. Creta.*

Rhodiola Cand. 10. S. foliis oblongo-cuneatis apice ſerratis, corymbo coarctato, floribus 8andris dioecis. *Alp. Europ. med.* (Rhodiola roſea L.)

lividum W. 11. S. foliis oblongis baſi attenuatis apice ſubcrenatis glabris, cyma terminali. *Patria?*

ſtellatum 12. S. foliis obovatis apice ſubdentatis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Helvet. Ital. Gallia.*

† *Nolarianni* Tenor. 13. S. caule aſcendente herbaceo, foliis alternis ovatis petiolatis ſinuatis obtuſe dentatis, floribus axillaribus ſparſis. *Neapol.*

† *deltoideum* Tenor. 14. S. caule erectiuſculo, foliis alternis deltoideo-cuneiformibus crenato-dentatis, cymis lateralibus. *Neapol.*

†† *Foliis integerrimis.*

altum Clark. 15. S. foliis lanceolatis acutis integerrimis, floribus corymboſis ſubſecundis 6petalis, petalis lanceolatis. *Palaeſtina.*

Cotyledon Jacq. 16. S. foliis oblongo-lanceolatis acutis, cyma 3fida folioſa. *Patria?*

divaricatum Ait. 17. S. foliis rhombeo-cuneiformibus emarginatis petiolatis, caule ramoſo, panicula terminali divaricata. *Madera.*

Cepaea 18. S. foliis ſpathulatis integerrimis ciliatis, infimis ſubternis quaternisve, ſuperioribus ſparſis, paniculae folioſae ramis abbreviatis, petalis acuminatis. *Europ. med. et auſtr.* (S. galioides Pourr. All., ſpathulatum Kit., 4phyllum Sm.)

ternatum Mx. 19. S. foliis ternis margine ſcabris, inferioribus obovatis, ſummis lanceolatis, cyma 3partita, floribus ſubſeſſilibus ſecundis ſub-8andris, petalis acuminatis. *Amer. bor.* (S. portulacoides Mühlb. W.)

oxypetalum Kunth. 20. S. caule fruticoſo, foliis alternis obovatis ſubemarginatis, cymis dichotomis, floribus ſeſſilibus ſecundis, petalis acuminatis. *Mexico.*

bicolor Kunth. 21. S. caule herbaceo erectiuſculo glabro, foliis ſpathulatis acutiuſculis, racemis terminalibus, petalis acutis ſubtus discoloribus. *Nov. Granat.*

quitenſe Kunth. 22. S. caule herbaceo glabro, foliis alternis ſpathulatis acutiuſculis ſubtus convexis, racemis elongatis, petalis acuminatis. *Quito.*

alſinifolium All. 23. S. caule herbaceo ramoſo, foliis ovato-oblongis glabris, floribus laxe paniculatis, ramis 1floris villoſis, petalis mucronatis. *Pedemont.*

magellenſe Tenor. 24. S. caule aſcendente, foliis obovato-oblongis ſeſſilibus, floribus racemoſis, petalis acutis. *Neapol.*

arenarium Brot. 25. S. caule erecto caeſpitoſo, foliis alternis ovatis obtuſiuſculis ſubtus convexis ſeſſilibus, cyma 2fida recurva, petalis acutis. *Luſitan.*

pubeſcens Vahl. 26. S. caule ramoſiſſimo foliisque oblongis obtuſis ſubtus convexis glaucis pubeſcentibus, cyma 2fida, petalis lanceolatis. *Afric. bor.*

ſempervivum Ledeb. 27. S. caule ſimplici erecto ſubtomentoſo folioſo, foliis ſpathulato-ovatis acutis pubeſcentibus ciliatis, corymbo multifloro hemiſphaerico, petalis cuſpidatis. *Iberia.* (S. ſempervivoides Fiſch. M. B.)

roſeum Stev. 28. S. caule ramoſiſſimo repente glabro, foliis oppoſitis obovatis carnoſis glaberrimis, cyma pauciflora, petalis cuſpidatis. *Caucaſ.*

libanoticum 29. S. caule aſcendente ſimpliciſſimo ſuperne nudo, foliis radicalibus faſciculatis ſpathulato-lanceolatis, floribus racemoſis. *Palaeſtina. Inſ. Samos.* (Cotyledon ſamium Urv.)

piloſum M. B. 30. S. caule aſcendente folioſo, foliis confertis oblongis obtuſis hirſutis, panicula corymboſa, petalis lanceolatis. *Caucaſ.*

eriocarpon Sm. 31. S. foliis oblongis obtuſis calycibusque glabris, floribus cymoſis, germinibus hirtis. *Peloponneſ.*

***Teretifolia.*

† *Flores flavi.*

nudum Ait. 32. S. caule fruticoſo ramoſo, ramis tortuoſis, foliis ſparſis abbreviatis oblongo-cylindricis obtuſis, floribus ſubſolitariis terminalibus. *Madera.*

altiſſimum Poir. 33. S. caule ſuffruticoſo ſtricto, foliis glaucis cylindricis acutis ſuperioribus ſparſis planiuſculis, floribus denſe corymboſis 6-8petalis. *Pedemont.*

Pyren. Graecia. (Sempervivum ſediforme Jacqu. Sedum ochroleucum Sm.)

fruticuloſum Brot. 34. S. caule ſuffruticoſo erecto, foliis 5fariam imbricatis tereti-planiusculis baſi ſolutis mucronatis glaucefcentibus, cyma ſub-3fida, corolla 6petala obtuſa. *Luſitan.*

rupeſtre 35. S. foliis tereti-ſubulatis baſi ſolutis, ramorum ſterilium arcte imbricatis ſubadpreſſis glaucefcentibus, floriferi erectis viridibus, cymae 5fidae ramis erectis. *Europ.*

collinum W. 36. S. foliis omnibus glaucis tereti-ſubulatis acutis, ramorum ſterilium patentibus, floriferi erecto-patulis, cymae ramis recurvis. *Europ.* (S. rupeſtre Cand., glaucum Sm.)

reflexum 37. S. foliis tereti-ſubulatis viridibus, ramorum ſterilium reflexis, floriferi patulis, ramis cymae recurvatis, calycibus acutis. *Europ.* (S. virens Ait.)

Forſterianum Sm. 38. S. foliis tereti-ſubulatis viridibus, ramorum ſterilium ſquarroſis, floriferi erectis, cymae ramis patentibus, calycibus obtuſis. *Anglia.* (S. craſſicaule Link., criſtatum Schrad.)

vireſcens W. 39. S. foliis tereti-ſubulatis, ramorum ſterilium glaucefcentibus 7fariam patentibus, floriferi patulis compreſſis viridibus, cymae multifidae ramis confertis erectis, floribus vireſcentibus. *Sibir.*

anopetalum Cand. 40. S. foliis tereti depreſſis baſi ſolutis incurvis glaucis mucronatis, ramorum ſterilium 5fariam confertis, cyma 4fida, petalis erecto-patentibus, capſulis elongatis roſtratis. *Gallia. Italia.* (S. rupeſtre Vill., rufeſcens Tenor.)

ſexangulare 41. S. foliis 6fariam imbricatis teretibus obtuſis erectiusculis, cyma 3fida patente folioſa. *Europ.*

acre 42. S. foliis alternis ſubovatis gibbis adnato-ſeſſilibus, cyma 3fida folioſa. *Europ.* (S. glaciale Clarion.)

ſtenopetalum Pursh. 43. S. foliis confertis adnato-ſeſſilibus tereti-compreſſis ſubulatis, cymae trichotomae ramis recurvatis, floribus ſeſſilibus, petalis linearibus calyce multo longioribus. *Ora occid. Amer. bor.*

bolonienſe Loiſ. 44. S. foliis undique imbricatis cylindricis obtuſis baſi ſolutis, cymis paucifloris, petalis lanceolatis calycem duplo ſuperantibus. *Ager pariſienſis.*

amplexicaule Cand. 45. S. foliis tereti-ſubulatis baſi membranaceis amplexicaulibus, ramorum ſterilium imbricatis, floriferi ſparſis, cyma 2fida pauciflora, floribus remotis ſeſſilibus, capſulis roſtratis. *Hiſpan. Luſitan. Gallia. Italia.* (S. roſtratum Tenor., carinatum Link. Sempervivum anomalum Lag. hort. matr.)

hiſpidum Desf. 46. S. foliis ſparſis ſemiteretibus patentibus, ramis filiformibus villoſis, floribus paniculatis, petalis lanceolatis acutis. *Atlas.*

annuum 47. S. foliis ſparſis remotiusculis teretibus obtuſis baſi ſolutis, cyma folioſa patula, floribus pedunculatis diſtantibus. *Europa.* (S. rupeſtre Oed., Oederi

Retz., alpestre Vill., rubens Hänk., saxatile Wigg. Willd. Cand.)

repens Cand. 48. S. caule basi radicante ascendente, foliis sparsis cylindricis, cyma simplici pauciflora, petalis ovalibus. *Alp. helvet. et gall.* (S. annuum All.)

quadrifidum Pall. 49. S. caule simplici, foliis sparsis teretibus obtusis, floribus umbellatis 4petalis. *Asia bor. arctic.*

lineare Thunb. 50. S. caule simplici, foliis oppositis semiteretibus elongatis acutis, cyma composita 3fida. *Japon.*

†† *Flores albi, rubentes, coerulei.*

hispanicum 51. S. foliis sparsis teretibus acutiusculis glaucis, floribus cymosis 6petalis, radice perenni. *Europ. austr.*

glaucum Kit. 52. S. foliis sparsis teretiusculis obtusis glaucis, floribus cymosis 6petalis, radice annua. *Hungar. Transsylvan. Caucas.* (S. 6fidum M. B.)

rubens 53. S. foliis alternis fusiformibus gibbis glabris, caule ramoso villoso, cyma 4fida foliosa, floribus secundis 5petalis 10andris. *Europ. austr.* (Crassula rubens All. Ait. W. S. pallidum M. B.)

atratum 54. S. foliis sparsis teretibus obtusis basi solutis, floribus corymbosis fastigiatis, capsulis obtusis atropurpureis. *Alp. Europ. med.* (S. Guettardi Vill. var.)

anglicum Hudf. 55. S. caule ascendente humili, foliis confertis alternis abbreviatis ovatis gibbis basi solutis, cyma sessili pauciflora, capsulis glabris membranaceis. *Anglia. Scotia.*

moranense Kunth. 56. S. caule repente ramoso, foliis sparsis ovato-oblongis obtusis, floribus racemosis secundis subsessilibus, petalis obtusiusculis. *Mexico.*

album 57. S. caule erecto, foliis sparsis cylindricis obtusis glaberrimis, panicula ramosissima. *Europ.*

dasyphyllum 58. S. caule debili decumbente, foliis brevissimis ovato-subglobosis glaucis, ramorum sterilium imbricatis, floriferi alternis, floribus paucis terminalibus, petalis obtusiusculis. *Anglia. Europ. austr.*

turgidum Cand. 59. S. caule repente glaberrimo subramoso, foliis remotis semicylindricis abbreviatis, floribus cymosis, petalis acutis. *Gallia austr. Mons Athos.* Urville. *Caucas.?* (S. tenellum M. B., micranthum Cand.?)

villosum 60. S. caule simplici erecto foliisque remotiusculis semiteretibus erectis viscido-pilosis, cyma terminali pauciflora. *Europ.*

hirsutum All. 61. S. caule erecto foliisque remotis oblongo-cylindricis obtusis hirsutis, cyma pauciflora, petalis subulatis. *Alp. pennin. Arvern.*

cruciatum Desf. 62. S. caule ramoso basi glabro radicante, foliis verticillatis semicylindricis obtusis laevibus, corymbi ramis viscoso-pubescentibus. *Alp. grai. pennin.* (S. monregalense Balb.)

brevifolium Cand. 63. S. caule suffruticoso decumbente ramoso, foliis ovatis gibbis depressiusculis glaucis, floribus corymbosis, petalis obtusis. *Pyren. Corsica.* (S. sphaericum Lapeyr.)

coeruleum Vahl. 64. S. foliis ſparſis oblongo-cylindricis obtuſis baſi ſolutis, racemis paniculatis terminalibus, petalis obtuſis. *Afric. bor. Sicil.* (S. azureum Desf.)

heptapetalum Poir. 65. S. foliis ſparſis ovato-oblongis depreſſo-gibbis, racemis paniculatis filiformibus ſubpubeſcentibus, petalis cuſpidatis. *Afric. bor. Corſica. Melita. Creta.* (S. Cotyledon Sieber. ?)

bracteatum Viv. 66. S. caule humili hirſutiuſculo, foliis lineari-teretibus obtuſis, floribus cymoſis bracteatis, petalis ellipticis glanduloſis. *Ad magnam Syrtim Afr. bor.*

1731. COTYLEDON.

**Frutеſcentes.*

†*Foliis planis.*

orbiculata 1. C. foliis obovato-orbiculatis acutiuſculis carnoſis, floribus paniculatis. *C. B. S.* (C. ovata, oblonga, ramoſa et ramoſiſſima Haw., paniculata L. ſuppl.)

faſcicularis Ait. 2. C. foliis terminalibus faſciculatis cuneiformibus, caudice incraſſato, ramis carnoſis ſubconicis, floribus paniculatis nudis pendulis. *C. B. S.* (C. paniculata Thunb., curviflora Sims.)

ſpuria 3. C. foliis radicalibus ſpathulatis acutiuſculis, ſcapo paucifloro, floribus nudis pendulis. *C. B. S.*

linguaeformis R. Br. 4. C. foliis radicalibus linguaeformibus acutis, floribus paniculatis, bracteis ſagittatis ſemiamplexicaulibus. *Californ.*

hemiſphaerica 5. C. foliis ovatis acutiuſculis ſubtus hemiſphaericis furfureo-punctatis, ſpica nuda terminali, floribus remotiuſculis. *C. B. S.*

coccinea Cav. 6. C. foliis obovatis acutis carnoſis ramiſque villoſiuſculis, ſpica folioſa terminali. *Patria?*

tuberculoſa Lam. 7. C. caule craſſo tuberculoſo, foliis ſerotinis oblongo-lanceolatis acutis, racemis terminalibus nudis calycibuſque pubeſcentibus. *C. B. S.*

mucronata Lam. 8. C. foliis radicalibus obovatis mucronatis ſinuato-crenatis, ſcapo corymboſo. *Africa auſtr.* (C. undulata Haw.)

††*Foliis teretiuſculis.*

ungulata Lam. 9. C. caule tuberculato, foliis oppoſitis ſemiteretibus canaliculatis apice colorato mucronatis erectis, floribus corymboſis nudis nutantibus. *C. B. S.* (C. canaliculata Haw. ?)

teretifolia Thunb. 10. C. foliis oppoſitis teretibus mucronatis cauleque hirſutis, floribus paniculatis cernuis villoſis. *C. B. S.*

cacalioides Thunb. 11. C. caule craſſo tuberculato, foliis ſerotinis teretibus acutis glabris patulis, floribus corymboſis, pedunculis ſquamoſis. *C. B. S.*

reticulata Thunb. 12. C. caule craſſo foveolato, foliis teretibus acutis glabris erectis, paniculae decompoſitae ramis reticulatis erectis. *C. B. S.*

***Herbaceae.*

† Foliis planis.

cuneata Thunb. 13. C. caule pubefcente vifcido, foliis obovatis carnofis hirfutis, floribus paniculatis villofo-glutinofis. *C. B. S.*

purpurea Thunb. 14. C. caule glabro, foliis oblongo-linearibus carnofis concavis laevibus, floribus paniculatis. *C. B. S.*

triflora Thunb. 15. C. caule erecto glabro, foliis obovatis obtufiffimis laevibus fubincurvis, floribus fpicatis ternis bracteatis. *C. B. S.* (C. elata Haw. ?)

Malacophyllum Pall. 16. C. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis obtufiusculis glaberrimis, fcapo ftricto fimplici undique floribus pedunculatis foliisque tecto. *Davuria.*

fpinofa 17. C. caule fimpliciffimo ftricto, foliis radicalibus obovatis longiffime cufpidatis, caulinis lanceolatis, fpica elongata. *Sibiria.* (Craffula L. mant. Sedum W. en.)

ferrata 18. C caule fimplici fpicato, foliis radicalibus fpathulatis crenatis ciliatis. *Creta.*

Umbilicus 19. C. caule fimplici, foliis omnibus peltatis cucullatis repando-dentatis, panicula racemofa pyramidata, floribus cernuis. *Anglia. Europ. auftr.*

lutea Hudf. 20. C. caule fimplici, foliis inferioribus fubpeltatis crenatis, fuperioribus bracteisque ovatis dentatis, fpica elongata foliofa, floribus erectis. *Anglia. Europ. auftr.*

parviflora Sm. 21. C. foliis orbiculatis crenato-repandis, floribus paniculatis. *Creta.*

†† Foliis teretiusculis.

papillaris Thunb. 22. C. caule decumbente villofiusculo, foliis oppofitis teretibus utrinque attenuatis, floribus paniculatis glabris. *C. B. S.*

mammillaris Thunb. 23. C. caule repente carnofo, foliis fubverticillatis fecundis tereti-ovatis obtufis glabris, floribus alternis pedunculatis. *Afric. auftr.*

hifpanica 24. C. caule fubramofo, foliis alternis teretibus obtufis pilofiusculis, floribus terminalibus corymbofo-fafciculatis. *Hifpania. Lufitania.* (C. fedoides Poir.)

hifpida Lam. 25. C. caule fubramofo pubefcente, foliis alternis teretibus obtufis, floribus fparfis fubpaniculatis. *Hifpania. Lufitania.* (C. vifcofa Vahl. Mucizonia Ort.)

1732. SURIANA.

maritima *Ind. occid.* Frutex foliis fpathulatis, floribus corymbofis flavis.

1733. BIEBERSTEINIA Steph.

odora Steph. 1. B. foliis pinnatifidis, laciniis rotundatis incifo-dentatis, petalis integerrimis. *Sibir.*

multifida Cand. 2. B. foliis pinnatifidis, laciniis multifidis linearibus, petalis dentatis. *Perſia.*

1734. JONCQUETIA Schreb.

paniculata W. *Guiana.* Arbor excelſa, foliis impari-pinnatis oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis albis. (Tapirira guianenſis Aubl.)

1735. ROBERGIA Schreb.

fruteſcens W. *Guiana.* Frutex foliis impari-pinnatis oblongis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus paniculatis albis. (Rourea fruteſcens Aubl.)

1736. CNESTIS Juſſ.

trifolia Lam. 1. Cn. foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, ſtipulis ſetaceis, panicula terminali. *Afric. occ.*

obliqua P. B. 2. Cn. foliis ternatis, foliolis lanceolatis acutis inaequilateris ſubtus glabris, panicula terminali. *Guinea.*

pinnata P. B. 3. Cn. foliis pinnatis, foliolis cordato-oblongis integerrimis glabris, corymbis axillaribus abbreviatis, floribus 2bracteatis. *Guinea.*

glabra Lam. 4. Cn. foliis pinnatis, foliolis ovali-oblongis utrinque ſubattenuatis integerrimis glabris, racemis aggregatis lateralibus. *Inſ. Mascaren.*

polyphylla Lam. 5. Cn. foliis pinnatis, foliolis ovali-oblongis acutis ſubtus villoſiuſculis, racemis terminalibus tomentoſis. *Madagascar.*

corniculata Lam. 6. Cn. foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis nervo medio villoſis, racemis lateralibus paucifloris, fructibus corniculatis pruritivis. *Afr. occ.*

1737. SPONDIAS.

Monbin 1. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-10jugis, foliolis oblongis ſubdentatis parallele venoſis, petiolo communi compreſſo, racemis terminalibus. *Ind. occid.* (Sp. Myrobalanus Jacq.)

Myrobalanus 2. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-8jugis, foliolis oblongis integerrimis parallele venoſis, petiolo communi tereti, panicula terminali laxa. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Sp. Monbin Jacq.)

dulcis Forſt. 3. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-6jugis, foliolis oblongis acuminatis remote ſerratis, petiolo communi tereti, racemis axillaribus paniculatis. *Inſ. Societ. Mascaren.* (Sp. cytherea Sonner.)

Amra Hamilt. 4. Sp. foliis impari-pinnatis ſub-4jugis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, petiolo communi angulato, panicula terminali. *Ind. orient.* (Mangifera pinnata L. Sp. Mangifera W. amara Lam.)

1738. AVERRHOA.

Bilimbi 1. A. foliolis ovato-lanceolatis, fructibus oblongis obtusangulis. *Ind. or. Cochinchina.*

Carambola 2. A. foliolis ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. *Ind. or. Cochinchina.*

1739. KIGGELARIA.

africana *Afric. auſtr.* Arbuscula foliis oblongis ſubſerratis glabris, floribus racemoſis pendulis albido-vireſcentibus. (K. integrifolia Jacq. var.)

1740. SMEGMARIA W.

emarginata *Chili.* Arbor frondoſa ſempervirens, foliis ovato-oblongis denticulatis emarginatis, floribus axillaribus. (Cullay Molin. non Quillaja.)

1741. CORIARIA.

myrtifolia 1. C. erecta diffuſa, foliis petiolatis ovato-lanceolatis 3plinerviis, racemis ſubterminalibus abbreviatis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

ruſcifolia 2. C. erecta ramoſa, foliis ſeſſilibus cordato-ovatis multinerviis, racemis axillaribus abbreviatis. *Peru. Chili.*

ſarmentoſa Forſt. 3. C. procumbens, foliis ſubpetiolatis cordato-ovatis acuminatis 5nerviis, racemis axillaribus elongatis nutantibus. *Nov. Zeeland.*

microphylla Poir. 4. C. ramis 4angulis, foliis minimis ovatis obtuſis 5nerviis, floribus ſpicatis lateralibus. *Peru.* Joſ. Juſſieu.

phylicifolia Humb. 5. C. erectiuscula, foliis pinnatis multijugis, foliolis petiolatis ſubcordato-oblongis acutis 3nerviis venoſis, racemis axillaribus ſubelongatis, pedunculis hiſpidis. *Peru.*

† *thymifolia* Humb. 6. C. erectiuscula, foliis pinnatis multijugis, foliolis petiolatis oblongis acutis 3nerviis eveniis, petiolis pedunculisque hiſpidis. *Peru.*

DECAGYNIA.

1742. NEVRADA.

procumbens *Aegypt. Arabia.* Herba tota lanato-tomentoſa, foliis ovato-oblongis ſinuato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis.

1743. GASTONIA Commerſ.

cutiſpongia Commerſ. 1. G. foliis pinnatis, foliolis integerrimis. *Inſ. Mascaren.*

Nalugu Lam. 2. G. foliis pinnatis, foliolis ſerratis. *Ind. or.*

1744. PHYTOLACCA.

decandra 1. Ph. floribus 10andris 10gynis. *Amer. bor.*

abyssinica Hofm. 2. Ph. floribus 10andris 5gynis. *Abyssinia.* (P. dodecandra Herit.)

bogotensis Humb. 3. Ph. floribus 7-12andris 7-9gynis. *Nov. Granat.*

octandra 4. Ph. floribus 8andris 8gynis, racemis breviter pedunculatis. *Japon. Mexico?*

heptandra Retz. 5. Ph. floribus 7andris 6gynis, foliis lanceolatis. *Amer.?* (Ph. stricta Hofm.)

icosandra 6. Ph. floribus 20andris 10gynis. *Ind. or.*

dioeca 7. Ph. fruticosa, floribus dioecis polyandris. *Amer. austr.*

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

I. *Flores perfecti.*

A. *Corolla monopetala.*

Fructus ſuperus.

1745. *Hopea* Roxb. Cal. 5ſepalus, ſepalis 2 demum in alas fructus excreſcentibus. Cor. contorta 5partita. Filamenta alterna 2fida. Stigma ſimplex. Capſ. 1ſperma. *Familia?*

1746. *Baſſia* Kön. Cal. 5partitus. Cor. campanulata limbo 8fido. Filamenta duplici ſerie. Antherae ſagittatae. Bacca 5pyrena. *Sapoteae.*

1747. *Baitaria* R. et P. Cal. 2ſepalus 2bracteatus. Cor. tubuloſa, limbo 5fido. Stamina incluſa. Stigma 3fidum. Capſ. 3locularis polyſperma. *Familia?*

B. *Corolla pleiopetala.*

a. Fructus ſuperus.

1748. *Crateva.* Cal. 4partitus aut 4ſepalus. Pet. 4 ſecunda. Stam. declinata ſtipiti ovarii inſerta. Bacca ſtipitata 1locularis polyſperma. *Capparideae.*

1749. *Garcinia.* Flores ſubdiclini. Cal. 4ſepalus. Pet. 4. Stam. baſi ſubconnata. Stigma lobatum. Bacca 4-8locularis. Semina arillata. *Guttiferae.*

1750. *Heliocarpus.* Cal. 4ſepalus coloratus. Pet. 4. Stylus 2fidus. Capſ. 2locularis 2ſperma, valvis fimbriatis, fimbriis radiato-plumoſis. *Tiliaceae.*

1751. *Crenea* Aubl. Cal. urceolatus 4fidus. Pet. 4. Capſ. 5locularis polyſperma. *Salicariae.*

1752. *Elaeocarpus.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5 apice fimbriato-laciniata vel lobata. Nectaria glanduloſo-ſquamaeformia. Antherae apice ſetigerae. Drupa ſub-2locularis. *Elaeocarpeae* Juſſ.

1753. *Tricuſpis* Perſ. Cal. 5dentatus. Pet. 5 3cuſpidata. Annulus nectariferus 10gonus. Antherae apice dehiſcentes. Capſ. 3locularis 3valvis oligoſperma. *Elaeocarpeae* Juſſ.

1754. *Vatica.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Antherae ſeſſiles 4loculares, ſpinula loculis exterioribus interiecta. Capſ. ſub-3locularis? *Tiliaceae?*

1755. *Eurya* Thunb. Flores polygami. Cal. 5sepalus ebracteatus. Pet. 5 basi subcoalita. Antherae 4gonae. Stylus 3fidus. Caps. baccata 3locularis. *Ternströmieae* Cand.

1756. *Aristotelea* Herit. Cal. 5partitus. Pet. 5. Stylus 3fidus. Bacca 3locularis. *Tiliaceae?*

1757. *Grangeria* Commers. Cal. 5partitus, laciniis revolutis. Pet. 5 unguiculata. Stigma simplex. Drupa 1pyrena. *Rosaceis aff.*

1758. *Triumfetta.* Cal. 5partitus. Pet. 5 acuminata aut 0. Stigma 2fidum. Glandulae nectariferae perigynae. Caps. 4locularis echinata. *Tiliaceae.*

1759. *Nitraria.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Stylus 3fidus. Drupa 1pyrena. *Familia?*

1760. *Peganum.* Cal. 5partitus persistens. Pet. 5. Filamenta basi dilatata. Stigma 3quetrum. Caps. 3locularis polysperma. *Rutaceae.*

1761. *Hudsonia.* Cal. tubulosus 5partitus. Pet. 5. Caps. 3valvis oligosperma. *Cisteae.*

1762. *Talinum* Adans. Cal. sub-2phyllus deciduus. Pet. 5. Stylus 3fidus. Caps. 1locularis 3valvis. *Portulaceae.*

1763. *Lythrum.* Cal. tubulosus, limbo 12dentato. Pet. 6, limbo calycis inserta. Stigma capitatum. Caps. 2locularis polysperma. *Salicariae.*

1764. *Melanium* P. Br. Cal. subcampanulatus, limbo 6-10-12dentato. Pet. 5, 6, limbo calycis inserta. Caps. 1locularis oligosperma. *Salicariae.*

1765. *Nesaea* Commers. Cal. campanulatus, limbo 12dentato. Pet. 6, limbo calycis inserta. Caps. 4locularis polysperma. *Salicariae.*

1766. *Cuphea* P. Brown. Cal. tubulosus basi gibbus, limbo sub-6dentato, dente supremo maximo. Pet. 6 limbo calycis inserta subinaequalia. Caps. 1locularis cum calyce hinc dehiscens. Sem. lenticularia columnae liberae affixa. *Salicariae.*

1767. *Ginoria* Jacq. Cal. campanulatus, limbo colorato 6fido. Pet. 6 unguiculata collo calycis inserta. Caps. 1locularis 4valvis apice dehiscens polysperma. *Salicariae.*

1768. *Blakea* P. Brown. Cal. campanulatus, limbo 6dentato squamis cinctus. Pet. 6 collo calycis inserta. Antherae basi appendiculatae subcoalitae. Stigma simplex. Caps. baccata 6locularis, placentis crassis axi centrali affixis polyspermis. *Melastomeae.*

1769. *Axinaea* R. et P. Cal. urceolatus, limbo obsolete denticulato. Pet. 6 orbiculata calyci inserta. Antherae declinatae basi appendiculatae apice poro gemino dehiscentes. Caps. 6locularis, placentis crassis axi centrali affixis polyspermis. *Melastomeae.*

1770. *Befaria* Mut. Cal. 7fidus. Pet. 7. Antherae pendulae. Stigma capitatum. Caps. 7locularis polysperma. *Ericeae.*

1771. *Lewisia* Pursh. Cal. 7-9sepalus coloratus. Pet. 14-18. Stigm. 3 2fida. Caps. 3locularis, loculis 2spermis. *Familia?*

b. *Fructus inferus.*

1772. *Portulaca.* Cal. 2partitus caducus. Pet. 4, 5 basi calycis inserta. Stylus 3-5partitus. Caps. 1locularis circumscissa polysperma: semina filis singulis ad placentas plures liberas fixa. *Portulaceae.*

1773. *Dodecas.* Cal. 5fidus. Pet. 5 calyci inſerta. Capſ. 1locularis 4valvis polyſperma. *Onagrae?*
1774. *Chamaemeles* Lindl. Cal. 5dentatus truncatus. Pet. abbreviata calyci inſerta. Stigma ſimplex. Fructus baccatus? 2ſpermus. *Pomaceae.*
1775. *Carallia* Roxb. Cal. 6-7fidus. Pet. orbiculata calyci inſerta. Stigma 3lobum. Bacca 1ſperma. *Pomaceae.*
1776. *Agathophyllum* Juſſ. Cal. truncatus. Pet. 6. Stam. alterna calyci alterna baſi petalorum inſerta. Drupa 6locularis. *Familia?*
1777. *Decumaria.* Cal. 8-12fidus. Pet. 8-12. Capſ. 8locularis polyſperma. *Familia?*

II. *Flores imperfecti.*

a. *Fructus ſuperus.*

1778. *Bocconia.* Cal. 2ſepalus caducus. Cor. 0. Antherae lineares. Stylus 2fidus. Capſ. compreſſa ſtipitata 1locularis ſub-1ſperma. *Papavereae.*
1779. *Podoria* Perſ. Cal. 4ſepalus. Cal. 0. Bacca ſtipitata globoſa 1ſperma. *Capparideae.*
† 1780. *Apactis* Thunb. Cal. 0. Cor. 4petala inaequalis. Stylus ſimplex. Fructus? *Familia?*
† 1781. *Toxicodendron* Thunb. Flores dioeci. Cal. 5-8ſepalus. Cor. 0. Stigmata 3. Capſ. 3locularis, loculis 2ſpermis. *Tricoccae?*
1782. *Mabea* Aubl. Flores monoeci. Cal. 5dentatus. Cor. 0. Stigmata 3 filiformia revoluta. Capſ. 3locularis, loculis 2valvibus elaſtice disſilientibus. *Tricoccae?*
1783. *Pterotum* Lour. Cal. 5ſepalus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Achenium ſemine 1 alato. *Familia?*
1784. *Stixis* Lour. Cal. corollinus 6ſepalus. Stigmata 3. Drupa 1ſperma. *Familia?*

b. *Fructus inferus.*

1785. *Aſarum.* Cal. corollinus 3partitus. Antherae laterales. Stigma 6lobum. Capſ. 6locularis. *Ariſtolochieae.*

c. *Flores nulli.*

1786. *Thoa* Aubl. Monoeca. Spica apice ♂, ſtamina e nodis, baſi ♀, ſtigmate 3fido. Caryopſis.

DIGYNIA.

1787. *Agrimonia.* Cal. 5fidus ſuperus uncinato-ſetoſus. Pet. 5 calyci inſerta. Sem. 2 calyce veſtita. *Roſaceae.*
1788. *Callicoma* R. Br. Flores aggregati. Rec. globoſum villoſum. Involucrum 4phyllum. Cal. 4ſepalus. Cor. 0. Styli divaricati. Germen ſuperum 4ſpermum. *Cunonieae* R. Br.
1789. *Euclea.* Flores dioeci. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Bacca ſupera 2locularis. *Rhamneae?*
1790. *Pleurandra* Labill. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stam. 1lateralia. Styli filiformes. Achenia 2. *Dillenieae.*

TRIGYNIA.

1791. *Reſeda.* Cal. inferus 4-5-6partitus. Pet. laciniata baſi incraſſata nectarifera. Capſ. 1locularis apice hians, placentatio parietalis. *Reſedeae.*
1792. *Ochradenus* Delil. Cal. rotatus 5dentatus, glandula annulari repletus. Bacca polyſperma. *Reſedeae.*
1793. *Gelonium* Roxb. Flores dioeci. Cal. 5ſepalus. Cor. 0. Stigmata 3 lacera. Capſ. 3locularis 3ſperma. *Tricoccae.*

TETRAGYNIA.

1794. *Viſnea.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae 4gonae. Styli breves. Nux 3locularis, loculis 2ſpermis. *Onagrae?*
1795. *Dichroa* Lour. Cal. tubuloſus 4dentatus. Pet. 5 craſſa. Stamina corolla breviora. Bacca 4locularis polyſperma. *Familia?*
1796. *Quillaja* Molin. Flores monoeci. Cal. 4ſepalus. Cor. 0. Capſ. 4locularis. *Familia?*
1797. *Bertolonia* *. Cal. 6-7ſepalus corollinus. Nectaria 10-14. Antherae ſeſſiles 2valves. Styli craſſi ſtigmatibus fungoſis. *Chenopodeae.*
1798. *Calligonum.* Cal. 5partitus. Cor. 0. Nux 4angularis 4alata. *Polygoneae.*
1799. *Aponogeton* Thunb. Flores ſpicati bracteis coloratis diſtincti. Capſ. 4 ſub-3ſpermae. *Aliſmeae?*

PENTAGYNIA.

1800. *Blackwellia* Commerſ. Cal. ſemiſuperus 5fidus. Pet. 5-10. Capſ. 1locularis polyſperma. *Roſaceae.*
1801. *Vauquelinia* Bonpl. Cal. 5fidus. Pet. 5 fauci calycis inſerta. Capſ. calyce cincta 5cocca, coccis 2ſpermis. *Roſaceae.*
1802. *Lindleya* Kunth. Cal. 5fidus. Pet. 5 fauci calycis inſerta. Diſcus annularis ſtaminifer. Antherae baſi uncinato-reflexae. Capſ. 5locularis ſub-5ſperma: ſemina marginata. *Roſaceae.*
1803. *Kageneckia* R. et P. Flores dioeci. Cal. hemiſphaericus 5partitus. Pet. 5 fauci calycis inſerta. Capſ. 5 1loculares: ſemina ſub 20 apice alata. *Roſaceae.*
1804. *Orygia* Forsk. Cal. 5ſepalus. Pet. 20 lanceolata. Styli filiformes. Capſ. 5locularis 5valvis polyſperma. *Portulaceae?*
1805. *Brunelia* R. et P. Cal. 5partitus. Cor. 0. Glandulae nectariferae 10-14. Capſ. 5 2ſpermae: ſemina arillata. *Terebinthaceae.*
1806. *Glinus.* Cal. 5ſepalus ſubcorollinus. Stamina ſetis diſtincta. Capſ. 5locularis polyſperma. *Aizoideae.*

HEXAGYNIA.

1807. *Stratiotes.* Flores dioeci. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Antherae acuminatae. Setae ſtamina ſtylosque ſtipantes. Bacca 6locularis polyſperma. *Hydrocharides.*
1808. *Cephalotus* Labill. Cal. 6partitus coloratus. Cor. 0. Stam. alterna longiora. Antherae didymae glandula nexae. Fructus 1ſpermi. *Roſaceae.*

DODECAGYNIA.

1809. *Sempervivum.* Cal. 10-12partitus. Pet. 10-12. Capſ. 10-12.

POLYGYNIA.

1810. *Ceratocephalus* Mönch. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 unguiculata. Caryopſes cornutae. *Ranunculeae.*
1811. *Iſopyrum.* Cal. corollinus 5ſepalus. Pet. 5 tubuloſa 2labiata. Folliculi plures pleioſpermi. *Ranunculeae.*
1812. *Laurelia* Juſſ. Flores monoeci. Cal. campanulatus multifidus, laciniis imbricatis. Squamae 3 nectariferae ad baſin ſtaminum. Caryopſes plures in calyce nidulantes. *Monimieae.*

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

1745. Hopea Roxb.

odorata Roxb. *Calcutta.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis ſubtus reticulatis, axillis venarum glanduloſis, floribus ſpicato-paniculatis flavidis.

1746. Bassia Kön.

longifolia 1. B. foliis lanceolatis acutis venoſis, pedunculis congeſtis axillaribus longiſſimis horizontalibus. *Malabar.*

latifolia Roxb. 2. B foliis oblongis acutis, pedunculis congeſtis terminalibus nutantibus. *Ind. or. Nov. Hebrid.* (B. obovata Forſt.)

1747. Baitaria R. et P.

acaulis R. et P. *Peru.* Herba foliis radicalibus lineari-lanceolatis.

1748. Crateva.

* *Floribus corollatis.*

gynandra 1. Cr. foliis membranaceis oblongis acutis, ſtaminibus germinis ſtipiti inſertis petala ſpathulato-linearia longe ſuperantibus. *Jamaica. Ad fl. Magdalen.* Bertero. (Cr. tapioides Gand.)

Tapia 2. Cr. foliis ſubcoriaceis oblongis acutis, ſtaminibus receptaculo inſertis petala obovata longe ſuperantibus. *Ind. or. et occ.*

obovata Vahl. 3. Cr. foliis obovatis obtuſis, ſtaminibus receptaculo inſertis petala ſubrotunda longe ſuperantibus, germinibus cylindricis. *Madagascar.* (Othrys Thuar.)

fragrans Sims. 4. Cr. caule volubili, foliis ellipticis, ſtaminibus petala elongata undulata aequantibus. *Sierra Leone.* (Cr. capparoides Andr.)

religiosa Forst. 5. Cr. foliis membranaceis oblongo-lanceolatis, staminibus petala oblonga acuta subexcedentibus. *Malabar. Ins. Societ. Cochinchina.* (Capparis magna Lour.)

falcata Cand. 6. Cr. foliis ovato-lanceolatis falcatis, racemis laxis terminalibus, staminibus petala oblonga superantibus. *Cochinchina.* (Capparis falcata Lour.)

oblongifolia * 7. Cr. foliis oblongis obtusis mucronatis perennantibus, staminibus germinis stipite brevioribus petala abbreviata superantibus. *Arabia. Ind. or.* (Capparis oblongifolia Forsk. Niebuhria Cand.)

** *Floribus apetalis.*

apetala * 8. Cr. foliis linearibus recurvo-mucronatis coriaceis, floribus racemosis, germinibus globosis. *Ind. or.* (Capparis apetala Roth. Niebuhria linearis Cand.)

cafra Burch. 9. Cr. foliis oblongis, floribus racemosis. *Afric. austr.* (Niebuhria Cand.)

avicularis Burch. 10. Cr. foliis obovatis abbreviatis, floribus racemosis. *Afric. austr.* (Niebuhria Cand.)

1749. GARCINIA.

* *Staminibus basi discretis.*

Mangostana 1. G. foliis oblongis venosis coriaceis, floribus terminalibus solitariis pedunculatis erectis. *Java. Ins. Molucc.*

cornea 2. G. foliis oblongis obtusis subemarginatis coriaceis, floribus terminalibus solitariis pedunculatis cernuis. *Ins. Molucc.*

Cambogia Desr. 3. G. foliis oblongo-lanceolatis subvenosis coriaceis, floribus terminalibus congestis subsessilibus, fructibus costatis. *Ind. or.* (Cambogia Gutta L.)

** *Staminibus basi subcoalitis.*

amboinensis * 4. G. foliis ovali-oblongis eveniis coriaceis, floribus congestis axillaribus pedunculatis. *Amboina. Cochinchina.* (Oxycarpus cochinchinensis Lour.)

celebica 5. G. foliis oblongo-lanceolatis subvenosis coriaceis, floribus axillaribus subaggregatis cernuis. *Ins. Molucc.* (Brindonia Thuar.)

Cowa Roxb. 6. G. foliis ovatis acuminatis, floribus polygamis, ♂ congestis lateralibus, ☿ solitariis terminalibus. *Ind. orient.* (G. dioeca Sm. Brindonia indica Thuar.)

1750. HELIOCARPUS.

americanus 1. H. foliis cordatis 3lobis subtus ramisque cymae glabris. *Nov. Hispan.*

popayanensis Kunth. 2. H. foliis cordatis 3lobis subtus ramisque cymae tomentosis. *Nov. Granat.*

1751. CRENEA Aubl.

maritima Aubl. 1. Cr. caule erecto 4gono, foliis oppofitis fpathulato-oblongis, pedunculis axillaribus aggregatis fubbifloris bracteatis. *Guiana.*

repens Meyer. 2. Cr. caule fruticofo repente, foliis oppofitis fpathulatis, pedunculis 1floris ebracteatis, capfula 1loculari. *Guiana.*

1752. ELAEOCARPUS.

* *Petala laciniato-fimbriata.*

ferratus 1. E. foliis elliptico-oblongis crenatis, racemis axillaribus elongatis, floribus 8andris. *Ind. or.*

reticulatus Sm. 2. E. foliis oblongis utrinque attenuatis ferratis fubtus reticulatis, racemis axillaribus folio brevioribus, floribus fecundis pendulis 15andris. *Nov. Holl.* (E. cyaneus Sims.)

fylveftris Poir. 3. E. foliis ovato-lanceolatis ferratis, racemis fpicatis fubterminalibus. *Ind. orient. Cochinchina.* (Adenodus fylveftris Lour. E. nitidus et Perim-Kara Cand.)

† *tectorius* Poir. 4. E. foliis oblongis crenatis, racemis fpicatis terminalibus. *Cochinchina.* (Crafpedum tectorium Lour.)

monoceras Cav. 5. E. foliis lanceolatis apice fubferratis, racemis axillaribus villofiusculis. *Amer. auftr.*

integrifolius Lam. 6. E. foliis ovato-oblongis obtufis integerrimis, racemis axillaribus, floribus 4fidis. *Inf. Mascaren. Molucc.* (E. oblongus Sm.)

integerrimus Lour. 7. E. foliis lanceolatis integerrimis, floribus congeftis axillaribus pedunculatis 5fidis. *Cochinchina.*

** *Petala triloba.*

peduncularis Labill. 8. E. foliis oppofitis lanceolatis ferratis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis nutantibus. *Nov. Holl.* (Friefia Cand.)

dentatus Vahl. 9. E. foliis alternis oblongis fuperne dentato-ferratis, racemis axillaribus. *Nov. Zeeland.* (Dicera dentata Forft.)

Dicera Vahl. 10. E. foliis oppofitis ovato-oblongis duplicato-ferratis, paniculis axillaribus pubefcentibus, floribus 4gynis. *Nov. Zeeland.* (Dicera ferrata Forft.)

1753. TRICUSPIS Perf.

dependens Perf. *Chili.* Arbor foliis oppofitis ovato-oblongis ferratis, pedunculis axillaribus folitariis. (Tricufpidaria R. et P.)

1754. VATICA.

chinenfis *China.* Frutex ramis angulatis, foliis alternis cordato-oblongis obtufis integerrimis, floribus paniculatis.

1755. EURYA Thunb.

japonica Thb. 1. E. foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ramulisque glabris, pedunculis axillaribus aggregatis abbreviatis. *Japon.*

chinenſis R. Br. 2. E. foliis obovato-oblongis, ramulis pubeſcentibus, floribus axillaribus. *China.*

multiflora Cand. 3. E. foliis elliptico-oblongis, ramulis piloſiusculis, floribus faſciculatis lateralibus. *Nepal.*

acuminata Cand. 4. E. foliis elliptico-oblongis acuminatis, ramulis villoſis, floribus axillaribus paucis. *Nepal.*

1756. ARISTOTELEA Herit.

Macqui Herit. *Chili.* Arbuscula foliis oppoſitis oblongis ſerratis, floribus racemoſis albidis.

1757. GRANGERIA Commerſ.

borbonica Lam. *Inſ. Mascaren.* Arbor excelſa, ramulis punctato-verruculoſis, foliis ovato-ellipticis integerrimis ſupra reticulatis ſubtus nitidis, floribus racemoſis albis.

1758. TRIUMFETTA.

* *Floribus corollatis.*

† *Foliis angulato-lobatis.*

glabra Rottl. 1. Tr. foliis cordato-ſubrotundis acute 3lobis crenatis utrinque nudis, racemis terminalibus elongatis, calycibus incanis pubeſcentibus, fructibus hirtis. *Ind. or.*

angulata Lam. 2. Tr. foliis oblongis baſi rotundatis angulatis dentatis ſupra glabris ſubtus villoſiusculis, floribus glomeratis axillaribus ſubſeſſilibus. *Ind. or.* (Tr. Bartramia L. excl. Rumph. ſyn.)

molliſſima Kunth. 3. Tr. foliis baſi truncatis glanduloſo-crenatis ſubrotundis angulatis inaequaliter dentatis ſupra ſtellato-pubeſcentibus ſubtus villoſo-tomentoſis, paniculis racemoſis terminalibus, calycibus fructibusque hiſpidiusculis. *Ad fl. Magdalen. Nov. Granat.*

hirta Vahl. 4. Tr. foliis baſi ſubcordatis glanduloſo-dentatis 3lobis acuminatis inaequaliter ſerratis ſupra glabris ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, paniculae terminalis ramis dichotomis hirtis. *Ad fl. Magdalen.*

velutina Vahl. 5. Tr. foliis baſi rotundatis glanduloſo-dentatis ovatis acuminatis ſubangulatis inaequaliter ſerratis ſubtus incano-tomentoſis, floribus axillaribus. *Inſ. Mascaren. Guinea.*

procumbens Forſt. 6. Tr. foliis ſubrotundo-cordatis ſub-3lobis utrinque tomentoſis, floribus axillaribus, caule procumbente. *Inſ. Societ.*

semitriloba 7. Tr. foliis basi rotundatis glanduloso-dentatis oblongis 3lobis subtus dense villosis, lobo medio producto, summis indivisis lanceolatis, floribus axillaribus glomeratis, fructibus incano-pilosis. *Ind. occ.* (Tr. havanensis Kunth.)

trilocularis Roxb. 8. Tr. foliis subrotundo-ovatis 3lobis serratis superioribus ovato-lanceolatis, capsulis 3locularibus. *Ind. or.*

†† *Foliis indivisis.*

rhomboidea Jacq. 9. Tr. foliis rhombeo-ovatis crenatis subtus incanis, pedunculis axillaribus aggregatis, fructibus hirsutis. *Ind. occ.*

annua 10. Tr. foliis ovatis acutis dentatis glabriusculis, pedunculis axillaribus 3floris. *Java.* (Tr. indica Lam.)

rotundifolia Lam. 11. Tr. foliis subrotundis duplicato-dentatis basi glandulosis supra rugulosis subtus albido-tomentosis, racemis terminalibus, calycibus incanis. *Ind. or.* (Tr. suborbiculata Cand.)

glandulosa Forsk. 12. Tr. foliis late ovalibus inaequaliter dentatis basi glandulosis subtus villosiusculis, pedunculis axillaribus congestis. *Arabia. Ins. Mascaren. Ind. or.* (Tr. Vahlii Poir.)

althaeoides Lam. 13. Tr. foliis basi rotundatis glanduloso-dentatis ovatis acutis utrinque villoso-tomentosis, floribus axillaribus, setis fructuum hispidis. *Ind. occ.* (Tr. macrophylla Vahl.)

grandiflora Vahl. 14. Tr. foliis basi subtruncatis ovato-oblongis inaequaliter dentatis supra substrigosis subtus glabris, ramis hirsutis, setis fructuum elongatis glabris. *Ins. Carib.*

† *acuminata* Kunth. 15. Tr. foliis subcordato-oblongis acuminatis duplicato-serratis supra pubescentibus subtus tomentosis. *Nov. Granat.*

bogotensis Cand. 16. Tr. foliis ovato-oblongis acuminatis argute duplicato-dentatis ramisque pilosis, pedunculis axillaribus 3floris. *Nov. Granat.* (Tr. pilosa Kunth.)

rubricaulis Kunth. 17. Tr. foliis oblongis acuminatis serratis basi glandulosis ramisque pubescentibus, pedunculis axillaribus 3floris, fructibus 6locularibus. *Caracas.*

trichoclada Cand. 18. Tr. foliis ovato-oblongis acuminatis aequaliter serratis basi integerrimis utrinque substrigosis, ramis, petiolis pedunculisque axillaribus hinc hirsutis. *Nepal.* (Tr. triclada et oblongata Link.)

† *obliqua* Roth. 19. Tr. foliis oblique cordatis oblongis acuminatis inaequaliter serratis supra stellato-asperis subtus tomentosis. *Patria?*

** *Floribus apetalis.*

Lappula 20. Tr. foliis subcordato-subrotundis acutis angulatis inaequaliter dentatis subtus villosis, racemis paniculatis terminalibus, calycibus hirsutis. *Ind. occid.*

heterophylla Lam. 21. Tr. foliis inferioribus ſubrotundis 3lobis, ſuperioribus oblongis repandis, pedunculis axillaribus. *Hiſpaniola.*

piloſa Roth. 22. Tr. foliis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter crenatis piloſis ſubtus ſericeo-tomentoſis, pedunculis axillaribus, calycibus incano-hiſpidiusculis. *Ind. or.*

1759. NITRARIA.

Schoberi Murr. 1. N. foliis ſpathulatis integerrimis. *Aſia med.*

tridentata Desf. 2. N. foliis cuneatis ſub-3dentatis. *Afric. bor.* (Peganum retuſum Forsk.?)

1760. PEGANUM.

Harmala *Ad mare mediterraneum, pontum euxinum et mare caſpium.* Herba ſuffruticoſa foliis ſubbipinnatifidis linearibus glabris, floribus ſolitariis albis. (P. crithmifolium Retz.)

1761. HUDSONIA.

ericoides. 1. H. pubeſcens ſuberecta, foliis filiformibus ſubulatis ſubimbricatis, pedunculis ſolitariis, calycibus obtuſis. *Amer. bor.*

montana Nutt. 2. H. glabriuscula decumbens, foliis filiformibus ſubulatis elongatis, pedunculis terminalibus, calycibus acuminatis lanatis, capſulis 3ſpermis. *Carolin. bor.*

tomentoſa Nutt. 3. H. incano-tomentoſa, foliis exiguis ovatis imbricatis appreſſis, floribus ſubſeſſilibus aggregatis, calycibus obtuſis. *Amer. bor.*

auſtralis * 4. H. glabriuscula erecta, foliis lineari-lanceolatis ſubtus piloſis ſparſis patulis, floribus terminalibus ſolitariis pedunculatis, calycibus acuminatis hirſutiusculis. *Monte Video.* Sello.

1762. TALINUM Adanſ.

* *Fruticoſa.*

triangulare W. 1. T. foliis obovatis retuſis, pedunculo racemoſo terminali 3angulari. *Ind. occ.* (Portulaca racemoſa L., 3angularis Jacq., Rülingia Ehrh.)

craſſifolium W. 2. T. foliis obovatis mucronatis, pedunculo terminali corymboſo 3angulari. *Patria?* (Portulaca craſſifolia Jacq.)

cuneifolium W. 3. T. foliis obovatis ſeſſilibus, paniculae terminalis ramis 3floris. *Arabia.* (Orygia portulacaefolia Forsk. Portulaca cuneifolia Vahl.)

fruticoſum W. 4. T. foliis obovatis emarginatis, corymbo terminali, calycibus 5ſepalis. *Ind. occ.* (Portulaca fruticoſa ſyſt. veg. ed. 15. paniculata L.)

Anacampſeros W. 5. T. foliis ovatis ſubtus gibbis, ſtipulis piliformibus folio brevioribus, racemo ſimplici. *Afric. auſtr.* (Portulaca Anacampſeros L. Rülingia Ehrh. R. varians Haw.)

arachnoides R. Br. 6. T. foliis ellipticis ſubtus gibbis araneoſis, ſtipulis folio brevioribus, pedunculis ſub-3floris elongatis. *C. B. S.* (Portulaca Haw. Anacampſeros Sims. Talinum retuſum W.)

filamentoſum R. Br. 7. T. foliis ovatis obtuſiuſculis utrinque gibbis araneoſis, ſtipulis folio longioribus, pedunculis 3floris. *C. B. S.* (Portulaca Haw. Anacampſeros Sims. Rülingia polyphylla Haw.)

lanceolatum Link. 8. T. foliis lanceolatis acutis utrinque convexis nitidis, ſtipulis filamentoſis folio brevioribus, caule abbreviato ſub-1floro. *C. B. B.* (Rülingia et Portulaca Haw.)

** *Herbacea.*

patens W. 9. T. foliis ovato-lanceolatis ſubpetiolatis, ramis 4gonis, paniculae terminalis ramis dichotomis. *Ind. occ.* (Talinum reflexum Cav.)

mucronatum Kunth. 10. T. foliis ſpathulato-lanceolatis, pedunculis terminalibus racemoſis, petalis mucronatis. *Nov. Granat.*

paniculatum R. et P. 11. T. foliis obovato-oblongis acuminatis, floribus paniculatis, petalis acutis. *Peru.*

revolutum Kunth. 12. T. foliis ſpathulatis margine revolutis, pedunculis terminalibus dichotome paniculatis, petalis mucronatis. *Amer. auſtr.* (T. lingulatum R. et P.)

cauleſcens * 13. T. foliis ſubſpathulato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus 1floris, floribus oligandris. *Quito. Mexico.* (Coſmia Domb. Calandrinia Kunth. T. album et nitidum R. et P.)

crenatum R. et P. 14. T. foliis ſubrotundo-ovatis acutis, floribus racemoſis polyandris, petalis crenulatis. *Peru.*

polyandrum R. et P. 15. T. foliis ſubrotundo-obovatis acutis, floribus racemoſis polyandris, petalis obcordatis. *Peru.*

monandrum R. et P. 16. T. foliis ſpathulato-lanceolatis, floribus racemoſo-ſpicatis ſecundis 1andris. *Chili.*

ciliatum R. et P. 17. T. foliis oblongo-linearibus ciliatis, floribus axillaribus ſolitariis. *Peru.*

lineare Kunth. 18. T. foliis linearibus acutiuſculis, pedunculis racemoſis fructiferis recurvatis. *Mexico.*

umbellatum R. et P. 19. T. foliis linearibus piloſis, ſcapis umbelliferis filiformibus. *Peru.*

teretifolium Pursh. 20. T. foliis teretibus carnoſis, pedunculis corymboſis terminalibus. *Amer. bor.*

acaule * 21. T. foliis linearibus obtuſis elongatis, ſcapo unifloro foliis breviori. *Quito.* (Calandrinia Kunth.)

1763. LYTHRUM.

Salicaria 1. L. foliis oppofitis cordato-lanceolatis fubhirfutis, floribus racemofo-fpicatis. *Europ. Amer. boreal.*

virgatum 2. L. foliis oppofitis lanceolato-linearibus glabris, ramis virgatis teretiusculis, pedunculis fubternis. *Auftria. Italia. Galicia. Podolia. Caucaf.* (L. acuminatum W. Gräfferi Tenor. varr.)

alatum Pursh. 3. L. foliis feffilibus fubcordatis lanceolatis glabris, ramis virgatis 4gono-alatis, floribus geminis fubfeffilibus axillaribus 6andris. *Georgia.*

nummularifolium Perf. 4. L. foliis oppofitis fuperioribus alternis fubrotundis obtufiusculis, floribus axillaribus folitariis 8andris. *Corfica.*

dipetalum Mutis. 5. L. foliis verticillatis oppofitisque ovatis acutis afperis fupra nitidis, ramis vifcofis, floribus axillaribus pedunculatis nutantibus 2petalis. *Nov. Granat.*

flavum * 6. L. foliis oppofitis lineari-lanceolatis ramisque glaberrimis, floribus axillaribus fubfeffilibus folitariis 12andris. *Monte Video.* Sello.

maritimum Kunth. 7. L. foliis oppofitis fparfisque ovato-lanceolatis acutis fubtus glaucefcentibus glabris, floribus axillaribus folitariis 6andris, caule fuffruticofo. *Peru.*

Kennedianum Kunth. 8. L. foliis oppofitis fuperioribus alternis fubcordato-oblongis acutis fubtus glaucefcentibus, floribus axillaribus folitariis 6andris. *Nov. Hifpan.*

album Kunth. 9. L. foliis fparfis linearibus acutis, floribus axillaribus folitariis 6andris, caule fuffruticofo. *Mexico.*

acutangulum Lag. 10. L. foliis fubalternis lanceolatis, floribus folitariis breviter pedunculatis, calycibus acute angulatis. *Hifpania.*

lineare 11. L. foliis oppofitis linearibus acutis glabris, floribus axillaribus folitariis 2bracteatis 6andris, caule herbaceo ramofo. *Virginia.*

apetalum * 12. L. foliis linearibus acutis alternis, floribus fubverticillatis apetalis 6andris, caule fruticofo. *Brafil.* Sello.

Hyffopifolia 13. L. foliis alternis lineari-lanceolatis, floribus axillaribus folitariis 6andris, caule herbaceo ftricto. *Europ. Afric. auftr.* (L. tenellum Thb.)

Thymifolia 14. L. foliis alternis linearibus, floribus axillaribus folitariis 4petalis 2andris, caule herbaceo ramofo. *Europ. Afric. auftr.* (L. hyffopifolium Thb.)

thefioides M. B. 15. L. foliis alternis lineari-lanceolatis, capfulis pedicellatis fubglobofis 4dentatis. *Caucaf.*

1764. MELANIUM P. Br.

alliaceum * 1. M. caule proftrato, foliis ovatis oppofitis, floribus alternis fub-10andris. *Jamaica.* (Lythrum Melanium L.)

hirtum * 2. M. caule erecto ramofo hirto, foliis oppofitis lanceolatis feffilibus, floribus pedunculatis erectis

ſubſolitariis 6andris, calycibus 2bracteatis hirſutis. *Hiſpaniola. Portorico.*

ſcabrum * 3. M. caule erecto diffuſe ramoſo foliisque oppoſitis ovatis ſcaberrimis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus 6andris. *Jamaica. Hiſpaniola.* (Lythrum Parſonſia L.)

fruticoſum * 4. M. caule fruticoſo erecto, foliis oppoſitis oblongis, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis 12andris. *Amboina. Inſ. Societ.* (Pemphis acidula Forſt. Lythrum Pemphis L. ſuppl.)

1765. NESAEA Commerſ.

ſalicifolia Kunth. 1. N. caule fruticoſo, foliis inferioribus oppoſitis ſuperioribus alternis, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus, pedunculis axillaribus abbreviatis 1floris. *Mexico.* (Heimia Link.)

ſpecioſa Kunth. 2. N. caule fruticoſo, foliis cordato-ovatis acutis ſeſſilibus, pedunculis unifloris abbreviatis. *Braſil.*

triflora Kunth. 3. N. caule herbaceo, foliis oppoſitis ſeſſilibus lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus elongatis 3floris. *Amer. auſtr.* (Lythrum 3florum L. ſuppl.)

verticillata Kunth. 4. N. caule herbaceo foliisque oppoſitis petiolatis lanceolatis pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis verticillato-corymboſis ſub-10andris. *Virginia.* (Lythrum verticillatnm L.)

1766. CUPHEA P. Brown.

** Fruticoſae.*

Swartziana * 1. C. caule decumbente, ramis hirſutis, foliis cordato-ovatis venoſis ſcabris, floribus racemoſis 10andris, petalis ſubaequalibus. *Hiſpaniola.* (Lythrum cordifolium Sw.)

racemoſa * 2. C. foliis oppoſitis petiolatis obovatis obtuſiuſculis glabris, racemis terminalibus, calycibus piloſo-viſcidis. *Amer. auſtr. Jamaica.* (Lythrum racemoſum Mut.)

decandra R. Br. 3. C. foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis glabris ciliatis, racemis terminalibus elongatis, floribus 10andris. *Jamaica.* (Lythrum ciliatum Sw.)

microphylla Kunth. 4. C. foliis ovato-oblongis ſcabriuſculis ramisque viſcidis, floribus lateralibus alternis. *Peru.* (C. cordata R. et P.?)

ſerpyllifolia Kunth. 5. C. foliis ovato-oblongis acutis utrinque ſubſtrigoſis ramisque viſcidulis, calycibus hiſpidulo-glutinoſis. *Nov. Granat.*

antiſyphilitica Kunth. 6. C. foliis ovato-oblongis acutis ſcabris, floribus alternis lateralibus axillaribusque, calycibus hiſpidulis. *Amer auſtr.* (C. ſtriguloſa Kunth.)

ſcabrida Kunth. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis rigidis ſupra ſtrigilloſo-ſcabris venoſis ſubtus calycibus-

que glabris, ramis 2fariam pilosis, floribus alternis lateralibus. *Mexico. Brasil.*

† *micropetala* Kunth. 8. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis rigidis scabris, floribus alternis secundis, petalis minutissimis. *Mexico.*

† *xorullensis* Kunth. 9. C. foliis oblongo-lanceolatis acutis rigidis utrinque scabris, ramis viscido-pubescentibus, pedunculis terminalibus subracemosis, calyce viscido pubescente. *Mexico.*

† *verticillata* Kunth. 10. C. foliis verticillatis ovato-oblongis acutiusculis viscoso-strigillosis, floribus lateralibus subsolitariis. *Peru.*

hirtella Kunth. 11. C. foliis oblongis utrinque attenuatis ramulisque viscido-subhirsutis, floribus terminalibus racemosis. *Nov. Granat.*

denticulata Kunth. 12. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris denticulato-ciliatis, ramulis viscoso-hirsutis, floribus racemosis, calycibus hispidulis. *Cumana.*

loxensis Kunth. 13. C. foliis ovato-oblongis acutis supra scabris subtus pilosiusculis, ramulis calycibusque glanduloso-hirsutis, floribus lateralibus alternis. *Nov. Granat.*

hyssopifolia Kunth. 14. C. foliis lanceolatis acutis supra glabris subtus ramisque substrigosis, floribus lateralibus alternis, calycibus glabris. *Mexico.*

gracilis Kunth. 15. C. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis virgatis calycibusque piloso-glandulosis, floribus lateralibus alternis. *Ad Orinoc. Brasil.* (C. fruticosa *, N. E.)

flava * 16. C. foliis oppositis confertis cordato-lanceolatis margine revolutis glabriusculis, floribus terminalibus subracemosis, calycibus piloso-glandulosis. *Brasil.* Sello.

** *Herbaceae.*

viscosissima Jacq. 17. C. caule erecto ramoso viscoso-hirsutiusculo, foliis ovato-lanceolatis supra scabris, floribus axillaribus subsolitariis. *Virginia. Amer. tropic.* (Lythrum petiolatum L. L. Cuphea L. fil. Balsamona Pinto Vand.)

procumbens Cav. 18. C. caule ramoso hirto subviscido, foliis oblongo-lanceolatis pilosiusculis, floribus lateralibus alternis, calycibus pilosis, filamentis duobus longioribus apice barbatis. *Mexico.* (C. lanceolata R. Br. bracteata Lag.)

nitidula Kunth. 19. C. caule ramoso fusco-villoso, foliis ovato-oblongis subtus hispidulis supra viscido-nitidulis, floribus lateralibus subsessilibus, calycibus glanduloso-pilosis, petalis subaequalibus. *Mexico.* (C. aequipetala Cav.)

cordifolia Kunth. 20. C. caule ramoso viscido-pubescente, foliis cordato-oblongis acutis margine revolutis rigidis scabris, floribus lateralibus subracemosis, calyce hispidulo-viscoso. *Nov. Granat.*

virgata Cav. 21. C. ramis virgatis hiſpidis, foliis ovato-lanceolatis ſupra ſcabris ſubtus piloſis, floribus lateralibus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Mexico.*

ſpicata Cav. 22. C. ramis hiſpidulis, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, racemis nudis axillaribus terminalibusque, calycibus hiſpidulis. *Peru. Braſil.* (C. circaeoides Ker.)

micrantha Kunth. 23. C. ramis foliisque ovato-oblongis acutis piloſiusculis, floribus terminalibus ſubracemoſis, calycibus hiſpidulis, petalis ſubaequalibus. *Ad Orinocum.*

1767. GINORIA Jacq.

americana Jacq. *Cuba.* Frutex cubitalis, ramis cinereis, foliis oppoſitis oblongis obtuſiusculis integerrimis glabris, floribus umbellato-corymboſis cyaneo-rubris.

1768. BLAKEA P. Brown.

* *Foliis 3-5plinerviis.*

trinervia L. ſuppl. 1. Bl. foliis ovali-oblongis utrinque nitidis parallele venoſiſſimis, ramis rufo-tomentoſis, pedunculis ſolitariis, ſquamis calycem excedentibus imbricatis. *Jamaica.*

laevigata Don. 2. Bl. foliis ovalibus integerrimis ramulisque glabris, pedunculis ſolitariis, ſquamis baſi connatis calyce brevioribus. *Mexico.*

latifolia Don. 3. Bl. foliis ovali-oblongis acutis 3plinerviis glabris, pedunculis ſolitariis, ſquamis calyce longioribus. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

ovalis Don. 4. Bl. foliis ovali-oblongis acuminatis utrinque nitidis, pedunculis geminis, ſquamis calyce longioribus, petalis obtuſis. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

roſea Don. 5. Bl. foliis ovali-lanceolatis acuminatis glabris, pedunculis geminis, ſquamis calyce longioribus, petalis mucronatis. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

repens Don. 6. Bl. foliis lanceolatis acuminatis ſubtus piloſis, pedunculis geminis, ſquamis calyce brevioribus, petalis mucronulatis. *Peru.* (Valdeſia R. et P.)

** *Foliis quinquenerviis.*

quinquenervia Aubl. 7. Bl. foliis oblongis acuminatis 5plinerviis utrinque nitidis, pedunculis geminis, ſquamis calyce longioribus. *Guiana.* (Bl. 3plinervia L. ſuppl. Vahl.)

paraſitica Don. 8. Bl. caule ſcandente, foliis ſubcordato-ovatis acutis ſupra nitidis, pedunculis ſubternis abbreviatis, ſquamis calycem aequantibus. *Guiana.* (Topobea paraſitica Aubl.)

macrophylla Don. 9. Bl. foliis amplis ovalibus utrinque glabris, pedunculis ſolitariis, ſquamis calyce longioribus. *Mexico.*

rotundifolia Don. 10. Bl. foliis amplis ſubrotundis ſubtus ramulisque denſe ferrugineo-tomentoſis, pedunculis ſolitariis, ſquamis calyce longioribus. *Peru.*

multiflora Don. 11. Bl. foliis ovali-oblongis acutis ſubtus piloſis, pedunculis ſubternis, ſquamis calyce 3plo brevioribus. *Peru.*

mexicana Don. 12. Bl. foliis ellipticis acutis denticulatis ſubtus piloſis, pedunculis ſubternis, ſquamis calyce longioribus. *Mexico.*

1769. AXINAEA R. et P.

purpurea R. et P. 1. A. foliis cordatis 7nerviis crenatis reticulato-venoſis ſupra rugoſis ſcabris ſubtus lacunoſis fuſco-tomentoſis, pedunculis 1floris aggregatis. *Peru.*

glanduloſa R. et P. 2. A. foliis ovatis 5nerviis denticulatis baſi 2glanduloſis ſupra glabris ſubtus flavido-tomentoſis, panicula terminali multiflora. *Peru.*

lanceolata R. et P. 3. A. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis 5nerviis dentatis ſupra glabris ſubtus fuſco-tomentoſis, racemis paniculatis. *Peru.*

dependens R. et P. 4. A. foliis lanceolatis acuminatis 5nerviis dentato-ſerratis ſupra glabris, racemo terminali compoſito pendulo. *Peru.*

muricata Don. 5. A. foliis ſubcordato-oblongis acutis 3nerviis crenatis ſupra nudis ſubtus ramulisque denſe granuloſis, panicula terminali granuloſo-muricata. *Peru.*

1770. BEFARIA Mut.

racemoſa Vent. 1. B. foliis ovato-lanceolatis glabris, ramis laevibus hiſpidisve, floribus racemoſo-paniculatis terminalibus. *Georgia. Florida.* (B. paniculata Mx.)

aeſtuans Mut. 2. B. foliis oblongis ſupra glabris ſubtus glauco-pubeſcentibus, corymbis terminalibus glanduloſo-hirſutis viſcidis. *Nov. Granat.* (Acunna lanceolata R. et P.?)

reſinoſa Mut. 3. B. foliis ovatis laevibus, pedunculis terminalibus corymboſis pubeſcentibus, corollis reſinoſis. *Nov. Granat.*

coarctata Humb. 4. B. foliis oblongis glabris ſubtus glaucis, pedunculis terminalibus corymboſis calycibusque ferrugineo-tomentoſis. *Peru.* (Acunna oblonga R. et P.?)

caxamarcenſis Kunth. 5. B. foliis oblongis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus glaucis, pedunculis terminalibus corymboſis calycibusque ferrugineo-hirtis. *Peru.*

glauca Humb. 6. B. glabra, foliis oblongis obtuſis ſubtus glaucis, racemis axillaribus terminalibusque, pedicellis ſubfaſtigiatis. *Nov. Granat.*

grandiflora Humb. 7. B. foliis ovatis ſupra glabris ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis terminalibus corymboſis calycibusque ferrugineis. *Quito.*

ledifolia Humb. 8. B. foliis oblongis submucronatis margine revolutis subtus glaucis nervo medio glanduloso-pilosis, pedunculis terminalibus racemosis viscoso-hirsutis. *Nov. Granat.*

1771. LEWISIA Pursh.

rediviva Pursh. *Ad fl. Clarkii et montes scopulosos* (rocky mountains) *Amer. ad Caurum.* Herba acaulis succulenta, foliis radicalibus linearibus obtusis, scapo 1floro, floribus albis.

1772. PORTULACA.

oleracea 1. P. caule prostrato, foliis spathulatis, floribus sessilibus. *Europ.*

marginata Kunth. 2. P. caule erectiusculo diffuso, foliis spathulatis marginatis, floribus congestis involucratis. *Nov. Granat.*

pusilla Kunth. 3. P. caule ramoso, foliis ellipticis, floribus subsessilibus. *Ad Orinoc.*

halimoides 4. P. foliis oblongis, floribus terminalibus congestis. *Jamaica.*

meridiana 5. P. caule radicante, foliis oblongis, axillis pilosis, floribus terminalibus subbaggregatis. *Ind. orient.*

quadrifida 6. P. caule prostrato, foliis ovato-lanceolatis, floribus sessilibus bracteatis 4fidis. *Aegypt.*

umbricola Kunth. 7. P. caule ramoso, foliis sparsis lanceolatis acutis, floribus subsessilibus. *Nov. Granat.*

rubricaulis Kunth. 8. P. caule ascendente ramoso, foliis subverticillatis lanceolatis acutis, floribus congestis involucratis. *Amer. austr.*

† *caffra* Thunb. 9. P. caule ramoso, foliis lineari-oblongis, floribus axillaribus pedunculatis. *Afric. austr.*

pilosa 10. P. caule procumbente, foliis lineari-teretibus subulatis, axillis pilosis, floribus terminalibus sessilibus subcongestis. *Amer. austr.* (P. teretifolia Kunth.)

guineensis Lindl. 11. P. caule decumbente, ramis erectis sub-3floris, foliis lineari-teretibus subulatis, axillis nudis, floribus axillaribus terminalibusque solitariis involucratis, calycibus pilosis, petalis retusis. *Afric. occ.*

lanuginosa Kunth. 12. P. caule decumbente, foliis teretibus obtusis, summis subverticillatis, axillis calycibusque pilosis, floribus terminalibus sessilibus congestis. *Ad fl. Amazonum.*

1773. DODECAS.

surinamensis L. suppl. *Surinam.* Frutex ramis 4gonis, foliis spathulatis, pedunculis axillaribus 1floris.

1774. CHAMAEMELES Lindl.

coriacea Lindl. *Madera.* Frutex foliis ſpathulatis ſubcrenatis, racemis axillaribus paucifloris.

1775. CARALLIA Roxb.

lucida Roxb. *Ind. or.* Arbor foliis oppoſitis oblongis ſerrulatis nitidis, pedunculis axillaribus incraſſatis cymoſis paucifloris, floribus luteis.

1776. AGATHOPHYLLUM Juſſ.

aromaticum W. *Madagascar.* Arbor craſſa, foliis alternis obovatis coriaceis, corymbis terminalibus. (Ravenſara Sonner. Evodia Gärtn.)

1777. DECUMARIA.

barbara *Carolina.* Frutex ſcandens foliis ovato - oblongis ſubſerratis, floribus corymboſis albis. (D. ſarmentoſa Boſc. var.)

1778. BOCCONIA.

fruteſcens 1. B. caule fruticoſo, foliis oblongis pinnatifidis ſubtus tomentoſis, laciniis dentatis. *Cuba. Mexico. Peru.*

integrifolia Humb. 2. B. caule fruticoſo, foliis oblongis crenatis. *Peru. Nov. Hiſpan.*

cordata W. 3. B. caule herbaceo elato, foliis cordatis ſinuato-lobatis glabris. *China bor.*

1779. PODORIA Perſ.

ſenegalenſis Perſ. *Senegambia.* Frutex foliis oblongis mucronatis, floribus parvis corymboſis. (Boſcia Lam.)

†1780. APACTIS Thunb.

japonica Thb. *Japon.* Arbor foliis alternis ovatis ſerratis glabris, floribus racemoſis.

†1781. TOXICODENDRON Thunb.

capenſe Thb. *C. B. S.* Frutex foliis verticillatis oblongis coriaceis, pedunculis corymboſis axillaribus. (Hyaenanche globoſa Lamb.)

1782. MABEA Aubl.

Piriri Aubl. 1. M. foliis oblongis utrinque attenuatis. *Guiana.*

Taquari Aubl. 2. M. foliis ſubcordato - oblongis obtuſiuſculis. *Guiana.*

1783. PTEROTUM Lour.

procumbens Lour. *Cochinchina.* Frutex foliis alternis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis axillaribus.

1784. STIXIS Lour.

ſcandens Lour. *Cochinchina.* Frutex ſcandens foliis oblongis acuminatis integerrimis, floribus racemoſis variegatis.

1785. ASARUM.

europaeum 1. A. foliis geminatis reniformibus obtuſiſſimis pubeſcentibus, calycibus hirſutiusculis erectis. *Europ.*

canadenſe 2. A. foliis geminatis reniformibus ſubmucronatis pubeſcentibus, calycibus lanatis reflexis. *Amer. boreal.* (A. carolinianum Walt., latifolium Salisb.)

virginianum 3. A. foliis ſolitariis cordatis coriaceis glabris, calycibus ſubcampanulatis. *Amer. boreal. China. Japon.*

arifolium Mx. 4. A. foliis ſolitariis ſubhaſtato-cordatis maculatis, calycibus tubuloſis infra limbum contractis. *Carolina.* (A. virginicum Walt.)

1786. THOA Aubl.

urens Aubl. 1. Th. partibus ♀ ſolitariis. *Guiana.*

edulis W. 2. Th. partibus ♀ ſpicatis. *Ind. or.*

D I G Y N I A.

1787. AGRIMONIA.

Eupatoria 1. A. foliis interrupte pinnatis hirſutis, impari petiolato, ſpicis pedunculatis elongatis. *Europ. Amer. bor.* (A. odorata Camer. Ait.)

ſuaveolens Pursh. 2. A. foliis interrupte pinnatis hirtis, impari ſeſſili, racemis ſpicatis elongatis viſcoſis. *Virginia. Carolina.*

parviflora Ait. 3. A. foliis interrupte pinnatis lineari-lanceolatis hirſutis, impari ſeſſili, ſpicis virgatis. *Amer. bor.* (A. ſtriata Mx.?)

repens 4. A. foliis interrupte pinnatis hirſutis, impari ſeſſili, racemis ſpicatis hirtis ſeſſilibus, bracteis reflexis pedicellos ſuperantibus.

1788. CALLICOMA R. Br.

ſerratifolia R. Br. *Nov. Holl.* Frutex foliis oppoſitis oblongis ſerratis ſupra nitidis ſubtus tomentoſis, capitulis pedunculatis, floribus ochroleucis.

1789. EUCLEA.

lancea Thunb. 1. E. foliis lanceolatis acutiusculis, pedunculis axillaribus 3fidis. *Afric. auſtr.*

racemoſa 2. E. foliis obovato-oblongis obtuſis coriaceis, pedunculis racemoſis nutantibus. *Afric. auſtr.*

undulata Thb. 3. E. foliis obovato-oblongis undulatis, pedunculis racemoſis erectiusculis. *Afric. auſtr.*

1790. PLEURANDRA Labill.

** Foliis glabris.*

bracteata R. Br. 1. Pl. foliis ſpathulatis mucronatis ſubtus discoloribus, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, bracteis ſericeis. *Nov. Holl.*

nitida R. Br. 2. Pl. foliis ſpathulatis acutiusculis mucronatis laevibus glaucis, floribus terminalibus ſolitariis, bracteis glabris, germinibus tomentoſis. *Nov. Holl.*

Cneorum Cand. 3. Pl. foliis ſpathulatis obtuſis, bracteis germinibusque glabris, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

riparia R. Br. 4. Pl. foliis linearibus obtuſiusculis margine revolutis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, calycibus glabris, germinibus hirſutis. *Nov. Holl.*

pedunculata R. Br. 5. Pl. foliis linearibus obtuſis margine ſubrevolutis, floribus pedunculatis ſub-8andris, calycibus germinibusque glabris. *Nov. Holl.*

enervia Cand. 6. Pl. foliis linearibus acutiusculis enerviis, floribus ſeſſilibus, calycibus obtuſis mucronulatis germinibusque glabris. *Nov. Holl.*

acicularis Labill. 7. Pl. foliis linearibus cuſpidatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris, germinibus hirſutis. *Nov. Holl.*

aceroſa R. Br. 8. Pl. foliis lineari-ſubulatis margine revolutis ſupra ſcabris ſubtus laevibus, pedunculis terminalibus 1floris, germinibus villoſis. *Nov. Holl.*

*** Foliis pubeſcentibus.*

hypericoides Cand. 9. Pl. foliis linearibus obtuſis margine revolutis ſupra aſperis ſubtus incanis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

ericaefolia Cand. 10. Pl. foliis linearibus obtuſiusculis margine revolutis ſupra aſperis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſeſſilibus, calycibus germinibusque hirſutiusculis. *Nov. Holl.*

intermedia Cand. 11. Pl. foliis linearibus obtuſis margine revolutis ſuperne ſcabris nitidis ſubtus ſubpubeſcentibus, floribus pedunculatis, calycibus glabris, germinibus hirſutis, ſtaminibus ſubamphigynis. *Nov. Holl.*

empetrifolia Cand. 12. Pl. foliis linearibus obtufis margine revolutis fupra nitidis fubtus villofiusculis, floribus pedunculatis 5andris. *Nov. Holl.*

fcabra R. Br. 13. Pl. foliis oblongis obtufis utrinque afperis fubtus canefcentibus, floribus pedunculatis, calycibus glabris, germinibus fubtomentofis. *Nov. Holl.*

ovata Labill. 14. Pl. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ftrigillofo-afperis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque pubefcentibus. *Terra Diemen.*

parviflora Cand. 15. Pl. foliis obovatis utrinque ftellato-pubefcentibus fubtus tomentofis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque pilofis. *Nov. Holl.*

furfuracea R. Br. 16. Pl. foliis fpathulatis ftellato-pubefcentibus, floribus pedunculatis bracteatis, calycibus germinibusque hirfutiusculis. *Nov. Holl. verfus Africum.*

cinerea R. Br. 17. Pl. foliis oblongis obtufis utrinque villofis fubtus incanis, floribus pedunculatis, calycibus germinibusque hirfutis. *Nov. Holl. ad Africum.*

fericea R. Br. 18. Pl. foliis linearibus obtufiusculis margine revolutis calycibusque fericeo-villofis, floribus fubfeffilibus terminalibus. *Nov. Holl. ad Africum.*

TRIGYNIA.

1791. RESEDA.

* *Foliis indivifis.*

fefamoides 1. R. foliis linearibus obtufis craffiusculis glabris, capfulis fub-4dentatis, dentibus reflexis. *Gallia auftr. Hifpania. Lufitania.* (R. purpurafcens L. ftellata Lam. Clufii *.)

linifolia Horn. 2. R. foliis linearibus fubulatis canaliculatis, capfulis 3-5dentatis. *Europ. auftr. Aegypt.?* (R. fubulata Delil.?)

glauca 3. R. foliis linearibus glaucis fubdentatis, caule ramofo, capfulis 4dentatis. *Hifpan. Aegypt.*

dipetala Ait. 4. R. foliis linearibus integerrimis acutis, floribus 4gynis 2petalis, petalis inaequaliter laciniatis. *Afric. auftr.* (R. capenfis Thunb.)

fcoparia Brouff. W. 5. R. foliis linearibus integerrimis glabriusculis, caule fruticofo, ramis virgatis, capfulis clavatis 3dentatis. *Teneriffa.*

canefcens 6. R. foliis lineari-lanceolatis undulatis pilofis, ramis hirtis, capfulis 6dentatis. *Aegypt.* (R. 6gyna Forsk.)

Luteola 7. R. foliis lanceolatis glabris bafi utrinque 1dentatis, capfulis 4dentatis, radice perenni. *Europ.* (R. lanceolata Lag., crifpata Link.)

virefcens Horn. 8. R. foliis lineari-lanceolatis glabris bafi edentulis, capfulis 4dentatis, radice annua. *Hifpan.*

chinensis Lour. 9. R. foliis lato-lanceolatis integerrimis glabris, calycibus 5partitis, capsulis 3dentatis. *China austr.*

cochinchinensis Lour. 10. R. foliis lato-lanceolatis 5nerviis integerrimis, calycibus 5partitis, capsulis 3dentatis. *Cochinchina.*

** *Foliis subdivisis.*

mediterranea 11. R. foliis lanceolatis acutis integris 3fidisque, calycibus 6partitis corolla brevioribus, capsulis 3dentatis. *Afric. bor.* (R. 4gyna Forsk.)

odorata 12. R. foliis lanceolatis obtusiusculis integris 3fidisque, calycibus 6partitis corollam aequantibus, capsulis 3dentatis. *Afric. bor.*

Phyteuma 13. R. foliis inferioribus spathulatis indivisis, superioribus subdivisis, calycibus 6partitis florem superantibus, capsulis 3dentatis. *Austria. Helvetia. Europ. austr.* (R. media Lag.)

ramosissima Pourr. 14. R. foliis linearibus indivisis 3fidisque, caule ramosissimo, calycibus 6partitis, capsulis obovatis 3dentatis. *Hispania.* (R. erecta Lag.)

saxatilis Pourr. 15. R. foliis omnibus 3fidis, superiorum laciniis linearibus, inferiorum lanceolatis undulatis, caule simplici, fructibus clavato-elongatis. *Hispan.* (R. stricta Pers.)

pruinosa Delil. 16. R. foliis omnibus 3fidis cauleque pruinoso-papulosis, laciniis lineari-lanceolatis acutis, capsulis clavatis obtuse 3dentatis. *Aegypt.*

*** *Foliis pinnatis pinnatifidisque.*

lutea 17. R. foliis infimis pinnatis, superioribus pinnatifidis 3fidisque, laciniis lanceolatis subundulatis, calycibus 6partitis, capsulis 3dentatis. *Europ.*

undata 18. R. foliis omnibus pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis mucronatis undulatis margine scabris, racemo dense spicato, petalis 3fidis calycem 5partitum superantibus, capsulis maximis 3dentatis. *Europ. austr.*

alba 19. R. foliis omnibus pinnatifidis, laciniis lanceolatis laevibus subundulatis, racemo laxo, petalis 3lobis calycem 6partitum superantibus, capsulis 4dentatis. *Europ. austr.*

fruticulosa 20. R. foliis interrupte pinnatis, pinnis lanceolatis recurvis margine scabris, caule basi fruticoso, calycibus 5partitis, capsulis 4dentatis, dentibus recurvis. *Hispan. Sicil.*

bipinnata W. 21. R. foliis 2pinnatifidis scaberrimis, caule suffruticoso, floribus spicatis. *Hispan.*

1792. OCHRADENUS Delil.

baccatus Delil. *Aegypt. super.* Fruticulus ramosus, ramis virgatis strictis glabris, foliis linearibus obtusiusculis e tuberculo glanduloso, floribus spicatis flavis, pedunculis demum spinescentibus.

1793. GELONIUM Roxb.

bifarium Roxb. 1. G. foliis oblongis utrinque attenuatis. *Ind. or.*
lanceolatum W. 2. G. foliis ſpathulato-lanceolatis. *Ind. or.*

TETRAGYNIA.

1794. VISNEA.

Mocanera *Inſ. Canar.* Frutex foliis petiolatis oblongis coriaceis ſubſerratis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis nutantibus albis.

1795. DICHROA Lour.

febrifuga Lour. *China. Cochinchina.* Arbor foliis lanceolatis ſerratis, floribus corymboſis extus albis intus coeruleis.

1796. QUILLAJA Molin.

Saponaria Molin. *Chili.* Arbor excelſa, foliis alternis oblongis denticulatis undulatis, floribus axillaribus pedunculatis virentibus.

1797. BERTOLONIA *.

paniculata * *Braſil.* Frutex foliis oppoſitis oblongis glabris, floribus paniculatis. (Leandra Radd.?)

1798. CALLIGONUM.

Pallaſia Ait. 1. C. fructibus alatis, alis membranaceis ſubdentatis undulatis. *Ad Volgam.* (Pallaſia caſpica L. ſuppl. Pterococcus aphyllus, Calligonum polygonoides et Pallaſia Pterococcus Pall.)
polygonoides 2. C. fructibus cancellatis, ſetis ramoſis rigidis. *Armenia. Aegypt. Afric. boreal.* (C. comoſum Hérit.)

1799. APONOGETON Thunb.

monoſtachys L. ſuppl. 1. A. ſpica ſimplici, foliis cordato-ovalibus. *Ind. or. China. auſtr.* (Saururus natans L. Spathium chinenſe Lour... A. lineare Vahl. var.?)
criſpus Thb. 2. A. ſpica ſimplici, foliis enſiformibus acuminatis criſpis. *Ceylon.*
diſtachys Ait. 3. A. ſpica 2fida, foliis oblongis elongatis acutiusculis natantibus, bracteis indiviſis. *C. B. S.*
anguſtifolius Ait. 4. A. ſpica 2fida, foliis lineari-lanceolatis erectis, bracteis 2partitis, floribus 6andris. *C. B. S.*

PENTAGYNIA.

1800. BLACKWELLIA Commerſ.

axillaris Lam. 1. Bl. foliis ovatis ſubcrenatis utrinque glabris, ſpicis axillaribus elongatis nutantibus, floribus plumoſo-villoſis. *Madagascar.*

ſpiralis Wall. 2. Bl. foliis ovato-oblongis uncinato-dentatis ſubtus villoſiusculis, petiolo apice 2glanduloſo, racemis axillaribus elongatis villoſis, floribus faſciculatis apetalis. *Inſ. Mascaren.*

paniculata Lam. 3. Bl. foliis ovato-ſubrotundis dentatis, floribus paniculatis. *Inſ. Mascaren.*

integrifolia Lam. 4. Bl. foliis ovatis obtuſis ſubintegerrimis utrinque glabris, floribus paniculatis terminalibus. *Inſ. Mascaren.*

glauca Vent. 5. Bl. foliis ovato-oblongis obtuſis glaucis utrinque glabris ſubintegerrimis, racemis axillaribus paniculatis. *Inſ. Mascaren.*

ceraſifolia Vent. 6. Bl. foliis oblongis acuminatis dentatis utrinque glabris, racemis axillaribus oppoſitis. *Madagascar.*

tomentoſa Vent. 7. Bl. foliis obovatis dentatis tomentoſis, ſpicis axillaribus elongatis. *Java.*

1801. VAUQUELINIA Bonpl.

corymboſa Bonpl. *Mexico.* Arbor foliis ſparſis lanceolatis dentatis, floribus corymboſis albis.

1802. LINDLEYA Kunth.

meſpiloides Kunth. *Mexico.* Arbor foliis ſparſis oblongis crenulatis, floribus axillaribus ſolitariis albis.

1803. KAGENECKIA R. et P.

glutinoſa Kunth. *Nov. Granat.* Arbor ramulis glutinoſis, foliis oblongo-lanceolatis crenato-ſerratis nitidis, floribus terminalibus ♂ corymboſis, ♀ ſolitariis. (Lydaea Lyday Molin.)

1804. ORYGIA Forsk.

decumbens Forsk. *Arabia.* Fruticulus decumbens, foliis obovatis mucronatis, floribus racemoſis axillaribus purpureis. (Portulaca Vahl. Talinum W.)

1805. BRUNELIA R. et P.

comocladifolia Humb. 1. Br. foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis oblongis ſpinoſo-ſerratis ſubtus tomentoſis, paniculis axillaribus. *Peru.*

inermis R. et P. 2. Br. foliis impari-pinnatis ternatis ſimplicibusque, foliolis ſerratis, fructibus glabris. *Peru.*

aculeata R. et P. 3. Br. foliis abrupte pinnatis, foliolis integerrimis, fructibus aculeatis. *Peru.*

acutangula Humb. 4. Br. foliis ternis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus pulverulento-pubeſcentibus, ramis 3quetris, fructibus pubeſcentibus. *Nov. Granat.*

ovalifolia Humb. 5. Br. foliis ternis ſubrotundo-ovalibus ſerratis ſubtus pubeſcentibus, capitulis axillaribus pedunculatis. *Peru.*

tomentoſa Humb. 6. Br. foliis ternis ovali-oblongis ſerratis ſubtus reticulatis tomentoſis, racemis axillaribus. *Peru.*

1806. GLINUS.

lotoides 1. Gl. albido-lanatus diffuſus herbaceus, foliis obovatis faſciculatis inaequalibus, pedunculis unifloris axillaribus. *Ad litora maris mediterr. et ind.*

trianthemoides Roth. 2. Gl. glaber herbaceus, foliis obovatis, floribus paniculatis. *Ind. or.*

dictamnoides 3. Gl. tomentoſus fruticoſus, foliis orbiculatis, pedunculis aggregatis axillaribus 1floris. *Ind. orient.*

ſetiflorus Forsk. 4. Gl. villoſus fruticoſus, foliis orbiculatis, floribus capitatis. *Arabia.*

mozambicenſis * 5. Gl. glaber fruticuloſus, foliis obovato-oblongis ſubſeſſilibus, floribus congeſtis pedunculatis lateralibus. *Inſ. Mozambica. Afric. orient.* (Miltus africana Lour.)

HEXAGYNIA.

1807. STRATIOTES.

aloides 1. Str. foliis lineari-lanceolatis carinatis aculeato-denticulatis, ſpatha bifida nuda. *Europ.*

acoroides 2. Str. foliis linearibus elongatis flaccidis apice ſubſerratis, ſpatha bifida apice barbata. *Inſ. Ind. orient.*

1808. CEPHALOTUS Labill.

follicularis Labill. *Nov. Holl. ad Africum.* Planta acaulis mirabilis propter folliculos plicatos operculatos ore annulato, foliis radicalibus ſpathulatis acutis interjectos, ſcapo racemoſo-paniculato.

DODECAGYNIA.

1809. SEMPERVIVUM.

* *Fruticosa: foliis planis.*

arboreum 1. S. caule laevi ramoso, foliis spathulatis acutiusculis glabris ciliatis, ciliis patulis mollibus, panicula diffusa. *Graecia. Lusitania. C. B. S.* (S. africanum Mill.)

ciliatum Brouss. 2. S. caule glabro, foliis obovatis acutis glabris cartilagineo-ciliatis, cymis confertis. *Teneriffa.*

canariense 3. S. caule abbreviato foliisque spathulatis mucronatis villosis, paniculae ramis divaricatis. *Ins. Canar.*

tortuosum Ait. 4. S. ramis tortuosis pubescentibus, foliis obovatis subtus convexis villosis, floribus paniculatis. *Ins. Canar.*

glutinosum Ait. 5. S. foliis cuneiformibus viscidis ciliatis, ciliis cartilagineis appressis, paniculae amplissimae declinatae ramis divaricatis glutinosis. *Madera.*

glandulosum Ait. 6. S. foliis orbiculato-spathulatis margine glutinosis globoso-glandulosis. *Madera.*

Smithii Sims. 7. S. foliis obovatis acuminatis plano-convexis subtus maculatis cauleque hispidis, ramis floriferis apice revolutis, floribus confertis. *Teneriffa.*

barbatum C. Smith. 8. S. foliis ovato-spathulatis acutis cartilagineo-denticulatis, ramis tortuosis, floribus paniculatis. *Ins. Canar.* (S. lineolare Haw. spathulatum Horn.)

† *tabulaeforme* Haw. 9. S. foliis dense imbricatis spathulatis ciliatis glabris. *Madera.*

** *Herbacea.*

tectorum 10. S. propaginibus patulis, foliis lanceolatis ciliatis, caule folioso villoso, nectariis cuneiformibus subcarnosis. *Europ.*

globiferum 11. S. propaginibus globosis demum patulis, foliis lanceolatis ciliatis, caule folioso villoso, nectariis subnullis. *Europ.*

montanum 12. S. propaginibus patulis, foliis lanceolatis villosis, petalis lineari-lanceolatis acuminatis elongatis. *German. austr.*

hirtum 13. S. propaginibus globosis demum patulis, foliis ciliatis, petalis elongatis apice hirsutis. *Hungar. Bohemia. Helvetia.*

pumilum M. B. 14. S. propaginibus globosis, foliis lanceolatis pilosis, caule paucifloro, petalis hirsutis. *Caucasus.*

arachnoideum 15. S. propaginibus globofis, foliis 3gonis apice barbatis filo nexis. *Europ. auftr.*

anomalum Lag. 16. S. glaberrimum, propaginibus cylindricis, foliis carnofis fubulatis bafi folutis. *Hifpan. auftr.*

caefpitofum C. Smith. 17. S. propaginibus globofis, foliis lanceolato-linearibus longe ciliatis lineato-maculatis glabris, cymae 2fidae ramis divaricatis. *Inf. Canar.* (S. barbatum Horn., ciliatum Sims.)

† *foboliferum* Sims. 18. S. propaginibus globofis deciduis, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petalis fimbriatis erectis. *Patria?*

flagelliforme Fifch. 19. S. propaginibus patulis lateralibns, foliis ovatis mucronatis papillofis ciliatis, cymae ramis 2fidis. *Sibir.*

aureum C. Smith. 20. S. foliis obovato-fpathulatis mucronatis margine cartilagineo-membranaceis integerrimis, floribus cymofo-umbellatis, nectariis 0. *Inf. Canar.*

villofum Ait. 21. S. foliis obovatis obtufis villofis, nectariis palmatis. *Madera.*

pruinatum * 22. S. foliis lanceolatis acutis fubtus convexis cauleque erecto pruinofis, cyma 2fida pauciflora. *Lufitania.* (Sedum pruinatum Link.)

dodrantale W. 23. S. foliis oblongis obtufis integerrimis glabris in petiolum attenuatis, cymis divaricatis, pedunculis calycibusque hirtis. *Teneriffa.*

hifpanicum W. 24. S. foliis imbricatis femiteretibus fubulatis ciliatis, cyma 2fida. *Hifpania.*

ftellatum Sm. 25. S. caule pubefcente, foliis fpathulatis fparfis, floribus paniculatis. *Mons Baldus.*

monanthon Ait. 26. S. caule breviffimo, foliis undique confertis clavatis glabris, pedunculis 1floris fubaggregatis, nectariis obcordatis. *Inf. Canar.*

POLYGYNIA.

1810. CERATOCEPHALUS Mönch.

falcatus Perf. 1. C. fructuum cornubus falcatis fubafcendentibus. *Europ. auftr.* (Ranunculus falcatus L.)

orthoceras Cand. 2. C. fructuum cornubus rectis. *Tauria. Sibir. auftr.* (Ranunculus falcatus M. B.)

1811. ISOPYRUM.

fumarioides 1. I. radice annua, petiolis bafi fimplicibus, foliis decompofitis, foliolis fpathulato-linearibus, floribus acutis, fructibus pluribus. *Sibir.*

thalictroides 2. I. radice fafciculata, petiolis bafi ftipulatis, foliis 3ternatis, foliolis obtufe lobatis, floribus obtufis, fructibus fubternis. *Europ. auftr.* (I. aquilegioides L. Helleborus thalictroides Lam.)

adoxoides Cand. 3. I. radice tuberofa, petiolis bafi fimplicibus, foliis ternatis, foliolis 3fidis, laciniis obtufis 3dentatis, floribus obtufiusculis, capfulis fubternis. *China med.* Jac. Cunningham. *Japon.* Fifcher.

grandiflorum Fifch. Cand. 4. I. fcapo unifloro, floribus maximis ovalibus. *Imaus.*

1812. LAURELIA Juff.

aromatica Juff. *Chili.* Arbor foliis oppofitis lanceolatis integerrimis aromaticis, floribus axillaribus fubcymofis. (Pavonia R. et P. Thiga chilenfis Molin.)

CLASSIS XII.

I C O S A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

I. *Flores corollati.*

A. *Corolla* 4-5*petala.*

a. *Fructus ſuperus.*

1813. *Antherylium* Vahl. Cal. 4partitus. Pet. 4. Capſ. 1locularis 3valvis polyſperma. *Guttiferae.*
1814. *Kunzia* *. Cal. 5partitus. Pet. 5. Fructus 1ſpermus. *Familia?*
1815. *Amygdalus.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma tomentoſa, putamine lacunoſo. *Pomaceae.*
1816. *Prunus.* Cal. 5partitus. Pet. 5. Drupa 1ſperma glabra, putamine laeviusculo. *Pomaceae.*
1817. *Chryſobalanus.* Cal. 5partitus campanulatus. Pet. 5. Stylus lateralis. Drupa 1ſperma, putamine 5valvi. *Pomaceae.*
1818. *Plinia.* Cal. 4-5partitus. Pet. 4, 5. Stylus elongatus. Drupa 1ſperma multiſulca. *Pomaceae.*
1819. *Banara* Aubl. Cal. 6partitus. Pet. 6. Bacca 1locularis polyſperma.

b. *Fructus inferus. Myrteae.*

1820. *Drupatris* Lour. Cal. 5fidus. Pet. 4. Filamenta craſſa, antheris 2lobis. Drupa exſucca nuce 3loculari.
1821. *Guapurium* Juſſ. Cal. 4fidus. Pet. 4. Bacca umbilicata 2-4ſperma.
1822. *Myrtus.* Cal. 4-5partitus. Pet. 4-5. Bacca 1-3locularis, 1-3ſperma.
1823. *Nelitris* Gärtn. Cal. 4-5dentatus. Pet. 4-5. Bacca 1locularis ſub-10ſperma, ſeminibus inverſis.
1824. *Campomaneſia* R. et P. Cal. 4-5partitus. Pet. 4, 5. Bacca 1locularis ſub-10ſperma, ſeminibus placentae centrali affixis.
1825. *Pſidium.* Cal. 3-5lobus. Pet. 4-5. Bacca 1-5locularis, loculis polyſpermis.
1826. *Glaphyria* Jack. Cal. 5fidus. Pet. 5. Bacca 5locularis polyſperma, ſemina duplici ordine placentae centrali affixa.
1827. *Robinſonia* Schreb. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Bacca 7locularis 7ſperma.

1828. *Punica.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Pomum 10loculare polyſpermum.
1829. *Calythrix* Labill. Cal. 5fidus, laciniis ariſtatis perſiſtentibus. Pet. 5 decidua. Achenium.
1830. *Angophora* Cav. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stamina longiſſima. Capſ. 3locularis 3ſperma.
1831. *Metroſideros* Gärtn. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stamina longiſſima. Capſ. 4-5locularis polyſperma.
1832. *Leptoſpermum* Forſt. Cal. 5fidus. Pet. 5 unguiculata. Stamina petalis breviora. Capſ. 4-5locularis polyſperma: ſemina linearia exigua.
1833. *Fabricia* Gärtn. Cal. 5fidus. Pet. 5 exunguiculata. Stamina petalis aequalia. Capſ. multilocularis: ſemina alata pauca.
1834. *Philadelphus.* Cal. 4-5fidus. Pet. 4-5. Capſ. 4locularis: placenta angularis: ſemina membrana obvoluta.

B. *Corolla 6-polypetala.*

1835. *Sonneratia* L. fil. Cal. 6fidus. Pet. 6. Pomum multiloculare: ſemina numeroſa nidulantia. *Aurantia.*
1836. *Calyplectus* R. et P. Cal. campanulatus apice 10-12dentatus baſi 2bracteatus. Pet. 10, 12 limbo calycis inſerta. Stylus longiſſimus. Bacca corticoſa polyſperma. Sem. alata. *Salicariae.*
1837. *Bartonia* Sims. Cal. 5fidus. Pet. 10. Capſ. 1locularis apice operculatim 3-5valvis polyſperma. *Loaſeae.*
1838. *Cactus.* Cal. 1phyllus imbricatis ſuperus. Petala plurima baſi ſubcohaerentia calyci innata. Stigma multifidum. Bacca 1locularis polyſperma. *Cereae.*

II. *Flores apetali.*

1. *Fructus ſuperus.*

† 1839. *Triphaca* Lour. Flores monoeci. Cal. 5fidus. Fructus 3 leguminiformes. *Familia?*
1840. *Phoberos* Lour. Cal. 10fidus. Bacca 1locularis ſub-4ſperma. *Familia?*
1841. *Lophira* Banks. Cal. 5ſepalus inaequalis. Stigma 2fidum. Nux coriacea 1ſperma. *Familia?*
1842. *Abatia* R. et P. Cal. 4partitus. Capſ. 1locularis 2valvis polyſperma. *Tiliaceae?*
1843. *Polylepis* R. et P. Cal. turbinatus ſuperne ſpinoſus, limbo 3-4partito. Stigma multifidum. Achenium calyce obtectum. *Roſaceae.*
1844. *Cercocarpus* Kunth. Cal. turbinatus coloratus, limbo 5lobo. Achenium calyce obtectum. *Roſaceae.*

2. *Fructus inferus.*

1845. *Calliſtemon* R. Br. Cal. 5fidus. Stam. elongata. Capſ. 3locularis polyſperma. *Myrteae.*
1846. *Calyptranthes* Sw. Cal. truncatus in aeſtivatione calyptra caduca tectus. Bacca 1locularis oligoſperma. *Myrteae.*
1847. *Eucalyptus* Heri. Cal. prioris. Capſ. 4locularis polyſperma. *Myrteae.*
1848. *Foetidia* Commerſ. Cal. 4fidus. Nux lignoſa 4angula 4locularis, loculis 2ſpermis. *Familia?*

DI - PENTAGYNIA.

1. *Fructus ſuperi.*

1849. *Waldſteinia* Kit. Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus Pet. 5. Styli 2. Caryopſes 2, 3 receptaculo exſucco inſertae. *Roſaceae.*
1850. *Spiraea.* Cal. 5fidus. Pet. 2. Styli 3-5. Folliculi 3-5 polyſpermi. *Roſaceae.*
1851. *Keria* Cand. Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 5. Capſ. 5 globoſae. *Roſaceae.*
1852. *Seſuvium.* Cal. 5partitus intus corollinus. Cor. 0. Styli 3. Capſ. 3locularis circumſciſſa. *Aizoideae.*
1853. *Aizoon.* Cal. 5partitus. Cor. 0. Styli 5. Capſ. 5locularis. *Aizoideae.*

2. *Fructus inferi.* *Pomaceae.*

1854. *Meſpilus.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 2-5. Bacca calyce coronata 2-5pyrena, oſſiculis 1locularibus 2ſpermis.
1855. *Raphiolepis* Lindl. Cal. infundibuliformis 2fidus. Pet. 5. Styli 2. Bacca calycina 2-4pyrena, putamine chartaceo. *Roſaceae.*
1856. *Photinia* Lindl. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Styli 2. Pericarpium 2loculare 4ſpermum calyce carnoſo incluſum: teſta cartilaginea. *Roſaceae.*
1857. *Pyrus.* Cal. 5dentatus. Pet. 5. Pomum clauſum 5loculare, loculis 1-2ſpermis.
1858. *Mesembrianthemum.* Cal. 5fidus perſiſtens. Petala numeroſa et ſecum et cum ſtaminibus coalita. Capſ. carnoſa multilocularis. *Aizoideae.*
1859. *Tetragonia.* Cal. 4partitus perſiſtens intus corollinus. Styli 4. Drupa 4angula, nuce 4loculari. *Aizoideae.*

DECA - POLYGYNIA.

1. *Fructus ſuperi.*

* *Potentilleae.*

1860. *Dalibarda* Mx. Cal. 5fidus. Pet. 5. Caryopſes 5-10 in rec. ſicco, ſtylis caducis.
1861. *Dryas.* Cal. 8-9partitus. Pet. 8, 9. Caryopſes plurimae, ſtylis plumoſis coronatae.
1862. *Rubus.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Bacca compoſita.
1863. *Fragaria.* Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes nudae plurimae in rec. ſucculento turgido.
1864. *Potentilla.* Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes nudae plurimae in rec. ſicco, ſaepe piloſo.
1865. *Geum.* Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes ſtylis geniculatis coronatae.
1866. *Sieverſia* W. Cal. 10fidus, laciniis alternis minoribus. Pet. 5. Caryopſes ſtylis rectis coronatae.

** *Urticeis affines.*

1867. *Calycanthus.* Perianthium multiplici ſerie imbricatum coloratum. Stamina 4plici ſerie, interna abortientia. Antherae

2loculares laterales. Caryopſes plurimae ſtylis coronatae calyce baccato cinctae.

1868. *Chimonanthus* Lindl. Perianthium imbricatum coloratum. Stamina duplici ſerie, externa perfecta baſi connata. Caryopſes paucae.

1869. *Atheroſperma* Labill. Flores monoeci. Cal. 8partitus. Stamina antheris lateralibus filamentis ſterilibus interſtincta. Styli plumoſi filamentis interſtincti. Achenia plurima.

1870. *Peumus* Perſ. Flores dioeci. Cal. 10partitus, laciniis internis corollinis. Stamina glanduloſa. Drupae plurimae 1ſpermae.

1871. *Citroſma* R. et P. Flores monoeci. Cal. campanulatus 4-8-dentatus. Filamenta laxa corollina. Styli ſubulati. Baccae plurimae 1ſpermae calyce carnoſo cinctae.

1872. *Hedycarya* Forſt. Flores dioeci. Cal. 8-10fidus. Antherae ſeſſiles apice barbatae. Nuces 1ſpermae.

*** *Anoneae.*

1873. *Eupomatia* R. Br. Cal. truncatus. Calyptra in aeſtivatione caduca. Stamina interiora petaloidea: antherae laterales. Bacca polyſperma.

**** *Roſaceae.*

1874. *Roſa.* Cal. 5fidus. Pet. 5. Bacca polyſperma calyce coronata.

1875. *Anthodiſcus* Meyer. Cal. planus ſubintegerrimus perſiſtens. Pet. 5. Bacca globoſa umbilicata.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

1813. Antherylium Vahl.

Rohrii Vahl. 1. A. ramulis 4gonis glabris, ſtipulis ſpineſcentibus, foliis ovato-ellipticis glaberrimis eglandulofis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Inſ. Carib.*

*floribundum** 2. A. ramulis 4gonis pubeſcentibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis umbelliferis axillaribus floribusque glandulofis. *Nov. Granat.* (Adenaria Kunth.)

*purpuratum** 3. A. ramulis teretibus villoſiusculis, foliis oblongis acuminatis ſupra glabris coloratis ſubtus ad venas pubeſcentibus, umbellis ſubſeſſilibus glandulofis. *Nov. Granat.* (Adenaria Kunth.)

*grisleoides** 4. A. ramulis teretibus pubeſcentibus, foliis oblongis acuminatis glabris, umbellis breviſſime pedunculatis. *Ad fl. Magdalen.* (Adenaria Kunth.)

1814. Kunzia.*

*tridentata** *Montes ſcopuloſi* (rocky mountains) *Amer. bor.* Frutex ramoſiſſimus, foliis obovatis 3dentatis villoſo-tomentoſis, floribus terminalibus ſolitariis luteis. (Tigarea Pursh. Purshia Cand.)

1815. Amygdalus.

Perſica 1. A. foliis lanceolatis argute ſerratis, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Perſia.*

communis 2. A. foliis lanceolatis baſi glanduloſo-ſerratis, floribus ſeſſilibus geminis. *Afric. bor. Palaeſtina. Graecia.* (A. fragilis W.)

pumila 3. A. foliis lanceolatis duplicato-ſerratis, pedunculis ſubgeminis. *China. Africa?* (Prunus ſinenſis Perſ., japonica Ker.)

nana 4. A. foliis oblongis baſi attenuatis ſimpliciter argute ſerratis, pedunculis ſubgeminis. *Tataria.* (A. georgica Desf.)

microphylla Humb. 5. A. foliis oblongis acutis crenato-ſerrulatis glabris, floribus ſubſeſſilibus. *Mexico.*

orientalis Ait. 6. A. foliis lanceolatis integerrimis perennantibus argenteo-ſericeis. *Aſia minor.* (A. argentea Lam.)

1816. PRUNUS.

* *Pedunculis ſolitariis.*

ſpinoſa 1. Pr. foliis oblongis crenulatis ſubtus pubeſcentibus, ramis ſpinoſis, fructibus ſubgloboſis. *Europ. omnis.*

ceraſifera Ehrh. 2. Pr. foliis ellipticis ſerrulatis utrinque glabris, ramis ſubinermibus, fructibus globoſis acutiuſculis. *Amer. bor.*

maritima W. 3. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis duplicato-ſerratis, fructibus ovatis acuminatis. *Amer. bor.* (Pr. acuminata Mx.)

aſpera Thunb. 4. Pr. foliis ovatis acuminatis ſerratis utrinque aſperis, fructibus ſubgloboſis ſtylo coronatis, nuce triquetra. *Japon.*

japonica Thunb. 5. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis utrinque glabris. *Japon.*

glanduloſa Thunb. 6. Pr. foliis oblongis glanduloſo-ſerratis ſubtus reticulatis. *Japon.*

inciſa Thunb. 7. Pr. foliis ovatis acutis inciſo-ſerratis villoſis. *Japon.*

tomentoſa Thunb. 8. Pr. foliis ovatis acutis ſerratis ſupra villoſis, ſubtus tomentoſis, fructibus globoſis. *Japon.*

** *Pedunculis geminis.*

domeſtica 9. Pr. foliis ovalibus crenatis ſubtus ſubpubeſcentibus, fructibus ellipticis. *Europ.* (Pr. pyramidalis Cand.)

inſiticia 10. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus villoſiuſculis, ramis ſpineſcentibus, fructibus globoſis. *Europa.*

Chicaſa Mx. 11. Pr. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis glabris, ramis ſpineſcentibus, fructibus ſubgloboſis. *Virginia. Carolina.* (Pr. inſiticia Walt.)

daſycarpa Ehrh. 12. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis glabris, petiolis glanduloſis, floribus ſubſeſſilibus, fructibus globoſis ſubvilloſis. *Patria?*

Armeniaca 13. Pr. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis glanduloſo-ſerrulatis utrinque glabris, floribus ſubſeſſilibus, fructibus ſubgloboſis pubeſcentibus. *Perſia bor. Armenia.*

brigantiaca Vill. 14. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerrulatis utrinque glabris, petiolis ſubglanduloſis, fructibus ſubgloboſis glabris, nucibus compreſſis. *Gallia orient.*

ſibirica 15. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis utrinque glabris baſi ſubglanduloſis, floribus ſubſeſſilibus, fructibus coriaceis compreſſis. *Sibir.*

† *Cocomilia* Tenor. 16. Pr. foliis ovalibus glanduloſo-crenulatis, petiolis glanduloſis. *Calabria.*

proſtrata Labill. 17. Pr. foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo depreſſo. *Syria. Armenia. Caucaſ. Creta. Atlas.* (Amygdalus incana Pall.)

*** *Pedunculis ſubumbellatis.*

avium 18. Pr. foliis ovato-oblongis ſerratis baſi 2glanduloſis ſubtus pubeſcentibus, ramulis bimis floriferis, fructibus globoſis. *Europ.* (Pr. macrophylla Poir.)

Ceraſus 19. Pr. foliis ovato-lanceolatis ſerratis utrinque glabris, ramulis annotinis floriferis, fructibus globoſis. *Europ.*

penſylvanica Ait. 20. Pr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis aequaliter ſerratis baſi 2glanduloſis utrinque glabris, umbellis ſubcompoſitis, fructibus ſubgloboſis exiguis. *Amer. bor.* (Pr. borealis Mx.)

nigra Ait. 21. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter ſerratis, petiolis 2glanduloſis, umbellis paucifloris. *Amer. bor.* (Pr. perſicifolia Deſf.)

hyemalis Mx. 22. Pr. foliis obovato-oblongis acuminatis ſerratis, umbellis paucifloris, ſtipulis ſetaceo-compoſitis, fructibus ſubovatis. *Amer. bor.*

pubeſcens Pursh. 23. Pr. foliis ovato-oblongis ſerrulatis baſi ſubglanduloſis, caule fruticoſo, umbellae pauciflorae pedunculis calycibusque pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Pr. ſphaerocarpa Mx., ſphaerica W.)

pumila 24. Pr. foliis lanceolatis apice ſerratis ſubtus pallidis, caule fruticoſo, ramis virgatis, umbellis paucifloris. *Amer. bor.*

depreſſa Pursh. 25. Pr. foliis ſubſpathulato-lanceolatis ſubſerratis ſubtus glaucis, caule fruticoſo, ramis declinatis, fructibus ovatis. *Amer. bor.* (Pr. pumila Mx. Susquehannae W.)

pygmaea W. 26. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis argute ſerratis baſi 2glanduloſis, caule fruticoſo, umbellis paucifloris. *Penſylvania. Virginia.* (Pr. candicans W.)

Chamaeceraſus 27. Pr. foliis obovato-oblongis obtuſiuſculis glanduloſo-ſerratis, caule fruticoſo, fructibus globoſis ſubexſuccis. *Europ. Aſia media.* (Pr. fruticoſa Pall.)

**** *Pedunculis racemoſis.*

ſemperflorens Ehrh. 28. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis baſi glanduloſis, floribus ſubracemoſis pendulis foliatis, laciniis calycinis ſerratis. *Europ.* ~~*Amer. bor.*~~

Mahaleb 29. Pr. foliis ſubcordato-ovatis ſerrulatis ſubtus ſubpubeſcentibus, floribus terminalibus racemoſo-corymboſis. *Europ. med. et auſtr.*

paniculata Thunb. 30. Pr. foliis ovato-oblongis acute ſerratis ciliatis, racemis piloſiuſculis ſubcompoſitis, laciniis calycinis petaliſque dentatis. *Japon.*

Capuli Cav. 31. Pr. foliis lanceolatis argute ſerratis eglanduloſis glabris. *Peru.*

ſalicifolia Kunth. 32. Pr. foliis oblongis longiſſime acuminatis ſerrulatis laevibus, petiolis glanduloſis, racemis pendulis (?), calycibus perſiſtentibus. *Nov. Granat.*

occidentalis Sw. 33. Pr. foliis oblongis acuminatis integerrimis ſempervirentibus utrinque glabris, racemis lateralibus elongatis, trunco altiſſimo, fructibus ovalibus. *Ind. occid.*

ſphaerocarpa Sw. 34. Pr. foliis ovato-lanceolatis integerrimis nitidis ſempervirentibus, racemis axillaribus laxis folio brevioribus, fructibus ſubrotundis. *Ind. occid.*

luſitanica 35. Pr. foliis ovato-lanceolatis obtuſe ſerratis eglanduloſis nitidis ſempervirentibus, racemis erectis. *Luſitania.*

Laurocerasus 36. Pr. foliis oblongis coriaceis ſerrulatis lucidis dorſo 2glanduloſis, racemis erectis. *Aſia minor. Caucaſ.*

Hixa Brouſſ. 37. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis baſi ſubtus glanduloſis ſempervirentibus, racemis elongatis. *Teneriffa.*

elliptica Thunb. 38. Pr. foliis elliptico-oblongis ſerratis glabris, racemis paucifloris. *Japon.*

caroliniana Ait. 39. Pr. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis ſerratis eglanduloſis laevibus ſempervirentibus, racemis erectis. *Amer. bor.*

ſerotina Ehrh. 40. Pr. foliis oblongis acutis ſerratis baſi glanduloſis nitidis annuis, nervo medio ſubtus 2fariam pubeſcente, racemis erectis. *Amer. bor.* (Pr. virginiana du Roi.)

virginiana 41. Pr. foliis ovato-oblongis duplicato-ſerratis nitidis annuis, petiolo glanduloſo, racemis laxis nutantibus. *Amer. bor.* (Pr. rubra W.)

Padus 42. Pr. foliis oblongis duplicato-ſerratis ſubrugoſis, petiolo glanduloſo, racemis pendulis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

1817. CHRYSOBALANUS.

Icaco 1. Chr. foliis obovatis ſubemarginatis glabris, ſtaminibus piloſis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Chr. pellocarpus Meyer var.?)

oblongifolius Mx. 2. Chr. foliis obovato-oblongis ſubtus lanatis, floribus ſubdioecis, ſtaminibus glabris. *Georgia. Florida.*

1818. PLINIA.

crocea *Ind. occid. Braſil.* Arbor foliis abrupte pinnatis 6jugis ovato-lanceolatis, floribus ſparſis ſeſſilibus.

1819. BANARA Aubl.

guianenſis Aubl. 1. B. foliis ovato-oblongis ſerratis ſubtus ſubtomentoſis, racemis compoſitis axillaribus glabris. *Guiana.*

*Roxburghii** 2. B. foliis lanceolatis remote denticulatis basi attenuatis integerrimis subtus lanatis, panicula axillari villosissima. *Ind. or.*

1820. DRUPATRIS Lour.

cochinchinensis Lour. *Cochinchina.* Arbor foliis oblongis serratis glabris, floribus spicatis albis.

1821. GUAPURIUM Juss.

*fruticosum** 1. Gu. caule fruticoso, foliis simplicibus pinnatisque pellucido-punctatis. *Peru.*

*herbaceum** 2. Gu. caule herbaceo volubili, foliis simplicibus dentatis hispidis. *Nov. Granat.* (Klaprothia mentzelioides Kunth.)

1822. MYRTUS.

1. *Floribus axillaribus subsessilibus.*

*Commersonii** 1. M. foliis subrotundo-ovalibus obtusis coriaceis supra lucidis subtus pallidis, floribus 4fidis. *Ins. Mascaren.* (Eugenia lucida Lam.)

*sessiliflora** 2. M. foliis oblongis glaberrimis supra nitidis subtus fusco-punctatis, floribus lateralibus subsolitariis 4fidis. *Ind. occid.* (Eugenia sessiliflora Vahl., lateriflora W.)

lineata Sw. 3. M. foliis ovatis acuminatis rigidis parallele venosis subtus incanis, floribus subaggregatis 4fidis. *Hispaniola.*

cordata Sw. 4. M. foliis subsessilibus cordato-oblongis obtusis rigidis nitidis, floribus subaggregatis 4-5fidis. *Ind. occid.*

2. *Pedunculis unifloris subsolitariis.*

*angustifolia** 5. M. foliis linearibus acutis subsessilibus, pedunculis folio brevioribus. *Hispaniola.* (Eugenia angustifolia Lam.)

*rosmarinifolia** 6. M. foliis subsessilibus linearibus cuspidatis margine revolutis utrinque glaberrimis, pedunculis lateralibus folio brevioribus. *Hispaniola.* (Eugenia rosmarinifolia Poir.)

*linifolia**; 7. M. foliis petiolatis linearibus obtusis enerviis glabris subtus planis, pedunculis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.*

tenuifolia Sm. 8. M. foliis linearibus mucronatis supra glabris subtus revolutis pubescentibus, pedunculis sericeis folio brevioribus. *Nov. Holl.*

communis 9. M. foliis ovato-lanceolatis acutis utrinque nitidis, pedunculis folio brevioribus, floribus 5fidis bracteatis. *Europ. austr.*

*ovalis** 10. M. foliis ovalibus venosis glabris, ramulis fusco-villosis, pedunculis folia excedentibus. *Brasil.* Sello.

*grammica** 11. M. foliis oblongis utrinque attenuatis obtufis parallele venofis ramulisque glabris, pedunculis capillaribus folio brevioribus. *Brafil.* Sello.

*lurida ** 12. M. foliis feffilibus lanceolatis cufpidatis utrinque glaberrimis reticulato-venofis, pedunculis rigidis folio brevioribus bafi ftipulatis. *Monte Video.* Sello.

vaccinioides Kunth. 13. M. foliis ovatis acutis coriaceis nitidis eveniis, ramulis hirtis, floribus 4partitis. *Peru.*

nummularia Poir. 14. M. caule radicante fruticulofo, foliis fubrotundis coriaceis glabris venofis, pedunculis rigidis folio brevioribus, floribus 4partitis. *Inf. Mafcaren.*

*daphnoides** 15. M. foliis obovatis coriaceis glabris fupra opacis fubtus punctatis reticulatis, pedunculis capillaribus petiolos fuperantibus, floribus 4partitis. *Amer.*? (Eugenia rufcifolia Poir.)

myricoides Kunth. 16. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis fubeveniis fupra glabris fubtus pubefcentibus, floribus 5partitis. *Peru.*

liguftrina Sw. 17. M. foliis lanceolatis obtufis convexis nitidis pellucido-punctatis, pedunculis folia aequantibus, floribus 4fidis. *Hifpaniola.* (Eugenia W.)

punicifolia Kunth. 18. M. foliis obovato-oblongis fubcoriaceis nitidis, pedunculis geminis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Cumana.*

brafiliana 19. M. foliis fubcordato-ovatis obtufiusculis utrinque glaberrimis, pedunculis folia fubfuperantibus, floribus 4fidis. *Brafil.* (Eugenia 1flora et Plinia rubra L. E. Michelii Lam.)

bracteata W. 20. M. foliis ellipticis glabris punctatis, pedunculis villofis apice bracteatis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Ind. or.*

*Patrifii** 21. M. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis geminis capillaribus bracteatis, bracteis fetaceis. *Amer. auftr. Hifpaniola.* (Eugenia Patrifii Vahl.)

*Willdenowii** 22. M. foliis oblongis utrinque attenuatis obtufiusculis coriaceis nitidis venofis, pedunculis filiformibus bracteatis, bracteis fubulatis appreffis. *Ceylon. Portorico.* (Eugenia zeylanica W.)

alpina Sw. 23. M. foliis ovato-oblongis eveniis rigidis utrinque nitidis, ramulis quaternis faftigiatis, pedunculis rigidis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Jamaica.* (Eugenia W.)

tomentofa Ait. 24. M. foliis ovatis 3plinerviis fubtus tomentofis, pedunculis villofis folio fubbrevioribus, floribus 5fidis. *China. Cochinchina.* (M. canefcens Lour.)

calophylla Kunth. 25. M. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis coriaceis eveniis nitidis, floribus 5fidis. *Ad Orinocum.*

*orbiculata** 26. M. foliis fuborbiculatis coriaceis fubtus albidis, pedunculis folia fubfuperantibus, floribus 4fidis. *Inf. Mafcaren.* (Eugenia Lam.)

*borbonica** 27. M. foliis ovatis obtufis coriaceis fubtus revolutis obfcure lepidotis, pedunculis folio brevioribus, ca-

calycibus villosis 4fidis. *Inf. Mafcaren.* (Eugenia buxifolia Lam.)

mefpiloides * 28. M. foliis oblongis fupra glabris fubtus fubpubefcentibus, pedunculis breviffimis calycibusque villofis, floribus 4fidis. *Inf. Mafcaren.* (Eugenia Lam.)

tinifolia * 29. M. foliis ovalibus fupra lucidis fubtus revolutis, pedunculis elongatis tomentofis apice bracteatis. *Inf. Mafcaren.* (Eugenia Lam.)

† *Ugni* * 30. M. foliis fubcordatis carnofis, pedunculis axillaribus terminalibusque. *Chili.* (Eugenia Molin.)

balfamica * 31. M. foliis ovatis acuminatis fubundulatis fupra nitidis fubtus punctatis glaucis, pedunculis fubvillofis. *Jamaica.* (Eugenia Jacqu.)

foetida * 32. M. foliis ovato-lanceolatis obtufiusculis utrinque glabris fubtus pallidis, pedunculis abbreviatis. *Cayenn.* (Eugenia foetida et maleolens Perf.)

cerafina Vahl. 33. M. foliis ovalibus coriaceis fupra lucidis fubtus revolutis punctatis, ramis divaricatis, pedunculis filiformibus folia fuperantibus. *Ind. occid.*

microphylla Humb. 34. M. foliis ovato-oblongis acutiusculis coriaceis fupra nitidis fubtus revolutis fericeis. *Peru. Nov. Granat.*

falutaris Kunth. 35. M. foliis ovato-oblongis obtufis fubmembranaceis nitidis reticulatis, floribus 5fidis. *Ad Orinocum.*

Arayan Kunth. 36. M. foliis ovato-oblongis acutis membranaceis reticulatis nitidis, ramulis villofis, floribus 5fidis. *Peru.*

3. *Pedunculis unifloris aggregatis.*

erythrocarpa Kunth. 37. M. foliis oblongis obtufis coriaceis nitidis, pedunculis umbellatis. *Nov. Granat. Brafilia.* (Eugenia umbellata N. Entd.)

Pfeudopfidium * 38. M. foliis ovato-lanceolatis apice falcato-acuminatis nitidis, pedunculis aggregatis. *Martinica. Guadalupa.* (Eugenia Jacqu.)

cotinifolia * 39. M. foliis fubrotundo-obovatis coriaceis lucidis fubtus fubvenofis, pedunculis fubaggregatis folio brevioribus. *Cayenn. Mafcaren.* (Eugenia L.)

caffinoides * 40. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, pedunculis fubaggregatis folio brevioribus. *Madagafcar.* (Eugenia Lam.)

oleaefolia Kunth. 41. M. foliis oblongis obtufis bafi attenuatis coriaceis nitidis, pedunculis quaternis. *Ad fl. Amazonum.*

erythroxyloides Kunth. 42. M. foliis ellipticis emarginatis coriaceis nitidis, pedunculis aggregatis. *Cumana.*

cayennenfis * 43. M. foliis elliptico-oblongis acuminatis fubtus venofo-reticulatis, pedunculis abbreviatis aggregatis bracteatis. *Cayenn.* (Eugenia citrifolia Poir.)

procera Sw. 44. M. foliis ovatis acuminatis glaberrimis fubtus parallele venofis, pedunculis filiformibus folio brevioribus, floribus 4fidis, trunco procero. *Hifpaniola. Nov. Hifpan.* (Eugenia Poir.)

*Chryfophyllum** 45. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis fupra lucidis fubtus aureo-fericeis, pedunculis aggregatis abbreviatis. *Inf. Mafcaren.* (Eugenia Poir.)

*undulata** 46. M. foliis oblongis acuminatis undulatis glabris pellucido-punctatis, pedunculis abbreviatis bracteatis, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

*latifolia** 47. M. foliis amplis ovato-oblongis glabris, pedunculis abbreviatis bracteatis, floribus 4fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

*Heynii** 48. M. foliis ellipticis obtufis coriaceis glabris pellucido-punctatis, pedunculis ramulisque ferrugineo-tomentofis, floribus 5fidis. *Ind. or.* (M. latifolia Roth.)

4. *Pedunculis paucifloris.*

biflora 48. M. foliis lanceolatis acutis utrinque glabris, pedunculis 2fidis 2floris, floribus 4fidis. *Jamaica.*

*triflora** 49. M. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris fupra nitidis fubtus venofo-reticulatis, pedunculis ftrictis bracteatis 3floris folia aequantibus, floribus confertis 5fidis. *Monte Video.* Sello.

*Selloi** 50. M. foliis oblongis utrinque attenuatis obtufiusculis opacis fubtus pallidis venofis, pedunculis capillaribus 3floris folio brevioribus, floribus 5fidis. *Brafil.* Sello.

*auftralis** 51. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris obfcure venofis, pedunculis axillaribus foliatis fub-3floris coloratis. *Nov. Holl.* (Eugenia auftralis Wendl., myrtifolia Ker.)

rufcifolia W. 52. M. foliis ovali-fubrotundis venofis punctatis, pedunculis abbreviatis pubefcentibus fub-4floris. *Ind. or.*

lucida 53. M. foliis fubfeffilibus ovato-lanceolatis glaberrimis, pedunculis 3floris. *Surinam.*

*guianenfis** 54. M. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis venofo-reticulatis glabris, pedunculis bafi ftipulatis trifloris folio brevioribus, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

*lancea** 55. M. foliis lanceolatis acuminatis coriaceis nitidis, pedunculis pubefcentibus folio brevioribus fub-3floris, floribus 4fidis. *Inf. Carib.* (Eugenia Poir.)

*punctata** 56. M. foliis oblongis obtufis coriaceis glabris punctatis, pedunculis 3floris folia aequantibus, floribus 5fidis. *Inf. Carib.* (Eugenia Vahl.)

crenulata Sw. 57. M. foliis fubrotundis glabris crenulatis, pedunculis fub-3floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Hifpaniola.* (Eugenia Willd.)

trinervia Sm. 58. M. foliis ovatis acuminatis 3nerviis fubtus tomentofis, pedunculis 3floris pilofis, floribus 4fidis. *Nov. Holl.*

foliofa Kunth. 59. M. foliis confertis fubrotundo-ellipticis coriaceis glabris nitidis, pedunculis 3floris folia fubaequantibus, floribus 4fidis. *Amer. auftr.*

discolor Kunth. 60. M. foliis ſubternis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis reticulatis ſupra nitidis ſubtus discoloribus, pedunculis ſub-3floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Nov. Granat.*

compreſſa Kunth. 61. M. foliis obovato-oblongis ſubcoriaceis reticulatis glabris, ramulis compreſſis, pedunculis 3floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Peru.*

umbellulifera Kunth. 62. M. foliis ellipticis ſubemarginatis coriaceis glabris ſubtus ſubargenteis, pedunculis umbelliferis paucifloris, floribus 5fidis. *Cumana.*

dumoſa Vahl. 63. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis ſubmembranaceis reticulatis glabris, pedunculis dichotomis paucifloris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Nov. Granat.* (M. ſalicifolia Kunth.)

limbata Kunth. 64. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis reticulatis glabris marginatis, ramulis pubeſcentibus, pedunculis 2fidis paucifloris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Peru.*

fimbriata Kunth. 65. M. foliis ſubrotundo-ellipticis coriaceis utrinque pubeſcentibus, pedunculis dichotomis paucifloris folia ſuperantibus, floribus 4fidis, petalis villoſo-fimbriatis. *Peru.*

rhopaloides Kunth. 66. M. foliis obovatis coriaceis nitidis reticulatis, pedunculis dichotomis ſub-6floris folio brevioribus, floribus 4fidis. *Peru.*

xalapenſis Kunth. 67. M. foliis ovatis utrinque attenuatis membranaceis nitidis, pedunculis ſub-6floris. *Mexico.*

5. *Floribus faſciculato-glomeratis.*

macrophylla * 68. M. foliis ampliſſimis oblongis glabris, pedunculis lateralibus faſciculatis, floribus 4fidis. *Ind. or.* (Eugenia Lam.)

glomerata * 69. M. foliis ovalibus coriaceis glabris, panicula ſeſſili terminali glomerata abbreviata, floribus 4fidis. *Inſ. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

ſinemarienſis * 70. M. foliis oblongis acuminatis glabris, floribus ſubſeſſilibus glomeratis axillaribus terminalibusque 4-5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl.)

elliptica * 71. M. foliis ellipticis ſubtus venoſis glabris, pedunculis lateralibus faſciculatis abbreviatis. *Inſ. Mascaren.* (Eugenia Lam.)

axillaris Sw. 72. M. foliis oblongis acuminatis nitidis venoſis, pedunculis axillaribus faſciculatis abbreviatis. *Jamaica. Amer. auſtr.* (Eugenia W. M. malpighioides Kunth.)

† *Poireti* * 73. M. foliis obovato-oblongis nitidis 3nerviis glabris, pedunculis dichotomis faſciculatis, floribus 4fidis. *Hiſpaniola.* (M. axillaris Poir.)

glabrata Sw. 74. M. foliis ſubellipticis acutiuſculis convexis coriaceis glaberrimis, pedunculis axillaribus breviſſimis faſciculatis, floribus 4fidis. *Hiſpaniol.*

diſticha Sw. 75. M. foliis diſtichis deflexis ovato-lanceolatis obtuſiuſculis nitidis, ramis horizontalibus, pedunculis axillaribus faſciculatis, floribus 4fidis, fructibus 2-4ſpermis. *Jamaica.*

baruenſis * 76. M. foliis ovato-lanceolatis glabris eveniis opacis, pedunculis axillaribus faſciculatis ebracteatis. *Amer. auſtr. Guadalupa.* (Eugenia Jacq.)

caſearioides Kunth. 77. M. foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis ſubtus pubeſcentibus, floribus axillaribus verticillato-glomeratis 4fidis. *Cumana.*

guayaquilenſis Kunth. 78. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis piloſiuſculis, floribus axillaribus verticillato-glomeratis 4fidis. *Quito.*

tuberculata Kunth. 79. M. foliis elliptico-oblongis margine revolutis coriaceis glabris ſupra glanduloſo-tuberculatis ſubtus ſericeis, floribus axillaribus congeſtis 4fidis. *Cuba.*

6. *Racemis axillaribus.*

malaccenſis * 80. M. foliis breviter petiolatis ovato-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis lateralibus abbreviatis corymboſis, fructibus maximis. *Ind. or.* (Eugenia L.)

javanica * 81. M. foliis ſeſſilibus ovato-oblongis opacis glabris, racemis axillaribus laxis folia ſuperantibus. *Java.* (Eugenia Lam.)

Stoupii * 82. M. foliis elliptico-oblongis acuminatis ſupra lucidis, pedunculis axillaribus ſubquaternis arcuatis villoſis racemoſo-faſciculatis, pedicellis bracteatis, floribus 5fidis. *Cayenn.* (M. bracteolaris Poir.)

Luma Molin. 83. M. foliis ſuborbiculatis, racemis axillaribus trichotomis, caule arboreo. *Chili.*

buxifolia Sw. 84. M. foliis obovato-oblongis coriaceis nitidis ſubtus punctatis, racemis breviſſimis axillaribus multifloris, floribus 4fidis. *Hiſpaniola. Mexico.* (Eugenia buxifolia W. myrtoides Poir. M. maritima Kunth.)

floribunda * 85. M. foliis oblongis utrinque attenuatis margine revolutis ſubtus punctatis, racemis bracteatis multifloris petiolos aequantibus. *Inſ. Carib.* (Eugenia Weſt. W.)

laurina Retz. 86. M. foliis alternis oblongis glaberrimis ſerratis, racemis ſubbifidis ſimplicibus folio brevioribus, floribus 5fidis. *Ceylon.* (Eugenia W.)

Vahlii * 87. M. foliis ovatis acutis 3nerviis glaberrimis, pedunculis geminatis racemoſis, floribus bracteatis 4fidis. *Cayenn.* (Eugenia 3nervia Vahl.)

monticola Sw. 88. M. foliis ovatis apice obtuſe attenuatis glaberrimis, racemis breviſſimis multifloris, floribus 4-5fidis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

Pimenta [redacted] 89. M. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis coriaceis glaberrimis, racemis corymboſis axillaribus terminalibusque. *Ind. occid.* (M. citrifolia Poir. ?)

dichotoma Poir. 90. M. foliis obovato-lanceolatis coriaceis glabris ſupra nitidis, pedunculis dichotomis corymboſis folia ſuperantibus, floribus 5fidis. *Hiſpaniola.*

Lindleyana Kunth. 91. M. foliis ſubellipticis obtuſis baſi attenuatis coriaceis marginatis glabris, pedunculis dichoto-

mis corymbofis pubefcentibus folio brevioribus, floribus 4fidis. *Nov. Granat.*

emarginata Kunth. 92. M. foliis obovato-oblongis emarginatis coriaceis nitidis fubtus pubefcentibus, racemis folitariis folia fubaequantibus, floribus 4fidis. *Ad Orinocum.*

pubefcens Kunth. 93. M. foliis ovato-oblongis obtufis fupra nitidis fubtus fericeis, racemis axillaribus geminis terminalibus fubquaternis folia fubaequantibus, floribus 4fidis. *Ad Orinocum.*

7. *Racemis terminalibus.*

Jambos Kunth. 94. M. foliis lanceolatis acuminatis elongatis lucidis, racemis laxis terminalibus. *Ind. or.* (Eugenia L.)

venofa * 95. M. foliis ellipticis coriaceis opacis venofo-reticulatis, racemis fimplicibus, floribus 4fidis. *Madagascar.* (Eugenia Lam.)

Sonneratii * 96. M. foliis fubfeffilibus lanceolatis pellucido-punctatis, racemis terminalibus. *Ind. or.* (Eugenia lanceolata Lam.)

Dombeyi * 97. M. foliis ovalibus coriaceis fupra lucidis, gemmis fquamofo-imbricatis terminalibus racemiferis, pedicellis bracteatis, floribus 4fidis. *Brafil.* (Eugenia brafilienfis Lam.)

Cheken Feuill. 98. M. foliis feffilibus ovatis acutis nitidis venofis, racemis bracteatis terminalibus, floribus 4fidis. *Chili.* (Eugenia Chequen Molin.)

laevis Thunb. 99. M. foliis ovatis acuminatis argute ferratis venofis glaberrimis, floribus corymbofo-umbellatis terminalibus. *Japon.*

chinenfis Lour. 100. M. foliis fubfeffilibus ovato-lanceolatis argute ferratis pilofis, floribus terminalibus fubcorymbofis. *China auftr.*

† *nitens* Poir. 101. M. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis lucidis fubtus pallidis, corymbis terminalibus divaricato-trichotomis. *Inf. Mascaren.*

pallens Vahl. 102. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis obtufis glaberrimis lucidis fubtus punctatis, racemis terminalibus pubefcentibus, floribus 4fidis. *Ind. occ.* (Eugenia Poir.)

albida Humb. 103. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis fupra nitidis fubtus fericeis, ramis pubefcentibus, racemis terminalibus ternis, floribus 4fidis. *Nov. Granat.*

† *micrantha* Kunth. 104. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis fubcoriaceis glabris nitidiusculis, racemis terminalibus fubternis, floribus minutis 4fidis. *Nov. Granat.*

8. *Paniculis lateralibus.*

Caryophyllus * 105. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis opacis venofis, paniculis trichotomis, calycibus repandis, fructibus ellipticis. *Inf. Molucc.* (Ca-

ryophyllus aromaticus L. Eugenia caryophyllata Thunb. W.)

aromatica Poir. 106. M. foliis obovatis coriaceis glaberrimis, paniculis axillaribus patulis, calycibus 5fidis. *Ind. orient.?*

cymoſa * 107. M. foliis ſubſeſſilibus ovato-lanceolatis acutis venoſis utrinque glaberrimis, pedunculis lateralibus coloratis cymoſo-paniculatis, calycibus 4lobis. *Inſ. Molucc.* (Eugenia Lam.)

parviflora * 108. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus ramisque pubeſcentibus, paniculis incano-villoſiusculis, floribus 4fidis. *Java.* (Eugenia Lam.)

Mini * 109. M. foliis oblongo-lanceolatis longe acuminatis venoſiſſimis ſupra lucidis, paniculis laxis bracteatis axillaribus terminalibusque, floribus 4fidis. *Guiana. Braſil.* (Eugenia Mini Aubl., microcarpos Lam., patens Poir.)

virgultoſa Sw. 110. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis venoſis glabris, ramis virgatis, paniculae ramis decuſſatis, floribus 4fidis. *Ind. occid.* (Eugenia divaricata Lam., laxiflora Poir. M. Billardiana Kunth.)

Aubletii * 111. M. foliis ſubſeſſilibus ovato-ellipticis tomentoſis, paniculis axillaribus folia ſuperantibus villoſis, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia tomentoſa Aubl.)

multiflora * 112. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis nitidis venoſis pellucido-punctatis, paniculis axillaribus patulis elongatis, floribus 4fidis. *Cayenn.* (Eugenia multiflora Lam.)

dioeca 113. M. foliis oblongo-lanceolatis coriaceis venoſis glabris, paniculis axillaribus quaternis patulis elongatis trichotomis, pedicellis compreſſis, floribus dioecis. *Braſil.*

maxima Molin. 114. M. foliis oblongis acuminatis, paniculis multifloris, trunco procero. *Chili.*

deflexa Kunth. 115. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis reticulatis ſubtus pubeſcentibus, paniculis divaricatis ferrugineo-tomentoſis folio brevioribus, floribus 5fidis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Eugenia deflexa Poir. M. complicata et mollis Kunth. var.)

obovata * 116. M. foliis obovatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus venoſo-reticulatis, paniculis lateralibus, calycibus repandis. *Inſ. Mascaren.* (Eugenia Poir.)

coccolobaefolia Kunth. 117. M. foliis ſubrotundis coriaceis nitidis venoſo-reticulatis, paniculis axillaribus folia aequantibus, floribus 4-5fidis. *Nov. Granat.*

cluſiaefolia Kunth. 118. M. foliis obovato-ellipticis emarginatis coriaceis nitidis reticulatis, paniculis axillaribus folia aequantibus, floribus 5fidis. *Nov. Granat.*

Greggii Sw. 119. M. foliis ſubellipticis acutis ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis, paniculis axillaribus patulis, floribus 4fidis. *Ind. occid.* (Greggia aromatica Gärtn.)

villosa * 120. M. foliis amplis obovato-subrotundis obtusis supra asperis subtus tomentosis, paniculae ramis patentibus dichotomis villosis, floribus 5fidis. *Ins. Mascaren.* (Eugenia Poir.)

Smithii * 121. M. foliis oblongis utrinque attenuatis, paniculis axillaribus, calycibus repandis. *Nov. Holl.* (Eugenia elliptica Sm.)

splendens Sw. 122. M. foliis ovato-oblongis obtusiusculis nitidis reticulato-venosis, ramis virgatis, paniculis axillaribus trichotomis, floribus 4-5fidis. *Hispaniola.* (Eugenia periplocifolia Jacq.)

fragrans Vahl. 123. M. foliis ovatis convexiusculis acutis eveniis supra nitidis subtus punctatis, paniculis axillaribus trichotomis elongatis, floribus 4fidis. *Jamaica. Amer. austr.* (Eugenia fragrans W., paniculata Jacq., montana Aubl.)

rufescens * 124. M. foliis oblongo-lanceolatis obtusis basi attenuatis glabris opacis venosis subtus discoloribus, paniculis erectis elongatis, floribus 4fidis. *Brasil.* Sello.

firma * 125. M. foliis ovato-ellipticis coriaceis amplis rufescentibus glabris venosis, paniculis oppositis axillaribus trichotomis tomentosis folio subbrevioribus. *Brasil.* Sello.

anceps * 126. M. foliis lanceolatis subsessilibus coriaceis nitidis parallele venosis subtus discoloribus, ramis ancipitibus glaberrimis, paniculis erectis folia aequantibus. *Brasil.* Sello.

polyantha Kunth. 127. M. foliis oblongis utrinque attenuatis supra nitidis subtus ramisque pubescentibus, paniculis subsimplicibus, floribus 5fidis. *Ad Orinocum.* (M. sylvatica Meyer.)

9. *Panicula terminali.*

caryophyllata 128. M. foliis obovatis glabris, panicula terminali trichotoma, calycibus repandis. *Ceylon. Ins. Mascaren.* (Eugenia contracta Poir.? corymbosa Lam.?)

acris Sw. 129. M. foliis ellipticis coriaceis convexis venosis punctatis, panicula trichotoma elongata, calycibus 4-5dentatis. *Ind. occid.* (M. caryophyllata Jacq.)

coriacea Vahl. 130. M. foliis subrotundo-ellipticis utrinque nitidis coriaceis eveniis punctatis, panicula terminali trichotoma, floribus 4fidis. *Ind. occ.*

Berteriana * 131. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis supra nitidis subtus glaberrimis, panicula terminali, floribus confertis 4fidis. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

ferruginea * 132. M. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis supra nitidis subtus venosis, junioribus ramulisque ferrugineo-subsericeis, panicula terminali cymosa. *Nov. Granat. Afric. occ.* (M. acuminata Kunth. Eugenia owariensis P. B.)

fulva * 133. M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis supra nitidis subtus venoso-reti-

culatis paniculaeque ramis fulvo-villosiusculis, floribus congestis. *Brasil.* Sello.

Loureiri * 134. M. foliis lanceolatis glabris, paniculae ramis abbreviatis, floribus congestis, fructibus nervosis. *Cochinchina.* (Eugenia nervosa Lour.)

corticosa * 135. M. foliis ovatis acuminatis glabris, panicula corymbosa, fructibus minutis. *Cochinchina.* (Eugenia Lour.)

marginata * 136. M. foliis ovalibus obtusis coriaceis utrinque nitidis marginatis, paniculae laxae ramis umbellatis. *Hispaniola.* (Eugenia Juss. Pers.)

acetosans * 137. M. foliis obovatis obtusis coriaceis venosis punctatis, paniculae terminalis ramis elongatis cymosis, calycibus campanulatis 4fidis punctatis. *Guiana.* (Eugenia Rich. Poir.)

androsaemoides 138. M. foliis sessilibus amplis ovato-oblongis obtusis venosis, paniculae ramis 3fidis, calycibus 4dentatis. *Ceylon. Cochinchina.*

Comete * 139. M. foliis ovato-oblongis acutis glabris pellucido-punctatis, paniculae terminalis ramis 3floris, floribus 5fidis. *Guiana.* (Eugenia Aubl. M. carnea Meyer.)

ceylanica 140. M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis lucidis, paniculae terminalis pedunculis 3floris. *Ceylon.* (Eugenia spicata Lam.? Opa odorata Lour.)

violacea * 141. M. foliis ellipticis coriaceis glabris, paniculae terminalis ramis abbreviatis, floribus congestis. *Ins. Mascaren.* (Eugenia violacea Lam.)

1823. NELITRIS Gärtn.

Jambosella Gärtn. 1. N. foliis oppositis ovatis pubescentibus, pedunculis solitariis axillaribus 1floris bracteatis. *Ins. Societ.* (Decaspermum fruticosum Forst. Psidium decaspermum L. suppl.)

polygama * 2. N. foliis oblongis acuminatis, floribus terminalibus paniculatis. *Ins. Molucc.* (Eugenia Roxb.)

trinervia * 3. N. foliis ovatis acuminatis 3nerviis glabris, floribus racemosis terminalibus. *Cochinchin.* (Myrtus 3nervia Lour., dumetorum Poir.)

1824. CAMPOMANESIA R. et P.

cornifolia Kunth. 1. C. foliis subellipticis acutis conduplicatis subtus pubescentibus, floribus axillaribus aggregatis. *Nov. Granat. Peru?* (C. lineatifolia R. et P.?)

† *tomentosa* Kunth. 2. C. foliis elliptico-oblongis acutiusculis coriaceis subtus fusco-tomentosis. *Nov. Granat.*

1825. PSIDIUM.

pyriferum 1. Ps. foliis oblongis coriaceis venosis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus 1floris abbreviatis, fructibus pyriformibus. *Ind. orient. et occid.*

aromaticum Aubl. 2. Pſ. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis oppoſitis 2bracteatis elongatis, fructibus globoſis. *Guiana.* (Pſ. grandiflorum Aubl. var.)

Cattleyanum Sabin. 3. Pſ. foliis obovatis coriaceis glaberrimis ciliatis, pedunculis axillaribus ſolitariis abbreviatis, fructibus globoſis. *China.*

guianenſe Rich. Perſ. 4. Pſ. foliis oblongis glabris obſolete crenatis, pedunculis oppoſitis ſolitariis. *Guiana.*

† *amplexicaule* Perſ. 5. Pſ. foliis ovalibus ſubamplexicaulibus coriaceis integerrimis. *Inſ. Antill.*

ſapidiſſimum Jacq. 6. Pſ. foliis oblongis acutis ſubtus tomentoſis, pedunculis oppoſitis 1floris, fructibus ſubrotundis. *Patria ?*

cordatum Sims. 7. Pſ. foliis ſeſſilibus cordato-ſubrotundis utrinque glabris, pedunculis 1floris aggregatis. *Ind. occ.*

pumilum Vahl. 8. Pſ. foliis lanceolatis acutis ſubtus tomentoſis, pedunculis ſolitariis 1floris, fructibus ſubglobofis. *Amboina. Guadalupa.* Bertero. (Pſ. anguſtifolium Lam.)

pomiferum 9. Pſ. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 3floris, fructibus ſubrotundis. *Ind. or. et occ.*

polycarpon Anderſ. Lamb. 10. Pſ. foliis oblongis acutis ſubcrenatis ſupra pubeſcentibus ſubtus rugoſis ſcabris, pedunculis 3floris, fructibus ſubgloboſis. *Inſ. Trinitat.*

guineenſe Sw. 11. Pſ. foliis oblongis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis 3floris, fructibus parvis globoſis. *Guinea.*

rubrum Lour. 12. Pſ. foliis oblongis obtuſis integerrimis glabris, floribus axillaribus congeſtis ſeſſilibus. *Cochinchina.*

montanum Sw. 13. Pſ. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis, pedunculis axillaribus multifloris, fructibus parvis. *Jamaica.*

caninum Lour. 14. Pſ. foliis ovatis acutis ſubſerratis utrinque tomentoſis, pedunculis axillaribus multifloris. *China auſtr.*

dubium Kunth. 15. Pſ. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, racemis axillaribus abbreviatis paucifloris. *Ad Orinocum.*

nigrum Lour. 16. Pſ. foliis ovato-lanceolatis ſubſerratis glabris nitidis, pedunculis terminalibus multifloris. *Cochinchina.*

1826. GLAPHYRIA Jack.

nitida Jack. 1. Gl. foliis obovatis obtuſis. *Sumatra.*

ſericea Jack. 2. Gl. foliis lanceolatis acuminatis. *Sumatra.*

1827. ROBINSONIA Schreb.

melianthifolia W. *Guiana.* Arbor magna foliis pinnatis argute ſerratis, floribus flavis paniculatis. (Touroulia guianenſis Aubl.)

1828. PUNICA.

Granatum 1. P. foliis lanceolatis, caule arboreo. *Europ. auſtr. Aſia med.*

nana 2. P. foliis linearibus, caule fruticoſo. *Inſ. Antill.*

1829. CALYTHRIX Labill.

tetragona Labill. 1. C. foliis filiformi-4gonis punctatis. *Nov. Holl. ad Africum.*

glabra R. Br. 2. C. foliis teretibus glabris. *Nov. Holl.*

1830. ANGOPHORA Cav.

lanceolata Cav. 1. A. foliis alternis petiolatis lanceolatis acuminatis, floribus umbellatis. *Nov. Holl.*

cordifolia Cav. 2. A. foliis alternis ſeſſilibus cordato-ovatis ſupra nitidis, ramis hiſpidis, floribus corymboſis. *Nov. Holl.* (Metroſideros cordifolia Perſ. hiſpida Sm. hirſuta Andr. anomala Vent.)

1831. METROSIDEROS Gärtn.

* *Foliis alternis.*

capitatus Sm. 1. M. foliis obovatis mucronulatis margine ſcabris, ramulis calycibusque hirſutis, capitulis terminalibus. *Nov. Holl.*

ciliatus Sm. 2. M. foliis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis glabris eveniis, ramulis villoſis, corymbis terminalibus. *Nov. Caledon.* (Leptoſpermum et Melaleuca Forſt.)

coriaceus Labill. 3. M. foliis elliptico-oblongis acutiusculis coriaceis 5-7nerviis utrinque ruguloſis, ramulis glabris, racemis ſubſpicatis. *Nov. Holl.*

macrophyllus Poir. 4. M. foliis ovato-lanceolatis coriaceis 3nerviis ſubtus lepidoto-pulverulentis, paniculae terminalis ramis divaricatis. *Madagascar.*

marginatus Cav. 5. M. foliis lanceolatis 3nerviis margine revolutis, floribus terminalibus glomeratis. *Nov. Holl.*

lanceolatus Sm. 6. M. foliis lanceolatis cuſpidatis enerviis marginatis ſublepidoto-punctatis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

lophanthus Vent. 7. M. foliis lanceolatis cuſpidatis 3nerviis punctatis, floribus terminalibus ſpicatis pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

ſpecioſus Sims. 8. M. foliis lanceolatis ſubtus venoſis glanduloſo-mucronatis, floribus lateralibus confertis, capſulis apice tomentoſis. *Nov. Holl.*

viminalis Gärtn. 9. M. foliis lineari-lanceolatis cuſpidatis elongatis ſubfalcatis glaberrimis, floribus confertis lateralibus pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

ſalignus Sm. 10. M. foliis ſublinearibus cuſpidatis abbreviatis glaberrimis, ramulis pubeſcentibus, floribus con-

fertis ſubverticillatis lateralibus glabris. *Nov. Holl.*

corifolius Vent. 11. M. foliis ſubfaſciculatis abbreviatis linearibus ſubciliatis apice recurvo-mucronatis, ramulis hirſutis, floribus lateralibus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.* (Leptoſpermum ambiguum Sm.)

ericaefolius Sm. 12. M. foliis imbricatis linearibus obtuſiuſculis mucronatis piloſis, floribus capitatis terminalibus, bracteis piloſis, calycibus glabris. *Nov. Holl. ad Africum.*

linearis Sm. 13. M. foliis linearibus canaliculatis acutis rigidis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

pinifolius Wendl. 14. M. foliis lineari-filiformibus rigidis ſcabris, floribus lateralibus confertis viridibus. *Nov. Holl.*

** *Foliis oppoſitis.*

floribundus Sm. 15. M. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, paniculae terminalis ramis decuſſatis umbellatis. *Nov. Holl.* (M. laurifolius Desf.)

floridus Sm. 16. M. foliis obovato-oblongis venoſis glabris, panicula terminali thyrſoidea, calycibus turbinatis ſericeis. *Nov. Zeeland.* (Melaleuca florida et Leptoſpermum ſcandens Forſt.)

glomulifer Sm. 17. M. foliis ovatis ſubundulatis reticulato-venoſis ſubtus pubeſcentibus, capitulis lateralibus pedunculatis bracteisque tomentoſis. *Nov. Holl.*

villoſus Sm. 18. M. foliis ovatis venoſis ſubtus pubeſcentibus, thyrſis axillaribus terminalibusque oppoſitis villoſis, floribus ſeſſilibus confertis. *Inſ. Societ.* (Leptoſpermum collinum et Melaleuca aeſtuoſa Forſt. Melaleuca villoſa L. ſuppl.)

diffuſus Sm. 19. M. foliis ovatis 3nerviis venoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus terminalibusque pedicellis oppoſitis. *Nov. Zeeland.* (Melaleuca diffuſa Forſt. lucida L. ſuppl.)

coſtatus Gärtn. 20. M. foliis lineari-lanceolatis acuminatis obliquis, paniculae decompoſitae ramis umbellatis. *Nov. Holl.*

umbellatus Cav. 21. M. foliis lanceolatis margine revolutis 1nerviis glabris, pedunculis terminalibus umbellatis. *Nov. Holl.*

anguſtifolius Sm. 22. M. foliis lineari-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus umbellatis, bracteis lanceolatis glabris. *C. B. S.* (Myrtus anguſtifolia L.)

1832. LEPTOSPERMUM Forſt.

* *Foliis nervoſis.*

grandifolium Sm. 1. L. foliis lanceolatis apice dilatatis mucronatis 5nerviis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſolitariis, dentibus calycis membranaceis coloratis. *Nov. Holl.*

emarginatum Wendl. 2. L. foliis ſpathulatis emarginatis obſcure 5nerviis, dentibus calycis membranaceis coloratis. *Nov. Holl.*

ſericeum Labill. 3. L. foliis obovatis acutis ſericeis 3-5nerviis, floribus ſolitariis, dentibus calycis rigidis perſiſtentibus. *Nov. Holl.*

marginatum Labill. 4. L. foliis obovato-oblongis ſub-3nerviis margine niveo-ſericeis ciliatis, floribus glomeratis ſeſſilibus 10andris. *Nov. Holl. ad Africum.*

pubeſcens Sm. 5. L. foliis obovato-lanceolatis 3nerviis, ramulis villoſis, calycibus ſericeis, dentibus viridibus. *Nov. Holl.* (L. lanigerum W. trinerve Sm.)

lanigerum Sm. 6. L. foliis obovatis 3nerviis piloſis, ramulis villoſis, calycibus villoſiſſimis. *Terra Diemen. Nov. Holl.*

ſcoparium Forſt. 7. L. foliis ovato-lanceolatis acutis 3nerviis, ramis virgatis pubeſcentibus, calycibus glabris, dentibus calycis coloratis. *Nov. Holl.* (L. ſtellatum Cav. Melaleuca ſcoparia Forſt. L. ſuppl. Philadelphus ſcoparius Ait.)

tuberculatum Poir. 8. L. foliis ovatis obtuſiuſculis mucronatis 3nerviis ſubtus punctato-tuberculatis, calycis villoſi dentibus rigidis. *Nov. Holl.*

† *porophyllum* Cav. 9. L. foliis ſpathulatis glabris obſcure 3nerviis pellucido-punctatis, dentibus calycis deciduis. *Nov. Holl.*

attenuatum Sm. 10. L. foliis lanceolato-linearibus acutis 3nerviis, calycibus ſericeo-villoſis, dentibus coloratis. *Nov. Holl.*

** *Foliis enerviis.*

flexuoſum Link. 11. L. foliis ovato-lanceolatis acuminatis venoſis glabris, ramis flexuoſis compreſſis, floribus ſeſſilibus aggregatis, calycibus hirſutis. *Nov. Holl.* (Metroſideros W.)

flaveſcens Sm. 12. L. foliis lineari-lanceolatis obtuſis ſubmucronatis glabris, ramulis ſericeis, dentibus calycis coloratis. *Nov. Holl.* (Melaleuca Thea Wendl. Lept. Thea W. multiflorum Cav.)

triloculare Vent. 13. L. foliis lineari-lanceolatis mucronato-pungentibus ſubciliatis, calycibus villoſis, floribus 15andris, capſulis 3locularibus. *Nov. Holl.*

juniperinum Sm. 14. L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus, ramulis ſericeis, calycibus glabris, dentibus coloratis. *Nov. Holl.*

baccatum Sm. 15. L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus, ramulis hirtis, calycibus glabris, dentibus coloratis pubeſcentibus, capſula baccata. *Nov. Holl.*

dubium * 16. L. foliis linearibus anguſtiſſimis obtuſiuſculis, dentibus calycis glabri viridibus. *Nov. Holl.*

arachnoideum Sm. 17. L. foliis ſubulatis pungentibus, ramulis hirtis, calycibus dentibusque villoſis. *Nov. Holl.*

parvifolium Sm. 18. L. foliis obovatis incanis, ramulis calycibusque piloſis, dentibus coloratis. *Nov. Holl.*

imbricatum Sm. 19. L. foliis obovatis imbricatis ramulisque glabris, dentibus calycis glabri coloratis carinatis. *Nov. Holl.*

1833. FABRICIA Gärtn.

myrtifolia Gärtn. 1. F. foliis oppositis obovato-lanceolatis, dentibus calycis orbiculatis. *Nov. Holl.*

laevigata Sm. 2. F. foliis alternis obovatis sub-3nerviis glaucis, dentibus calycis 3angularibus. *Nov. Holl.*

1834. PHILADELPHUS.

coronarius 1. Ph. foliis ovato-oblongis acuminatis dentatis utrinque glabris. *Europ. austr.* (Ph. nanus Mill. var.)

grandiflorus W. 2. Ph. foliis ovatis acuminatis dentatis, axillis venarum subtus barbatis. *Carolin. Georgia.* (Ph. inodorus Hortul.)

hirsutus Nutt. 3. Ph. foliis ovato-oblongis acutis dentatis supra hirsutis subtus albido-villosis, caule humili. *Louisiana.*

Lewisii Pursh. 4. Ph. foliis ovatis acutis subintegerrimis ciliatis, stylo 3fido. *Amer. bor. occid.*

inodorus Mill. 5. Ph. foliis ovatis acutis integerrimis, stylo indiviso, stigmatibus 4. *Carolina.*

1835. SONNERATIA L. fil.

acida L. fil. 1. S floribus corollatis, stigmate subrotundo. *Ins. Molucc.* (Rhizophora caseolaris L. Aubletia Gärtn.)

† *apetala* Roth. 2. S. floribus apetalis, calycibus 4fidis, stigmate umbraculiformi. *Ind. or.*

1836. CALYPLECTUS R. et P.

speciosus Kunth. *Nov. Granat. Peru.* Arbor excelsa, foliis oppositis oblongis integerrimis, floribus axillaribus solitariis longe pedunculatis albis speciosis. (C. acuminatus R. et P. Lafoënsia Vand.)

1837. BARTONIA Sims.

ornata Pursh. 1. B. capsula basi foliosa 5valvi, seminibus subemarginatis. *Ad fl. Missuri.* (B. 10petala Sims.)

nuda Pursh. 2. B. capsula basi nuda 5valvi, seminibus marginatis. *Ad fl. Missuri.*

1838. CACTUS.

1. *Echinocacti: oblongi tuberculis compositi.*

mammillaris 1. C. simplex cylindrico-oblongus, tuberculis ovatis apice spinoso-lanatis, spinis breviusculis rectis. *Amer. austr.* (Mammillaria simplex Haw.)

stellatus W. 2. C. simplex ovato-subglobosus, tuberculis oblongis apice piloso-spinosis, pilis longitudine spinarum. *Amer. tropic.*

coronatus W. 3. C. ſimplex clavatus, tuberculis ovatis apice ſpinoſo-lanatis, lana ſpinis breviore, ſpina media apice uncinata. *Amer. tropic.*

glomeratus Lam. 4. C. caeſpitoſus, tuberculis ſubdiscretis clavatis glaucis tomentoſis apice ſtellato-ſpinuloſis. *Hiſpaniola.* (M. lanifera Haw.)

viviparus Fraſ. 5. C. caeſpitoſus, glomerulis ſubgloboſis, tuberculis ovato-cylindricis barbatis ſulcatis proliferis. *Louiſiana ſuper.* (Mammillaria prolifera Haw.)

flaveſcens Cand. 6. C. ovatus, tuberculis apice ſpinoſo-tomentoſis, ſpinis rigidis elongatis divergentibus inaequalibus. *Amer. tropic.*

depreſſus Cand. 7. C. globoſo-depreſſus, tuberculorum apice lanato dupliciter ſpinoſo, ſpinis exterioribus intricato-patentiſſimis, internis rectis discoloribus. *Amer. tropic.* (C. pſeudo-mammillaris Salm. Mammillaria discolor Haw.)

ſtramineus * 8. C. caeſpitoſus prolifer, tuberculis cylindricis apice longe lanatis, ſpinis ſtramineis. *Patria?* (Mammillaria ſtraminea Haw.)

† *Microthele* * 9. C. globoſus prolifer, tuberculis numeroſis obtuſiſſimis abbreviatis apice fuſco-ſpinoſis. *Patria?* (Mammillaria parvimamma Haw.)

abnormis W. 10. C. difformis ſubdiviſus, tuberculis oblongis compreſſis inaequalibus, faſciculis ſpinarum aggregatis baſi lanatis. *Amer. tropic.* (C. monſtroſus Desf.)

gibboſus Haw. 11. C. turbinato-cylindricus multangulatus, faſciculis ſpinarum divaricatarum et tuberculis latis obtuſis apice nudis alternantibus. *Ind. occ.*

puſillus Cand. 12. C. globoſus minimus, ſpinis tuberculorum externis mollibus albis, internis rigidis pubeſcentibus flavicantibus. *Patria?*

2. *Melocacti: ſimplices angulati.*

Melocactus 13. C. hemiſphaericus 14angulatus, ſpinis rigidiſſimis patentibus, vertice florifero diſtincto cylindrico ſpinoſiſſimo. *Ind. occ.*

nobilis 14. C. ſubrotundus 15angulatus, ſpinis latis recurvis. *Mexico.* (C. recurvus Mill.)

intortus Mill. 15. C. oblongus multangulatus, angulis ſuperne in ſpiram tortis, ſpinis erecto-curvatis. *Inſ. Carib.*

reductus Link. 16. C. oblongus multangulatus, angulis ſpinisque confertiſſimis rectis brevibus. *Mexico.* (C. nobilis Haw.)

Hyſtrix Haw. 17. C. oblongus multangulatus, faſciculis ſpinarum confertiſſimis elongatis rectis fulvis. *Ind. occid.* (C. Erinaceus Haw.?)

3. *Cerei: elongati continui.*

* *Erecti.*

Scopa * 18. C. ſuberectus ſubcylindricus glaber, ſpinis ſtellatis ſetaceis molliusculis niveis. *Patria?*

cylindricus Lam. 19. C. erectus teres leviſſime decuſſatim ſulcatus, ſpinis faſciculatis lanatis, pilis ſpinas divaricatas aequantibus. *Peru.*

ſerpentinus W. 20. C. erectus ſubſcandens, junior ſubangulatus, ſpinis ſetaceis elongatis confertis albidis. *Amer. auſtr.*

Pitajaya Jacq. 21. C. erectus ramoſus, ramis 3quetris, angulis repandis, faſciculis ſpinarum nigricantibus. *Amer. auſtr.*

tetragonus 22. C. erectus 4angularis, angulis compreſſis transverſim plicatis. *Amer. auſtr.* (C. grandis Haw.)

paniculatus Lam. 23. C. erectus ramoſiſſimus, ramis divaricatis 4angulis, angulis crenato-repandis, faſciculis ſpinarum abbreviatis. *Hiſpaniola.*

ſpecioſus W. 24. C. ſuberectus ramoſiſſimus, ramis divergentibus, angulis dentatis, ſpinis faſciculatis divergentibus. *Mexico.* (C. ſpecioſiſſimus Desf. bifrons Haw.)

pentagonus 25. C. erectus tenuis 5-6angulatus, faſciculis ſpinarum nudis. *Amer. tropic.*

Haworthii * 26. C. procerus ſub-5angulatus profunde ſulcatus, ſpinis numeroſis elongatis fulvis. *Ind. occ.* (Cereus nobilis Haw.)

priſmaticus W. 27. C. erectus obſolete 5gonus nitidus, ſpinis faſciculatis tenuibus brevibus fuſcis baſi nudis. *Amer. tropic.*

hexagonus 28. C. erectus 5-6angularis, angulis compreſſis, ſpinis ſubulatis fuſcis, lanugine breviſſima. *Amer. auſtr.*

† *heptagonus* 29. C. erectus oblongus 7angulatus. *Amer. trop.*

ſtrictus W. 30. C. erectus 7angulatus, angulis compreſſis repandis, ſpinis pallidis, lanugine breviſſima. *Amer. tropic.*

niger Salm. 31. C. erectus 7angulatus, ſpinis inaequalibus divaricatis albidis, tomento breviſſimo. *Amer. auſtr.*

† *laetus* Kunth. 32. C. erectus articulatus 7angulatus, angulis tuberculatis faſciculato-ſpinoſis. *Quito.* (C. Hyſtrix Salm.?)

eburneus Salm. 33. C. erectus glauceſcens 8angulatus, angulis obtuſis, ſpinis albicantibus elongatis. *Amer. auſtr.* (C. peruvianus W.)

peruvianus 34. C. erectus ramoſus ſub-8angulatus, angulis obtuſis, ſpinis fuſcis abbreviatis *Peru.*

repandus 35. C. erectus 8angulatus, angulis compreſſis repandis, ſpinis fuſcis. *Ind. occ.*

ſubrepandus Haw. 36. C. erectus 8angulatus, angulis obtuſis repandis, ſpinis validis pallidis, lana breviſſima. *Ind. occ.* (C. crenulatus Salm.?)

Royeni 37. C. erectus articulatus 8angulatus, angulis obtuſis, ſpinis albis elongatis lanam ſubaequantibus. *Amer. trop.*

fimbriatus Lam. 38. C. erectus continuus 8angulatus, angulis obtuſiſſimis, ſpinis albis elongatis, petalis fimbriatis. *Hiſpaniola.* (C. albiſpinus Salm.?)

† *fulvispinosus* Haw.	39. C. erectus sub-9angulatus, lateribus planis, spinis validis fulvis elongatis. *Amer. trop.*
† *regalis* Haw.	40. C. erectus 9angulatus sulcatus, spinis fulvis elongatis, junioribus lanam aequantibus. *Amer. tropic.*
lanuginosus	41. C. erectus 10angulatus, angulis obsoletis, spinis flavescentibus elongatis lanam aequantibus. *Amer. tropic.*
chlorocarpus Kunth.	42. C. erectus ramosus, ramis fastigiatis 10-12angulatis, angulis tuberculatis stellato-spinosis. *Quito.*
† *euphorbioides* Haw.	43. C. erectus sub-10angulatus, angulis validis, spinis inaequalibus basi subnudis. *Amer. trop.*
coquimbanus Molin.	44. C. erectus 10angulatus, angulis obtusis, spinis centralibus longissimis rectis. *Chili.*
polygonus Lam.	45. C. erectus ramosus 11angulatus sulcatus, angulis subundulatis, spinis gryseis abbreviatis. *Hispaniola.* (C. gryseus Haw.)
multangularis W.	46. C. erectus sub-18-20angulatis, angulis approximatis obtusis, spinis setaceis flavescentibus confertis. *Amer. trop.*
divaricatus Lam.	47. C. erectus ramosus, ramis divaricatis multangulis, angulis obtusis, spinis approximatis. *Hispaniola.*

** *Cerei repentes.*

parasiticus	48. C. ramosus, ramis compressis undulato-subarticulatis compressis striatis. *Hispaniola.*
serpens Kunth.	49. C. ramosus subangulatus areolatus, areolis 6angulatis apice spinosis. *Quito.*
triangularis	50. C. diffusus subarticulatus, articulis ovatis 3gonis dentatis, spinis setaceis paucis lanugine longioribus. *Ind. occ.*
triqueter W.	51. C. repens, articulis oblongis 3quetris repandis, spinis setaceis lanugine longioribus. *Amer. trop.* (C. 3gonus Haw.)
caripensis Kunth.	52. C. repens diffusus, ramis 4gonis, angulis tuberculosis stellato-setosis. *Nov. Granat.* (C. 4angularis Haw.)
grandiflorus	53. C. repens diffusus 5-7angulatus, spinis longitudine pilorum. *Ind. occ.*
reptans W.	54. C. repens 5gonus, lateribus planis, spinis subulatis rufis lanuginem superantibus. *Ind. occ.*
albisetosus Haw.	55. C. repens 5angulatus, spinis stellatis albis lanugine rufa brevioribus. *Ind. occ.*
flagelliformis	56. C. repens teretiusculis 10gonus, spinis setaceis lanugine longioribus. *Amer. tropic.* (C. Humboldtii, sepium et icosagonus Kunth.)

4. *Rhipsalides: penduli s. erectiusculi teretes glabri.*

pendulus Sw.	57. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris obtusis. *Jamaic. Hispaniol.* (Rhipsalis Cassutha Gärtn.)

58.

faſciculatus W. 58. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris, pilis juniorum ſubfaſciculatis. *Ind. occid.* (C. paraſiticus Cand.)

funalis Salm. 59. C. erectiusculus, ramis longis teretibus obtuſis glabris ſparſe punctatis. *Ind. occid.* (Rhipſalis garndiflora Haw.)

† *micranthus* Kunth. 60. C. pendulus inermis, ramis compreſſo-ancipitibus 3-4angula, floribus minutis. *Quito.*

5. *Opuntiae: ramis articulatis compreſſis.*

ſalicornioides Haw. 61. C. ramoſiſſimus tener, ramis verticillatis, articulis lineari-angulatis, junioribus teretiusculis, ſpinis faſciculatis minutiſſimis. *Patria?*

nanus Kunth. 62. C. repens, articulis teretibus ſubcompreſſis areolatis ſpinoſis. *Quito.*

fragilis Nutt. 63. C. ramoſus, articulis teretiuſculis confluentibus fragilibus, faſciculis ſpinarum confertis, ſpinis exterioribus molliuſculis internis elongatis rigidis, utrisque albis. *Amer. boreal.* (C. puſillus Haw.)

humilis Lag. 64. C. depreſſus, ramis divaricatis, articulis lanceolatis tumidis, ſpinis ſubſolitariis abbreviatis. *Ind. occ.* (C. folioſus W.)

truncatus Link. 65. C. dichotome ramoſus, articulis compreſſo-foliaceis denticulatis apice truncato-barbatis glaberrimis. *Braſil.*

braſilienſis W. 66. C. caule tereti, ramis compreſſis ovatis planis, ſpinis ſubſolitariis validis. *Braſil.*

monacanthos W. 67. C. articulato-prolifer, articulis obovato-oblongis, ſpinis ſolitariis validis. *Amer. auſtr.*

Opuntia 68. C. articulato-prolifer, articulis ovatis, ſpinis ſetaceis lanuginem aequantibus. *Amer. boreal. Ind. occ.*

Tuna 69. C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis numeroſis validis divergentibus flavis elongatis, ſpinulis baſilaribus circinatis. *Quito. Mexico.* (C. Bonplandii Kunth.)

Ficus indica 70. C. articulato-prolifer, articulis ellipticis, ſpinis ſetaceis lanuginem aequantibus. *Amer. trop.*

tuberculatus W. 71. C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis utrinque attenuatis, tuberculis ſpinoſis, ſpinis ſetaceis lanuginem aequantibus. *Amer. trop.*

Dillenii Ker. 72. C. articulato-prolifer, articulis latis oblique obovatis turgidis, ſpinis inaequalibus validis divaricatis. *Amer. bor. et auſtr. Ad fl. Miſſuri.* (C. ferox Nutt. Opuntia polyacantha Haw.)

tomentoſus Link. 73. C. articulato-prolifer, articulis oblongo-lanceolatis villoſiuſculis, ſpinis inaequalibus abbreviatis rectis. *Amer. tropic.*

coccionellifer 74. C. articulato-prolifer, articulis oblongis obtuſis, ſpinis lanuginem aequantibus deciduis. *Amer. trop.* (C. decumanus W., ſubinermis Link. Opuntia craſſa et ſtricta Haw.)

elongatus W. 75. C. articulis lanceolatis confluentibus turgidis, ſpina faſciculi inferiore elongata, reliquis ſubobſoletis. *Amer. trop.*

elatior W. 76. C. articulis oblongis, ſpinis fuſcis validis inaequalibus divergentibus, lanugine obſoleta. *Amer. trop.* (Opuntia maxima Haw.)

curaſſavicus 77. C. articulis obovato-oblongis tumidis, ſpinis ſubbinis elongatis patentibus albis, lanugine breviſſima. *Amer. auſtr.* (C. triacanthos W.)

lanceolatus Haw. 78. C. articulis lanceolatis elongatis, ſpinis aequalibus breviſſimis. *Amer. trop.*

polyanthes Cand. 79. C. articulis ovatis, ſpinis duplicibus, majoribus patulis, minoribus circinatis. *Amer. trop.*

nigricans Haw. 80. C. articulis oblongis, ſpinis duplicibus nigricantibus, majoribus divaricatis, minoribus circinatis. *Amer. trop.*

moniliformis 81. C. articulis globoſis, ſpinis baſi nudis ſolitariis geminisque validis elongatis divaricatis. *Ind. occ.*

ferox W. 82. C. articulis oblongis elongatis, ſpinis duplicibus albidis validis et ſetaceis lanugine longioribus. *Amer. trop.*

ſpinoſiſſimus Lam. 83. C. articulis oblongis, ſpinis confertiſſimis flavidis ſetaceis ſubulatisque. *Ind. occ.*

6. *Phyllanthi.*

Phyllanthus 84. C. ramis foliaceis articulatis oblongis crenatis, lanugine breviſſima, pedunculis lateralibus elongatis. *Amer. auſtr.* (Flores albi.)

elegans Link. 85. C. ramis foliaceis oblongis crenato-dentatis, lanugine breviſſima, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus roſeis. *Amer. auſtr.* (C. ſpecioſus Bonpl. Deſf. phyllanthoides Cand.)

alatus Sw. 86. C. ramis foliaceis petiolatis enſiformibus crenatis, floribus ſeſſilibus parvis albidis. *Jamaic.*

7. *Peireſciae: foliis diſtinctis.*

Peireſcia 87. C. caule tereti, ſpinis faſciculatis, foliis ovato-oblongis acutis petiolatis. *Amer. trop.* (Pereskia aculeata et longiſpina Haw. C. Bleo Kunth.)

portulacifolius 88. C. caule tereti arboreo, ſpinis trunci faſciculatis, foliis confertis obovatis emarginatis, ſpinis ſolitariis axillaribus elongatis. *Ind. occ.*

† *grandifolius* * 89. C. caule ſpinoſiſſimo, foliis oblongo-lanceolatis carnoſis ſupra laevibus ſubtus punctato-aſperis. *Braſil.* (Pereskia grandifolia Haw. C. horridus Kunth.)

1839. TRIPHACA Lour.

africana Lour. *Afric. or.* Arbor magna, foliis cordatis integerrimis, floribus cymoſis luteis.

1840. PHOBEROS Lour.

cochinchinensis Lour. 1. Ph. caule toto aculeato, foliis ovatis subserratis, pedunculis terminalibus. *Cochinchina.*

chinensis Lour. 2. Ph. ramis inferioribus aculeatis superioribus inermibus, foliis ovatis integerrimis, pedunculis lateralibus. *China austr.*

1841. LOPHIRA Banks.

alata Banks. *Afric. trop.* Arbor foliis alternis obcordatis rigidis, floribus racemosis.

1842. ABATIA R. et P.

rugosa R. et P. 1. A. foliis oblongo-lanceolatis rugosis, racemis terminalibus. *Peru.*

parviflora R. et P. 2. A. foliis oblongo-lanceolatis acutis planis, racemis e dichotomia. *Peru. Nov. Granat.?* (A. verbascifolia Kunth.)

1843. POLYLEPIS R. et P.

racemosa R. et P. 1. P. foliis pinnatis, foliolis obovato-oblongis emarginatis crenatis, floribus racemosis. *Peru.*

lanuginosa Kunth. 2. P. foliis pinnatis, foliolis subintegerrimis subtus sericeo-lanatis, floribus racemosis. *Peru.*

villosa Kunth. 3. P. foliis ternatis, foliolis crenatis subtus villosis, racemis multifloris. *Peru.*

incana Kunth. 4. P. foliis ternatis, foliolis crenatis subtus tomentosis, floribus racemosis 5andris. *Peru.*

1844. CERCOCARPUS Kunth.

fothergilloides Kunth. *Mexico.* Arbor foliis alternis oblongis serratis, floribus umbellato-fasciculatis.

1845. CALLISTEMON R. Br.

rigidus R. Br. *Nov. Holl.* Frutex foliis linearibus cuspidatis, floribus confertis axillaribus, staminibus rubris. (Metrosideros linearis W. enum.)

1846. CALYPTRANTHES Sw.

paniculata R. et P. 1. C. foliis oblongo-lanceolatis obtuse acuminatis utrinque glabris, racemis paniculatis. *Peru.*

brasiliensis * 2. C. foliis oblongis utrinque attenuatis supra glabris subtus incano-pubescentibus asperis, paniculis axillaribus elongatis patulis ferrugineo-tomentosis, floribus glomeratis. *Brasil.* (C. paniculata N. E.)

Chytraculia Sw. 3. C. foliis ovato-lanceolatis utrinque glabris, paniculis axillaribus terminalibusque trichotomo-

diffuſis villoſo-lanatis, floribus glomeratis. *Jamaica.* (Myrtus L.)

caryophyllifolia W. 4. C. foliis ovato-ellipticis parallele venoſis utrinque glabris, paniculae lateralis ramis rigidis glabris divaricatis 3floris. *Ind. or.* (Eugenia Lam. Myrtus Cumini L.)

Jambolana W. 5. C. foliis obovatis emarginatis, panicula terminali corymboſa glabra. *Ind. orient.* (Eugenia Lam.)

Syzygium Sw. 6. C. foliis ovato-oblongis obtuſis parallele venoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus trichotomis glabris. *Jamaica.* (Myrtus Zuzygium L.)

guineenſis W. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis venoſo-reticulatis, pedunculis axillaribus terminalibusque corymboſis. *Guinea.*

rigida Sw. 8. C. foliis ovatis acutis eveniis rigidis, pedunculis axillaribus 3floris glabris. *Jamaica.*

latifolia Poir. 9. C. foliis ovali-ſubrotundis emarginatis coriaceis reticulatis, floribus lateralibus ſubſeſſilibus faſciculatis. *Inſ. Mascaren.*

1847. EUCALYPTUS Herit.

* *Operculo conico.*

robuſta Sm. 1. E. operculo medio conſtricto calycem ſuperante, umbellis lateralibus terminalibusque, foliis oblongis acuminatis ſubtus discoloribus. *Nov. Holl.*

pilularis Sm. 2. E. operculo medio conſtricto calycem aequante, floribus corymboſis, fructibus globoſis, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl.*

roſtrata Cav. 3. E. operculo roſtrato, floribus umbellatis, foliis ovato-lanceolatis nitidis. *Nov. Holl.*

cornuta Labill. 4. E. operculo longiſſime roſtrato, floribus capitatis, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl. ad Africum.*

Globulus Labill. 5. E. operculo conico medio conſtricto calycem 4gonum aequante, floribus ſubſolitariis, foliis lanceolato-linearibus elongatis ſubfalcatis craſſiſſimis ſubeveniis. *Nov. Holl.*

incraſſata Labill. 6. E. operculo conico calycem aequante, floribus ſubcapitatis pedunculatis, foliis lanceolatis craſſiusculis parallele venoſis, nervis marginalibus. *Nov. Holl.*

marginata Sm. 7. E. operculo conico calycem aequante, umbellis lateralibus, foliis ovatis margine incraſſatis. *Nov. Holl.*

tereticornis Sm. 8. E. operculo conico tereti membranaceo calycem latitudine et longitudine ſuperante, umbellis lateralibus, foliis lanceolatis. *Nov. Holl.*

reſinifera Sm. 9. E. operculo conico tereti coriaceo calycem latitudine aequante longitudine ſuperante, umbellis lateralibus, foliis oblongo-lanceolatis membranaceis venoſo-reticulatis, nervis marginalibus. *Nov. Holl.*

multiflora Poir. 10. E. operculo conico, pedunculis multifloris elongatis, foliis lanceolatis baſi inaequalibus parallele venoſis apice incurvo-acuminatis. *Nov. Holl.* (E. longifolia Link.)

capitellata Sm. 11. E. operculo conico obtuſiuſculo calyceque angulato ſubancipiti, pedunculis 3floris ſubcapitatis, fructu globoſo, foliis ovato-lanceolatis obliquis. *Nov. Holl.* (E. triantha Link.)

ſaligna Sm. 12. E. operculo conico acuto calyceque anguloſo ſubancipiti, capitulis lateralibus, fructu turbinato, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl.* (E. anguſtifolia Link.)

viminalis Labill. 13. E. operculo conico obtuſiuſculo, pedunculis 3floris axillaribus, foliis lineari-lanceolatis ſubfalcatis longiſſimis. *Nov. Holl.*

** *Operculo hemiſphaerico.*

pulverulenta Ker. 14. E. operculo ſubmutico, pedunculis 3floris, foliis oppoſitis cordato-orbiculatis ſubcucullatis pulverulentis. *Nov. Holl.*

hirſuta Link. 15. E. operculo ſubmutico, pedunculis 3floris ramisque ſtrigoſis, foliis cordatis obtuſis ſubtus pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

botryoides Sm. 16. E. operculo mutico, capitulis pedunculatis, fructu turbinato, foliis lanceolatis. *Nov. Holl.*

amygdalina Labill. 17. E. operculo mutico, capitulis pedunculatis, foliis lineari-lanceolatis. *Nov. Holl.*

paniculata Sm. 18. E. operculo ſubmutico, calyce angulato, umbellis terminalibus ſubpaniculatis. *Nov. Holl.*

haemaſtoma Sm. 19. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus terminalibusque, ramulis angulatis, foliis lanceolatis elongatis coriaceis. *Nov. Holl.*

piperita Sm. 20. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus compoſitis, ramulis angulatis, foliis ovatis obliquis. *Nov. Holl.*

obliqua Sm. 21. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus ſolitariis, ramulis teretibus, foliis oblongo-lanceolatis obliquis. *Nov. Holl.*

corymboſa Sm. 22. E. operculo mucronulato, calyce tereti, umbellis terminalibus corymboſo-paniculatis, foliis lanceolatis. *Nov. Holl.*

ovata Labill. 23. E. operculo mucronulato, capitulis paucifloris pedunculatis, foliis ovatis ſubcrenulatis venoſis. *Nov. Holl.*

cordata Labill. 24. E. operculo mucronulato, pedunculis ſub-3floris congeſtis axillaribus, foliis oppoſitis ſeſſilibus cordatis crenatis. *Nov. Holl.*

1848. Foetidia Commerſ.

mauritiana Lam. *Inſ. Mascaren.* Arbor foliis ovalibus, floribus ſolitariis pedunculatis.

DI - PENTAGYNIA.

1849. WALDSTEINIA Kit.

geoides W. *Hungar. Transſylvan.* Herba ſubſpithamea, foliis 5lobis, pedunculis ſubbifloris, floribus flavis.

1850. SPIRAEA.

* *Fruteſcentes.*

alpina Pall. 1. Sp. foliis lineari-lanceolatis ſubdenticulatis ſupra glabris ſubtus ſubpubeſcentibus, corymbis lateralibus. *Sibir. or.*

acutifolia W. 2. Sp. foliis ſpathulatis acutis integerrimis 3plinerviis glabris, corymbis lateralibus ſeſſilibus. *Patria?*

hypericifolia 3. Sp. foliis obovatis obtuſis ſubintegerrimis 3plinerviis glabris, corymbis lateralibus ſeſſilibus. *Hungar. Transſylvan. Podolia. Tauria. Gallia med. Japon. Amer. bor.* (Sp. crenata L. obovata W. picovienſis et ſawranica Beſſ. folioſa Poir. varr.)

chamaedryfolia 4. Sp. foliis oblongis apice inciſo-dentatis baſi attenuatis ſubpubeſcentibus, corymbis pedunculatis. *Hungar. Transſylvan. Sibir. China.* (Sp. oblongifolia Kit. cantonienſis Lour.)

triloba 5. Sp. foliis ſubcordato-ſubrotundis obtuſe lobatis dentatis, umbellis pedunculatis. *Sibir.*

thalictroides 6. Sp. foliis obovatis obtuſis ſub-3lobis, umbellis ſeſſilibus. *Sibir.*

argentea Mut. 7. Sp. foliis obovato-oblongis apice ſerratis ſericeis flabellato-venoſis, racemis paniculatis. *Nov. Granat.*

ulmifolia Scop. 8. Sp. foliis ovato-oblongis ſubduplicato-ſerratis glabriuſculis, corymbis pedunculatis terminalibus. *Carniolia.*

betulifolia Pall. 9. Sp. foliis late ovatis inciſo-ſerratis glabris, corymbis terminalibus compoſitis faſtigiatis folioſis. *Sibir. Virginia.* (Sp. corymboſa Rafin.)

capitata Pursh. 10. Sp. foliis ovatis ſublobatis duplicato-dentatis ſubtus reticulatis tomentoſis, corymbis terminalibus congeſtis ſubcapitatis longiſſime pedunculatis, calycibus tomentoſis. *Ora occ. Amer. bor.*

discolor Pursh. 11. Sp. foliis ovatis lobatis dentatis ſubplicatis ſubtus niveo-tomentoſis, paniculis terminalibus pedunculatis ramoſiſſimis. *Ad montes ſcopuloſos Amer. bor.*

crataegifolia Link. 12. Sp. foliis obovatis obtuſis duplicato-ſerratis glabris ſubtus reticulatis, corymbis terminalibus compoſitis, floribus ſubcapitatis. *Patria?*

opulifolia 13. Sp. foliis ovatis 3lobis ſerratis glabris, corymbis terminalibus. *Amer. bor.*

tomentoſa 14. Sp. foliis lanceolatis inaequaliter ſerratis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus compoſitis. *Amer. bor.*

callofa Thunb. 15. Sp. foliis lanceolatis acutis ferratis fubtus glaucis fubvillofis, panicula ramofiffima terminali. *Japon.* (Sp. japonica L. fuppl.)

falicifolia 16. Sp. foliis oblongis ferratis glabris fubfeffilibus, racemis compofitis terminalibus. *Europ. med. auftr. Sibir. Amer. bor.* (Sp. carpinifolia W. var. foliis latioribus, racemis paniculatis. Sp. alba Ehrh., paniculata Ait. fimilis var. foliis bafi attenuatis.)

magellanica Poir. 17. Sp. foliis oblongo-lanceolatis bafi attenuatis petiolatis incifo-ferratis utrinque glabris fubtus pallidis nervofis, racemis terminalibus fimplicibus. *Ad fretum Magellan.*

lanceolata Poir. 18. Sp. foliis lanceolatis obtufe ferratis glabris petiolatis rubro-venofis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Inf. Mascaren.*

incifa Thunb. 19. Sp. foliis ovatis acutis incifis fub-5fidis fubtus villofis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Japon.*

laevigata 20. Sp. foliis oblongis obtufis integerrimis glaucis, panicula terminali thyrfoidea. *Sibir.* (Sp. altaica Pall.)

coerulefcens Poir. 21. Sp. foliis fubfeffilibus lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis fubtus albidis, paniculis axillaribus cymofis. *Ind. or.*

forbifolia 22. Sp. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis duplicato-ferrulatis venofo-lineatis glabris, floribus paniculatis. *Sibir. Camtfchatca. Ora occ. Amer. bor.*

* *Herbaceae.*

Aruncus 23. Sp. foliis fupradecompofitis, foliolis ovato-oblongis duplicato-ferratis acuminatis glabris, racemis fpiciformibus paniculatis, floribus dioecis, petalis minimis. *Europ. med. Amer. bor. Japon.*

Filipendula 24. Sp. foliis interrupte pinnatis, foliolis lanceolatis incifo-ferratis, floribus corymbofis. *Europ.* (Sp. pubefcens Cand. var.)

Ulmaria 25. Sp. foliis pinnatis fubtus fubtomentofis, lateralibus indivifis, extremo majori 3lobo, corymbis proliferis. *Europ.* (Sp. denudata Presl.)

quinqueloba Baumg. 26. Sp. foliis interrupte pinnatis fubtus hirfutiusculis, foliolis lateralibus 3-extimo 5fidis, floribus cymofo-corymbofis. *Transfylvan.*

digitata W. 27. Sp. foliis pinnato-ternatis fubtus albo-tomentofis, foliolis lateralibus 5- extimo 7fidis, laciniis acutis ferratis, panicula corymbofa. *Sibir.* (Sp. palmata Pall.)

lobata Jacq. 28. Sp. foliis pinnatis fubtus glabris, lateralibus 3fidis extimo 7partito, laciniis acutis ferratis, corymbis paniculatis proliferis. *Virginia. Carolina. Japon.* (Sp. palmata L. fuppl Thunb.)

camtfchatica Pall. 29. Sp. foliis palmato-5partitis, petiolis auriculatis, caule hirfuto, corymbis proliferis. *Camtfchatca. Inf. Aleut.*

trifoliata 30. Sp. foliis ternatis oblongo-lanceolatis ferratis, ftipulis linearibus integerrimis, floribus corym-

bosis, calycibus campanulatis, petalis elongatis. *Amer. bor.* (Gillenia Mönch.)

stipulata Mühlb. W. 31. Sp. foliis ternatis lanceolatis elongatis serrulatis, stipulis foliaceis ovatis inciso-dentatis, floribus corymbosis, calycibus campanulatis, petalis elongatis. *Louisiana.* (Gillenia stipulacea Nutt.)

1851. KERIA Cand.

japonica Cand. *Japon.* Suffrutex foliis ovato-lanceolatis duplicato-serratis venoso-lineatis, floribus flavis plerumque plenis. (Rubus japonicus L. Corchorus Thunb.)

1852. SESUVIUM.

Portulacastrum 1. S. foliis spathulato-oblongis, articulis caulis tumidis, flore pedunculato. *Amer. trop.* (S. pedunculatum Pers.)

longifolium W. 2. S. foliis lineari-spathulatis, articulis caulis aequalibus, flore pedunculato. *Amer. austr.* (S. spathulatum Kunth.)

revolutifolium Vahl. 3. S. foliis lineari-lanceolatis margine revolutis, flore terminali sessili. *Amer. trop.* (S. sessile Pers. Portulacastrum Cand., revolutifolium Ort.)

repens W. 4. S. foliis lanceolato-spathulatis, caulis repentis articulis filiformibus, flore pedunculato. *Ind. orient.*

microphyllum Humb. 5. S. foliis subrotundis lanceolatisve, caulis humimifusi articulis aequalibus, flore pedunculato. *Cuba.*

1853. AIZOON.

* *Fruticosa.*

fruticosum 1. A. caule erecto ramoso, ramis virgatis, foliis lanceolatis basi attenuatis, floribus sessilibus. *C. B. S.*

rigidum 2. A. caule decumbente, ramis diffusis, foliis obovatis acutiusculis glauco-tomentosis, floribus alternis secundis sessilibus. *C. B. S.* (A. tomentosum Lam.)

stellatum Lam. 3. A. caule diffuso, foliis spathulato-linearibus incano-villosis, floribus paniculatis stellato-patentibus. *C. B. S.*

perfoliatum 4. A. caule erecto ramoso tomentoso, foliis obovatis perfoliato-connatis papulosis, floribus axillaribus pedunculatis solitariis. *C. B. S.*

** *Herbacea.*

paniculatum 5. A. caule decumbente ramoso, foliis obovato-lanceolatis hirsutis, ramis floriferis trichoto-

mis, floribus ſeſſilibus. *C. B. S.* (A. lanceolatum Murr.)

hiſpanicum 6. A. caule diffuſo, foliis lanceolatis ſeſſilibus papilloſis, floribus axillaribus ſubpedunculatis ſolitariis. *Hiſpan.*

canarienſe 7. A. caule diffuſo, foliis obovatis papilloſis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Inſ. Canar. Afric. bor. Aegypt. Arab.*

glinoides 8. A. caule decumbente, foliis obovatis hirſutis, floribus ſeſſilibus ſparſis. *C. B. S.*

ſecundum 9. A. caule decumbente, foliis obovatis acutis villoſo-tomentoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſecundis. *C. B. S.*

ſarmentoſum 10. A. caule diffuſo ſarmentoſo, foliis lineari-ſemiteretibus glabris, floribus ſolitariis pedunculatis. *C. B. S.*

1854. MESPILUS.

* *Inermes, foliis indiviſis.*

germanica 1. M. foliis oblongis ſubdentatis ſubtus villoſo-tomentoſis, floribus terminalibus ſolitariis ſubſeſſilibus 5gynis. *Europ. Aſia med.*

grandiflora Sm. 2. M. foliis oblongis baſi attenuatis inaequaliter ſerratis ſubangulatis ſubtus villoſiuſculis, floribus terminalibus ſubcorymboſis 3gynis. *Patria?* (M. lobata Poir.)

tomentoſa W. 3. M. foliis ellipticis obtuſis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ſubcorymboſis parvis, calycibus germinibusque lanatis. *Gallia. Hungaria. Transſylvan.* (M. eriocarpa Cand.)

Cotoneaſter 4. M. foliis ovatis acutis mucronatis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ſubcorymboſis parvis, calycibus germinibusque glabris. *Europ. media. Tauria. Caucaſ. Sibir.*

acuminata Wall. 5. M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis utrinque piloſiuſculis, floribus geminis parvis, calycibus glabris. *Ind. or.*

† *affinis* * 6. M. foliis obovatis, calycibus pedunculisque lanatis. *Ind. or.* (Cotoneaſter Lindl.)

japonica Thb. 7. M. foliis oblongis utrinque attenuatis apice dentatis ſubtus tomentoſis coriaceis, floribus corymboſis. *Japon. China.* (Crataegus Bibas Lour. Eriobotrya Lindl.)

Cuila Buchan. 8. M. foliis ellipticis ſubdenticulatis. *Ind. orient.* (Eriobotrya elliptica Lindl.)

pubeſcens Kunth. 9. M. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, corymbis paucifloris, calycibus villoſis. *Mexico.*

ſtipuloſa Kunth. 10. M. foliis oblongis mucronatis ſerratis baſi attenuatis utrinque pubeſcentibus, ſtipulis elongatis perſiſtentibus, corymbis paucifloris, calycibus tomentoſis. *Mexico.*

denticulata * 11. M. foliis obovato-ellipticis mucronatis apice denticulatis coriaceis ſubtus tomentoſis, floribus

corymboſis, calycibus lanatis. *Mexico.* (Cotoneaſter Kunth.)

ferruginea * 12. M. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis crenatis ſubtus reticulatis calycibusque ferrugineo-tomentoſis, floribus ſubcorymboſis. *Quito.* (Crataegus Perſ. Oſteomeles Kunth.)

lanuginoſa R. et P. 13. M. foliis cordato-ovatis obtuſis ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus calycibusque rufo-tomentoſis. *Peru.* (Eriobotrya cordata Lindl. Oſteomeles latifolia Kunth.)

glabrata * 14. M. foliis breviſſime petiolatis ſubrotundo-ovatis obtuſis coriaceis crenatis utrinque glabris, ramulis verrucoſis, calycibus pubeſcentibus. *Nov. Granat.* (Oſteomeles Kunth.)

Perſoonii * 15. M. foliis ovatis obtuſis ſerratis glabris ſubtus glaucis in petiolum longum decurrentibus, floribus corymboſis pubeſcentibus. *Peru.* (Crataegus obtuſifolia Perſ. Oſteomeles Kunth.)

turbinata * 16. M. foliis obovatis inciſis ſerratis glabris, corymbis paucifloris, pedicellis brevibus, fructibus turbinatis. *Amer. bor.* (Crataegus Pursh.)

laevis * 17. M. foliis ovatis acuminatis ſerrulatis laevibus, umbella ſimplici terminali. *Japon.* (Crataegus Thunb.)

villoſa * 18. M. foliis oblongis acuminatis ſerratis ſubtus fructibusque villoſis, umbella compoſita terminali. *Japon.* (Crataegus Thunb.)

** *Spinoſae, foliis indiviſis diviſisque.*

Pyracantha 19. M. foliis ſempervirentibus lanceolatis crenatis lucidis, corymbis pubeſcentibus, dentibus calycis obtuſis. *Europ. med. Caucaſ. Cochinchina.* (M. pauciflora Poir. var.)

prunifolia Poir. 20. M. foliis ellipticis inaequaliter ſerratis glabris, pedunculis corymboſis calycibusque glanduloſis, dentibus calycis obtuſis. *Amer. bor.* (Crataegus elliptica Ait. M. prunellifolia Poir.)

lucida Ehrh. 21. M. foliis obovatis ſubſeſſilibus coriaceis lucidis apice ſerratis, corymbis compoſitis, dentibus calycis lanceolatis ſubdentatis. *Amer. bor.* (Crataegus Crus galli Ait., lucida Wangenh., hyemalis Walt.. Cr. linearis Perſ. M. linearis Poir. var.)

cuneifolia Ehrh. 22. M. foliis obovato-oblongis acutis in petiolum decurrentibus ſubangulatis ſerratis ſupra glabris opacis ſubtus venoſo-lineatis villoſiuſculis, calycibus ſubvilloſis, dentibus ſubulatis integerrimis. *Amer. bor.* (Crataegus punctata Ait. Crus galli du Roi. M. cornifolia Poir.)

xanthocarpos Ehrh. 23. M. foliis obovatis inciſis ſerratis ſupra nitidis ſubtus villoſis, dentibus calycis lanceolatis inciſis, floribus 5gynis, fructibus turbinatis verrucoſis. *Amer. bor.* (Crataegus tomentoſa L., parvifolia Ait., uniflora du Roi. M. lutea Poir.)

ſpathulata * 24. M. foliis ſpathulatis 3fidis dentatis ſubfaſciculatis, ſpinis incurvis, corymbis paucifloris, calycibus tomentoſis. *Amer. bor.* (Crataegus Mx.)

triloba Poir. 25. M. foliis cuneatis 3lobis mucronatis villoſis, pedunculis corymboſis calycibusque tomentoſis. *Afric. bor. Neapol.* (Cr. maura L. ſuppl., maroccana Perſ. varr.)

caroliniana Poir. 26. M. foliis obovato-cuneiformibus ſublobatis crenato-ſerratis, ſtipulis cordatis calycibusque glanduloſis, floribus ſubſolitariis, fructibus turbinatis ſub-4ſpermis. *Carolina.* (Crataegus flava Ait., Michauxii Perſ., glanduloſa Mx, viridis Walt., Meſp. flexiſpina Mönch.)

pyrifolia W. 27. M. foliis ovato-ellipticis baſi attenuatis inciſo-ſerratis ſubplicatis ſubtus villoſis, calycibus villoſiusculis, dentibus lineari-lanceolatis ſerratis, floribus 3gynis. *Amer. bor.* (Crataegus pyrifolia Ait., leucophleos Mönch., tomentoſa du Roi., Meſp. latifolia Poir., Calpodendron Ehrh., flexuoſa Poir.)

glanduloſa W. 28. M. foliis ovatis baſi cuneatis angulatis inciſo-ſerratis utrinque glabris ſupra nitidis, petiolis ſtipulis calycibusque glanduloſis piloſiusculis, fructibus 5ſpermis. *Sibir. Amer. bor.* (Crataegus glanduloſa Ait., ſanguinea Pall., Meſp. rotundifolia Ehrh.)

cordata Mill. W. 29. M. foliis cordato-ovatis angulato-inciſis utrinque glaberrimis, petiolis calycibusque eglanduloſis, fructibus 5ſpermis. *Amer. bor.* (Crataegus cordata Ait., populifolia Walt., Meſp. Phaenopyrum Ehrh., acerifolia et fiſſa Poir.)

coccinea Ehrh. 30. M. foliis cordato-ovatis angulato-inciſis glanduloſo-dentatis utrinque glabris, petiolis calycibusque glanduloſis, fructibus 5ſpermis. *Amer. bor.* (Crataegus coccinea L., Meſp. aeſtivalis Walt., purpurea Poir.)

Oxyacantha Gärtn. 31. M. foliis obovatis ſubrhombeis 3fidis obtuſis membranaceis utrinque concoloribus, floribus corymboſis 1-3gynis. *Europ.* (Crataegus L. M. oxyacanthoides Thuill., laevigata et intermedia Poir.)

monogyna Ehrh. 32. M. foliis obovatis 3fidis ſublaciniatis ſubcoriaceis nitidis ſubtus discoloribus, floribus corymboſis 1gynis, ſtigmate peltato. *Europ. Sibir.* (Crataegus 1gyna Jacq. Pall. M. elegans Poir., heterophylla Flügg. Crataegus laciniata Stev.)

melanocarpa * 33. M. foliis ſub-3fidis antice ſerratis baſi attenuatis, floribus ſub-5gynis, dentibus calycis acutis reflexis villoſis. *Tauria.* (Crataegus M. B.)

nigra W. 34. M. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſub-3fidis inciſo-ſerratis ſubtus villoſis, petiolis ramulisque tomentoſis, floribus 5gynis, calycibus villoſis. *Hungar. Transſylvan.* (Crataegus Kit.)

pentagyna * 35. M. foliis ovatis 3fidis ſerratis ſubtus ramisque villoſis, dentibus calycis breviſſimis, floribus 5gynis. *Hungar.* (Crataegus W.)

Azarolus Poir. W. 36. M. foliis obtufis 3fidis fubdentatis fubtus villofis, dentibus calycis ovatis. *Europ. auftr.* (Crataegus L. Pyrus Scop. Mefp. Oliveriana Bofc. var.)

apiifolia * 37. M. foliis deltoideis inclfo-lobatis, lobis acutis incifo-dentatis, calycis tubo oblongo, dentibus fubferratis. *Amer. bor.* (Crataegus apiifolia Mx. Oxyacantha Walt.)

orientalis Poir. 38. M. foliis fub-3fidis incifo-ferratis hirfutis, floribus 5gynis, dentibus calycis acutis reflexis. *Tauria.* (Crataegus M. B. Mefp. odoratiffima Andr.)

tanacetifolia Poir. Sm. 39. M. foliis pinnatifidis utrinque hirfutis, laciniis obtufis aequaliter ferrulatis, dentibus calycis lanceolatis, floribus 5gynis. *Graecia. Afia minor.*

*** *Foliis pinnatis.*

anthyllidifolia * 40. M. foliis impari-pinnatis 10gynis, foliolis fpathulatis pubefcentibus, floribus corymbofis, officulis 1fpermis. *Inf. Sandwich.* (Pyrus Sm. Ofteomeles Lindl.)

1855. RAPHIOLEPIS Lindl.

indica Lindl. 1. R. foliis lanceolatis ferratis glabris fupra nitidis, floribus corymbofis, petalis lanceolatis calyces fuperantibus, ftaminibus exfertis. *Ind. or.* (Crataegus L.)

falicifolia Ker. 2. R. foliis lanceolatis elongatis ferratis glabris, floribus paniculatis, petalis lanceolatis calycem aequantibus, ftaminibus abbreviatis. *China.*

Loureiri * 3. R. foliis lanceolatis inaequaliter ferratis glabris, floribus corymbofis, petalis fubrotundis. *Cochinchina.* (Crataegus indica Lour.)

rubra Lindl. 4. R. foliis obovatis crenatis glabris, racemis compofitis terminalibus, petalis ovatis, ftaminibus abbreviatis. *China auftr.* (Crataegus Lour.)

1856. PHOTINIA Lindl.

ferrulata Lindl. 1. Ph. foliis oblongo-lanceolatis elongatis coriaceis ferrulatis lucidis, floribus paniculatis, pedicellis calyce longioribus. *China. Japon.* (Crataegus glabra Thunb.)

arbutifolia Lindl. 2. Ph. foliis oblongo-lanceolatis mucronato-ferrulatis, panicula thyrfoidea, pedicellis calyce brevioribus. *California.* (Crataegus arbutifolia Hort. kew. ed. 2.)

dubia Lindl. 3. Ph. foliis lanceolatis remote ferratis, panicula villofa. *Nepal.*

integrifolia Lindl. 4. Ph. foliis ovalibus integerrimis glaberrimis, ramis puftulatis, panicula corymbofa glabra. *Nepal.*

1857. PYRUS.

* *Foliis simplicibus.*

† *utrinque glabris.*

communis 1. P. foliis ellipticis obtusis serratis nitidis, floribus corymbosis, fructibus basi productis. *Europ.*

Chamaemespilus Ehrh. 2. P. foliis subellipticis utrinque attenuatis duplicato-serrulatis, floribus corymboso-fasciculatis, fructibus ovalibus. *Montes Europ. med.* (Mespilus L.)

alnifolia Nutt. 3. P. foliis subrotundis retusis apice denticulatis venosis subtus glaucis, racemis simplicibus elongatis, fructibus subrotundis. *Montes scopulosi Amer. boreal.*

melanocarpa W. 4. P. foliis obovato-oblongis acutis serrulatis, nervo medio supra glanduloso, subtus discoloribus, floribus corymbosis, calycibus extus glabris intus villosis, fructibus subglobosis. *Amer. bor.*

Botryapium L. suppl. 5. P. foliis ovato-oblongis cuspidatis serrulatis subtus discoloribus, racemis simplicibus elongatis pubescentibus, petalis spathulato-lanceolatis, fructibus globosis. *Amer. bor.* (Mespilus canadensis L. Crataegus racemosa Lam.)

ovalis W. 6. P. foliis subrotundo-ovalibus acutiusculis serrulatis supra nitidis subtus pallidis, racemis erectis villosis, bracteis pedicellos subsuperantibus, petalis obovatis, fructibus subrotundis. *Amer. bor.* (Mespilus Amelanchier Walt. Crataegus spicata Lam.)

sanguinea Pursh. 7. P. foliis subcordato-ovalibus obtusis mucronatis tenuissime serrulatis, ramis sanguineis, racemis paucifloris, calycibus glabris, petalis linearibus obtusis. *Amer. bor.* (Mespilus canadensis γ. rotundifolia Mx.)

† *Michauxii* Bosc. 8. P. foliis ovali-oblongis obtusiusculis integerrimis supra lucidis subtus pallidis, pedunculis 1floris incrassatis, fructibus globosis. *Amer. bor.*

angustifolia Ait. 9. P. foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis crenato-dentatis, pedunculis corymbosis. *Amer. boreal.*

japonica Thb. 10. P. foliis obovato-oblongis serratis coriaceis nitidis, floribus axillaribus subgeminis brevissime pedunculatis, calycibus glabris obtusis. *Japon.* (Chaenomeles Lindl.)

prunifolia W. 11. P. foliis ovato-oblongis acutis serrulatis, pedunculis umbellatis pilosis. *Sibir.*

spectabilis Ait. 12. P. foliis elliptico-oblongis utrinque subattenuatis serrulatis laevibus, pedunculis umbellatis pubescentibus, unguibus petalorum calyce longioribus, stylis basi lanatis. *China.*

baccata 13. P. foliis ovato-oblongis acutis aequaliter serrulatis, pedunculis umbellatis, unguibus petalorum abbreviatis, fructibus baccatis, calyce deciduo. *Sibir. Japon.*

coronaria 14. P. foliis cordatis angulatis inciſo-ſerratis, pedunculis corymboſis, ſtylis glabris. *Virginia.*

torminalis Ehrh. 15. P. foliis cordato-ovatis laciniato-lobatis ſerratis, lobis infimis divaricatis, pedunculis corymboſis pubeſcentibus, fructibus ellipticis. *Germania.*

†† *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

Malus 16. P. foliis ovatis acutiuſculis ſerratis ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis umbellatis, fructibus baſi umbilicatis. *Europ. Aſia med.*

dioeca W. 17. P. foliis oblongis acutis duplicato-ſerratis ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis ſubaggregatis pubeſcentibus, floribus dioecis, petalis linearibus calycem aequantibus. *Patria?*

Cydonia 18. P. foliis ovato-ellipticis acutiuſculis integerrimis ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis ſolitariis, loculis fructus pleioſpermis. *Transſylvan. Tauria. Graecia.* (Cydonia vulgaris Perſ.)

chinenſis Thouin. 19. P. foliis ſubellipticis acutis ſerrulatis ſubtus ſericeis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus bracteatis, fructibus oblongis toruloſis. *China.*

arbutifolia Ehrh. 20. P. foliis obovato-oblongis acutis crenato-dentatis ſubtus tomentoſis, nervo medio ſupra glanduloſo, floribus corymboſis, calycibus lanatis. *Amer. boreal.* (Meſpilus arbutifolia L., pumila Schmidt. Crataegus pyrifolia Lam.)

Amelanchier du Roi. 21. P. foliis ſubrotundo-ellipticis acutis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis racemoſis germinibusque piloſis, petalis lanceolatis obtuſis. *Europ. med.* (Meſpilus L.)

Pollveria 22. P. foliis ovato-oblongis acutis ſerratis ſubtus tomentoſis, nervo medio ſupra glanduloſo, pedunculis corymboſis lanatis. *Alſatia.* (P. irregularis du Roi.)

cretica W. 23. P. foliis ovatis venoſis mucronato-dentatis ſubtus tomentoſis, pedunculis corymboſis calycibusque lanato-tomentoſis, petalis lanceolatis. *Creta.*

parviflora Desf. 24. P. foliis elliptico-oblongis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis corymboſis, fructibus globoſis. *Creta.*

nivalis Jacq. 25. P. foliis ovalibus obtuſis apice ſubſerrulatis ſubtus ſericeo-tomentoſis, pedunculis corymboſis, fructibus globoſis. *Auſtria.*

alpina W. 26. P. foliis elliptico-oblongis ſerrulatis baſi attenuatis integerrimis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis corymboſis lanatis. *Patria?*

edulis W. 27. P. foliis oblongis baſi cuneatis inaequaliter duplicato-ſerratis ſubtus tomentoſis, pedunculis corymboſis ſublanatis. *Gallia?*

Aria Ehrh. 28. P. foliis ſubrotundo-ovatis inciſo-dentatis ſubtus albido-tomentoſis, floribus corymboſis. *Europa.* (Crataegus L., Sorbus Crantz. Perſ., Meſpilus Scop.)

intermedia Ehrh. 29. P. foliis ovato-lanceolatis inciſo-dentatis ſubtus niveo-tomentoſis, floribus corymboſis. *Scandinavia.*

ſinaica Thouin. 30. P. foliis ovato-oblongis mucronatis ſubintegerrimis ſubtus lanatis, corymbis paucifloris. *Mons Sinai.*

elaeagnifolia Pall. 31. P. foliis ovato-lanceolatis integerrimis tomentoſo-lanatis, floribus corymboſis, dentibus calycis acutis. *Gallia auſtr. Tauria. Caucaſ.* (P. perſica Perſ., amygdaliformis Vill., ſalicifolia Balb.)

ſalicifolia 32. P. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis ſubcrenulatis ſubtus lanatis, dentibus calycis oblongis obtuſiuſculis. *Caucaſ. Sibir.*

** *Foliis pinnatis.*

pinnatifida Ehrh. 33. P. foliis inferne pinnatis ſubtus tomentoſis, foliolis inferioribus anguſte oblongis antice ſerratis, extremo maximo rhombeo inciſo-ſerrato, caule arboreo, corymbis compoſitis. *Scandinavia.* (Sorbus hybrida L.)

hybrida Mönch. 34. P. foliis pinnatis ſubtus tomentoſis, foliolis elliptico-oblongis, lateralibus apice dentatis, extremo maximo ſerrato, nervo medio glanduloſo, caule fruticoſo, floribus corymboſis. *Patria?*

domeſtica Sm. 35. P. foliis pinnatis ſub-8jugis ſubaequalibus ſubtus demum nudis, foliolis oblongis antice ſerratis, gemmis glabris acuminatis glutinoſis, fructu pyriformi. *Europ. med.* (Sorbus L.)

aucuparia Sm. 36. P. foliis pinnatis ſub-8jugis ſubaequalibus ſubtus demum nudis, foliolis oblongis duplicato-ſerratis, petiolo communi pubeſcente, gemmis ſubtomentoſis obtuſis, fructu globoſo baccato. *Europ. Aſia.* (Sorbus L.)

americana * 37. P. foliis pinnatis ſub-8jugis ſubaequalibus petioloque communi glaberrimis, foliolis lanceolatis acuminato-cuſpidatis aequaliter ſerrulatis, fructibus globoſis baccatis. *Canada.* (Sorbus aucuparia *β.* Mx. S. americana W.)

microcarpa * 38. P. foliis pinnatis ſub-6jugis ſubaequalibus petioloque communi glabris, foliolis lanceolatis acuminatis inaequaliter inciſis mucronato-ſerrulatis, ramulis glutinoſis, fructibus globoſis exiguis. *Amer. bor.* (Sorbus aucuparia *α.* Mx., microcarpa Pursh.)

1858. Mesembrianthemum.

* *Herbacea, annua ſ. biennia.*

† *Foliis planis.*

α. Floribus albis.

lineare Thunb. 1. M. acaule, foliis linearibus glabris, ſcapo 1floro. *Afric. auſtr.*

criniflorum Thunb. 2. M. ſubacaule, foliis obovatis papuloſis, ſcapo 1floro, petalis filiformibus 5. *Afric. auſtr.*

ſpathulatum W. 3. M. acaule, foliis ſpathulatis petiolatis papuloſis, ſcapo 1floro. *C. B. S.*

lanceum Thb. 4. M. caule erecto ſub-4gono, foliis oppoſitis connatis lanceolatis acutis papuloſis, floribus terminalibus. *Afric. auſtr.*

lanceolatum Haw. 5. M. caule proſtrato, foliis alternis lanceolatis obtuſiuſculis papuloſis, floribus pedunculatis. *Afr. auſtr.*

filiforme Thb. 6. M. caule filiformi decumbente, foliis ſpathulatis obtuſis papuloſis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Afric. auſtr.*

ovatum Thb. 7. M. caule flexuoſo ſubangulato, foliis ovatis ſubpetiolatis glabris, floribus terminalibus. *Afric. auſtr.*

cryſtallinum 8. M. caule erectiuſculo, foliis ampliſſimis ovato-oblongis undulatis decurrentibus ſubtus 3plinerviis pellucido-papuloſis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

glaciale Haw. 9. M. caule proſtrato, foliis ovato-oblongis undulatis pellucido-papuloſis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Attica. Aegypt.* (M. cryſtallinum Sibth. W.)

Tripolium 10. M. caule abbreviato proſtrato, foliis oblongo-lanceolatis acutis amplexicaulibus laeviſſimis ſubcrenulatis, pedunculis rigidis, calycibus 5angularibus. *C. B. S.*

β. Floribus flavis.

pinnatifidum 11. M. caule depreſſo dichotomo, foliis oppoſitis lyratis papuloſis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

ſabuloſum Thb. 12. M. ſubacaule, foliis oblongis acutis concavis papuloſis, ſcapo 1floro. *Afric. auſtr.*

angulatum Thb. 13. M. caule decumbente angulato, foliis obovatis obtuſis ſulcatis papuloſis. *Afric. auſtr.*

pomeridianum 14. M. caule erectiuſculo dichotomo hirſuto, foliis lato-lanceolatis laevibus ſubciliatis, pedunculis elongatis calycibusque villoſis. *C. B. S.*

glabrum Ait. 15. M. caule depreſſo foliisque ſpathulato-oblongis ſubundulatis glaberrimis, calycibus hemiſphaericis. *C. B. S.*

helianthoides Ait. 16. M. caule erecto ramoſo ſuperne pubeſcente, foliis ſpathulato-lanceolatis acutiuſculis glabris, pedunculis calycibusque elongatis. *C. B. S.*

ſeſſiliflorum Ait. 17. M. caule ramoſo, ramis divaricatis foliisque ſpathulatis papuloſis, floribus ſeſſilibus. *C. B. S.*

γ. Floribus rubris.

limpidum Ait. 18. M. caule decumbente ramoſiſſimo, foliis ſpathulatis pellucido-papuloſis, pedunculis elongatis, calycibus obtuſis. *C. B. S.* (M. cuneifolium Jacq. Cand., pyropeum Haw. var.)

19.

papulofum Ait. 19. M. caule dichotomo, foliis ovato-fpathulatis papillofis, papillis globofis, ramis angulatis, pedunculis deflexis. *C. B. S.* (M. Aitoni Jacq.)

†† *Foliis teretiusculis.*

tricolor W. 20. M. fubcaulefcens, foliis lineari-fpathulatis canaliculatis connatis. *C. B. S.*

copticum. 21. M. foliis femiteretibus papulofis diftinctis, floribus feffilibus axillaribus albis. *Aegypt.*

nodiflorum 22. M. caule diffufo, foliis alternis teretiusculis obtufis bafi ciliatis papulofis, floribus axillaribus, petalis (albis) calyce brevioribus. *Italia. Aegypt.*

apetalum Ait. 23. M. foliis amplexicaulibus femiteretibus canaliculatis papulofis, floribus pedunculatis, petalis abortientibus fetaceis. *C. B. S.* (M. copticum Jacq.)

caducum Ait. 24. M. foliis filiformibus femiteretibus diftinctis papulofis, papulis ovatis, floribus feffilibus, terminalibus bafi foliatis. *C. B. S.*

pilofum Haw. 25. M. foliis lineari-teretiusculis ciliatis, ramis calycibusque hirtis, floribus polygynis. *C. B. S.*

** *Perennia.*

† *Acaulia.*

α. Sphaeroidea, foliis connatis obtufiffimis in globum connatis: petalis bafi in tubum coalitis.

minutum Haw. 26. M. laeve glaucum fubemaculatum, floribus rubris. *C. B. S.*

minimum Haw. 27. M. laeve glaucefcens maculofum, floribus albidis, germine exferto. *C. B. S.*

obcordellum Haw. 28. M. glaucefcens, maculis confluentibus ramofis, floribus albicantibus, germine inclufo. *C. B. S.*

obconellum Haw. 29. M. virefcens, maculis confluentibus fubtuberculiformibus, floribus albis, germine inclufo. *C. B. S.*

truncatellum Haw. 30. M. fubglaucum depreffum, maculis punctiformibus fubdiftinctis, floribus ftramineis, germine exferto. *C. B. S.*

fibulaeforme Haw. 31. M. fubcanefcens pubefcens emaculatum depreffum. *C. B. S.*

nuciforme Haw. 32. M. glaucum emaculatum, apicibus foliorum fubdiftinctis. *C. B. S.*

β. Thelephora, foliis fubclavatis fubdiftinctis.

pififorme Haw. 33. M. foliis primis connato-pififormibus, fequentibus femiteretibus pellucido-papulofis, cauliculo ramofiffimo humillimo. *C. B. S.*

truncatum Thb. 34. M. foliis fphaerico-obconicis umbilicato-truncatis proliferis, pedunculo folitario 1floro. *C. B. S.*

fubglobofum Haw. 35. M. foliis fubconnatis fubglobofis papulofis caefpitofis, ramulis filiformibus, floribus pedunculatis. *C. B. S.* (M. capillare Thb.)

digitiforme Thunb. 36. M. foliis teretibus obtufis diftinctis laeviffimis, floribus feffilibus. *Afric. auftr.* (M. digitatum Ait.)

γ. *Stavrophora, foliis femiteretibus decuffatis.*

moniliforme Thunb. 37. M. foliis primis connato-fphaeroideis, fequentibus decuffatis femiteretibus fubulatis elongatis recurvatis, floribus pedunculatis. *Afric. auftr.*

tefticulare Ait. 38. M. foliis quaternis fubovatis fupra planis fubtus convexis, floribus feffilibus. *Africa auftr.*

fiffum Haw. 39. M. foliis quaternis aequalibus femiteretibus obtufiffimis glaucis. *Afric. auftr.*

obtufum Haw. 40. M. foliis quaternis inaequalibus femitereti-aciniformibus obtufis. *Afric. auftr.*

compactum Ait. 41. M. foliis connatis punctatis femiteretibus, apice triquetro fubreflexo acuto, floribus feffilibus, calyce fubcylindrico 6fido. *C. B. S.*

δ. *Gibbofo-difformia, folio altero abbreviato.*

gibbofum Haw. 42. M. foliis ovatis femicylindricis apice fubcarinatis patentibus viridibus. *C. B. S.*

luteo-viride Haw. 43. M. foliis oblongis femicylindricis apice triquetris luteo-viridibus, calycibus 6fidis. *C. B. S.*

perviride Haw. 44. M. foliis fubovatis craffis femicylindrico-triquetris viridiffimis. *C. B. S.*

pubefcens Haw. 45. M. foliis femicylindricis incano-pubefcentibus apice obliquis. *C. B. S.*

ε. *Gloffoidea, foliis diftichis complanatis apice oblique incraffatis.*

linguaeforme 46. M. foliis linguaeformibus altero margine incraffatis, floribus feffilibus, calycibus laevibus, petalis emarginatis. *C. B. S.* (M. fcalpratum Haw.)

fragrans Salm. 47. M. foliis linguaeformibus obliquis turgidis apice craffe uncinatis, floribus feffilibus. *C. B. S.*

cultratum Salm. 48. M. foliis linguae-enfiformibus lucidis apice oblique obtufis fubmucronatis. *C. B. S.* (M. lucidum Haw.)

obliquum W. 49. M. foliis linguaeformibus apice oblique acutis, floribus pedunculatis, calycis carina ciliata, petalis acutis. *C. B. S.*

longum Haw. 50. M. foliis linguaeformibus elongatis apice oblique acutis, pedunculis elongatis, calycis carina glabra, petalis acutis. *C. B. S.*

praepingue Haw. 51. M. foliis linguaeformibus, junioribus ciliato-pubefcentibus, flore fubfeffili, carina calycis ciliata, petalis emarginatis. *C. B. S.*

depreffum Haw. 52. M. foliis linguaeformibus obtufis humo arcte appreffis glaucefcentibus. *C. B. S.*

anguftum Haw. 53. M. foliis lineari-linguaeformibus femicylindricis longiffimis. *C. B. S.*

afcendens Haw. 54. M. foliis late linguaeformibus obtufiffimis fubtruncatis afcendentibus viridibus, floribus pedunculatis. *Afr. auftr.*

rufescens Haw. 55. M. foliis linguaeformibus obtusis arctissime imbricatis reclinatis rufescentibus apice incurvis, floribus sessilibus, petalis latissimis. *Afr. austr.*

Salmii Haw. 56. M. foliis lineari-linguaeformibus semiteretibus altero apice crassioribus apice oblique dentatis, *C. B. S.*

medium Haw. 57. M. foliis latissimis linguaeformibus reclinatis, pedunculis elongatis. *Afric. austr.* Burchell.

latum Haw. 58. M. foliis late linguaeformibus obtusissimis, humo appressis viridissimis, floribus subsessilibus. *Afr. austr.*

pustulatum Haw. 59. M. foliis linguaeformibus ascendentibus basi pustulatis. *Afric. austr.* Burchell.

ζ. *Ringentia: foliis decussatis subtriquetris apice incrassatis margine dentatis, ciliatis.*

murinum Haw. 60. M. foliis basi semicylindricis attenuatis apice triquetris denticulatis asperis glaucis, floribus sessilibus. *Afric. austr.*

mustelinum Salm. 61. M. foliis patentissimis triquetris supra planis lucidis punctatis ciliato-dentatis apice incrassatis. *Afric. austr.* (M. magnipunctatum Haw.)

felinum Lam. 62. M. foliis oblongis subtus convexis punctatis glaucis apice integerrimis margine ciliato-spinulosis. *Afric. austr.*

tigrinum Haw. 63. M. foliis oblongis subtus convexis glaucescentibus maculatis margine longissime ciliatis. *Afric. austr.*

caninum Haw. 64. M. foliis oblongis apice dilatatis triquetris epunctatis, angulis binis obtuse dentatis, floribus longe pedunculatis. *Afric. austr.*

vulpinum Haw. 65. M. subcaulescens, foliis elongatis glaucescentibus triquetris, angulis obsolete denticulatis, floribus longe pedunculatis. *Afric. austr.*

η. *Rostrata, foliis semiteretibus s. subtriquetris, apice mucronatis vel rostratis.*

albidum 66. M. foliis triquetro-ensiformibus integerrimis albidis obtusis mucronatis, pedunculo diphyllo elongato. *Afric. austr.*

canum Haw. 67. M. foliis triquetris compressis canescentibus basi attenuatis apice gibboso-carinatis mucronatis. *Afric. austr.*

aloides Haw. 68. M. foliis patentissimis rigidis semiteretibus acutis apice triquetris calloso-punctatis. *Afr. austr.* Burchell.

denticulatum Haw. 69. M. foliis triquetris compressis glaucis apice dilatato-carinatis subdenticulatis rostratis. *C. B. S.*

bellidiflorum 70. M. foliis triquetris viridibus apice dilatatis trifariam denticulatis mucronatis. *C. B. S.*

subulatum Haw. 71. M. foliis triquetris subulatis dorso superne serratis, pedunculis elongatis. *C. B. S.* (M. bellidiflorum Cand.)

subrostratum W. 72. M. foliis semicylindricis connatis apice 3gonis acutiusculis interne tenuissime tuberculosis. *C. B. S.* (M. rostratoides et acutum Haw.)

roſtratum 73. M. foliis ſemicylindricis elongatis acutis glaucis apice 3gonis externe tuberculatis, bracteis pedunculum ſuperantibus. *C. B. S.*

bibracteatum Haw. 74. M. ſubacaule ramoſum, foliis ſemiteretibus elongatis ſubulatis punctatis glaucis, bracteis quaternis pedunculo brevioribus. *C. B. S.*

bifidum Haw. 75. M. ſubacaule, foliis tereti-ſubulatis glaucis punctatis, calyce 2-4fido. *C. B. S.*

quadrifidum Haw. 76. M. ſubacaule, foliis teretibus obtuſis glaucis obſolete punctatis, calyce 4fido. *C. B. S.*

robuſtum Haw. 77. M. ſubacaule, foliis teretibus obtuſis punctatis baſi interiore gibboſo-puſtulatis. *C. B. S.*

† *diminutum* Haw. 78. M. ſubacaule, foliis lineari-ſubtriquetris ſubulatis. *C. B. S.* (M. cauliculatum Haw.)

ϑ. Calamiformia: foliis teretibus.

calamiforme 79. M. foliis teretibus glaucis punctatis ſurſum curvatis apice mucronatis laeviſſimis baſi ſupra planis. *C. B. S.*

obſubulatum Haw. 80. M. foliis ſubclavatis teretibus obtuſis punctatis viridibus. *C. B. S.*

teretiusculum Haw. 81. M. foliis ſubtrigono-teretibus craſſis elongatis viridibus punctatis. *C. B. S.* (M. punctatum et teretifolium Haw.)

cylindricum Haw. 82. M. foliis trigono-teretibus elongatis glaucis punctatis, pedunculo terminali ſolitario. *C. B. S.*

†† Caulescentia ſ. ſuffruticoſa.

α. Difformia: forma foliorum definitu difficilis.

difforme 83. M. foliis ſubtriquetro-ſemiteretibus ſubdentatis punctatis, altero minori. *C. B. S.*

ſemicylindricum Haw. 84. M. foliis ſemiteretibus apice dilatatis medio utrinque 1dentatis, caule aſcendente ramoſo. *C. B. S.* (M. bidentatum Haw.)

heterophyllum Haw. 85. M. foliis viridibus epunctatis, inferioribus triquetris compreſſis apice gibboſis mucronatis, ſuperioribus ſemiteretibus ſubdentatis, altero minori. *C. B. S.*

taurinum Haw. 86. M. foliis 2fariis oblique cruciatis ſemiteretibus craſſis obtuſis incurvatis luteſcenti-viridibus, calyce 2fido ſcarioſo. *Afric. auſtr.*

cruciatum Haw. 87. M. foliis lineari-linguaeformibus ſemicylindricis molliſſimis cruciatis. *C. B. S.*

dolabriforme 88. M. foliis glauceſcentibus punctatis baſi tereti-compreſſis apice dilatatis breviter acinaciformibus. *C. B. S.*

β. Planifolia.

cordifolium 89. M. foliis petiolatis cordato-ovatis papuloſo-punctatis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus rubris. *Afr. auſtr.*

pallens Ait. 90. M. foliis faſciculatis amplexicaulibus oblongo-lanceolatis acutis carinatis papuloſis, floribus axil-

laribus pedunculatis albis. *C. B. S.* (M. expansum Cand.)

relaxatum W. 91. M. foliis lineari-lanceolatis subconnatis, junioribus semiteretibus, laciniis calycis duabus latioribus, petalis rubris. *Afr. austr.*

tortuosum 92. M. caule divaricato laxo procumbente, foliis confertis ovato-lanceolatis connatis subpapulosis, floribus argenteis, calycibus 3sepalis 2cornibus. *Afric. austr.*

varians Haw. 93. M. foliis lanceolatis acuminatis carinatis subtrigonis, pedunculis crassissimis. *Afr. austr.*

anatomicum Haw. 94. M. foliis elliptico-lanceolatis pellucido-papulosis, caule filiformi, petalis staminibusque argenteis. *C. B. S.*

expansum 95. M. caule divaricato laxo decumbente, foliis remotis ovato-lanceolatis distinctis, floribus flavis, calycibus inaequaliter 5partitis. *Afric. austr.* (M. tortuosum Cand.)

protractum Link. 96. M. caule erectiusculo pedunculisque hirsutis, foliis lanceolatis acuminatis distinctis laevibus ciliatis, floribus flavis. *Afric. austr.*

humifusum Ait. 97. M. caule prostrato, foliis amplexicaulibus spathulatis carinatis, papulis conicis scabris, petalis minutissimis albis. *C. B. S.*

emarcidum Thunb. 98. M. caule erectiusculo glabro, foliis connatis ovatis acutis, floribus pedunculatis subternis albis. *Afric. austr.*

articulatum Thunb. 99. M. caule erecto ramosissimo, ramis asperis secundis, foliis connatis lineari-lanceolatis subtus convexis, floribus sessilibus. *Afric. austr.*

micranthon Haw. 100. M. foliis lineari-lanceolatis distinctis carinatis epunctatis, floribus pedunculatis, laciniis calycis duabus longissimis. *Afr. austr.* (M. parviflorum Jacqu.)

γ. Hemistrongyla; foliis semiteretibus.

junceum Haw. 101. M. ramis virgatis subdichotomis, foliis remotis semiteretibus subulatis, calycibus inaequaliter 4fidis. *Afric. austr.*

canaliculatum Haw. 102. M. caule repente suffruticoso, ramis laxis decumbentibus, foliis semiteretibus canaliculatis obtusis patentibus elongatis papulosis. *Afric. austr.* (M. repens Salm.)

fastigiatum Haw. 103. M. foliis confertis semiteretibus subulatis flexuoso-reflexis glaucis, caule gracili declinato, laciniis calycis aequalibus. *Afric. austr.*

Haworthii W. 104. M. foliis semiteretibus acutiusculis punctatis glaucescentibus connatis, pedunculo incrassato terminali, petalis emarginatis rubris. *Afr. austr.*

elegans Jacqu. 105. M. foliis confertis 3gono-semiteretibus obtusis glaucis asperis, floribus pedunculatis roseis. *C. B. S.*

puniceum Jacqu. 106. M. foliis semiteretibus punctatis distinctis glabris internodio brevioribus, floribus longe pedunculatis. *C. B. S.*

tenuifolium 107. M. foliis ſemiteretibus ſubcompreſſis ſubulatis viridibus glabris internodio longioribus, caule procumbente, floribus longe pedunculatis coccineis. *Afric. auſtr.*

longiſtylum Cand. 108. M. foliis ſemiteretibus obtuſiuſculis patentibus glabris internodia aequantibus, caule erecto ſuffruticoſo, floribus terminalibus albis, ſtylis elongatis. *Afric. auſtr.* (M. pallens Jacqu.)

filicaule Haw. 109. M. foliis confertiſſimis ſemiteretibus acuminatis, floribus rubellis, caule filiformi reptante. *Africa auſtr.*

curvifolium Haw 110. M. foliis ſemiteretibus compreſſis ſubulatis incurvo-recurvis, ramulis decumbentibus aſperis angulato-compreſſis, floribus puniceis. *Afric. auſtr.* (M. ceratophyllum W.)

flexifolium Haw. 111. M. foliis ſemitereti-ſub3gonis ſubulatis incurvo-recurvis flexuoſis viridibus, ramis effuſis filiformibus compreſſis. *Afric. auſtr.*

teſtaceum Haw. 112. M. foliis ſemiteretibus papuloſo-micantibus, caule ſuffruticoſo, floribus teſtaceis. *Afric. auſtr.* Burchell.

violaceum Cand. 113. M. foliis ſemiteretibus acutis ſubreflexis glaucis ſcabris, ramis deflexis, floribus terminalibus longe pedunculatis violaceis. *Afric. auſtr.* (M. deflexum Haw.)

inflexum Haw. 114. M. foliis ſemiteretibus ſub-3gonis compreſſiuſculis glaucescentibus laevibus falcato-inflexis confertis. *Afric. auſtr.*

flexuoſum Haw. 115. M. foliis ſemiteretibus viridibus flexuoſo-recurvis, ramis gracilibus lucidis, laciniis calycis digitiformibus. *C. B. S.*

ſplendens 116. M. foliis ſemiteretibus confertis flexuoſo-recurvis, caule radicante, laciniis calycis digitiformibus. *C. B. S.*

reflexum Haw. 117. M. foliis ſemiteretibus obtuſis glaucis flexuoſo-reflexis, laciniis calycinis inaequalibus. *C. B. S.*

ciliatum Ait. 118. M. foliis ſemiteretibus connatis, ſtipulis membranaceis reflexis laceris ciliaceis. *C. B. S.*

noctiflorum 119. M. foliis ſemiteretibus glaucis epunctatis remotis obtuſis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus clavatis. *C. B. S.* (M. ſtramineum et horizontale Haw.)

geniculiflorum 120 M. foliis ſemiteretibus obtuſis papuloſis remotis, ramis divaricatis, floribus ſeſſilibus axillaribus. *C. B. S.*

villoſum 121. M. foliis ſemiteretibus canaliculatis pubeſcentibus, caule proſtrato piloſo. *Afric. auſtr.*

nitidum Haw. 122. M. foliis ſemiteretibus papuloſis, ramis gracilibus diffuſis, pedunculis dichotomis. *C. B. S.* (M. pruinoſum Thunb.)

ſpinuliferum Haw. 123. M. foliis ſemiteretibus confertis canaliculatis, emarcidis ſpineſcentibus, ramis erectis incraſſatis. *C. B. S.* (M. ſordidum Cand.)

anomalum W. 124. M. foliis ſemiteretibus connatis pellucido-punctatis ſubmucronatis, floribus umbellatis apetalis, calycibus membranaceis. *C. B. S.*

δ. *Macrophylla, foliis confertis elongatis, floribus subluteis.*

loreum 125. M. foliis confertis 3gono-semiteretibus elongatis glaucis glaberrimis basi interiore gibbis connatis, caule pendulo. *C. B. S.*

corniculatum 126. M. foliis subconfertis 3gono-semiteretibus elongatis glaucis punctato-scabris linea elevata basilari connatis, caule angulato nodoso. *C. B. S.*

diversifolium Haw. 127. M. foliis confertis 3gono-semiteretibus longissimis subrecurvis viridibus, caule angulato robusto. *C. B. S.*

dubium Haw. 128. M. foliis subconfertis longiusculis 3gono-semiteretibus ascendentibus viridibus, caule teretiusculo. *C. B. S.*

elongatum Haw. 129. M. radice tuberosa, caule decumbente, foliis confertis 3gono-semiteretibus elongatis flexuosis glabris, floribus pedunculatis, petalis flavis elongatis acuminatis, stylis numerosis. *C. B. S.*

capitatum Haw. 130. M. foliis triquetris elongatis glaucis terminalibus confertis, ramis procumbentibus, laciniis calycis petala superantibus. *C. B. S.*

pugioniforme 131. M. foliis 3gonis elongatis glaucis alternis confertis, ramis procumbentibus, caule subbienni, laciniis calycis petala superantibus. *C. B. S.*

brevicaule Haw. 132. M. foliis triquetris strictis viridibus laevissimis patulis, caule humili. *Afric. austr.* Burchell.

ε. *Strongylodea: erecta, foliis teretibus,*

αα. *foliis glabris.*

patens W. 133. M. foliis teretiusculis acutis connatis punctatis, ramis patentibus, floribus solitariis terminalibus albis. *C. B. S.*

foliosum Haw. 134. M. foliis confertis connatis teretiusculis obtusis recurvo-mucronulatis laevibus glaucescentibus, vaginis apice incrassatis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.* (M. tumidulum Haw.)

tetragonum Thunb. 135. M. foliis teretibus connatis obtusissimis inflexis, caule 4gono, floribus terminalibus pedunculatis luteis. *Africa austr.*

decussatum Thunb. 136. M. foliis teretiusculis connatis obtusis, ramis fastigiatis trichotomis, floribus pedunculatis albis. *Afric. austr.*

maculatum Haw. 137. M. foliis teretiusculis compressis obtusis remotis, caule erecto maculato. *Afric. austr.*

spinosum 138. M. foliis teretiusculis distinctis punctatis, ramis 3acanthis, floribus rubris. *C. B. S.*

fasciculatum Thunb. 139. M. foliis teretiusculis connatis obtusis, caule articulato radicante, floribus terminalibus pedunculatis albis. *C. B. S.*

corallinum Thunb. 140. M. foliis teretibus distinctis obtusis incurvis, caule ramosissimo, floribus terminalibus sessilibus albis. *Afric. austr.*

cornutum Salm. 141. M. foliis teretibuus mucronatis connatis incurvis glaberrimis viridibus, ramis deflexis. *C. B. S.*

ſtramineum W. 142. M. foliis teretibus obtuſis elongatis punctatis viridibus, caule procumbente angulato, floribus tricoloribus polygynis. *Afric. auſtr.* (M. tricolor Haw.)

laeve Ait. 143. M. foliis confertis teretibus obtuſis arcuatis glaucis, laciniis calycis oblongis obtuſis. *C. B. S.*

purpureo-croceum Haw. 144. M. foliis confertis teretiusculis obtuſis glaucis, laciniis calycis inaequalibus. *C. B. S.*

verruculatum 145. M. foliis faſciculatis teretiusculis acutis glaucis incurvis, floribus corymboſis flavis. *C. B. S.*

clavatum Jacqu. 146. M. foliis teretiusculis diſtinctis, pedunculis terminalibus aggregatis clavatis, floribus albis. *C. B. S.*

ββ. Foliis ſcabris, papuloſis, hiſpidis.

umbellatum 147. M. foliis teretiusculis acutis glaucis connatis ſcabro-punctatis recurvis, vaginis apice tumidis, floribus umbellatis albis. *C. B. S.*

umbelliflorum Jacqu. 148. M. foliis teretiusculis papuloſis diſtinctis, ramulis unifloris, floribus incarnatis. *C. B. S.*

pulverulentum Haw. 149. M. foliis teretiusculis obtuſis pulverulento-ſcabris, calyce 6fido, floribus rubris. *C. B. S.*

tenuiflorum Jacqu. 150. M. foliis teretiusculis obtuſis canaliculatis pellucido-papuloſis, ramis diffuſis flaccidis, floribus rubris. *C. B. S.*

viridiflorum Ait. 151. M. foliis teretiusculis papuloſo-piloſis, pedunculis lateralibus 1floris calycibusque hirſutis, floribus virentibus. *C. B. S.*

groſſum Ait. 152. M. foliis teretiusculis confertis papuloſis utrinque ſulcatis, ramis diffuſis, floribus luteis, caule baſi incraſſato. *C. B. S.*

incomtum Haw. 153. M. foliis teretiusculis confertiſſimis papuloſis viridibus, floribus terminalibus ſubumbellatis albis. *Afric. auſtr.* Burchell.

micans 154. M. foliis teretiusculis obtuſiusculis ſubrecurvis papuloſis, ramis aſperis, floribus croceis, filamentis nigris. *Afric. auſtr.*

ſpecioſum Haw. 155. M. foliis teretiusculis ſubulatis incurvis papuloſis, calycibus obtuſis, floribus ſaturrime coccineis. *C. B. S.*

brevifolium Ait. 156. M. foliis teretibus obtuſiſſimis papuloſis patentibus, ramis effuſis, ſtaminibus expanſis purpuraſcentibus. *C. B. S.*

ramuloſum 157. M. foliis teretibus obtuſis punctatis baſi interiore puſtulato-gibboſis, ſenioribus expanſis, caule proſtrato ramoſo. *C. B. S.*

hiſpidum 158. M. foliis teretibus obtuſis calycibusque glabris obconicis papuloſis, ſtaminibus piſtilla ſuperantibus, ramis hiſpidis. *C. B. S.*

floribundum Haw. 159. M. foliis teretibus obtuſis papuloſis, calycibus hemiſphaericis papuloſo-piloſis, piſtillis ſtamina ſuperantibus, ramis hiſpidis. *C. B. S. Inſ. Canar.* (M. hiſpidum β. W.)

hirtellum Haw. 160. M. foliis teretibus obtuſiſſimis papuloſo-echinatis, calycibus turbinatis papuloſo-hirſutis, ſta-

minibus ſtylos aequantibus. *C. B. S.* (M. pilifolium et hiſpifolium Haw., tuberculatum Cand.)

ſtriatum Haw. 161. M. foliis teretibus obtuſis papuloſis ſubincurvis faſciculatis, calycibus lanatis, ſtaminibus ſtylos aequantibus. *C. B. S.* (M. hiſpidum γ. L.)

brachiatum Haw. 162. M. foliis teretiusculis acutis erecto-patulis papuloſis, ramis ſtrictis trichotomis, laciniis calycis binis foliaceis elongatis, floribus luteis. *Afric. auſtr.*

echinatum 163. M. foliis teretiusculis oblongo-ovatis papuloſis echinatis, laciniis calycis inaequalibus foliaceis. *C. B. S.*

γγ. Foliis apice barbatis.

barbatum 164. M. procumbens, ramis gracilibus nudis, foliis ſemierectis oblongis remotis papuloſis, barba apicis 5radiata, laciniis calycis inaequalibus. *Afric. auſtr.*

ſtelligerum Haw. 165. M. erectiusculum, ramis gracilibus nudis, foliis ſubhorizontalibus oblongis remotiusculis papuloſis, barba apicis 6radiata, laciniis calycis aequalibus. *C. B. S.*

denſum Haw. 166. M. ſubacaule, foliis denſiſſime caeſpitoſis ſemiteretibus papuloſis baſi ſubciliatis, barba apicis multiradiata, pedunculis calycibusque 6fidis hirſutiſſimis. *C. B. S.* (M. barbatum γ. W.)

hirſutum Haw. 167. M. ſubacaule, foliis caeſpitoſis canis ſemiteretibus papuloſo-ſcabris, barba apicis multiradiata, ramulis craſſis, pedunculis calycibusque ſub-6fidis hirſutis. *C. B. S.* (M. barbatum β. W.)

ζ. Trigonoidea: foliis ſubtrigonis.

ſtipulaceum 168. M. foliis ſub-3gonis acutis laevibus glaucis pellucido-punctatis incurvis baſi marginatis, floribus terminalibus ſolitariis rubris. *C. B. S.*

variabile Haw. 169. M. foliis 3gonis compreſſis glaucis, caule decumbente, floribus verſicoloribus flavis demum rubris. *C. B. S.*

inaequale Haw. 170. M. foliis 3gonis viridibus, ramis decumbentibus, pedunculis fructiferis compreſſo-clavatis, laciniis calycis inaequalibus. *C. B. S.*

bicolor 171. M. foliis 3gonis acutis viridibus, ramis erectis, pedunculis calycibusque ſubaequalibus ſcabris, floribus intus luteis. *C. B. S.*

coccineum Haw. 172. M. foliis 3gonis obtuſis glauceſcentibus, pedunculis baſi laevibus, floribus coccineis. *C. B. S.*

aureum Ait. 173. M. foliis 3gonis mucronatis glaucis punctatis, floribus croceis, ſtylis atropurpureis. *C. B. S.*

aurantium Haw. 174. M. foliis 3gono-compreſſis glaucis, bracteis ſemiteretibus, laciniis calycis oblongo-ovatis, floribus aurantiacis. *C. B. S.* (M. croceum Jacqu.?)

tuberoſum 175. M. foliis 3gono-compreſſis ſubpapuloſis patentiſſimis apice recurvis, radice ampla tuberoſa, floribus terminalibus congeſtis puniceis. *C. B. S.*

clavellatum Haw. 176. M. foliis clavato-trigonis obtuſiſſimis mucronulatis viridibus, ramis decumbentibus, floribus puniceis. *Nov. Holl.*

molle Ait. 177. M. foliis 3gonis turgidis obtuſis caneſcentibus, marginibus lineato-punctatis, ramis ancipitibus decumbentibus. *C. B. S.*

trichotomum Thunb. 178 M. foliis connatis 3gonis obtuſis laevibus, ramis trichotomis, floribus ſeſſilibus. *C. B. S.*

ſeſſile Thunb. 179. M. foliis 3gono-globoſis gibbis connatis, floribus terminalibus ſeſſilibus rubris. *C. B. S.*

η. *Oxygonia: foliis triquetris.*

glaucum 180. M. foliis triquetris acutis compreſſis glaucis aſpero-punctatis, laciniis calycis cordato-ovatis, floribus ſulfureis. *C. B. S.*

ſcabrum 181. M. foliis triquetris viridibus aſperis, angulo inferiori muricato, laciniis calycis ovato-acuminatis, floribus lilacinis. *C. B. S.*

retroflexum Haw. 182. M. foliis triquetris glaucis ſcabris, calycibus retroflexis, floribus rubicundis. *C. B. S.*

verſicolor Haw. 183. M. foliis triquetris glaucis verrucoſo-aſperis, laciniis calycis apice ſub-2dentatis, floribus ſubverſicoloribus rubris. *C. B. S.*

emarginatum 184. M. foliis triquetris glaucis ſcabris, calycibus dorſo ſpinoſis, petalis lilacinis denticulatis. *Afric. auſtr.* (M. roſeum W.)

Milleri W. 185. M. foliis triquetris connatis acutis punctatis, pedunculis clavatis, floribus violaceis. *C. B. S.*

imbricans Haw. 186. M. foliis ſubtriquetris compreſſis albidis glabris, terminalibus imbricatis. *C. B. S.*

polyanthes Haw. 187. M. foliis abbreviatis ſubtriquetris mucronatis glaucis ſcabris, ramis rectis dumoſis, floribus paniculatis confertiſſimis lilacinis. *C. B. S.*

glomeratum 188. M. foliis triquetris compreſſis glaucis incurvis punctatis, ramulis filiformibus pedunculisque compreſſis erectis. *Afric. auſtr.*

compreſſum Haw. 189. M. foliis triquetris glauceſcentibus aſperis, pedunculis compreſſis bracteatis, floribus puniceis. *C. B. S.*

inſiticium W. 190. M. foliis triquetris obtuſis connatis glaucis epunctatis, pedunculis compreſſis nudis, calycibus 2cornibus, floribus intus croceis. *C. B. S.*

pulchellum W. 191. M. foliis triquetris connatis pellucido-punctatis mucronatis, carina ſub apice ciliata, caule ancipiti decumbente, floribus lilacinis. *C. B. S.*

microphyllum Haw. 192. M. foliis triquetris acuminato-cuſpidatis punctatis viridibus baſi intus puſtulatis, ramulis confertiſſimis, floribus rubellis. *C. B. S.*

mucronatum Haw. 193. M. foliis triquetris mucronato-ariſtatis glauceſcentibus, ramis confertis. *C. B. S.*

† *graniforme* Haw. 194. M. foliis ſubtriquetris ovatis graniformibus diſtinctis, floribus luteis. *C. B. S.* (Bradley ſucc. 2. t. 20.)

auſtrale Ait. 195. M. foliis triquetris laevibus glaucis punctulatis, caule reptante ſemitereti, pedunculis ancipitibus,

floribus rubris. *Nov. Zeeland.* (M. demiſſum W. ſuppl.)

chinenſe Molin. 196. M. foliis triquetris ſemiamplexicaulibus, caule procumbente, floribus purpureis. *Chili.*

ſarmentoſum Haw. 197. M. ſarmentis radicantibus, foliis confertis triquetris punctatis glaberrimis, pedunculis ternatis 2bracteatis clavatis, floribus rubris. *Nov. Holl.*

recurvum Haw. 198. M. foliis triquetris recurvis glauceſcentibus punctatis, angulis ſerrulatis aſperis. *C. B. S.*?

laxum W. 199. M. foliis triquetris connatis tuberculato-punctatis margine carinaque tenuiſſime denticulatis, caule laxo diffuſo, ramis junioribus compreſſo-teretibus, adultioribus angulatis. *C. B. S.*

craſſifolium 200. M. foliis triquetris laevibus viridibus epunctatis baſi ſemiteretibus, floribus puniceis, caule humili reptante. *Afric. auſtr.*

reptans Ait. 201. M. foliis triquetris acutis glaucis pellucido-punctatis ſcabris, floribus rubris, caule filiformi reptante. *C. B. S.*

ſtrictum Haw. 202. M. foliis triquetris obtuſis expanſis glauceſcentibus groſſe punctatis, caule ſtricto lignoſo ramoſiſſimo. *C. B. S.*

blandum Haw. 203. M. foliis triquetris erectis glaucis apice fuſco-mucronatis, petalis carneis emarginatis. *Afric. auſtr.* Burchell.

cymbiforme Haw. 204. M. foliis triquetris cymbiformibus patentibus glaucis, ramis filiformibus erectis. *C. B. S.*

ſpectabile Haw. 205. M. foliis triquetris elongatis acutis glaucis laevibus, caule aſcendente, floribus coccineo-purpureis. *C. B. S.*

conſpicuum Haw. 206. M. foliis triquetris mucronatis glaberrimis viridibus, floribus paniculatis ruberrimis. *C. B. S.*

virgatum Haw. 207. M. foliis triquetro-compreſſis acutis glauceſcentibus remotis, ramis virgatis elongatis. *C. B. S.*

ϑ. *Oncinophylla: foliis ſubtriquetris apice aduncis.*

bracteatum 208. M. foliis compreſſo-triquetris apice recurvo-aduncis viridibus aſperiuſculis, bracteis quaternis carinatis calycem obvallantibus, ramis fuſcis ſcabris, floribus baſi albis. *C. B. S.*

radiatum Haw. 209. M. foliis compreſſo-triquetris apice recurvis glaucis aſperis, bracteis late ovatis pedunculos amplectentibus, ramis caneſcentibus, floribus rubris. *C. B. S.*

geminatum Haw. 210. M. foliis longe connatis triquetris glaucis laevibus margine cartilagineis apice aduncis, ramulis dichotomis. *Afric. auſtr.*

perfoliatum Haw. 211. M. foliis longe connatis triquetris glaucis cuſpidatis apice ſubtus 3acanthis, floribus purpureis. *C. B. S.* (M. uncinatum β. W.)

uncinatum Haw. 212. M. foliis longe connatis triquetris glaucis recurvo-mucronatis ſubtus ſubdiacanthis. *C. B. S.* (M. uncinatum α. W.)

viride Haw. 213. M. foliis longe connatis triquetris laevibus viridibus apice recurvo-uncinatis. *C. B. S.* (M. ſubaduncum Haw.)

ſemidentatum Salm. 214. M. foliis longe connatis triquetris glaucis punctatis, angulo inferiori recurvo-dentato. *C. B. S.*

multiflorum Haw. 215. M. foliis triquetris connatis glaucis laevibus punctatis remotis apice aduncis, calycibus cylindricis baſi attenuatis. *C. B. S.*

imbricatum Haw. 216. M. foliis triquetris connatis glaucis laevibus punctatis remotis apice aduncis, calycibus turbinatis. *C. B. S.*

vaginatum Haw. 217. M. foliis triquetris connatis viridibus glabris patentibus, angulis ſuperne aſperis, caule decumbente. *C. B. S.*

rigidum Haw. 218. M. foliis triquetris connatis glaucis horizontalibus glabris, angulis ſuperne ſcabris, ramis rigidiſſimis patentibus, floribus paniculatis. *C. B. S.*

parviflorum Haw. 219. M. foliis triquetris connatis glaucis glaberrimis erectis, ramis erectiusculis, floribus paniculatis. *C. B. S.*

tenellum Haw. 220. M. foliis triquetris tenuibus connatis glaucis ſcabris, ramis filiformibus, floribus paniculatis. *C. B. S.*

aduncum Haw. 221. M. foliis ſemiteretibus acuminatis apice recurvis, ramulis erectis confertiſſimis. *C. B. S.*

ſpiniforme Haw. 222. M. ramulis foliisque teretibus ſubulatis ſpiniformibus erectis, apicibus recurvis, pedunculis carinisque bractearum ſcabriusculis. *C. B. S.*

ι. *Acinacophylla: foliis acinaciformibus.*

anceps Haw. 223. M. foliis triquetro-acinaciformibus pellucido-punctatis, lateribus inferne ſubmembranaceis, ramis decumbentibus ancipitibus bruneo-caneſcentibus. *C. B. S.*

ſtellatum Haw. 224. M. foliis triquetro-acinaciformibus glauceſcentibus gracilibus ſcabriusculis, ramis ſtrictiſſimis, bracteis ovatis acutis calycem ſubamplectentibus, floribus rubris. *C. B. S.*

includens Haw. 225. M. foliis acinaciformibus triquetris, carina ſerrata, calycibus ſcabris punctatis. *C. B. S.*

acinaciforme 226. M. foliis acinaciformibus epunctatis connatis, marginibus ſubundulatis ſcabris, petalis lineari-lanceolatis. *C. B. S.* (M. ſubalatum et laevigatum Haw. varr.)

edule 227. M. foliis acinaciformibus ſubaequilateris epunctatis canaliculatis, carina ſerrulata, ramulis ancipitibus. *C. B. S.*

glauceſcens Haw. 228. M. foliis ſubacinaciformibus mucronatis connatis glaberrimis glauceſcentibus, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Afric. auſtr.*

vireſcens Haw. 229. M. foliis ſubacinaciformibus virentibus laevibus, caule proſtrato, pedunculis ſolitariis alatis. *C. B. S.* (M. laevigatum Haw.?)

aequilaterum Haw. 230. M. foliis ſubacinaciformibus laevibus, marginibus cartilagineis integerrimis, caule debili proſtrato, floribus rubris. *C. B. S.*

filamentoſum 231. M. foliis ſubacinaciformibus punctatis confertis margine cartilagineis ſerrulatis, caule proſtrato reptante angulato. *C. B. S.*

forficatum	232. M. foliis acinaciformibus apice ſpinuloſis epunctatis, caule ancipiti, floribus rubris. *C. B. S.*
ſerratum	233. M. foliis ſubacinaciformibus erectis cuſpidatis punctatis, carina retrorſum ſerrata, pedunculis ſolitariis clavatis, laciniis calycis rigidis. *C. B. S.*
rubricaule Haw.	234. M. foliis ſubacinaciformibus marginibus ſerrulatis, ramis coloratis aſperis. *C. B. S.* (M. ſerrulatum et dimidiatum Haw.)
lacerum Haw.	235. M. foliis acinaciformibus connatis carina cartilagineo-dentatis, calycibus 5cornibus. *C. B. S.*
heteropetalon W.	236. M. foliis acinaciformibus ſubfalcatis glaucis confertis, angulis cartilagineis, carina lacera, petalis inaequalibus calyce magno brevioribus. *C. B. S.*
dilatatum Haw.	237. M. foliis acinaciformibus glaucis flexuoſo-recurvis, angulo carinali extra medium ſubdilatato. *C. B. S.* (M. marginatum Haw. ?)
mutabile Haw.	238. M. foliis acinaciformibus diſtinctis punctatis carina cartilagineis integerrimis, ramulis ancipitibus, petalis ſubulatis. *C. B. S.*
incurvum Haw.	239. M. foliis ſubacinaciformibus glaucis utrinque attenuatis, ramulis teretibus gracilibus effuſis. *Afric. auſtr.* (M. confertum Haw. ?)

κ. Drepanophylla: foliis falcatis.

falciforme Haw.	240. M. foliis acinaciformi-falcatis glaucis punctatis craſſis, floribus terminalibus pedunculatis faſtigiatis. *C. B. S.*
decumbens Haw.	241. M. foliis falcatis ſubacinaciformibus glaucis baſi attenuatis punctatis, ramis teretibus, floribus paniculatis. *Afric. auſtr.*
falcatum	242. M. foliis ſubfalcatis minutis glaucis faſciculatis, ramulis numeroſis filiformibus. *C. B. S.*
lunatum W.	243. M. foliis acinaciformi-ſemilunatis ſubconnatis epunctatis confertis ſubpapuloſis, floribus rubris. *C. B. S.*
maximum Haw.	244. M. foliis acinaciformibus ſemilunatis obtuſis ſubconnatis pellucido-punctatis, caule erecto, floribus rubris. *C. B. S.*

λ. Deltoidea: foliis deltoideis.

deltoides Haw.	245. M. foliis deltoideis confertis glaucis, lateribus carinaque dentatis, carina bractearum calycisque laciniis integerrimis. *C. B. S.* (M. deltoides β. W.)
muricatum Haw.	246. M. foliis deltoideis confertiſſimis, lateribus, carina foliorum calycibusque denticulatis. *C. B. S.* (M. deltoides α. W.)
cauleſcens Haw.	247. M. foliis deltoideis confertis glaucis, lateribus denticulatis, carina integerrima. *C. B. S.* (M. deltoides γ. W.)

1859. TETRAGONIA.

*Fruticosae.

fruticosa 1. T. caule erecto, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus racemosis, fructibus obtuse angulatis. *C. B. S.*

Tetrapteris Haw. 2. T. caule procumbente, foliis lanceolatis subdecurrentibus, fructibus 4alatis. *C. B. S.*

decumbens Mill. 3. T. caule decumbente foliisque obovatis pruinosis, fructibus alatis. *C. B. S.*

**Herbaceae.

hirsuta 4. T. caule procumbente foliisque ovato-oblongis carnosis subvillosis, floribus axillaribus ternis pedunculatis, fructibus angulato-alatis. *C. B. S.* (T. villosa Poir.)

herbacea 5. T. caule decumbente foliisque spathulato-oblongis glabris, pedunculis axillaribus ternis, radice tuberosa crassa. *C. B. S.*

spicata 6. T. caule erecto, foliis inferioribus ovatis superioribus lanceolatis glabris, racemo spicato terminali. *C. B. S.*

echinata Ait. 7. T. caule diffuso foliisque rhombeo-ovatis papulosis, pedunculis axillaribus solitariis, fructibus echinatis. *C. B. S.*

crystallina Herit. 8. T. caule diffuso foliisque ovatis sessilibus papulosis, fructibus axillaribus inermibus. *Peru.*

expansa Ait. 9. T. caule diffuso, foliis ovato-rhombeis papulosis, fructibus axillaribus subsessilibus 4cornibus. *Nov. Zeeland. Ins. Amicorum. Japonia.* (T. halimifolia Forst., japonica Thunb.)

DECA-POLYGYNIA.

1860. DALIBARDA L. Mx.

repens L. Poir. 1. D. stolonibus reptantibus foliisque simplicibus cordatis crenatis villosis, pedunculis unifloris. *Amer. bor.* (D. violaeoides Mx., Rubus Dalibardae L. W.)

geoides Pers. 2. D. foliis simplicibus ternatisque obtusis serratis glabris, impari maximo cordato, pedunculis solitariis abbreviatis. *Ad fretum Magellan.* (Rubus geoides Sm.)

fragarioides Mx. 3. D. foliis ternatis, foliolis cuneatis inciso-serratis ciliatis, pedunculis multifloris, calycis tubo obconico. *Amer. bor. Ins. Aleut.* (Dryas trifoliata Pall.)

pedata Steph. 4. D. foliis quinato-pedatis incisis, pedunculis filiformibus medio bracteatis, caule repente. *Ora occid. Amer. bor.* (Rubus pedatus Sm.)

1861. DRYAS.

octopetala — 1. Dr. foliis cordato-oblongis inciſo-crenatis rugoſis ſubtus niveo-tomentoſis, pedunculis unifloris. *Alp. Europ. med. Regio arctica Europ., Aſiae et Amer.*

† *integrifolia* Horn. — 2. Dr. foliis cordato-oblongis integerrimis ſubtus niveo-tomentoſis, pedunculis 1floris. *Grönland. Island. Amer. bor.* (Dr. tenella Pursh.) Ex Inſ. Aleutis collegit Chamiſſo Dryada intermediam utriusque ſpeciei.

1862. RUBUS.

* *Fruticoſi.*

† *Aculeati.*

α. Foliis pinnatis.

pinnatus W. — 1. R. foliis pinnatis 2jugis rugoſo-venoſis duplicato-ſerratis utrinque glabris, nervo medio aculeato, ramis villoſis, aculeis recurvis, pedunculis racemoſis calycibusque villoſis. *C. B. S. Inſ. Helenae.*

roſaefolius Sm. — 2. R. foliis pinnatis 3jugis ſubtus ramisque villoſis, foliolis ovato-lanceolatis acutis duplicato-ſerratis, aculeis ramorum ſparſis recurvis, pedunculis axillaribus ſolitariis. *Inſ. Maſcaren.*

apetalus Poir. — 3. R. foliis pinnatis 3jugis ſubtus albido-tomentoſis, foliolis ovato-oblongis argute ſerratis, ramis ſarmentoſis petiolisque aculeatis, racemis axillaribus pubeſcentibus, floribus apetalis. *Inſ. Maſcaren.* (R. tomentoſus Bory. borbonicus Perſ.)

Commerſonii Poir. — 4. R. foliis pinnatis 3jugis utrinque glabris, foliolis lanceolatis ſerratis, impari ſub-3fido, aculeis ramorum rectis, pedunculis ſubſolitariis, calycibus acutis. *Java.*

laſiocarpus Sm. — 5. R. foliis pinnatis 3jugis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis ovatis acuminatis inciſo-ſerratis, aculeis ramorum confertis recurvis, racemo paucifloro, fructibus denſe lanatis. *Ind. or.* (R. myſorenſis Roth.)

rigidus Sm. — 6. R. foliis pinnatis ſupra glabris ſubtus villoſis, panicula terminali, ramis villoſiſſimis aculeatis. *C. B. S.*

biflorus Buchan. — 7. R. foliis pinnatis ſub-2jugis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis laciniatis, impari maximo trilobo, aculeis ramorum ſparſis rectis, pedunculis geminatis terminalibus 1floris. *Nepal.*

ſanguinolentus Link. — 8. R. foliis pinnatis bijugis glabris maculatis, foliolis lanceolatis acuminatis ſerrulatis, aculeis ramorum ſtrigoſorum confertis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Inſ. Maſcaren.*

fraxinifolius Poir. — 9. R. foliis pinnatis 3jugis utrinque laevibus, foliolis ovatis acuminatis inciſo-ſerratis, ramis glabris teretibus, aculeis raris, paniculae ramis filiformibus. *Java.*

parvifolius 10. R. foliis inferioribus pinnatis ſuperioribus ternatis ſubtus tomentoſis, foliolis obovatis inciſo-lobatis, ramis teretibus pubeſcentibus, aculeis ſparſis recurvis, corymbo terminali, calyce patulo, petalis erectis ſpathulatis. *China. Japon.* (R. 3phyllus Thunb.)

idaeus 11. R. foliis inferioribus pinnatis ſuperioribus ternatis ſupra glabris ſubtus albido-tomentoſis, aculeis rectis, floribus racemoſis, calycibus reflexis. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

β. Foliis quinato-ternatis.

fruticoſus 12. R. foliolis petiolatis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, caule ſuffruticoſo erecto 5angulari, aculeis recurvis, calyce reflexo. *Europ.*, *Afric. et Aſia bor.* (R. affinis Weih., paniculatus Schlechtend.)

floribundus Kunth. 13. R. foliolis longe petiolatis elliptico-oblongis argute ſerratis utrinque appreſſo-pubeſcentibus, ramulis villoſis nervisque foliorum ſubtus aculeatis, panicula terminali. *Quito.*

ſuberectus Anderſ. 14. R. foliis quinato-pedatis ſubcordato-ovatis duplicato-ſerratis ſubtus ſubpubeſcentibus, aculeis deflexis, ramis angulatis glabris, racemis lateralibus calycibusque inermibus piloſis. *Germania. Anglia. Scotia.* (R. neſſenſis Hall., nemoroſus Hayn., faſtigiatus Weih., ſulcatus Veſt.)

corylifolius Sm. 15. R. foliis quinatis ſubtus pubeſcentibus, lateralibus ſeſſilibus, aculeis confertis rectiuſculis, caule teretiuſculo fragili bienni, panicula glanduloſa, calycibus ſubreflexis. *Europ.* (R. bifrons et nutans Veſt., Aſchoffii Weih.)

nitidus Weih. 16. R. foliis quinato-ternatis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, aculeis recurvis caulis obtuſe angulati glabri, calycibus hiſpidulis ſubreflexis. *German. Anglia.*

leucoſtachys Sm. 17. R. foliis quinatis ovato-oblongis acuminatis laciniatis ſubtus hirſutiuſculis, aculeis deflexis, ramis angulatis pubeſcentibus, calycibus glanduloſis reflexis. *German. Anglia.* (R. Wiegmanni Weih.)

rhamnifolius Weih. 18. R. foliis ſubpedatis cordato-orbiculatis acutiuſculis ſubtus hirſutis, aculeis deflexis, ramis angulatis, calyce patente. *German. Anglia.* (R. cordifolius et rubricaulis Weih.)

plicatus Weih. 19. R. foliis quinatis petiolatis parallele venoſis ſubplicatis ſubtus hirſutis, aculeis recurvis, ramis angulatis, calyce reflexo ſubtomentoſo. *Germania. Anglia.*

Sprengelii Weih. 20. R. foliis quinato-ternatis ovato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis ſubtus piloſis, aculeis ſparſis tenuibus reflexis, caule proſtrato teretiuſculo villoſo, panicula corymboſa, calyce patente inermi hirſuto. *Germania.*

Menkii Weih. 21. R. foliis quinato-ternatis ſubcordato-ovatis ſubtus calycibusque reflexis villoſiſſimis, aculeis deflexis, caule villoſo tereti. *Germania.* (R. velutinus Veſt.)

22.

Schlechtendalii Weih. 22. R. foliis quinato-ternatis oblongis acuminatis angulatis ferratis fubtus pubefcentibus, aculeis ramisque deflexis, caule teretiusculo villofo, racemis axillaribus foliofis, calyce inermi reflexo. *Germania.*

tiliaefolius Weih. 23. R. foliis quinato-pedatis fubcordato-ovatis acutis ferrulatis utrinque glabriusculis, aculeis rectiusculis, caule tereti glabro, calycibus tomentofis patentibus. *Germania.*

Schleicheri Weih. 24. R. foliis quinatis oblongis acuminatis inaequaliter ferratis fubtus pubefcentibus, caule angulato aculeatiffimo ramisque villofis, aculeis recurvis, paniculae decompofitae ramis patentiffimis confertiffime aculeatis, calycibus aculeatis reflexis. *Germania.*

horridus Weih. 25. R. foliis quinatis fubrotundis ferratis rugofis fubtus villofis, caule ramisque fubangulatis aculeatiffimis glandulofis, racemis axillaribus, calycibus fructiferis appreffis. *Germania.* (R. ferox Veft.)

villofus Ait. 26. R. foliis quinato-digitatis ovato-oblongis acuminatis ferratis utrinque villofis, petiolis aculeatis, aculeis reflexis, caule hifpido, pedunculis racemofis laxis. *Amer. bor.*

cuneifolius Pursh. 27. R. foliis quinato-digitatis obovatis apice inaequaliter dentatis plicatis bafi revolutis fubtus tomentofis, aculeis fparfis recurvis, ramis petiolis pedunculisque villofis, pedicellis paniculae divaricatis nudiusculis. *Amer. bor.* (R. parvifolius Walt.)

laciniatus W. 28. R. foliis quinato-digitatis fubtus pilofis, foliolis pinnato-incifis, aculeis caulis fubangulati recurvis, calyce reflexo aculeolato, petalis 3lobis. *Patria?*

jamaicenfis 29. R. foliis quinato-ternatis incifo-ferratis fubtus villofo-tomentofis, caule glabriusculo, aculeis recurvis, paniculis terminalibus diffufis. *Ind. occ.*

γ. Foliis ternatis.

caefius 30. R. foliis ternatis fubpubefcentibus, caule repente tereti caefio-pruinofo, aculeis fubrecurvis, calyce erecto glandulofo-pubefcente, petalis obovatis emarginatis. *Europ. Japon.*

tomentofus W. 31. R. foliis ternatis obovatis acutiusculis inaequaliter ferratis fupra pilofis fubtus tomentofis, lateralibus fubincifis, caule angulato, aculeis rectiusculis, calyce villofo reflexo. *Europ. Afia minor.* (R. fanctus Schreb., obtufifolius W., agreftis Kit., canefcens et collinus Cand., argenteus C. C. Gmel., 3phyllus Bellard., hypoleucus Veft.)

glandulofus Bellard. 32. R. foliis fubrotundo-ovatis acuminatis mucronato-ferratis glabris ciliatis, venis fubtus pubefcentibus, caule angulato petiolis pedunculisque glandulofo-hifpidis, aculeis rectiusculis. *Ger-*

mania. *Italia super. Anglia. Transsylvan.* (R. hybridus Vill. Güntheri Weih.)

hirtus Kit. 33. R. foliis ternatis cordato-ovatis acutis inaequaliter serratis hirtis, nervo medio subtus aculeato, aculeis caulis angulati subrecurvis setisque confertis rubicundis, pedunculis inermibus calycibusque glanduloso-pilosis. *Bannatus. Transsylvan.*

† *ulmifolius* Schott. 34. R. foliis ternatis subcordatis ovalibus duplicato-dentatis glabris subtus aculeatis, caule decumbente aculeatissimo. *Hispan.*

occidentalis 35. R. foliis ternatis ovatis acuminatis incisis argute duplicato-serratis subtus tomentosis, petiolis teretibus, caule tereti glabro pruinoso, aculeis recurvis alternis.

hispidus 36. R. foliis ternatis cuneatis incisis inaequaliter dentatis glabriusculis, caule sarmentoso tereti, aculeis recurvis setisque sparsis, racemi pedicellis elongatis setosis, petalis obovatis. *Amer. bor.* (R. trivialis Mx., flagellaris W.)

heterophyllus W. 37. R. foliis ternatis ovato-oblongis acuminatis profunde dentatis glabriusculis, caule procumbente subangulato glabro, aculeis raris recurvis, petiolis pedunculisque racemosis inermibus villosis, calyce tomentoso reflexo, petalis spathulatis. *Nov. Eborac.* (R. villosus Torr.)

bogotensis Kunth. 38. R. foliis ternatis subcordato-ovatis acutis serratis supra pubescentibus subtus incano-hirtis, ramulis petiolisque piloso-glandulosis aculeatis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

nubigena Kunth. 39. R. foliis ternatis ovatis acutis utrinque pubescentibus, ramis petiolisque villosis aculeatis, panicula terminali simplici, calycibus aculeatis, fructibus sericeo-pilosis. *Quito.*

glabratus Kunth. 40. R. foliis ternatis oblongis acutis crenato-serratis utrinque glabris, ramulis petiolisque aculeatis, floribus solitariis, calycibus aculeato-pubescentibus. *Amer. austr.*

ellipticus Sm. 41. R. foliis ternatis ellipticis serrulatis subtus pubescentibus, summis simplicibus sub-3lobis, caule erecto flexuoso hispido, aculeis sparsis recurvis, panicula densa terminali. *Nepal.*

australis Forst. 42. R. foliis ternatis ovalibus subcoriaceis argute dentatis utrinque glabris, caule glabro teretiusculo, aculeis ramorum secundis recurvis, floribus racemosis dioecis, calyce obtuso patente. *Nov. Zeeland.*

roseus Poir. 43. R. foliis ternatis ovato-lanceolatis crenulatis utrinque glabris, nervo medio aculeato, stipulis ovalibus, ramis flexuosis glabris, pedunculis solitariis, petalis calyce glabro minoribus. *Peru.*

urticaefolius Poir. 44. R. foliis ternatis simplicibusque subcordato-oblongis dentatis utrinque sericeo-tomentosis, ramis angulatis setosis, aculeis raris rectiusculis, paniculae ramis hirsutissimis, calyce albido. *Peru.*

δ. *Foliis ſimplicibus.*

moluccanus 45. R. foliis cordato-lobatis acuminatis crenatis ſubtus tomentoſis, paniculis aggregatis axillaribus, bracteis palmatis calycibusque ſericeis. *Inſ. Molucc. Japon.?*

alceaefolius Poir. 46. R. foliis palmato-lobatis argute dentatis ſupra rugoſis ſubtus tomentoſis, ramis angulatis villoſis aculeatis, pedunculis axillaribus aculeatis, bracteis capillari-pinnatifidis, calycibus inflato-globoſis. *Java.*

reflexus Ker. 47. R. foliis cordatis ſub-5lobis crenulatis rugoſis utrinque hiſpidis medio maculatis, lobo medio elongato, ramis teretibus aculeatis hiſpidis, pedunculis axillaribus reflexis paucifloris, bracteis pectinatis. *China auſtr.*

rugoſus Sm. 48. R. foliis cordatis ſub-5lobis crenatis ſupra rugoſis ſubtus reticulatis piloſis, caule ſcandente, ramis teretibus villoſis, aculeis incurvis, racemis axillaribus compactis, bracteis ovatis inciſis, calycibus ſericeis. *Nepal.*

tiliaceus Sm. 49. R. foliis cordato-ſubrotundis obſolete angulatis ſubtus albo-tomentoſis, racemis axillaribus laxis, bracteis laciniatis. *Nepal.*

paniculatus Sm. 50. R. foliis cordatis acutis ſublobatis crenatis ſubtus tomentoſis, pedunculis aculeatis, panicula terminali diffuſa, calycibus acutis. *Nepal.*

microphyllus L. ſuppl. 51. R. foliis cordatis 3fidis inaequaliter dentatis glabris, venis ſubtus pubeſcentibus, ramis teretibus flexuoſis glabris, aculeis ſparſis recurvis, pedunculis ſolitariis, calyce villoſo. *Japon.* (R. palmatus Thb.)

inciſus Thb. 52. R. foliis cordato-ſubrotundis inciſo-ſerratis utrinque glabris, aculeis ſparſis ſubrecurvis, pedunculis ſolitariis glabris. *Japon.*

corchorifolius L. ſuppl. 53. R. foliis cordato-ovatis acutis ſublobatis ſerratis villoſis, nervo medio ſupra aculeato, ramis tomentoſis, aculeis recurvis, pedunculis axillaribus ſolitariis tomentoſis. *Japon.* (R. villoſus Thb.)

elongatus Sm. 54. R. foliis cordatis acuminatis duplicato-crenatis ſubtus tomentoſis, ramis viſcoſo-pubeſcentibus, aculeis ſparſis, paniculae ramis glomeratis, calyce obtuſo. *Java.*

acuminatus Sm. 55. R. foliis ovatis coriaceis nitidis glabris ſerratis, ramis aculeatis glabris, caule ſcandente inermi, panicula racemoſa, petalis calycem verrucoſum aequantibus. *Nepal.*

pyrifolius Sm. 56. R. foliis oblongis acuminatis ſerratis utrinque glabris, ramis flexuoſis, aculeis ſparſis, paniculae ramis corymboſis, bracteis inciſis, petalis calyce minoribus. *Java.*

†† *Inermes.*

ſtrigoſus Mx. 57. R. foliis quinato-ternatis ovatis acuminatis inaequaliter ſerratis ſubtus lineatis candido-to-

mentofis, pedunculis fub-3floris calycibusque hifpidis. *Amer. bor.* (R. penfylvanicus Poir.)

canadenfis 58. R. foliis digitatis denis quinis ternatisque, foliolis lanceolatis argute ferratis utrinque nudis, ftipulis linearibus fubaculeatis, caule purpureo glabriusculo. *Amer. bor.*

inermis W. 59. R. foliis ternatis fubtus albido-tomentofis, foliolis ovatis fubincifis inaequaliter ferratis, ftipulis fubulatis, caule procumbente glauco-tomentofo. *Penfylvan.*

obovalis W. 60. R. foliis ternatis obovato-fubrotundis ferratis nudis, ftipulis fetaceis, caule hifpido, racemis fubcorymbofis paucifloris, bracteis ovatis. *Amer. boreal.*

fpectabilis Pursh. 61. R. foliis ternatis ovatis acutis angulatis inaequaliter duplicato-ferratis fubtus pubefcentibus, petiolis fubaculeatis, ramis flexuofis glaberrimis, pedunculis terminalibus folitariis 1floris, petalis ovatis calyce longioribus. *Ora occid. Amer. bor. Inf. Aleut.* (R. ftenopetalus Choris.)

odoratus 62. R. foliis fimplicibus 5lobis inaequaliter dentatis, venis fubtus pubefcentibus, caule erecto, petiolis pedunculisque glandulofo-pilofis, calycibus appendiculatis. *Amer. bor.*

parviflorus Nutt. 63. R. foliis palmato-lobatis, pedunculis fub-3floris, petalis ovato-oblongis calyce villofo acuminato brevioribus. *Ad lacum Huronum.*

** *Herbacei.*

faxatilis 64. R. flagellis reptantibus, caule obtusangulo, foliis ternatis rhombeis acutis incifo-dentatis nudis, pedunculis fubternis elongatis, petalis linearibus. *Europ. Afia. Amer. bor.*

coriaceus Poir. 65. R. caule erecto fubaculeato, foliis ovato-oblongis ferratis glabris, pedunculis axillaribus aculeatis, petalis crenatis calyce lanceolato brevioribus. *Peru.*

arcticus 66. R. caule fimplici, foliisque ternatis ovatis obtufe dentatis glabris, pedunculis folitariis, petalis obovatis emarginatis. *Europ. bor. Sibir. Amer. bor.*

piftillatus Sm. 67. R. caule 1floro, foliis ternatis argute ferratis glabris, petalis oblongis integris, ftylis approximatis. *Amer. bor.* (R. acaulis Mx.)

radicans Cav. 68. R. caule proftrato farmentofo aculeato, foliis longe petiolatis ternatis orbiculatis fublobatis crenatis utrinque villofis, pedunculis folitariis elongatis, laciniis calycis denticulatis, petalis ovalibus. *Chili.*

Chamaemorus 69. R. caule fimplici 1floro, foliis fimplicibus fubreniformibus rotundo-lobatis plicatis, laciniis calycis oblongis incifis, floribus dioecis. *Europ. bor. Sibir. Amer. bor.*

ftellatus Sm. 70. R. caule erecto 1floro, foliis fimplicibus cordatis 3lobis rugofo-venofis, petalis lanceolatis. *Ora occ. Amer. bor.*

trifidus Thb. 71. R. caule glabro ſimplici, foliis ſimplicibus cordatis 3fidis ſerratis utrinque glabris, pedunculis ſolitariis. *Japon.*

1863. Fragaria.

collina Ehrh. 1. Fr. calyce fructifero erecto connivente, pube foliorum erecta petiolorum patentiſſima, foliis utrinque pubeſcentibus apice conniventi-ſerratis, fructibus duriuſculis. *Europ.*

indica Andr. 2. Fr. laciniis calycis alternis obovatis 3dentatis, pube petiolorum pedunculorumque erecto-patula, foliis dentato-ſerratis. *Nepal.* (Duchesnea fragiformis Sm.)

veſca 3. Fr. calyce fructifero reflexo, pube petiolorum patentiſſima, petiolorum appreſſa. *Europ. Amer. bor. et auſtr.* (Fr. ſemperflorens Hayn.)

elatior Ehrh. 4. Fr. calyce fructifero reflexo, pube pedunculorum petiolorumque patentiſſima. *Patria?*

virginiana Ehrh. 5. Fr. calyce fructifero patente, pube petiolorum erecta, pedunculorum appreſſa, foliis ſupra glabriuſculis. *Amer. bor.*

grandiflora Ehrh. 6. Fr. calyce fructifero erecto, pube petiolorum pedunculorumque erecta, foliis ſupra glabriuſculis. *Surinam.*

chilenſis Molin. 7. Fr. calyce fructifero erecto, pube petiolorum pedunculorumque patentiſſima, foliis ſubcarnoſis utrinque villoſis. *Chili:* (non inſ. Chiloe: Molin. ed. 2. p. 114.)

canadenſis Mx. 8. Fr. calyce fructifero patente, pube petiolorum pedunculorumque patentiſſima, foliis utrinque receptaculisque ſeminum villoſis. *Canada.*

† *monophylla* Duchesn. 9. Fr. calyce fructifero patente dentato, pube petiolorum pedunculorumque erecta, foliis ſimplicibus cordatis. *Patria?*

1864. Potentilla.

* *Foliis pinnatis.*

† *Floribus flavis, luteis.*

α. Caule erecto, ſuberecto.

fruticoſa 1. P. caule fruticoſo, foliis ſub-2jugis oblongo-lanceolatis integerrimis villoſis, ſtipulis ſcarioſis, petalis obovatis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (P. floribunda Pursh., davurica Neſtl., proſtrata Lapeyr.)

penſylvanica 2. P. caule erecto ſtricto, foliis interrupte pinnatis villoſiuſculis ſubtus ſublanatis, foliolis majoribus oblongis truncatis inciſo-ſerratis, minoribus ſubintegerrimis, ſtipulis indiviſis, petalis calycem ſubaequantibus. *Amer. bor. Sibir.* (P. hiſpida Poir.)

viscosa Donn. 3. P. caule erecto stricto foliisque pinnatis viscido-pubescentibus, foliolis lanceolatis inciso-serratis summis confluentibus, stipulis incisis, petalis calycem aequantibus. *Sibiria. Arabia.* (P. hispida Nestl., pensylvanica Horn., dentata Forsk.)

lineata Trevir. 4. P. caule erecto villoso, foliis interrupte pinnatis parallele venosis sericeo-argenteis, foliolis subellipticis serratis, stipulis dentatis, petalis calycem subaequantibus. *Nepal.*

arguta Pursh. 5. P. caule erecto stricto, foliis pinnatis sub-3jugis supra incano-sericeis subtus niveo-lanatis, foliolis oblongis pinnatifidis, laciniis lanceolato-linearibus acutis, stipulis incisis, floribus corymbosis congestis, petalis calyce longioribus. *Louisiana.* (P. missurica Horn. candicans Fisch.)

pimpinelloides 6. P. caule erecto simplici, foliis pinnatis sub-9jugis pilosis, foliolis aequalibus subrotundis obtusis crenatis, stipulis incisis, petalis calycem superantibus. *Armenia.*

cicutarifolia W. 7. P. caule erecto foliisque pinnatis sub-5jugis pilosiusculis, foliolis oblongo-cuneatis profunde dentatis, stipulis ovatis integris, floribus corymbosis. *Asia minor.*

Filipendula W. herb. 8. P. caule erecto villoso, foliis interrupte pinnatis sub-12jugis villosis, foliolis majoribus lanceolatis pinnatifido-serratis, minoribus integerrimis, stipulis incisis, petalis calycem superantibus. *Dauria.*

Sanguisorba W. herb. 9. P. caule erecto foliisque pinnatis sub-4jugis glabris, foliolis obovatis obtuse profundeque serratis, stipulis incisis, petalis calyce subbrevioribus. *Sibiria.*

Sprengeliana Lehm. 10. P. caule simplici erecto paucifloro, foliis pinnatis 3jugis pilosiusculis, foliolis obovatis serratis, extimis majoribus subrotundis, stipulis integerrimis. *Sibir.*

geoides M. B. 11. P. caule erecto, foliis pinnatis sub-3jugis hirsutis, foliolis subrotundis sublobatis inciso-serratis, extimis majoribus, stipulis incisis, calycibus obtusis corollam subaequantibus. *Tauria.*

Heynii Roth. 12. P. caule erecto, foliis pinnatis sub-2jugis sericeo-pilosis, foliolis obovatis inciso-dentatis, extimis minoribus, stipulis lanceolatis integerrimis, petalis calyce acuto duplo brevioribus. *Ind. orient.*

tanacetifolia W. herb. 13. P. caule ascendente foliisque pinnatis sub-5jugis hirsutissimis, foliolis lanceolatis pinnatifido-serratis, stipulis laciniatis, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Sibir.*

sericea 14. P. caule ascendente paucifloro villoso, foliis pinnatis multijugis utrinque tomentosis, foliolis ovatis pinnatifidis, stipulis lanceolatis integerrimis, petalis obcordatis. *Sibir.*

agrimonioides M. B. 15. P. caule ascendente foliisque pinnatis villosis, foliolis ovato-oblongis obtusis pinnatifidis sub-

tus ſericeo-tomentoſis, extimis majoribus, ſtipulis ſubbipartitis, petalis aureis calycem ſubexcedentibus. *Armen. Caucaſ.*

candicans Humb. 16. P. caule aſcendente paucifloro foliisque pinnatis multijugis ſericeis, foliolis inaequalibus profunde pinnatifidis, ſtipulis ſubinciſis, petalis calycem ſuperantibus. *Mexico.*

verticillaris W. 17. P. caule aſcendente villoſo, foliis pinnatis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis linearibus margine revolutis, lateralibus geminatis ſubverticillatis, terminali 3fido, ſtipulis inciſis. *Sibir.* (P. multifida Pall.)

Egedii Wormsk. 18. P. caule humili glaberrimo, foliis pinnatis 5jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acute pinnatifidis, petalis aureis calycem denſe piloſum ſuperantibus. *Grönland.*

bifurca 19. P. caule aſcendente, foliis pinnatis ſub-8jugis ſericeis, foliolis oblongis integerrimis 2fidisque extimis confluentibus, ſtipulis ſubinciſis, petalis calycem ſuperantibus. *Sileſia. Caucaſ. Sibir.*

β. Caule decumbente.

ſupina 20. P. caule decumbente dichotomo pubeſcente, foliis pinnatis 3jugis glabriuſculis, foliolis oblongis obtuſis inciſo-dentatis, ſtipulis ovatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris, fructiferis reflexis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

Dombeyi Neſtl. 21. P. caule decumbente piloſo, foliis pinnatis 2jugis ternatisque piloſis, foliolis obovatis dentatis utrinque piloſiuſculis, ſtipulis oblongis integerrimis, petalis calycem aequantibus. *Chili.*

multifida 22. P. caule decumbente, foliis pinnatis ſub-3jugis, foliolis oblongis pinnatifidis ſubtus lanato-tomentoſis, ſtipulis ovatis ſubintegris, petalis calycem ſubaequantibus. *Helvetia. Suecia. Italia ſuper. Tauria. Sibir.*

fragarioides 23. P. flagellis reptantibus, foliis radicalibus pinnatis ſub-3jugis villoſis, caulinis ternatis ſericeis, foliolis ovatis argute ſerratis, extimis majoribus confluentibus, ſtipulis ſerratis. *Sibir.*

Anſerina 24. P. caule repente, foliis interrupte pinnatis multijugis ſubtus ſericeis, foliolis oblongis argute ſerratis, ſtipulis multifidis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Europ. Aſia. Amer. boreal.*

†† Floribus albis.

rupeſtris 25. P. caule erecto dichotomo, foliis radicalibus pinnatis, caulinis ternatis pubeſcentibus, foliolis ſubrotundis dentatis, ſtipulis indiviſis. *Europ. Sibir.*

Saleſovii W. 26. P. caule ſuffruticoſo erecto, foliis pinnatis ſub-3jugis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis oblongis argute ſerratis, ſtipulis ſubſcarioſis, petalis calyce brevioribus. *Sibir.*

††† *Floribus rubris.*

paluſtris Scop. 27. P. caule aſcendente, foliis pinnatis ſub-2jugis glabris ſubtus glaucis, foliolis lanceolatis argute ſerratis, petalis lanceolatis acutis calyce brevioribus. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (Comarum paluſtre L.)

** *Foliis digitatis.*

† *Floribus flavis, luteis.*

α. *Caule erecto.*

recta 28. P. foliis 7-5natis, foliolis oblongis inciſo-ſerratis patenti-piloſis, petalis pallidis calycem ſuperantibus. *Europ. Caucaſ.* (P. piloſa W., pallens Mönch., ſulfurea Lam.)

obſcura W. 29. P. foliis 7-5natis, foliolis lanceolatis acutis inciſo-ſerratis hirſutis, petalis obcordatis aureis calycem aequantibus. *Italia ſuper. Gallia. Tauria. Sibir.* (P. recta Vill.)

hirta 30. P. foliis 7-5natis cauleque paucifloro hirtis, foliolis ſpathulato-linearibus 3dentatis, petalis aureis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. med. et auſtr. Sibir.* (P. piloſa Vill., anguſtifolia Cand.)

taurica W. herb. 31. P. foliis 5natis ſericeis, foliolis obovato-oblongis apice ſerratis, caule multifloro villoſo, petalis pallidis calyce longioribus. *Tauria. Ad Volgam.* (P. hirta M. B., rupeſtris Falk.)

intermedia 32. P. foliis 7-5-3natis piloſiuſculis, foliolis obovato-oblongis profunde ſerratis, ſtipulis integerrimis, caule erecto diffuſe ramoſo, petalis aureis calycem ſubaequantibus. *Thuringia. Gallia. Scotia. Tauria.* (P. opaca Sm., chryſantha Trev., thuringiaca Bernh., umbroſa Stev.)

pedata W. 33. P. foliis 7-5natis pedatis cauleque ramoſo hirſutis, foliolis lineari-lanceolatis aequaliter ſerrato-ſubpinnatifidis, petalis aureis calycem duplo ſuperantibus. *Italia.* (P. rubens All. piloſa Cand.)

laciniоſa Kit. Neſtl. 34. P. foliis 7-5natis cauleque ſtricto hirtis, foliolis lineari-lanceolatis inaequaliter laciniatis pinnatifidis, petalis luteis calycem duplo ſuperantibus. *Hungar.*

† *diſſecta* Pursh. 35. P. foliis 5natis cauleque erecto ramoſo glabriuſculis, foliolis pinnatifidis, floribus ſubcorymboſis. *Ad ſinum Hudſonis.*

† *virgata* Lehm. 36. P. foliis 9-7-5-3natis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis lanceolatis pinnatifidis, floribus paniculatis, petalis pallidis calyce longioribus. *Patria?*

† *divaricata* Cand. 37. P. foliis 7-5natis ſubpiloſis, foliolis ſpathulato-oblongis profunde ſerratis, corymbi ramis divaricatis, petalis obcordatis calycem aequantibus. *Corſica.*

ranunculoides Humb. 38. P. foliis 7-5-3natis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, foliolis obovatis crenato-dentatis, petalis obcordatis calycem ſuperantibus.

ſtipularis 39. P. foliis 7-5-3natis cauleque ſimplici debili glaberrimis, foliolis oblongo-linearibus apice 3dentatis, ſtipulis dilatatis acuminatis, pedunculis ſubcorymboſis filiformibus, petalis obovatis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

pumila Poir. 40. P. foliis 5natis ſubtus lanatis, foliolis obovato-oblongis inciſis, caule humili erecto pubeſcente, pedunculis 1floris abbreviatis, petalis calycem aequantibus. *Amer. bor.*

β. Caule aſcendente.

aſtracanica Jacq. 41. P. foliis radicalibus 5natis, ſuperioribus 3partitis piloſis, caule dichotomo villoſo, ſtipulis foliaceis amplis inciſis, petalis calycem ſubaequantibus. *Caucaſ. Ad Volgam.*

caneſcens Beſſ. 42. P. foliis quinatis ſubtus incano-lanatis, foliolis ſpathulato-lanceolatis profunde ſerratis, floribus paniculatis, petalis emarginatis calycem ſubaequantibus *Europ. med. Caucaſ. Amer. bor.* (P. aſcendens Kit. W., inclinata Vill., intermedia Wahlenb., recta Jacq. Lam., humifuſa Nuttall.)

argentea 43. P. foliis quinatis margine revolutis ſubtus candide tomentoſis, foliolis lanceolatis baſi attenuatis inciſo-ſerratis, petalis retuſis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (P. impolita Wahlenb., neglecta Baumg.)

calabra Tenor. 44. P. foliis quinatis ſupra incano-ſubtus revolutis candide tomentoſis, foliolis multipartitis, laciniis linearibus, petalis obovatis integerrimis calycem ſubduplo ſuperantibus. *Italia infer. Sicilia.*

Güntheri Pohl. 45. P. foliis inferioribus quinatis ſuperioribus 3partitis, foliolis lanceolatis baſi attenuatis margine planis acute ſerratis ſubtus caneſcentibus, caule diffuſo, petalis emarginatis calycem ſuperantibus. *Sileſia. Bohemia. Suecia auſtr.* (P. ſordida Fries., caneſcens Hartm.)

collina Wib. 46. P. foliis quinatis ternatisque ſubtus caneſcentibus, foliolis obovato-oblongis obtuſe dentatis, petalis ſubretuſis calyce longioribus. *Germania. Suecia auſtr. Italia.* (P. Thomaſii Tenor.)

patula Kit. 47. P. foliis quinatis ternatisque utrinque glabriusculis ciliatis, foliolis cuneatis paucidentatis, caule dichotomo piloſo, petalis retuſis calycem longe ſuperantibus. *Hungar. Transſylvan.*

crocea Lehm. 48. P. foliis quinatis utrinque cauleque hirſutiusculis, foliolis obovatis abbreviatis inciſis obtuſe dentatis, petalis retuſis calyce duplo longioribus. *Europ. alpeſtria.* (P. aurea Sm., filiformis et rubens Vill., pyrenaica et ſabauda Cand., aſcendens et heterophylla Lapeyr., ſalisburgenſis Jacq.)

aurea 49. P. foliis quinatis utrinque ſubtiliſſime margine denſe ſericeis, foliolis obovato-oblongis apice dentatis, petalis retuſis calyce duplo longioribus. *Europ. alpes.*

canadenſis 50. P. foliis quinatis ſupra obſcure ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis obovato-oblongis acute ſerratis, caule aſcendente debili petiolisque molliſſime villoſis, petalis orbiculatis calycem aequantibus. *Amer. bor.*

petraea W. 51. P. foliis quinatis utrinque denſe niveo-ſericeo-tomentoſis, foliolis approximatis rhombeis profunde ſerratis inciſis, petiolis rigidis, petalis ſubrotundis calycem ſuperantibus. *Perſia bor.*

γ. Caule decumbente.

geranioides W. 52. P. foliis quinatis ſubtus albido-villoſis, foliolis cuneiformibus apice ſubpalmatis inciſis, laciniis linearibus obtuſis, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Aſia minor. Armenia.*

Lindackeri Tauſch. 53. P. foliis quinatis ſubtus ſericeis, foliolis cuneiformibus inciſo-dentatis, dentibus oblongis rotundatis, caule filiformi procumbente, petalis calycem ſuperantibus. *Bohemia.*

inciſa Desf. 54. P. foliis quinato-ternatis rufo-piloſis, foliolis cuneato-lanceolatis apice inciſo-ſerratis diſtantibus, caule dichotomo decumbente, petalis cuneatis calycem ſuperantibus. *Patria?*

opaca 55. P. foliis 7-5natis utrinque petiolis pedunculisque hirtis, foliolis cuneato-lanceolatis profunde ſerratis, caule filiformi decumbente, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia et Amer. bor.*

verna 56. P. foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis utrinque ſimpliciter piloſis, foliolis obovatis apice profunde ſerratis, caule declinato, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Amer. bor.* (P. ſerotina Vill., ſubacaulis Lapeyr.)

ſubacaulis 57. P. foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis utrinque pube ſtellata incano-tomentoſis, foliolis obovatis obtuſis crenatis, caule decumbente, petalis obcordatis calycem ſubduplo ſuperantibus. *Europ. Aſia bor. et med.* (P. cinerea Chaix. Vill., opaca Vill. Pollich., ovata Poir., verna var. δ. W.)

flagellaris W. herb. 58. P. foliis omnibus quinatis utrinque glabris, foliolis lanceolatis acutis argute ſerratis, ſarmentis filiformibus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris, petalis obovatis integerrimis calycem ſubaequantibus. *Sibir. or.*

ſimplex Mx. 59. P. foliis quinatis ſubtus hirſutiuſculis, foliolis oblongis obtuſiuſculis acute ſerratis, caule procumbente ſarmentoſo hirſuto, petalis rotundatis calycem ſubaequantibus. *Amer. bor.* (P. ſarmentoſa W., caroliniana Poir.)

reptans 60. P. foliis quinatis utrinque piloſiuſculis, foliolis obovatis argute ſerratis, caule ſarmentoſo pro-

ſtrato, pedunculis axillaribus 1floris, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Aſia bor.*

nemoralis Neſtl. 61. P. foliis quinatis ternatisque ſubpedatis ſubtus appreſſe piloſis, foliolis cuneatis acute ſerratis, caule proſtrato filiformi, pedunculis axillaribus 1floris elongatis, floribus ſub-4petalis. *Europ.* (Tormentilla reptans L.)

†† *Floribus albis.*

alba 62. P. foliis quinatis ternatisque ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis oblongis apice conniventi-ſerratis, caule aſcendente paucifloro, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Europ. Caucaſ.*

valderia All. 63. P. foliis 7-5natis rigidiusculis ſubtus incano-tomentoſis, foliolis obovato-oblongis ſerratis, caule erecto, floribus corymboſis congeſtis, petalis calyce lanato brevioribus. *Alp. grai.* (P. lanata Lam.)

lupinoides W. ♄ 64. P. foliis 7-5natis utrinque ſericeo-villoſis, foliolis obovato-oblongis apice conniventi-ſerratis, caule erectiusculo, ſtipulis oblongo-lanceolatis maximis, floribus congeſtis bracteatis, petalis calyce brevioribus. *Delphinat. Pyren.* (P. valderia Vill., nivalis Lapeyr. P. integrifolia Lapeyr. var.)

Cluſiana Jacq. 65. P. foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis utrinque pubeſcentibus, foliolis ovali-cuneiformibus apice conniventi-3dentatis, caule aſcendente paucifloro, petalis amplis calycem ſuperantibus. *Alp. rhaet. noric. carn. Apennin.?* (P. cauleſcens Scop. Bocconi Neſtl.?)

cauleſcens 66. P. foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis utrinque nudis margine piloſis, foliolis oblongis apice conniventi-ſerratis, caule erecto multifloro, ſtipulis lanceolatis ſuperne latioribus, petalis cuneatis calycem ſubaequantibus. *Alp. Europ. auſtr.*

alchemilloides Lapeyr. 67. P. foliis 7-5natis ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis ſubſpathulatis apice conniventi-3dentatis ſubſerratis, caule erecto corymboſo, petalis emarginatis calycem excedentibus. *Pyren.*

††† *Floribus rubris.*

comaroides Humb. 68. P. foliis radicalibus quinatis caulinis ternatis ſubtus incano-ſericeis, foliolis oblongis apice ſub-5dentatis, caule erecto corymboſo, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Nov. Hiſpan.* (P. rubra W. herb.)

*** *Foliis ternatis.*

† *Floribus luteis ſ. flavis.*

α. *Caule erecto ſ. aſcendente.*

Tormentilla Schrank. 69. P. foliis ternatis nitidis glabriusculis, caulinis ſeſſilibus, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis, ſti-

pulis folio proximis incisis, pedunculis axillaribus 1floris, floribus 4petalis. *Europ. Asia bor.* (Tormentilla erecta L., officinalis Sm.)

norvegica 70. P. foliis ternatis (s. subquinatis) petiolatis utrinque pilosis, foliolis oblongis acute serratis, caule erecto dichotome ramoso, pedunculis axillaribus, petalis calyce brevioribus. *Marchia. Lusatia. Scandinavia. Europ. or. Asia med.* (P. dichotoma Mönch., geminiflora Schrank., ruthenica et diffusa W. varr.)

hirsuta Mx. 71. P. foliis ternatis petiolatis hirsutis, foliolis subrotundis inaequaliter obtuse serratis, caule erecto simpli corymboso, petalis calyce brevioribus. *Amer. bor.* (P. monspeliensis L.)

elatior Schlechtend. 72. P. foliis ternatis petiolatis utrinque glabriusculis, foliolis ovalibus acute serratis venosis, petalis obovatis calycem subsuperantibus. *Sibir. ?*

grandiflora 73. P. foliis ternatis pubescentibus, foliolis subrotundo-ovalibus acute dentatis, caule ascendente paucifloro, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Alp. Europ. med. Caucas. Sibir.*

fragiformis W. herb. 74. P foliis ternatis utrinque flavo-villosis, foliolis obovatis obtuse dentatis, caule erecto paucifloro hirsuto, petalis obcordatis calycem excedentibus. *Ins. Aleut.*

villosa Pall. 75. P. foliis ternatis supra sericeis subtus villosissimo-lanatis, foliolis obovatis crenato-serratis, stipulis late lanceolatis, caule ascendente paucifloro, petalis obcordatis calycem duplo excedentibus. *Ins. Aleut. et ora occ. Amer. bor.* (P. lucida Schlechtend.)

velutina Lehm. 76. P. foliis ternatis utrinque incano-villosis subtus reticulatis, foliolis obovatis crenatis, caule ascendente paucifloro, petalis subrotundis calycem subexcedentibus. *Gallia provinc.* (P. subacaulis Cand.)

emarginata Pursh. 77. P. foliis ternatis utrinque hirsutis, foliolis inciso-dentatis, caule ascendente paucifloro, pedunculis elongatis, petalis cuneato-oblongis emarginatis calyce duplo longioribus. *Terra Labrador.*

macrantha Ledeb. 78. P. foliis ternatis subtus albido-villosis, foliolis ovatis apice incisis, caule erecto paucifloro, petalis obcordatis calycem duplo superantibus. *Sibir. orient.*

nivea 79. P. foliis ternatis supra hirsutiusculis subtus niveo-tomentosis, foliolis obovatis margine planis inciso-serratis, caule ascendente paucifloro, petalis obcordatis calycem acutum villosum superantibus. *Alp. Europ. med. et bor.*

leucophylla Pall. 80. P. foliis ternatis supra glabriusculis subtus calycibusque obtusiusculis niveo-tomentosis, foliolis lanceolatis inciso-serratis margine subrevolutis, caule ascendente multifloro, petalis calycem subaequantibus. *Sibir. or.* (P. betonicaefolia Poir. angustifolia W. herb. Lehm.)

uniflora Ledeb. 81. P. foliis ternatis ſupra ſubvilloſis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis obovato-oblongis inciſo-ſerratis, caule 1floro, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Sibir.*

biflora W. herb. 82. P. foliis ternatis pubeſcentibus, foliolis linearibus lateralibus 2- terminali 3partitis ciliatis, caule erecto 2floro. *Sibir. or.*

nana W. herb. 83. P. foliis ternatis utrinque piloſis ſubtus caneſcentibus, foliolis obovato-ſubrotundis obtuſe dentatis, caule humili 1floro, petalis obcordatis calyce triplo longioribus. *Inſ. Aleut.*

Vahliana Lehm. 84. P. foliis ternatis cauleque 1floro hirſutiſſimis ſubtus albo-lanatis, foliolis lateralibus cuneiformibus 3fidis, medio rhombeo, petalis obcordatis calyce duplo longioribus. *Grönland.* (P. hirſuta Vahl. Hornem.)

β. Caule decumbente.

micrantha Ram. 85. P. foliis ternatis ſericeis, foliolis obovatis ſerratis, caule proſtrato hirſuto 1floro, petalis calyce brevioribus. *Pyren. Calabria. Styria.*

frigida Vill. 86. P. foliis ternatis hirſutis, foliolis obovatis crenatis, caule decumbente humili paucifloro, petalis calyce brevioribus. *Alpes ſummae Europ. med.* (P. norvegica All., glacialis Hall. fil.)

Brauneana Hopp. 87. P. foliis ternatis ſubtus pubeſcentibus ciliatis, foliolis obovatis acute dentatis, caule procumbente ſub-1floro, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Alp. noric. rhaet. lepont.* (P. minima Hall. fil., frigida var. *β.* Perſ. Cand.)

†† *Floribus albis aut rubentibus.*

ſpecioſa W. 88. P. foliis ternatis ſupra ſericeis ſubtus niveo-lanatis, foliolis ellipticis ſerratis, caule aſcendente corymboſo, floribus bracteatis, petalis albis ſpathulatis calycem ſubaequantibus. *Creta. Parnaſſus.*

tridentata Soland. 89. P. foliis ternatis coriaceis ſupra glabris ſubtus piloſiuſculis glauceſcentibus, foliolis oblongis baſi attenuatis apice 3dentatis, caule aſcendente corymboſo, petalis albis ſpathulatis calycem ſuperantibus. *Scotia. Grönland. Canada.* (P. retuſa Retz.)

Fragaria Poir. 90. P. foliis ternatis ſubſericeis, foliolis ovalibus acute ſerratis retuſis, caule decumbente 2floro, petalis albis obcordatis calycem aequantibus. *Europ. Caucaſ. Japon.* (Fragaria ſterilis L., Comarum fragarioides W. P. Fragariaſtrum Ehrh., proſtrata Mönch., fragarioides Vill.)

ſplendens Ram. 91. P. foliis ternatis ſupra appreſſe piloſis ſubtus ſubglauco-ſericeis, foliolis ovali-oblongis apice conniventi-ſerratis, caule decumbente radicante paucifloro, petalis calycem ſuperantibus. *Gallia. Pyren.* (P. Vaillantii Neſtl., montana Schrad.)

brevifcapa Veft. 92. P. foliis ternatis fubfericeis, foliolis ovalibus ferratis, fcapo fub-1floro petiolis breviori, petalis albis obcordatis calycem aequantibus. *Styria.*

Gunneri Hartm. 93. P. foliis ternatis fubtus albido-tomentofis, foliolis obovato-fubrotundis acute ferratis, fcapo fub-1floro folia fuperante, petalis albis integerrimis calycem fubaequantibus. *Norvegia.* (P. nivea Gunner.)

nitida 94. P. foliis ternatis utrinque argenteo-fericeis, foliolis obovatis apice 3dentatis, caule afcendente fub-1floro, petalis rofeis obovatis calycem fuperantibus. *Alp. Europ. med.* (P. apennina Tenor.)

† *Jamefoniana* Grev. 95. P. foliis ternatis utrinque fericeis, foliolis apice incifis, lateralibus 3- medio 5fido, caule fimplici fub-2floro. *Inf. Waigats maris Baffini.* (70° l. bor.)

1865. GEUM.

* *Foliis radicalibus lyrato-pinnatis.*

urbanum 1. G. foliis caulinis ternatis, ftipulis incifis, floribus erectis, fructibus hirfutis, ariftis nudiusculis. *Europ. Afia.* (G. intermedium Ehrh. et W., hederaefolium C. C. Gmel., hirtum Wahlb. fl. gothob. varr.)

album Gmel. 2. G. foliis caulinis ternatis, fummis fimplicibus fub-3fidis, floribus erectis, petalis calycem aequantibus, ariftis nudis apice pilofis. *Amer. bor.* (G. canadenfe Jacq.)

virginianum 3. G. foliis caulinis ternatis 3fidisque, floribus erectis, petalis calyce brevioribus, ariftis tortis pilofis. *Amer. bor.* (G. geniculatum Mx.)

atlanticum Desf. 4. G. foliis caulinis laciniatis cauleque fub-1floro villofis, flore fuberecto, fructibus hirfutis, ariftis contortis. *Afric. bor. Gallia auftr.* (G. fylvaticum Pourr. Cand.)

† *coccineum* Sm. 5. G. foliis caulinis 3lobis, radicalium pinna extrema maxima reniformi-cordata, floribus erectis. *Olymp. Afiae minoris.*

macrophyllum W. 6. G. hirtum, foliis caulinis pinnatis 3lobisque, radicalium pinna extrema maxima reniformi-cordata, floribus erectis, ariftis apice pilofis. *Camtfchatca. Amer. bor.* (G. radiatum Mx.)

pyrenaicum W. 7. G. villofum, foliis caulinis fub-3fidis, floribus nutantibus, petalis calycem fuperantibus, ariftis pilofis bafi tortis. *Pyren.*

rivale W. 8. G. foliis caulinis ternato-3fidis, floribus nutantibus, petalis calycem aequantibus, ariftis plumofis medio tortis. *Europ. Afia. Amer. bor.*

ftrictum Ait. 9. G. foliis caulinis interrupte pinnatis, foliolis ovatis dentatis, ftipulis incifis, floribus erectis, petalis calycem fuperantibus, ariftis nudis. *Amer. bor.* (G. canadenfe Murr., aleppicum Jacq., intermedium Fifch.)

hiſpidum Fries. 10. G. foliis radicalibus ſubaequaliter pinnatis caulinis pinnatifidis cauleque hirſutis, floribus erectis, petalis calycem ſuperantibus, ariſtis ſuperne hiſpidis. *Suecia auſtr.*

agrimonoides Pursh. 11. G. foliis caulinis aequaliter pinnatis, foliolis inciſis, ſtipulis ſubintegris, floribus erectis, petalis calycem aequantibus. *Amer. bor.*

ciliatum Pursh. 12. G. foliis caulinis pinnatifidis palmatisque glabriusculis ciliatis, laciniis linearibus inciſis, floribus corymboſis. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.*

† *involucratum* Perſ. 13. G. ſcapo elongato, floribus ſubcapitatis involucratis, petalis calyce minoribus. *Ad fretum Magellan.*

magellanicum Perſ. 14. G. foliis lyrato interrupte pinnatis, ſcapo elongato. *Ad fretum Magellan.*

** *Foliis radicalibus ſubſimplicibus.*

japonicum Thb. 15. G. foliis ſubrotundis 3-5lobis villoſis, floribus erectis, fructibus hirſutis, ariſtis glabris. *Japon.*

† *Peckii* Pursh. 16. G. foliis radicalibus reniformibus inciſo-dentatis glabriusculis, petiolis longiſſimis ſubauriculatis, caule 1floro, petalis calycem aequantibus. *Nov. Hantonia Amer. bor.*

1866. SIEVERSIA W.

montana * 1. S. foliis lyrato-pinnatis piloſis, caule erecto 1floro, ariſtis villoſis. *Alp. Europ. med.* (Geum montanum L.)

reptans * 2. S. foliis pinnatis villoſis, foliolis ovatis ſub-3fido-inciſis, flagellis reptantibus, caule 1floro, ariſtis villoſis. *Helvetia et Europ. auſtr.* (Geum reptans L.)

anemonoides W. 3. S. foliis pinnatis glabris, foliolis cuneiformibus apice dentatis, caule 1floro, ariſtis villoſis. *Camtſchatca.* (Dryas pentapetala L., anemonoides Pall. Caryophyllata camtſchatica Lam.)

geoides * 4. S. foliis lyrato interrupte pinnatis hirſutis, foliolis 3dentatis, caule 2floro, ariſtis nudis. *Sibir.* (Dryas geoides Pall. Geum potentilloides Ait. Caryophyllata potentilloides Lam.)

glacialis * 5. S. foliis pinnatifidis villoſo-lanatis, laciniis ovato-oblongis, mediis majoribus ſub-1dentatis, caule 1floro. *Ora Sibir. arctica.* (Geum glaciale Adam.)

triflora * 6. S. foliis radicalibus interrupte pinnatis piloſis, foliolis cuneatis inciſo-dentatis, caule ſimplici ſub-3floro, petalis calycem aequantibus, ariſtis longiſſimis villoſis. *Louiſiana.* (Geum 3florum Pursh.)

1867. CALYCANTHUS.

floridus 1. C. ramis patentibus, foliis ellipticis ſubtus villoſis. *Carolina.* (C. ſterilis Walt.)

glaucus W. 2. C. ramis patentibus, foliis oblongis acutis ſubtus glabris glauceſcentibus. *Carolina.* (C. fertilis Walt.)

laevigatus W. 3. C. ramis ſtrictiſſimis, foliis oblongis acuminatis utrinque viridibus glabris. *Amer. bor.* (C. fertilis Andr., ferax Mx.)

1868. CHIMONANTHUS Lindl.

fragrans Lindl. *Japon.* Frutex ramoſus, foliis oppoſitis oblongis acuminatis glabris, floribus lateralibus ſparſis ſeſſilibus ſulfureis intus rubris. (Calycanthus praecox L.)

1869. ATHEROSPERMA Labill.

moſchatum Labill. *Nov. Holl.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis ſubſerratis pellucido-punctatis ſubtus piloſis, pedunculis axillaribus geminis 1floris reflexis. Plantae partes omnes nucem moſchatam redolent.

1870. PEUMUS Perſ.

fragrans Perſ. *Chili.* Arbor ſempervirens aromatica, foliis oblongis pellucido-punctatis, floribus racemoſis. (Ruizia fragrans R. et P. excl. ſyn. Feuill. et Molin.)

1871. CITROSMA R. et P.

* *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

triflora * 1. C. foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis ſubintegerrimis ſubtus ramisque teretibus hiſpidulis, pedunculis 3floris axillaribus divaricatis abbreviatis. *Braſil.* Sello.

grandiflora Kunth. 2. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acuminatis baſi auriculatis dentatis utrinque ramisque teretibus pube ſtellata hiſpidis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Granat.*

macrophylla Bonpl. 3. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis inaequaliter dentatis ſubtus ramisque 4gonis villoſo-hirſutis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

geſnerioides Kunth. 4. C. foliis ovato-ellipticis acutis dentatis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

echinata Kunth. 5. C. foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis duplicato-dentatis ſupra piloſis ſubtus ramisque teretibus ſericeo-tomentoſis, pedunculis paucifloris, calycibus echinatis. *Nov. Granat.* (C. muricata R. et P.?)

mollis Kunth. 6. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis obſolete dentatis ſupra ſtellato-pubeſcentibus ſubtus ramisque ſub-4gonis incano-tomentoſis, pedunculis

lis paucifloris. *Nov. Granat.* (C. tomentoſa R. et P.?)

dubia Kunth. 7. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis ſinuato-denticulatis utrinque pube ſtellata tomentoſis, caule volubili, pedunculis dichotomis, floribus ☿ 4andris 1gynis. *Nov. Granat. Peru.?* (C. dentata R. et P.?)

ſeſſiliflora Kunth. 8. C. foliis oppoſitis elliptico-oblongis acutis denticulatis ſupra hiſpidulis ſubtus ramisque tomentoſis, caule volubili, floribus ſubſeſſilibus glomeratis polygynis. *Nov. Granat.*

braſilienſis * 9. C. foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis denticulatis ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, ramis teretibus, calycibus aggregatis tetracarpis. *Braſil.* Sello.

alternifolia * 10. C. foliis alternis oblongis obtuſis integerrimis ſubtus villoſis, calycibus ſubſeſſilibus aggregatis tetracarpis. *Braſil.* Sello.

Selloi * 11. C. foliis alternis oblongo-ellipticis acuminatis denticulatis, venis ſubtus appreſſo-piloſis, pedunculis aggregatis 3floris, calycibus villoſis. *Braſil.* Sello. (C. ovalis R. et P.?)

Mutiſii Bonpl. 12. C. foliis ſubquaternis ſubcordato-oblongis acuminatis obſolete denticulatis, junioribus, venis adultiorum ſubtus et ramis ſparſim ſtellulato-pubeſcentibus, pedunculis paucifloris. *Nov. Granat. Martinica.*

lepidota Kunth. 13. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis acutis remote denticulatis ramisque denſiſſime argenteo-lepidotis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Nov. Granat.*

** *Foliis ſubtus glabris.*

laurifolia Kunth. 14. C. foliis ovato-oblongis acutis ſubcoriaceis ſupra nitidis integerrimis, pedunculis paucifloris calycibusque glabris. *Nov. Granat. Peru?* (C. oblongifolia R. et P.?)

petiolaris Kunth. 15. C. foliis quaternis longe petiolatis oblongis utrinque attenuatis dentatis, ramis 4gonis, pedunculis ternis multifloris. *Nov. Granat.*

glabra * 16. C. foliis oppoſitis breviter petiolatis oblongis utrinque attenuatis opacis glaberrimis ſubtus discoloribus parallele venoſis rare dentatis, pedunculis ternis 3floris abbreviatis. *Braſil.* Sello.

umbellata * 17. C. foliis oppoſitis lanceolatis utrinque attenuatis argute remote ſerratis utrinque opacis, pedunculis elongatis tomentoſis corymboſo-umbellatis, calycibus polygynis. *Braſil.* Sello.

† *paniculata* * 18. C. foliis alternis oblongis opacis glabriusculis acutis integerrimis, ramulis teretibus ferrugineo-tomentoſis, pedunculis paniculatis elongatis. *Braſil.* Sello.

1872. HEDYCARYA Forſt.

dentata Forſt. 1. H. foliis oblongis glabris baſi attenuatis mucronato-ſerratis. *Nov. Zeeland.*

† *hirſuta* * 2. H. foliis ovato-oblongis ſinuato-crenatis utrinque hirſutis baſi 2glandulosis. *Bengal.* Roxb.

1873. EUPOMATIA R. Br.

laurina R. Br. *Nov. Holl.* Frutex glaberrimus ſuborgyalis, foliis alternis oblongis coriaceis, pedunculis unifloris.

1874. ROSA.

1. *Simplicifolia.*

berberifolia Pall. 1. R. germinibus globoſis pedunculisque aculeatis, aculeis caulinis ſubgeminatis uncinatis, foliis ſimplicibus ovatis ſeſſilibus denticulatis glabris. *Perſia bor. Tataria.* (R. ſimplicifolia Salisb.)

2. *Feroces: ramis tomentoſis aculeatiſſimis, fructibus nudis.*

ferox Lawr. 2. R. germinibus ſubgloboſis pedunculis petiolisque hiſpidis, aculeis ramorum duplicibus confertiſſimis, foliolis ſubrotundo-ovatis glanduloſo-ſerrulatis ſubtus rubiginoſo-glanduloſis. *Tauria.* (R. provincialis M. B., camtſchatica Red.)

rugoſa Thunb. 3. R. germinibus ſubgloboſis glabris, aculeis ramorum confertiſſimis rectis, foliolis oblongis dentatis rugoſo-venoſis ſubtus villoſis. *Japon.*

camtſchatica Vent. 4. R. germinibus ſubgloboſis glabris pedunculis petiolisque ſubtomentoſis inermibus, aculeis ramorum difformibus, ſtipularibus validis, reliquis confertiſſimis ſetiformibus, foliolis oblongis opacis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus. *Camtſchatca.*

3. *Bracteatae: fructibus tomentoſis, aculeis geminis ſtipularibus, floribus bracteatis.*

involucrata Roxb. 5. R. germinibus globoſis inermibus, floribus ſubſeſſilibus ſubſolitariis, ſtipulis bracteisque pectinatis glanduloſo-ciliatis, petiolis aculeatis, foliolis lanceolatis ſerrulatis ſubtus pubeſcentibus. *Bengal. Nepal. China.* (R. clinophylla Thor. Red.)

† *microphylla* Roxb. 6. R. germinibus globoſis aculeatis, bracteis appreſſis pectinatis, foliolis obovatis obtuſis. *China.*

bracteata Roxb. 7. R. germinibus ſubgloboſis ſericeo-villoſis, bracteis ovatis fimbriatis, aculeis ramorum validis erectis, petiolis aculeatis, foliolis oblongis lucidis mucronato-ſerrulatis. *Ind. or. China.* (R. lucida Lawr.)

Lyellii Lindl. 8. R. germinibus globosis villosis, stipulis pinnatifidis, bracteis integerrimis distantibus, floribus corymbosis, foliolis oblongo-lanceolatis lucidis glabris. *Nepal.*

4. *Cinnamomeae: foliis sublanceolatis, floribus bracteatis.*

*Willdenovii** 9. R. germinibus ovatis pedunculisque solitariis abbreviatis glabris, bracteis appressis, aculeis ramorum suboppositis subrecurvis, petiolis villosiusculis inermibus, foliolis oblongis angustis aequaliter serrulatis subtus villosis resinoso-punctatis. *Ad mare caspium? Sibiria?* (R. microphylla W. herb., arenaria M. B. Stev. in W. herb.)

nitida W. 10. R. germinibus subglobosis pedunculisque glanduloso-hispidis, aculeis ramorum confertis setaceis rectis, petiolis inermibus, foliis lanceolatis serratis nitidis. *Terra nova.* (R. blanda Pursh. rubescens Red.)

Rapa Bosc. 11. R. germinibus hemisphaericis ore ampliato, pedunculis cymosis petiolisque aculeatis glandulosis, ramulis inermibus, foliolis oblongis undulatis lucidis coloratis. *Florida.* (R. turgida Pers.)

lucida Ehrh. 12. R. germinibus depresso-globosis hispidis, aculeis stipularibus subrecurvis, ramorum setaceis, petiolis aculeatis glabris, foliolis oblongis lucidis glaberrimis. *Amer. bor.*

*Lindleyi** 13. R. germinibus globosis hispidis, pedunculis geminis glandulosis, ramulis virgatis subinermibus, foliolis oblongis opacis glaucis. *Amer. bor.* (R. carolina ε Ait., laxa Lindl.)

parviflora Ehrh. 14. R. germinibus depresso-globosis pedunculisque hispidis, calycibus viscosis, stipulis linearibus, aculeis rectis, petiolis aculeatis pubescentibus, foliolis lanceolatis subnitidis. *Amer. bor.* (R. caroliniana Mx., carolina du Roi., pensylvanica Wangenh., humilis Marsh.)

Woodsii Lindl. 15. R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, petiolis aculeatis, ramulis subinermibus, stipulis laciniisque calycis conniventibus, foliolis oblongis obtusis glabris. *Ad fl. Missuri.*

gemella W. 16. R. germinibus depresso-globosis pedunculisque geminatis glabris, aculeis ramorum oppositis remotis rectiusculis, petiolis inermibus villosiusculis, foliolis oblongis acutis glabris supra opacis subtus pallidis. *Amer. bor.*

carolina 17. R. germinibus globosis pedunculisque corymbosis hispidis, aculeis stipularibus reflexis, stipulis convolutis, petiolis subinermibus pubescentibus, foliolis oblongo-lanceolatis opacis. *Amer. bor.* (R. virginiana du Roi, corymbosa Ehrh., palustris Marsh., pensylvanica Mx., Hudsoniana Red., evratina Bosc. Poir.)

Lyonii Pursh. 18. R. germinibus subglobosis glabriusculis, pedunculis subternis hispidis, aculeis sparsis rectis, pe-

tiolis aculeatis, foliolis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis. *Tennaſſee Amer. bor.*

blanda Ait. 19. R. germinibus ſubgloboſis pedunculisque ſubſolitariis glabris, aculeis caulinis deciduis, ſtipulis bracteisque ſubcoloratis glanduloſo-ciliatis, petiolis pubeſcentibus, foliis oblongis opacis ſubtus ſubpubeſcentibus. *Ad ſinum Hudſon. Ora occid. Amer. bor.* (R. fraxinea W.)

fraxinifolia Borkh. 20. R. germinibus ſubgloboſis pedunculisque ſubcorymboſis glabris, ramis inermibus coloratis, ſtipulis ſerrulatis, petiolis glabris, foliolis oblongis ſubtus glaucis. *Terra nova.* (R. blanda Jacqu., virginiana Mill., alpina laevis Red.)

cinnamomea 21. R. germinibus globoſis pedunculisque glabris, aculeis ſtipularibus geminis ſubrecurvis, petiolis inermibus villoſis, foliolis lanceolatis baſi attenuatis ſubtus glauceſcentibus piloſiusculis. *Europa. Caucaſ. Sibir.* (R. foecundiſſima du Roi, majalis Wahlenb., fluvialis Retz., daurica Pall., mutica fl. dan., ariſtata Lapeyr.?)

laxa Retz. 22. R. germinibus oblongis pedunculisque corymboſis glaberrimis, aculeis caulinis recurvis, bracteis glanduloſo-ſerratis, petiolis inermibus villoſiusculis, foliolis oblongis aequaliter ſerratis ſubtus pubeſcentibus. *Sibir.*

Koſinſciana Beſſ. 23. R. germinibus oblongis glabris utrinque conſtrictis, pedunculis calycibusque hiſpidulis, aculeis ſubſtipularibus recurvis, foliolis cuſpidato-ſerratis utrinque glabris ſubtus pallidis. *Ad fl. Tyram.*

frutetorum Beſſ. 24. R. germinibus ſubgloboſis pedunculisque breviſſimis glabris, aculeis ſubſtipularibus validis reflexis, petiolis inermibus foliolisque ellipticis ſubtus villoſis. *Volhynia.*

ambigua Waiz. 25. R. germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, aculeis ſtipularibus reflexis, ramorum juniorum duplicibus confertiſſimis, petiolis inermibus piloſiusculis, foliolis ſubtus glabris. *Patria?*

macrophylla Lindl. 26. R. germinibus oblongis pedunculisque hiſpidulis, ramulis petiolisque inermibus, foliolis lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, bracteis ſubcoloratis, laciniis calycis longiſſimis. *Nepal.*

5. *Pimpinellifoliae: floribus ebracteatis, foliolis ovatis vel oblongis.*

alpina 27. R. germinibus elongatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule ramisque inermibus, fructibus pendulis. *Europ. med.* (R. pendulina L., pyrenaica Gouan., lagenaria et hybrida Vill., inermis Mill.)

pygmaea M. B. 28. R. germinibus ovatis abbreviatis, pedunculis ramisque hiſpidis, caule ſubinermi, foliolis ovatis acutis glanduloſo-2ſerratis ſubtus glaucis. *Tauria. Delphinatus.* (R. pimpinellifolia Vill.)

humilis Beſſ. 29. R. germinibus oblongis glabriusculis, pedunculis glanduloſo-hiſpidis, aculeis caulinis confertis un-

cinatis, petiolis aculeatis foliolisque fubtus pubefcentibus. *Volhynia.* (R. Ratomfciana Beff.)

rubella Sm. 30. R. germinibus globofis pedunculisque folitariis glandulofo-hifpidis, aculeis caulis humilis fparfis rectis fetisque glanduliferis, foliolis fubrotundis obtufis glandulofo-ferratis. *Anglia.* (R. polyphylla W.)

livefcens Beff. 31. R. germinibus oblongis utrinque attenuatis pedunculisque glandulofo-hifpidis, caule pruinofo humili petiolisque remote aculeatis, aculeis rectiusculis, foliolis ellipticis acutis glabris 2ferratis fubtus glaucis. *Ad Tyram fl.* . . *Caucaf.* (R. arguta Muff. Pufchk. in W. herb.)

balfamica W. 32. R. germinibus oblongis utrinque attenuatis hifpidiffimis, ramis inermibus, petiolis fubaculeatis, foliolis duplicato-ferratis fubtus pubefcentibus. *Patria?*

ftricta Mühlb. Lindl. 33. R. germinibus oblongis glabris maculatis, fructibus pendulis, pedunculis ramisque inermibus fetofis, petiolis aculeatis, foliolis glaucefcentibus. *Amer. bor.*

fuavis W. 34. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis petiolisque hifpidulis, foliolis fubrotundis duplicato-ferratis glabriusculis, aculeis ramorum confertiffimis rectis, ramulorum duplicibus. *Patria?*

acicularis Lindl. 35. R. germinibus obovatis glabris, laciniis calycis conniventibus, pedunculis petiolisque pubefcentibus, aculeis fparfis acicularibus rectis, foliolis glaucis rugofis. *Sibir.*

*horrida** 36. R. germinibus fubglobofis glabris, pedunculis hifpidis, aculeis ramorum confertiffimis duplicibus rectis, petiolis inermibus pubefcentibus, foliolis oblongis fimpliciter ferratis utrinque glaberrimis. *Patria?* (R. viminea Lindl.)

fulfurea Ait. 37. R. germinibus hemifphaericis turgidis glabris, pedunculis petiolisque nudiusculis, aculeis ramorum duplicibus confertis, foliolis fimpliciter dentatis fubtus glaucis. *Afia med.?*

lutefcens Pursh. 38. R. germinibus globofis pedunculisque glabris, aculeis ramorum confertiffimis gracilibus fetisque, petiolis inermibus, foliolis ovalibus fimpliciter ferratis glabris. *Sibir.*

fpinofiffima 39. R. germinibus globofis glabris pedunculisque glabriusculis, aculeis ramorum duplicibus confertis reflexis, majoribus falcatis bafi latis, petiolis aculeatis, foliolis fimpliciter ferratis glabris. *Europ. Afia med.* (R. fpimpinellifolia L., altaica W., ochroleuca Sw. varr.)

melanocarpa Link. 40. R. germinibus globofis pedunculisque hifpidiffimis, aculeis ramorum fubaequalibus confertiffimis reflexis, petiolis inermibus, foliolis fimpliciter ferratis glabris. *Podolia. Volhynia.* (R. microcarpa Beff.)

oxyacantha M. B. 41. R. germinibus globofis glabris, pedunculis villofo-glandulofis, fructiferis fubreflexis, aculeis ramorum e lata bafi fetaceis confertis, petiolis

aculeatis, foliolis fimpliciter ferratis glabris. *Sibir.* (R. grandiflora Lindl.?)

flava Wikftr. 42. R. germinibus globofis pedunculisque hifpidis, aculeis ramorum confertiffimis fubfetaceis, petiolis aculeatis, foliolis fubtus pubefcentibus. *Patria?*

myriacantha Cand. 43. R. germinibus globofis pedunculisque hifpidis, aculeis ramorum confertiffimis inaequalibus rectis, majoribus elongatis, petiolis fubaculeatis, foliolis minutis orbiculatis. *Gallia. Tauria.*

nankinenfis Lour. 44. R. germinibus ovatis glabris, pedunculis hifpidis, aculeis ramorum confertis, foliolis oblongis acutis ferrato-ciliatis. *China.*

involuta Sm. 45. R. germinibus globofis pedunculis petiolisque hifpidiffimis, aculeis ramorum confertis rectis fetisque glanduliferis, foliolis ellipticis duplicato-ferratis, venis fubtus pubefcentibus. *Scotia. Hebrides.*

reverfa Kit. 46. R. germinibus ovatis pedunculisque hifpidis, aculeis ramorum confertis fetaceis reflexis, petiolis villofis fubinermibus, foliolis fubtus pubefcentibus. *Hungar.*

Sabini Woods. 47. R. germinibus globofis pedunculisque hifpidis, aculeis ramorum fubconfertis rectiusculis, petiolis villofis hifpidulis, foliolis glandulofo-ferrulatis fubtus pubefcentibus. *Scotia.*

Doniana Woods. 48. R. germinibus globofis pedunculisque hifpidis, aculeis ramorum confertis fetaceis, petiolis aculeatis, foliolis duplicato-ferratis utrinque villofis. *Scotia.* (R. Sabini β. Lindl.)

6. *Centifoliae: aculeis difformibus, floribus bracteatis, foliis rugofis.*

damafcena 49. R. germinibus clavatis elongatis pedunculisque fubcorymbofis glandulofo-hifpidis, laciniis calycis reflexis, ramis viridibus, aculeis fubconfertis validis inaequalibus, petiolis aculeatis, foliolis fubtus pubefcentibus. *Syria?* (R. bifera Poir., belgica Mill., calendarum Ser.)

centifolia 50. R. germinibus ovatis pedunculisque fubgeminatis hifpidis, aculeis ramorum fparfis, ramulis petiolisque inermibus, foliolis fubtus pubefcentibus. *Caucaf. Macedonia.* (R. provincialis Ait. R. mufcofa Ait., pomponia Cand., burgundiaca Perf., apiifolia W. varr.)

gallica 51. R. germinibus ovatis pedunculisque glandulofo-hifpidulis, aculeis ramorum fubdeciduis fparfis, petiolis aculeatis, foliolis fubcoriaceis rugofis. *Europ. med. Caucaf.* (R. pumila L. fuppl. var. humilis, aculeis fetaceis confertis, radice repente. R. Polliniana*.)

pulchella W. 52. R. germinibus obovatis pedunculisque glandulofis, caule humili, aculeis fparfis, petiolis inermibus villofis, foliolis ellipticis acutis glandulofo-ferratis fubtus pubefcentibus. *Gallia.*

parvifolia Ehrh. 53. R. germinibus ovatis glabriusculis, pedunculis glandulofis, petiolis cauleque humili graciliter aculeatis, foliolis ovatis rugofis glandulofo-ferratis. *Gallia orient.* (R. remenfis Cand., burgundiaca C. C. Gmel.)

turbinata Ait. 54. R. germinibus campanulatis pedunculisque glandulofo-hifpidis, aculeis ramorum fparfis recurvis, petiolis villofis inermibus, foliolis duplicato-ferratis fubtus pubefcentibus. *Patria?* (R. campanulata Ehrh., francofurtana Borkh., inermis et Rofenbergiana Red.)

7. *Villofae; foliis pilofis, ferraturis divergentibus, aculeis rectiusculis.*

villofa 55. R. germinibus depreffo-globofis pedunculisque glandulofo-hifpidis, laciniis calycis fubdivifis, aculeis ramorum gracilibus rectiusculis fparfis, petiolis fubaculeatis glandulofo-fetofis, foliolis obtufiusculis utrinque villofis. *Europ. Afia med.* (R. mollis Sm., tomentofa β. Lindl., pulchella et heterophylla Woods.)

tomentofa Sm. 56. R. germinibus ellipticis pedunculisque glandulofo-hifpidis, laciniis calycis alternatim pinnatis, aculeis gracilibus fubrecurvis fparfis, petiolis fubaculeatis glandulofo-pubefcentibus, foliolis acutis utrinque villofis. *Europ.* (R. villofa Ehrh., molliffima Borkh., fcabriuscula et fubglobofa Sm., agreftis C. C. Gmel., foetida Bât. Cand. Red., dimorpha Beff. eft var. aculeis ramorum deciduis.)

gracilis Woods. 57. R. germinibus globofis pedunculisque glandulofo-hifpidis, laciniis calycis indivifis, aculeis ramorum fubgeminis fubrecurvis fparfisque fetis glandulofis, petiolis pubefcentibus fubaculeatis, foliolis utrinque villofis. *Europ.* (R. villofa engl. bot., pomifera Borkh. Fries.)

*Ledebourii** 58. R. germinibus ovatis glaucis pedunculisque aculeolatis, ramis glabris petiolisque pubefcentibus inermibus, foliolis obtufis duplicato-ferratis utrinque villofis. *Caucaf.* (R. mollis Ledeb.)

Andrzeiovii Stev. 59. R. germinibus globofis pedunculisque fetofo-aculeatis, laciniis calycis pinnatifidis, aculeis ramorum confertis rectis, petiolis aculeatis, foliolis parvis duplicato-glandulofo-ferratis utrinque villofis. *Volhynia.*

terebinthacea Beff. 60. R. germinibus oblongis utrinque attenuatis pedunculisque compofito-corymbofis fetofo-hifpidis, laciniis calycis lanceolatis emarginatis, aculeis ramorum rectis compreffis, petiolis pubefcentibus, foliolis fubtus tomentofis. *Ad fl. Tyram.*

farinofa Rau. 61. R. germinibus ovatis pedunculisque folitariis glaberrimis, aculeis caulinis fparfis rectis, petiolis inermibus, foliolis duplicato-ferrulatis utrinque incano-tomentofis. *Franconia.*

alba 62. R. germinibus fubovatis glabriusculis, pedunculis corymbofis elongatis hifpidis, aculeis ramo-

rum sparsis recurvis, petiolis villosis aculeatis, foliolis late ovatis simpliciter serratis subtus villosis. *Europ. Caucas.* (R. leucantha M. B. Friedländeriana Bess. var.)

montana Stev. 63. R. germinibus subovatis glabris, pedunculis hispidis bracteatis, petalis calyce minoribus, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis villosis aculeatis, foliolis duplicato-serratis subtus pubescentibus. *Tauria. Podolia austr.*

Boreykiana Bess. 64. R. germinibus ovatis glabris, pedunculis corymbosis glanduloso-hispidis, ramis subinermibus glabris, aculeis ramulorum raris recurvis, petiolis aculeatis, foliolis utrinque pubescentibus aequaliter serratis subtus glandulosis. *Podolia austr.*

hibernica Sm. 65. R. germinibus globosis pedunculisque subgeminis glabris, laciniis calycis pinnatifidis, aculeis ramorum raris incurvis, petiolis pubescentibus, foliolis simpliciter serratis, venis subtus villosiusculis. *Hibernia.*

8. *Rubiginosae; foliis glandulosis, aculeis inaequalibus.*

lutea Dalech. 66. R. germinibus globosis pedunculisque glabris, aculeis ramorum sparsis rectis, petiolis recurvo-aculeatis, foliolis acutis duplicato-serratis supra nitidis subtus glandulosis. *Europ.* (R. Eglanteria L., foetida All., chlorophylla Ehrh. punicea Mill. var. bicolor Jacqu.)

rubiginosa 67. R. germinibus ovatis hispidiusculis glabrisve, pedunculis hispidis, aculeis ramorum sparsis validis subrecurvis, petiolis aculeatis, foliolis ovatis duplicato-serratis subtus glanduloso-pilosis. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (R. Eglanteria Mill., suavifolia Lightf., suaveolens Pursh., micrantha Sm., umbellata C. C. Gmel., grandiflora et marginata Wallr., glutinosa Schultz., Seraphini Viv., flexuosa et aciphylla Rau., myrtifolia Hall. fil., sepium Thuill., agrestis Sav.)

† *adenophylla* W. 68. R. germinibus ovatis pedunculisque hispidissimis, aculeis ramorum sparsis, petiolis inermibus subglandulosis, foliolis oblongo-lanceolatis utrinque glabris margine glandulosis duplicato-serrulatis. *Patria?*

pulverulenta M. B. 69. R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis ramorum inaequalibus deciduis, aliis recurvis sparsis, aliis confertis setaceis, petiolis aculeatis villosis, foliolis duplicato-serratis utrinque glandulosis villosis. *Caucas.*

uncinella Bess. 70. R. germinibus oblongis pedunculisque glabris, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis subtus pubescentibus duplicato-serratis utrinque confertim glandulosis. *Volhyn. Tauria.*

caryophyllacea Bess. 71. R. germinibus oblongis pedunculisque glabris, aculeis ramorum aequalibus recurvis sparsis, pe-

tiolis subinermibus, foliolis duplicato-serratis utrinque glandulosis subtus incanis. *Volhynia. Podolia. Iberia.* (R. iberica Stev.)

Klukii Bess. 72 R. germinibus ovatis pedunculisque corymbosis glabris hispidisve, aculeis ramorum sparsis basi dilatatis recurvis, petiolis villosis aculeatis, foliolis 2serratis supra pubescentibus subtus glanduloso-scabris. *Volhynia. Tauria.* (R. balsamica Bess. et floribunda Stev.)

cuspidata M.B. 73. R. germinibus ovatis pedunculis corymbosis calycibusque hispidis, laciniis calycis pinnatifidis elongatis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis aculeatis, foliolis ovato-lanceolatis acutis utrinque villosis subtus glandulosis. *Caucas.*

agrestis Sw. 74. R. germinibus oblongis pedunculisque glaberrimis, laciniis calycis longissimis, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis inermibus foliolisque aequaliter serratis subtus villosis glandulosisque. *Suecia.*

glutinosa Sm. 75. R. germinibus ovato-ellipticis turgidis hispidissimis, pedunculis solitariis abbreviatis, aculeis ramorum duplicibus, aliis validis recurvis, aliis setaceis, ramulis petiolisque glanduloso-tomentosis, foliolis subrotundis duplicato-serrulatis utrinque glanduloso-villosiusculis viscosis. *Creta. Sicilia.* (R. rubiginosa cretica. Red.)

trachyphylla Rau. 76. R. germinibus ovatis apice constrictis glabris, pedunculis aggregatis hispidis, aculeis ramorum raris inaequalibus recurvis, petiolis sparse glandulosis subaculeatis, foliolis duplicato-serratis utrinque glabris, venis subtus rare glandulosis. *Franconia.*

9. *Caninae: foliis eglandulosis conniventi-serratis, aculeis aequalibus aduncis, laciniis calycis deciduis.*

canina 77. R. germinibus ovatis pedunculisque aggregatis glabris, laciniis calycis pinnatifidis, aculeis ramorum sparsis validis recurvis, petiolis subaculeatis, foliolis simpliciter serratis utrinque glabris. *Europ. Asia.* (R. senticosa Achar. Swartziana et Afzeliana Fries, armata Stev., calycina M. B.)

collina Jacqu. 78. R. germinibus ovatis basi pedunculisque glanduloso-hispidis, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis glandulosis subaculeatis, foliolis subsimpliciter serratis supra glaberrimis subtus villosis. *Europ.* (R. Forsteri Sm., bractescens Woods, taurica M. B., solstitialis Bess., campestris Sw., leucantha Lois.)

dumetorum Thuill. 79. R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, aculeis ramorum sparsis recurvis, petiolis glandulosis subaculeatis, foliolis subduplicato-serratis utrinque villosis. *Europ.* (R. Borreri Woods, sepium et corymbifera Borkh. sepincola Sw.)

caefia Sm. 80. R. germinibus ellipticis pedunculisque folitariis glabris, aculeis ramorum fparfis recurvis, petiolis pubefcentibus fubinermibus, foliolis inaequaliter ferratis fubtus glaucis pubefcentibus. *Anglia. Podolia. Suecia. Tauria.* (R. glauca Schott., glaucefcens Beff. var.? Et armis et pube magis carent.)

caucafica M. B. 81. R. germinibus ovatis pedunculisque umbellatis glabris, aculeis ramorum fparfis reflexis, petiolis aculeatis, foliolis duplicato-ferratis utrinque pubefcentibus. *Caucaf.*

frondofa Stev. 82. R. germinibus oblongis pedunculisque folitariis glaberrimis, laciniis calycis elongatis omnibus pinnatis, ramis inermibus laevibus, ftipulis membranaceis, foliolis ovatis fimpliciter ferratis utrinque glaberrimis. *Podol. auftr.*

turbinella Sw. 83. R. germinibus depreffo-globofis pedunculisque aggregatis glaberrimis, laciniis calycis integerrimis villofis elongatis, aculeis ramorum raris fubrecurvis, petiolis inermibus foliolisque aequaliter dentatis fubtus incano-villofis. *Suecia.*

venofa Sw. 84. R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, laciniis calycis elongatis fubincifis margine tomentofis, aculeis ramorum fparfis validis recurvis, petiolis inermibus foliolisque duplicato-ferratis venofis fubtus glaberrimis glaucefcentibus. *Suecia.*

Jundzillii Beff. 85. R. germinibus ovatis bafi pedunculisque hifpidis, aculeis ramorum raris recurvis, petiolis glandulofo-villofis aculeatis, foliolis glandulofo-2ferratis fubtus glaucefcentibus villofiusculis. *Volhynia. Tauria. Caucaf.* (R. glandulofa et nitidula Beff.)

coriifolia Fries. 86. R. germinibus globofis pedunculisque folitariis abbreviatis glabris, aculeis ramorum fparfis recurvis, petiolis inermibus villofis, foliolis coriaceis opacis inaequaliter ferratis fubtus villofis. *Suecia. Dania.* (R. craffifolia Liljebl., fepium Sw.)

baltica Roth. 87. R. germinibus globofis bafi pedunculisque glandulofo-hifpidis, bracteis coloratis, aculeis ramorum rectis, petiolis fubinermibus pilofis, foliolis fimpliciter ferratis fubtus pubefcentibus. *Ad litus maris baltici circa Roftochium.*

faxatilis Stev. 88. R. germinibus ovatis pedunculisque fubcorymbofis hifpidiffimis, aculeis ramorum fparfis recurvis, petiolis aculeatis glandulofis, foliolis duplicato-ferratis utrinque glabriusculis. *Podolia. Tauria.*

rubrifolia Vill. 89. R. germinibus ovatis pedunculisque corymbofis glabris, bracteis coloratis, aculeis ramorum fparfis recurvis, petiolis aculeatis, foliolis fimpliciter ferratis utrinque glabris fubtus fubcoloratis. *Europ. med.*

microphylla Roxb. 90. R. germinibus fubglobofis hifpidiffimis, aculeis ramorum raris, petiolis fubaculeatis, foliolis minutis ovatis ferrulatis nitidis glaberrimis. *China.*

fericea Lindl. 91. R. germinibus fubclavatis pedunculisque folitariis glabris, aculeis ramorum fparfis fubftipulari-

bus validis ſuberectis, ſtipulis connatis patentibus integerrimis, petiolis aculeatis, foliolis exiguis oblongis apice dentatis ſubtus ſericeis. *Nepal.*

indica 92. R. germinibus ovatis pedunculisque ſubcorymboſis glabris, aculeis ramorum raris recurvis, petiolis ſubaculeatis, foliolis coriaceis ovato-lanceolatis ſimpliciter ſerratis ſupra nitidis ſubtus glaucis. *China.* (R. longifolia W., ſinica Sm.)

ſemperflorens Curt. 93. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis glanduloſis, aculeis ramorum raris debilibus recurvis, petiolis ſubinermibus, foliolis membranaceis ovato-lanceolatis crenato-ſerratis ſubtus glaucis. *China.* (R. indica Red., chinenſis Jacqu., diverſifolia Vent., bengalenſis Perſ.)

Montezumae Humb. 94. R. germinibus ellipticis pedunculisque ſolitariis glabris, ramis inermibus, petiolis aculeatis, foliolis ovatis argute ſerratis glabris. *Mexico.* (R. mexicana W. herb.)

Lawrenceana Sweet. 95. R. germinibus oblongis pedunculisque glabris, fructibus oligoſpermis, petalis ſpathulatis acutiusculis, petiolis aculeatis, foliolis lanceolatis argutiſſime ſerrulatis. *China?*

10. *Syſtylae: ſtylis coalitis.*

ſyſtyla Woods. 96. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis ſubternis hiſpidiusculis, aculeis ramorum ſparſis validis recurvis, petiolis ſubaculeatis, foliolis ovato-lanceolatis ſubtus piloſiusculis. *Anglia. Gallia.* (R. collina Sm., ſtyloſa, breviſtyla et 2bracteata Cand.)

arvenſis 97. R. germinibus oblongis glabris, pedunculis ſubaggregatis glabriusculis, ramis proſtratis repentibus, aculeis ſparſis ſubreflexis, petiolis ſubaculeatis, foliolis ovato-lanceolatis utrinque glabris opacis inaequaliter ſerratis. *Europ.* (R. tuguriorum W., repens C. C. Gmel., montana Vill., ſarmentacea Woods., Herporrhodon et ſerpens Ehrh., ſylveſtris Poll., geminata Rau. R. Czackiana Beſſ.?)

abyſſinica R. Br. 98. R. germinibus oblongis pedunculisque corymboſis tomentoſis, laciniis calycinis integerrimis, aculeis ramorum ſcandentium confertiſſimis validis ſubfalcatis, petiolis aculeatis, foliolis obovatis ſimpliciter ſerratis ſempervirentibus. *Abyſſinia.*

ſempervirens 99. R. germinibus oblongis pedunculisque corymboſis glanduloſo-hiſpidulis, bracteis coloratis ſubintegerrimis, aculeis ramorum ſcandentium ſparſis ſubreflexis, petiolis ſubinermibus, foliolis utrinque glabris ſempervirentibus nitidis aequaliter ſerratis. *Europ. auſtr.* (R. balearica Perſ., ſcandens Brot. atrovirens Viv., microphylla Desf., proſtrata Cand.)

multiflora Thunb. 100. R. germinibus ovatis pedunculisque corymboſis villoſiſſimis inermibus, ramis ſcandentibus flexuoſis, aculeis ſtipularibus ſubrecurvis, ſtipulis pintifidis, petiolis foliolisque ſubtus villoſis. *Japon. China.* (R. florida Poir.)

*Brownii** 101. R. germinibus oblongis pedunculisque corymbofis glandulofo-villofis, laciniis calycis ftipulisque integerrimis, aculeis ramorum fparfis latiffimis recurvis, petiolis fubaculeatis, foliolis lanceolatis fimpliciter ferratis utrinque pubefcentibus. *Nepal.* (R. Brunonii Lindl.)

mofchata Mill. 102. R. germinibus ovatis pedunculisque paniculatis villofo-tomentofis, bracteis ftipulisque integerrimis ciliatis, aculeis ramorum fparfis reflexis, petiolis villofis aculeatis, foliolis fimpliciter ferratis fubtus glaucis fubpubefcentibus. *Afr. bor. Madera.* (R. Opfoftemma Ehrh. Noifettiana Red.)

rubifolia R. Br. 103. R. germinibus globofis pedunculisque folitariis glabris, aculeis ramorum abbreviatis recurvis, foliolis fimpliciter ferratis utrinque glabris. *Amer. bor.*

11. *Bankfiae: fcandentes, foliis ternatis, ftipulis liberis fubdeciduis.*

laevigata Mx. 104. R. germinibus ovatis pedunculisque folitariis hifpidiffimis, aculeis ramorum fubgeminatis falcatis, petiolis inermibus foliolisque coriaceis lucidis glaberrimis. *Georgia.*

finica R. Br. 105. R. germinibus ovatis pedunculisque folitariis hifpidis, aculeis ramorum fparfis recurvis, petiolis aculeatis, foliolis fimpliciter ferratis lucidis glaberrimis. *China.* (R. ternata Poir., nivea Cand. Red.)

fetigera Mx. 106. R. germinibus globofis pedunculisque hifpidis, laciniis calycis pennatim fetigeris, aculeis ftipularibus recurvis, petiolis aculeato-fetofis, foliolis fimpliciter ferratis glabris. *Virginia. Carolina.*

Hyftrix Lindl. 107. R. germinibus oblongis pedunculisque folitariis fetofiffimis, laciniis calycis rigidis erectis aculeatis, aculeis ramorum inaequalibus, majoribus recurvis, minoribus confertis fetaceis, petiolis aculeatis, foliolis fimpliciter ferratis lucidis glabris. *China. Japon.*

microcarpa Lindl. 108. R. germinibus globofis pedunculisque corymbofis glabris, ftipulis bracteisque fubnullis, aculeis ramorum aequalibus recurvis, petiolis inermibus, foliolis lanceolatis fimpliciter ferratis lucidis. *China.*

Bankfiae R. Br. 109. R. germinibus depreffo-hemifphaericis pedunculisque laxis nutantibus corymbofis glabris, ramis flexuofis inermibus, foliolis fimpliciter ferratis glaberrimis. *China.*

1875. ANTHODISCUS Meyer.

trifoliatus Meyer. *Guiana.* Arbor elata foliis ternatis, floribus racemofis virefcentibus.

CLASSIS XIII.

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

I. *Flores perfecti.*

1. *Monopetali.*

1876. *Antholoma* Labill. Cal. 4ſepalus. Cor. calyptraeformis crenata. Stigma ſimplex. Frutex 4locularis. *Marcgravieae.*

1877. *Marcgravia.* Cal. 6partitus imbricatus. Cor. calyptraeformis integra. Stamina membranulae perigynae inſerta. Stylus 0. Stigma craſſum. Capſ. baccata ſemimultilocularis. *Marcgravieae.*

1878. *Swartzia* W. Cal. 4ſepalus. Petalum 1 laterale. Legumen oligoſpermum. *Leguminoſae.*

1879. *Fouquiera* Kunth. Cal. 5ſepalus imbricatus. Cor. tubuloſa, limbo 5partito. Stylus apice 3fidus. Germen 1loculare. *Portulaceae?*

1880. *Omphalocarpus* P. B. Cal. imbricatus. Cor. limbo ſub-6fido, fauce ſquamata. Fructus ligneſcens multilocularis, loculis 1ſpermis. *Sapoteae.*

1881. *Dicalyx* Lour. Cal. duplex, ext. 3ſepalus, int. 5dentatus. Cor. 5partita. Stamina corollae inſerta. Drupa 1ſperma, cal. int. coronata.

1882. *Aſteranthus* Desf. Cal. urceolatus multidentatus. Cor. rotata multiloba ciliata. Stam. corollae inſerta. Stylus baſi 6radiatus. Stigmata 6. *Symploceae.*

2. *Tripetali.*

1883. *Doliocarpus* Roland. Cal. 5ſepalus. Filamenta apice dilatata, antherarum loculos discretos utrinque gerentia. Bacca 1locularis ſub-2ſperma. *Dillenieae.*

1884. *Trilix.* Cal. 3ſepalus. Bacca 5locularis polyſperma. *Roſaceae?*

3. *Tetrapetali.*

1885. *Papaver.* Cal. 2ſepalus caducus. Stylus 0. Capſ. 1locularis apice ſub ſtigmate perſiſtente hians, placentis valvaribus. *Papavereae.*

1886. *Stylophorum* Nutt. Cal. 2ſepalus caducus. Stylus diſtinctus. Stigma capitatum 4lobum. Capſ. elliptica 1locularis 4valvis, valvis revolutis. *Papavereae*.
1887. *Chelidonium*. Cal. 2ſepalus. Stigma 2lobum. Siliqua 1locularis 2valvis, ſemina ſtrophiolata. *Papavereae*.
1888. *Glaucium* Tourn. Cal. 2ſepalus. Stigma 2lobum. Siliqua 2 (3-4) locularis, ſepto fungoſo placentifero. *Papavereae*.
1889. *Actaea*. Cal. 4ſepalus caducus. Bacca polyſperma. *Ranunculeae*.
1890. *Grias*. Cal. 4fidus. Stigma urceolatum. Drupa nuce 8ſulca. *Guttiferae?*
1891. *Calophyllum*. Cal. coloratus ſub-4ſepalus. Stigma capitatum. Drupa globoſa. *Guttiferae*.
1892. *Mammea*. Cal. 2ſepalus. Petala coriacea. Stigma capitatum. Bacca 2-4ſperma. *Guttiferae*.
1893. *Sparrmannia* Thunb. Cal. 4ſepalus. Stamina plurima exteriora abortientia. Capſ. echinata 5locularis, loculis 2ſpermis. *Tiliaceae*.
1894. *Capparis*. Cal. 4partitus. Siliqua baccata ſtipitata. *Capparideae*.

4. *Pentapetali*.

a. *Fructibus ſuperis*.

1895. *Arſis* Lour. Cal. 5ſepalus coloratus deciduus. Antherae 4loculares. Bacca ſtipitata 1ſperma. *Capparideae*.
1896. *Shorea* Roxb. Cal. 5fidus. Antherae mucronatae. Capſ. 1ſperma ſtylo coronata, calyce alato veſtita. *Familia?*
1897. *Tilia*. Cal. 5partitus, pedicello bracteato. Petala ſubinde duplicata. Antherae didymae. Stigma 5fidum. Capſ. coriacea 5locularis 5ſperma non dehiſcens. *Tiliaceae*.
1898. *Brownlowia* Roxb. Cal. 5partitus. Nectaria 5 linearia perigyna. Capſ. 3 2valves 1ſpermae. *Tiliaceae*.
1899. *Dipterocarpus* Gärtn. Cal. 5dentatus, dentibus 2 elongatis. Antherae ſubulatae elongatae. Capſ. 1ſperma, calyce alato veſtita. *Tiliaceae*.
1900. *Diplophractum* Desf. Cal. 5ſepalus tomentoſus. Petala baſi ſquamata. Stigmata 5. Capſ. 5locularis 10locularis 10ſperma. *Tiliaceae*.
1901. *Grewia*. Cal. 5partitus coloratus. Petala baſi ſquamata ſ. glandulifera. Stigma lobatum. Drupa nucibus 4 2locularibus 2ſpermis. *Tiliaceae*.
1902. *Columbia* Perſ. Cal. 5ſepalus. Petala baſi ſquamata. Fructus 4alatus 4locularis, loculis 1-2ſpermis. *Tiliaceae*.
1903. *Muntingia*. Cal. 5partitus. Stylus ſulcatus. Bacca multilocularis polyſperma. *Tiliaceae*.
1904. *Aubletia* Schreb. Cal. 5partitus. Antherae apice foliaceae. Stigma infundibuliforme. Capſ. coriacea multilocularis, loculis polyſpermis. *Tiliaceae*.
1905. *Alegria* Seſſ. Involucrum 10-12phyllum. Cal. 5ſepalus. Stamina exteriora abortientia. Stigmata 5. Capſ. 5locularis 5valvis, valvis medio ſeptiferis. Semina alata. *Tiliaceae*.
1906. *Berria* Roxb. Cal. 5partitus irregularis. Stigma 3gono-capitatum. Capſ. 3locularis 3valvis, valvis ſingulis dorſo 2alatis medio ſeptiferis. *Tiliaceae*.

1907. *Corchorus*. Cal. 5ſepalus deciduus. Stigm. 1-3. Capſ. ſiliquaeformis 2-5locularis: ſemina angulata ſeptata. *Tiliaceae*.
1908. *Ciſtus*. Cal. 5partitus ſubaequalis. Stigma capitatum. Capſ. 5locularis, loculis oligoſpermis. *Ciſteae*.
1909. *Helianthemum* Tourn. Cal. 5partitus inaequalis ſ. 3partitus, ſepalis exterioribus acceſſoriis anguſtioribus. Capſ. 1locularis 3valvis polyſperma. *Ciſteae*.
1910. *Bixa*. Cal. 5ſepalus. Capſ. ſetoſo-hiſpida 1locularis 2valvis, ſeminibus ſubdenis farina colorata involutis. *Bixeae* Kunth.
1911. *Weihea* *. Cal. 5partitus. Pet. fimbriata. Capſ. baccata 3locularis, loculis 2-3ſpermis. *Familia?*
1912. *Sarcochlaena* Thuar. Involucrum carnoſum urceolatum. Cal. 3ſepalus. Urceolus ſtamina cingens. Capſ. 3locularis 6ſperma involucro baccato cincta. *Chlaenaceae*.
1913. *Schizochlaena* Thuar. Involucrum membranaceum 2florum fimbriatum. Cal. 3ſepalus. Antherae adnatae. Capſ. 3locularis polyſperma, involucro ampliato incluſa. *Chlaenaceae*.
1914. *Rhodochlaena* Thuar. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 3ſepalus carnoſus glutinoſus. Petala ſub-6na. Antherae 4angulae adnatae. Ovarium 3loculare polyſpermum. *Chlaenaceae*.
1915. *Ternſtrömia* L. ſuppl. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 5ſepalus. Stam. duplici ſerie. Bacca 2locularis, loculis 3ſpermis. *Ternſtrömieae* Mirb.
1916. *Cleyera* Thunb. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 5ſepalus. Antherae adnatae retrorſum hiſpidae. Stigm. 2, 3. Bacca 2-3locularis. *Ternſtrömieae*.
1917. *Freziera* Sw. Bracteae 2 loco involucri. Cal. 5ſepalus. Antherae terminales glabrae ovatae. Stigma 3fidum. Bacca 3-5locularis. *Ternſtrömieae*.
1918. *Cochloſpermum* Kunth. Cal. 5ſepalus inaequalis perſiſtens. Antherae acuminatae. Capſ. 5locularis polyſperma. Semina cochleata lanigera. *Ternſtrömieae?*
1919. *Ochna*. Cal. 5ſepalus. Antherae 2loculares. Drupae 5 1ſpermae gynobaſi inſertae. *Ochneae*.
1920. *Delima*. Cal. 5ſepalus. Capſ. membranacea 1locularis 2valvis: ſemina baccata. *Dillenieae*.
1921. *Taſmannia* R. Br. Flores dioeci. Cal. 2-3partitus. Fructus membranaceus 1locularis polyſpermus. *Magnolieae*.
1922. *Aegle* Corr. Cal. 5dentatus deciduus. Antherae lineares elongatae mucronatae. Fructus baccatus multilocularis, pulpa carnoſa demum excreſcente. *Aurantia*.
1923. *Bonnetia* Schreb. Cal. 5ſepalus imbricatus. Capſ. 3valvis polyſperma, valvis introflexis placentiferis. *Guttiferae*.
1924. *Cluſia*. Cal. imbricatus 4-5-8ſepalus. Pet. 4, 5, 6-8. Stigma radiato-peltatum. Capſ. coriacea 4-5-8valvis, valvis introflexis placentiferis. *Guttiferae*.
1925. *Sterbeckia* Schreb. Cal. 3-5partitus. Petala ſerrulata. Stigma capitatum. Capſ. cylindrica polyſperma. Sem. pulpa involuta. *Guttiferae*.
1926. *Vateria*. Cal. 5partitus. Antherae ſubulatae. Capſ. 3valvis 1ſperma. *Guttiferae?*
1927. *Aſcium* Schreb. Bractea cuculliformis pedicello adnata. Cal. coriaceus 5partitus. Bacca polyſperma. *Marcgravieae*.
1928. *Legnotis* Sw. Cal. 4-5partitus. Pet. inciſa fimbriata. Antherae oblongae. Capſ. 3locularis 3ſperma. *Elaeocarpeae*.

1929. *Vallea* Mut. Cal. 5partitus. Pet. 3loba. Antherae lineares basi affixae apice poro gemino dehiscentes. Stylus 3fidus. Caps. sublignosa muricata 5locularis, loculis 2spermis. *Elaeocarpeae.*
1930. *Myrodendron* Schreb. Cal. 5partitus. Antherae 2loculares. Stigma 5lobum. Ovarium 5loculare. *Familia ?*
1931. *Lemniscia* Schreb. Cal. 5dentatus. Pet. linearia nectario cum staminibus adnata. Stigma obtusum. Ovarium 5loculare. *Familia ?*
1932. *Sarracenia.* Cal. duplex deciduus, ext. 3- int. 5sepalus coloratus. Stigma latum peltatum. Caps. 5locularis polysperma, placenta 5angularis centralis. *Familia ?*

b. *Fructibus subinferis.*

1933. *Loasa* Adans. Cal. 5partitus. Pet. patentia, cum squamis 2lobis alternantia. Stam. exteriora abortientia, interiora in phalanges disposita. Antherae 2loculares. Stylus 3fidus. Caps. 1locularis apice 3valvis polysperma. *Loaseae.*
1934. *Mentzelia.* Cal. 5partitus. Pet. limbo calycis inserta. Stamina exteriora longiora basi dilatata, interiora in phalanges disposita. Antherae 2loculares. Stylus 3fidus. Caps. 1locularis apice 3valvis oligosperma. *Loaseae.*

5. *Flores* 6-10*petali.*

1935. *Mayna* Aubl. Flores dioeci. Cal. 3dentatus. Pet. 8. Antherae 4angulae. Bacca grandis polysperma externe foliosa. *Familia ?*
1936. *Heptaca* Lour. Flores polygami. Cal. 3sepalus. Pet. 10 subrotata. Stigma 7partitum. Bacca 7locularis polysperma. *Familia ?*
1937. *Decadia* Lour. Cal. 3sepalus persistens. Pet. 10 subserrata. Antherae 2lobae. Drupa nuce 3loculari. *Familia ?*
1938. *Bruguiera* Lam. Cal. superus 10-12partitus. Pet. 10-12 conduplicata, singula stamina bina basi ferentia. Fructus 1spermus angulatus, radicula longissima germinante. *Rhizophoreae.*
1939. *Alangium* Juss. Cal. superus 6-10dentatus. Pet. 6. 10. Bacca corticosa 2-sperma. *Myrteae.*
1940. *Lecythis.* Cal. superus 6lobus. Pet. 6 calyci inserta. Discus annularis intus staminibus obsitus, hinc dilatatus in ligulam membranaceam papilloso-lamellatam. Fructus lignosus operculatus sub-4locularis, loculis oligospermis. *Myrteae.*
1941. *Lagerströmia.* Cal. 6fidus campanulatus. Pet. 6 calyci inserta unguiculata. Stam. 6 exteriora crassiora longiora. Caps. stylo coronata 6locularis. *Salicariae ?*
1942. *Thea.* Cal. 5partitus obtusus inferus. Pet. 6. Antherae cordatae dorso affixae. Stylus 3fidus. Caps. 3locularis 3sperma. *Camellieae* Cand.
1943. *Espera* W. Cal. 5partitus. Pet. 6 persistentia. Caps. 4-6-alata 4-6locularis, loculis 1spermis. *Tiliaceae.*
1944. *Sanguinaria.* Cal. 2sepalus deciduus. Pet. 8-12. Stigmata 2. Caps. 1locularis 2valvis. *Papavereae.*
1945. *Argemone.* Cal. 3sepalus deciduus. Pet. 6. Styl. 0. Stigma 5lobum. Caps. 1locularis semivalvata, apice placentis filiformibus fornicatis. *Papavereae.*
1946. *Podophyllum.* Cal. 3sepalus. Pet. 6-9. Bacca subcarnosa 1locularis. *Podophylleae* Cand.

1947.

1947. *Monodora* Dun. Cal. 3partitus. Pet. 6, interna craſſiora. Stigma ſeſſile. Bacca 1locularis polyſperma. *Anoneae.*

6. *Flores polypetali.*

1948. *Oncoba* Forsk. Cal. 4partitus. Pet. 12, ext. longiora. Bacca globoſa 6-12locularis polyſperma. *Familia?*
1949. *Ventenatia* P. B. Cal. 3ſepalus. Pet. 12 ſpathulata. Stigma ſub-5lobum. Bacca 5locularis polyſperma. *Familia?*
1950. *Nymphaea.* Cal. 4-5ſepalus. Stamina exteriora dilatata, omnia germini inſerta. Stigma ſtellato-radiatum medio glanduliferum. Bacca multilocularis. Semina membrana reticulata laxè obvoluta. *Nymphaeae.*
1951. *Euryale* Salisb. Cal. 4ſepalus. Petala cum ſtaminibus germini inſerta. Bacca multilocularis. *Nymphaeae.*
1952. *Nuphar* Sm. Cal 5-6ſepalus. Stamina cum petalis receptaculo inſerta. Stigma ſtellatum. Bacca multilocularis. Semina nuda. *Nymphaeae.*

7. *Flores imperfecti.*

1953. *Thylacium* Lour. Calyptra conica ante antheſin clauſa, dein medio rupta, inferiore parte calycem ſiſtit. Cor 0. Capſ. ſtipitata 6-10valvis: ſemina reniformia in pulpa nidulantia. *Capparideae.*
1954. *Maerua* Forsk. Cal. 4partitus fauce corona petaloidea. Cor. 0. Siliqua ſtipiti innata, cui et ſtamina inſerta. *Capparideae.*
1955. *Ryania* Vahl. Cal. coloratus 5ſepalus perſiſtens. Cor. 0. Urceolus perigynus. Stigm. 4. Bacca polyſperma. *Flacourtieae* Rich.
1956. *Patriſia* Rich. Cal. coloratus 5ſepalus perſiſtens. Cor. 0. Urceolus 0. Fructus capſularis 3-5valvis. *Flacourtieae.*
1957. *Flacourtia* Commerſ. Flores dioeci. Cal. ſub-5partitus. Cor. 0. Stigma ſeſſile radiatum. Bacca multilocularis, loculis 2ſpermis, ſeminibus oſſeis. *Flacourtieae.*
1958. *Roydſia* Roxb. Cal. 6partitus Cor. 0. Stam. columnulae inſerta. Germen pedicellatum. Drupa nuce 3valvi 1ſperma. *Familia?*
1959. *Seguiera.* Cal. 5ſepalus perſiſtens. Cor. 0. Capſ. 4alata 1ſperma. *Familia?*
1960. *Rheedia.* Cor. calycina 4petala. Stylus elongatus, ſtigmate infundibuliformi. Bacca 3ſperma. *Guttiferae.*
1961. *Chloromyron* Perſ. Cal. coloratus 6ſepalus. Cor. 0. Stigma ſeſſile 3lobum. Capſ. 3ſperma. *Guttiferae.*
1962. *Xyloſma* Forſt. Flores dioeci. Cal. 5partitus. Cor. 0. Urceolus crenulatus ſtamina cingens. Stigma ſubſeſſile 3lobum. Bacca ſub-2ſperma. *Guttiferae.*
1963. *Davilla* Vand. Cal. 5ſepalus inaequalis, ſepalis 2 interioribus corollinis maximis genitalia includentibus. Fructus 1ſpermis ſepalis tectus. *Dillenieae.*
1964. *Sloanea.* Cal. 4-7ſepalus. Antherae longiſſimae ſubſeſſiles. Stylus filiformis. Capſ. echinata 4-5locularis 4-5valvis, loculis ſub-3ſpermis, ſeminibus arillo carneo cinctis. *Tiliaceae.*
1965. *Azara* R. et P. Cal. 4-6partitus. Cor. 0. Stamina plurima abortientia. Antherae 2loculares. Bacca polyſperma. *Bixeae* Cand.

1966. *Ludia* Commerſ. Cal. ſub-5lobus. Cor. 0. Stigma 3fidum. Bacca globoſa ſtylo coronata 6-8ſperma. *Bixeae.*
1967. *Prockia* P. Brown. Cal. 3-5ſepalus perſiſtens. Stigma varium. Bacca ſicca oligo-ſ. polyſperma. *Bixeae.*
1968. *Laetia.* Cal. 5ſepalus. Capſ. carnoſa 3-5valvis ſtylo coronata polyſperma. Semina arillata. *Bixeae.*
1969. *Pariana* Aubl. Flores diclini. Cal. 2valvis. Cor. 2valvis. Stigm. 2. Semen triquetrum. *Gramineae.*
1970. *Evandra* R. Br. Spicula ſub-1flora, ſquamulis undique imbricatis, plerisque vacuis. Nux cylindrica cruſtacea. *Cyperaceae.*
1971. *Chryſithrix.* Flores diclini capitati laterales. Cal. 0, niſi ſquamae numeroſae paleaceae ſtamina interſtinguentes. Antherae ſubulatae. Stylus filiformis. *Aroideae — Cyperaceae.*

D I G Y N I A.

1972. *Curatella.* Cal. 5ſepalus intus corollinus. Pet. 3 ſubcalycina. Styli filiformes. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Dillenieae.*
1973. *Hemiſtemma* Juſſ. Cal. 5ſepalus. Cor. 5petala. Stamina 1lateralia, ext. abortientia. Capſ. 2 ſub-1ſpermae. *Dillenieae.*
1974. *Temus* Molin. Cal. 3fidus. Pet. 18 linearia longiſſima. Bacca 2ſperma. *Magnolieae?*
1975. *Bauera* Andr. Cal. 8partitus. Cor. 8petala. Annulus nectarifer perigynus ſtamina gerens. Capſ. 2locularis polyſperma. *Saxifrageae?*
1976. *Poterium.* Flores diclini. Cal. 2ſepalus inferus. Cor. rotata 4fida ſupera. Stigmata penicillata. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Roſaceae.*
1977. *Cliffortia.* Flores diclini. Cal. 3fidus. Cor. 0. Antherae didymae. Semina duo calyce tecta. *Roſaceae.*
1978. *Ablania* Aubl. Cal. 4-5partitus perſiſtens. Cor. 0. Styli 2fidi. Capſ. 1locularis 4valvis, placenta centralis. *Guttiferae.*
1979. *Fothergilla.* Cal. integerrimus. Cor. 0. Filamenta clavata. Antherae 2loculares. Capſ. 2locularis 2ſperma, ſeminibus oſſeis. *Familia?*
1980. *Lacis* Schreb. Cal. 0. Cor. 0. Pedicelli baſi bracteati apice ſpinuloſi ſtaminiferi. Capſ. 1locularis 2valvis, placenta centrali. *Familia?*

T R I G Y N I A.

1981. *Homalium* Jacq. Cal. ſub-6partitus. Cor. ſub-6petala. Stamina terna aggregata: glandulis nectariferis 6, 7 ad baſin petalorum. Capſ. 1locularis polyſperma. Placentatio valvaris. *Roſaceae?*
1982. *Sauravia* W. Cal. 5partitus. Cor. rotata 5partita vel ſub-5petala. Capſ. 5locularis polyſperma. *Ternſtrömieae.*
1983. *Hibbertia* Salisb. Cal. 5ſepalus, fructifer clauſus. Pet. 5. Capſ. congeſtae 1-2ſpermae. *Dillenieae.*
1984. *Paeonia.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Ovaria 3-5 in folliculos pleioſpermos abeunt. *Ranunculeae.*
1985. *Delphinium.* Cal. corollinus 5ſepalus, ſepalo ſuper. calcarato. Petala ſub 4, ſuperiora poſtice cornuta. Ovaria 1-5 in folliculos pleioſpermos abeunt. *Ranunculeae.*

1986. *Aconitum.* Cal. corollinus 5ſepalus, ſepalo ſuper. fornicato (*galea*). Nectaria 2ſtipitata cucullata ſub galea, antice in labellum producta. Ovaria 3 in folliculos pleioſpermos abeunt. *Ranunculeae.*

Palmae.

1987. *Lodoicea* Commerſ. Flores dioeci ſpathacei. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 3ſperma. Putamen fibris involutum lobatum. Embryo ſubverticalis?

1988. *Latania* Commerſ. Flores dioeci ſpathacei. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Bacca 3pyrena. Embryo verticalis.

1989. *Ptychoſperma* Labill. Flores hermaphroditi. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1990. *Seaforthia* R. Br. Flores polygami. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1991. *Iriartea* R. et P. Flores androgyni ſeſſiles, ſpathis imbricatis. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Bacca 1ſperma. Embryo baſilaris.

1992. *Caryota.* Flores monoeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Bacca 2ſperma. Embryo dorſalis.

1993. *Jubaea* Humb. Flores hermaphroditi pedicellati. Cal. 3partitus. Cor. 3partita. Drupa nuce ſuperne 3forata. Albumen cavum.

1994. *Diplothemium* Mart. Flores androgyni, ſpathis duplicibus. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa fibroſa, putamine poris tribus baſilaribus. Embryo intra porum in albumine aequabili.

1995. *Attalia* Humb. Flores androgyni ſeſſiles. Cal. 3partitus. Cor. 3petala. Drupa 3locularis 3ſperma. Putamen baſi 3foratum. Embryo baſilaris in albumine aequabili.

1996. *Gomutus* Rumph. Flores monoeci ſeſſiles. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Antherae mucronatae. Bacca 3ſperma. Embryo lateralis.

1997. *Manicaria* Gärtn. Flores androgyni. Spatha reticulato-fibroſa. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Drupa 3cocca, cortice ſuberoſo echinato, putamine cruſtaceo baſi 1poro. Embryo baſilaris in albumine cavo.

1998. *Begonia.* Flores monoeci. Cal. 0. Cor. 4petala, petalis oppoſitis majoribus: ♀ ſub-6petala. Styli 3-2fidi. Capſ. infera 3angularis alata 3locularis polyſperma. *Familia?*

1999. *Mallotus* Lour. Flores dioeci. Cal. 3ſepalus. Cor. 0. Antherae 2lobae. Stylus 0. Stigmata 3. Capſ. ſubrotunda 1ſperma 6valvis, valvis ſubſeptiferis, ſemine pedicellato. *Familia?*

TETRAGYNIA.

2000. *Caryocar.* Cal. 5lobus. Pet. 5. Stamina duplici ſerie, interiora baſi ſubcoalita abortientia. Drupa nucleis 1-4 reticulatis. *Rhizoboleae* Cand.

2001. *Pera* Mut. Flores dioeci. Cal. 2ſepalus. Pet. 1 concavum. Squamae nectariferae multifidae. Capſ. 3locularis 3ſperma. *Tricoccae?*

2002. *Marialvea* Vand. Cal. 2ſepalus. Pet. 4. Pomum 4ſpermum. *Guttiferae?*

2003. *Cimicifuga*. Cal. 4-5ſepalus. Pet. 4-5-6 cartilaginea. Capſ. 4, 5 folliculares. *Ranunculeae*.

2004. *Drimys* Forſt. Cal. 2-3partitus. Pet. 6-24. Filamenta breviſſima apice craſſiora. Antherae didymae. Baccae 4-8 1loculares polyſpermae. *Magnolieae*.

2005. *Tetracera*. Cal. 4-6ſepalus imbricatus. Cor. 4-5petala ſ. 0. Filamenta apice dilatata, utrinque antherarum loculos discretos gerentia. Styli ſimplices. Folliculi 2valves ſub-2ſpermi: ſemina arillata. *Dillenieae*.

2006. *Agdeſtis* Seſſ. Cal. 4ſepalus. Cor. 0. Filamenta filiformia: antherae 2fidae medio inſertae. Fructus 4 ſtigmatibus reflexis coronati coaliti. *Meniſpermeae* Cand.

PENTAGYNIA.

2007. *Aquilegia*. Cal. 5ſepalus coloratus. Pet. 5 apice hiantia baſi cornuta. Stam. interiora dilatata abortientia ſubperſiſtentia. Folliculi pleioſpermi. *Ranunculeae*.

2008. *Nigella*. Cal. 5ſepalus corollinus. Pet. 5 2labiata, ungue foveolato nectarifero. Folliculi roſtrati polyſpermi. *Ranunculeae*.

2009. *Laplacea* Kunth. Cal. 4ſepalus imbricatus. Pet. 9 aequalia. Stam. 3ſeriata. Capſ. 5locularis, loculis 3ſpermis: ſemina dorſo alata axi centrali affixa. *Ternſtrömieae*.

2010. *Wormia* Rottb. Cal. 5ſepalus obtuſiſſimus. Pet. 5. Antherae lineares elongatae. Folliculi pleioſpermi. *Dillenieae*.

2011. *Porcelia* R. et P. Cal. 3ſepalus. Pet. 6, interiora majora. Capſulae 3-6 cylindricae coriaceae polyſpermae. *Anoneae*.

2012. *Reaumuria*. Cal. 5partitus. Pet. 5 baſi ſquamis crenatis. Capſ. 5locularis: ſemina lanata. *Aizoideae*.

2013. *Gynocardia* Roxb. Flores dioeci. Cal. 5lobus. Pet. 5 baſi ſquamis nectariferis. Stigmata cordata. Bacca ſicca polyſperma. *Cappparideae*.

2014. *Roumea* Poit. Flores dioeci. Cal. campanulatus 4-5partitus. Stamina baſi glandula crenata cincta. Stigmata umbilicata. Bacca ſtylis coronata oligoſperma. *Flacourtieae*.

POLYGYNIA.

1. *Flores perfecti.*

2015. *Sagittaria*. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Caryopſes plurimae exalbuminoſae. *Hydrocharideae*.

2016. *Braſenia* Schreb. Cal 3ſepalus. Cor. 3petala. Capſulae plures 2ſpermae. Embryo operculatus. *Hydrocharideae*.

2017. *Limnocharis* Bonpl. Cal. 3ſepalus. Cor. 3petala. Filamenta ſterilia peripherica. Folliculi plures membranacei polyſpermi. *Hydrocharideae*.

2018. *Nelumbium* W. Cal. 4-5ſepalus. Antherae laterales. Receptaculum ſuberoſum nuculas plurimas in alveis fovet, embryone evoluto. *Nymphaeae*.

2019. *Eucryphia* Cav. Cal. 5ſepalus. Cor. 5petala, initio calyptra tecta. Capſulae plures cymbaeformes polyſpermae axi centrali affixae. *Familia?*

2020. *Carpodon* Labill. Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Capſ. lignoſa multilocularis: ſeminibus alatis. *Familia?*
2021. *Guatteria* R. et P. Cal. 3partitus. Cor. 6petala. Antherae ſubſeſſiles. Baccae plurimae 1ſpermae. *Anoneae.*
2022. *Xylopia.* Cal. 3-5lobus. Cor. 6petala. Fructus 1-2ſpermi ſubſtipitati. *Anoneae.*
2023. *Artabotrys* R. Br. Cal. 3partitus. Cor. 6petala aequalis. Bacca 2ſperma, ſeminibus juxta ſe poſitis, pedunculo cirrhifero. *Anoneae.*
2024. *Unona.* Cal. 3lobus. Pet. 6, interiora minora. Fructus ſtipitati pleioſpermi. *Anoneae.*
2025. *Uvaria.* Cal. 3partitus. Pet. 6, exteriora minora. Baccae ſtipitatae multiloculares polyſpermae, ſeminibus 2ſeriatis. *Anoneae.*
2026. *Aſimina* Adanſ. Cal. 3partitus. Pet. 6, interiora minora. Antherae ſubſeſſiles. Baccae polyſpermae. *Anoneae.*
2027. *Anona.* Cal. 3partitus. Pet. 6. Antherae ſubſeſſiles. Fructus plures in baccam multilocularem cortice ſquamoſo muricato tectam connatae. *Anoneae.*
2028. *Cadſura* Juſſ. Cal. 3partitus. Pet. 6. Fructus plurimi glomerati 2ſpermi. *Familia?*
2029. *Liriodendron.* Cal. 3ſepalus bracteatus. Pet. 6. Samarae plures in conum aggregatae. *Magnolieae.*
2030. *Magnolia.* Cal. 3ſepalus. Pet. 9 et plura. Antherae laterales. Fructus 2valves 1ſpermi in conum aggregati: ſemina pendula funiculis umbilicalibus longiſſimis. *Magnolieae.*
2031. *Michelia.* Cal. 3ſepalus. Pet. 9 et plura. Antherae laterales. Capſ. baccatae 2valves pleioſpermae discretae. *Magnolieae.*
2032. *Illicium.* Cal. 3-6ſepalus. Pet. 9 et plura. Capſ. 2valves 1ſpermae ſtellatim diſpoſitae. *Magnolieae.*
2033. *Dillenia.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Capſ. plures polyſpermae in fructum carnoſum coalitae. *Dillenieae.*
2034. *Atragene.* Cal. corollinus 4ſepalus. Pet. linearia. Caryopſes plurimae caudatae. *Ranunculeae.*
2035. *Knowltonia* Salisb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 et plura, unguibus nudis. Caryopſes baccatae. *Ranunculeae.*
2036. *Adonis.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5 et plura, unguibus nudis. Caryopſes ſiccae acutae. *Ranunculeae.*
2037. *Ranunculus.* Cal. 5ſepalus. Pet. 5, baſi ſquama nectarifera. Caryopſes compreſſae mucronatae. *Ranunculeae.*
2038. *Hamadryas* Commerſ. Flores dioeci. Cal. 5-6ſepalus. Pet. 10, 12 linearia. Stigmata ſeſſilia. Caryopſes ovatae. *Ranunculeae.*

2. *Flores imperfecti.*

2039. *Trollius.* Cal. corollinus polyſepalus. Nectaria tubuloſa 1labiata. Folliculi plurimi pleioſpermi. *Ranunculeae.*
2040. *Helleborus.* Cal. ſubcorollinus 5ſepalus. Nectaria tubuloſa. Folliculi plures pleioſpermi. *Ranunculeae.*
2041. *Coptis* Salisb. Cal. corollinus 5-6ſepalus. Nectaria tubuloſa. Folliculi plures longe ſtipitati oligoſpermi ſtylo coronati. *Ranunculeae.*
2042. *Caltha.* Cal. corollinus 5ſepalus. Nectaria 0. Folliculi plures pleioſpermi. *Ranunculeae.*

2043. *Anemone.* Cal. corollinus pleiofepalus fubinvolucratus. Nectaria 0. Caryopfes ecaudatae. *Ranunculeae.*

2044. *Pulfatilla* Tourn. Cal. corollinus 5-6fepalus. Glandulae ftipitatae nectariferae ad bafin fepalorum. Caryopfes caudatae. *Ranunculeae.*

2045. *Clematis.* Cal. corollinus 4-5fepalus. Nectaria 0. Caryopfes caudatae. *Ranunculeae.*

2046. *Thalictrum.* Cal. corollinus 4-5fepalus. Nectaria 0. Filamenta elongata fubdilatata. Caryopfes nudae. *Ranunculeae.*

2047. *Gyroftemon* Desf. Flores dioeci. Cal. lobatus vel repandus. Cor. 0. Stamina in plures orbes concentricos difpofita. Capf. plures 2valves 1fpermae in orbem difpofitae. *Malvaceae.*

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

1876. Antholoma Labill.

montanum Labill. *Nov. Caledon.* Arbor foliis oblongis coriaceis, floribus corymbofis.

1877. Marcgravia.

umbellata 1. M. foliis ramorum fterilium cordatis fubfeffilibus obtufiusculis, floridorum ovato-oblongis acuminatis venofis. *Amer. trop.*

coriacea Vahl. 2. M. foliis ellipticis coriaceis eveniis. *Guiana.*

picta W. 3. M. foliis ramorum fterilium cordatis obtufis fupra albo-reticulatis. *Brafil.* Hofmannsegg.

fpiciflora Rich. 4. M. foliis obovato-oblongis obtufis acutisque, racemo terminali ftricto multifloro, bracteis recurvis, ftigmate 4lobo. *Guadalupa in monte ignivomo.*

1878. Swartzia W.

fimplex * 1. Sw. foliis fimplicibus oblongis, petiolis fubmarginatis, pedunculis racemofis, petalo fubrotundo calycem fuperante. *Inf. Carib.* (Rittera Vahl. Sw., Swartzia fimplicifolia W.)

† *grandiflora* W. 2. Sw. foliis fimplicibus oblongis acuminatis, petiolis teretibus, pedunculis 3floris, petalo reniformi maximo. *Inf. Trinit.* (Rittera Vahl.)

dodecandra W. 3. Sw. foliis fimplicibus fubfeffilibus ovato-oblongis emarginatis, pedunculis racemofis, petalo fubfpathulato calycem fubaequante. *Amer. auftr.*

triphylla W. 4. Sw. foliis ternatis oblongis, medio maximo, petiolis marginatis apice 2dentatis, petalo fubrotundo calycem fuperante. *Guiana. Brafil.* (Poffira arborefcens Aubl. Rittera Schreb.)

pinnata W. 5. Sw. foliis pinnatis, petiolo communi tereti. *Inf. Trinit.* (Rittera Vahl.)

alata W. 6. Sw. foliis pinnatis, petiolo communi alato, floribus apetalis, legumine elliptico. *Guiana.* (Tounatea guianensis Aubl.)

Langsdorffii Radd. 7. Sw. foliis pinnatis, petiolo communi alato, petalo subrotundo unguiculato. *Brasil.*

Flemingii Radd. 8. Sw. foliis pinnatis petioloque semitereti hirsutis, petalo calycem multo superante. *Brasil.*

apetala Radd. 9. Sw. foliis pinnatis petioloque canaliculato laevibus, floribus apetalis. *Brasil.*

1879. FOUQUIERA Kunth.

formosa Kunth. *Mexico.* Frutex spinosus, foliis solitariis subcarnosis, floribus terminalibus spicatis incarnatis.

1880. OMPHALOCARPUS P. B.

procerus P. B. *Guinea.* Arbor excelsa ramosa, floribus trunco innascentibus sessilibus, fructu umbilicato e corpusculis lignosis irregularibus composito.

1881. DICALYX Lour.

cochinchinensis Lour. *Cochinchina.* Arbor excelsa, foliis lanceolatis serratis, floribus racemosis albis.

1882. ASTERANTHUS Desf.

brasiliensis Desf. *Brasil.* Frutex foliis alternis ovato-lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis speciosis.

1883. DOLIOCARPUS Roland.

Rolandri J. F. Gmel. 1. D. caule scandente, foliis oblongis acuminatis apice dentatis, pedunculis lateralibus 1floris. *Surinam.* (Tetracera W.)

strictus Poir. 2. D. caule stricto, foliis ovato-lanceolatis dentatis deflexis, floribus terminalibus. *Surinam.* (Tetracera W.)

Calinea J. F. Gmel. 3. D. caule scandente, foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis multifloris lateralibus. *Guiana.* (Calinea scandens Aubl., Tetracera W.)

† *Soramia* Cand. 4. D. caule scandente, foliis obovatis integerrimis, pedunculis lateralibus subcorymbosis, floribus 5petalis. *Guiana.* (Soramia guianensis Aubl. Tetracera obovata W. Mappia Schreb.)

1884. TRILIX.

lutea *Cuba.* Frutex foliis alternis ovato-oblongis serratis, floribus lateralibus racemosis.

1885. PAPAVER.

* *Capſulis hiſpidis.*

hybridum 1. P. capſulis ſubgloboſis toroſis ſulcatis, caule folioſo, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus. *Europ. arva fertilia.*

Argemone 2. P. capſula clavata, caule folioſo, foliis 2pinnatifidis lineari-lanceolatis. *Europ.*

nudicaule 3. P. capſula obovato-oblonga, ſcapo 1floro, foliis ſimplicibus pinnatifidis (hirſutis ſ. glabris). *Norvegia. Island. Inſ. Faeroer. Grönland. Labrador. Sibir. Camtſchatca.* (P. microcarpon Cand.)

alpinum 4. P. capſula obovato-oblonga, ſcapo 1floro, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus ariſtatis. *Alp. Europ. med.*

pyrenaicum W. 5. P. capſula obovata, ſcapo 1floro, foliis pinnatis piloſis, pinnis inferioribus 3partitis. *Pyren. et Gallia auſtr.* (P. ſuaveolens Lapeyr. Argemone pyrenaica L.)

** *Capſulis glabris.*

† *Annua.*

Rhoeas 6. P. capſula obovata, ſetis caulinis patentibus foliis pinnatifidis inciſis. *Europ.*

dubium 7. P. capſula oblonga, ſetis caulinis appreſſis, foliis 2pinnatifidis. *Europ.*

obtuſifolium Desf. 8. P. capſula obovata depreſſa, ſetis caulinis abbreviatis patentibus, foliis 2pinnatifidis, laciniis ovatis obtuſiuſculis. *Afric. bor.*

trilobum Wallr. 9. P. capſula ſubrotunda, caule folioſo foliisque 3lobis acutis baſi attenuatis glaberrimis. *In Thuringia rariſſimum.*

laevigatum MB. 10. P. capſula oblonga calyceque glabris, ſetis caulinis rariſſimis, foliis pinnatifidis inciſis hirſutiuſculis. *Tauria. Caucaſ.*

arenarium MB. 11. P. capſula oblonga, calyce hiſpido, ſetis caulinis patulis raris, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus. *Caucaſ.*

caucaſicum MB. 12. P. capſula oblonga, calyce hirto, ſetis caulinis rariſſimis caducis, foliis pinnatifidis glaucis glabris, laciniis inciſis obtuſis ariſtatis. *Caucaſ.*

fugax Poir. 13. P. capſula ovata calyceque glabris, ſetis caulinis rariſſimis, foliis pinnatifidis glaucis, laciniis lanceolatis integris ariſtatis. *Perſia.*

turbinatum Cand. 14. P. capſula turbinata calyceque glabris, ſetis caulinis raris, foliis pinnatifidis, laciniis ovatis integris muticis. *Ad Euphraten.*

armeniacum Lam. 15. P. capſula elliptico-oblonga calyceque glabris, ſetis caulinis raris, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus ariſtatis. *Armenia.* (Argemone armeniaca L.)

† *Roubievi* Vign. 16. P. capſula oblonga, ſetis caulinis patulis, foliis 2pinnatifidis hirſutis, laciniis linearibus ariſtatis. *In agro Monspel. rariſſimum.*

floribundum Desf. 17. P. capſula oblonga, calyce hiſpido, ſetis caulinis patulis ſparſis, foliis inferioribus bi-ſuperioribus pinnatifidis glaucis piloſis, laciniis ovatis ariſtatis. *Armenia.* (P. virgatum Sm.)

horridum Cand. 18. P. capſula ſubelliptica, calyce hiſpido, ſetis caulinis confertis rigidis, foliis ſeſſilibus glaucis ſinuato-pinnatifidis, laciniis inciſo-dentatis ariſtatis. *Nov. Holl.*

gariepinum Burch. 19. P. capſula obovato-oblonga, calyce hiſpido, ſetis caulinis confertis inaequalibus rigidis, foliis ſeſſilibus ſinuato-pinnatifidis hiſpidis, laciniis ovatis remotis *Afric. auſtr.*

ſetigerum Cand. 20. P. capſula obovata, calyce hiſpido, caule glabro paucifloro, foliis amplexicaulibus glaucis inciſo-repandis, dentibus ariſtatis. *Inſ. Stoechad.*

ſomniferum 21. P. capſula globoſa calyceque glabris, caule foliisque amplexicaulibus inciſo-repandis obtuſe dentatis glaucis glabris. *Graecia. Aſia minor. Aegypt.*

† *Perennia.*

orientale 22. P. capſula obovata, calyce hirſuto, caule ſtrigoſo, foliis decurſive pinnatis hirtis, laciniis oblongis ſerratis. *Aſia minor. Caucaſ.* (P. bracteatum Lindl.)

piloſum Sm. 23. P. capſula obovata, calyce piloſo, caule foliisque amplexicaulibus obtuſe lobatis hirtis. *Olympus Aſiae minor.*

1886. STYLOPHORUM Nutt.

cambricum * 1. St. capſulis oblongis coſtatis cauleque glabris, foliis ternatis petiolatis pinnatifidis obtuſe dentatis hirſutiuſculis. *Cambria.* (Papaver cambricum L. Meconopſis Vign. Cand.)

ohienſe * 2. St. capſulis ellipticis turgidis denſe ſetoſis, caule ſub-4angulo ſuperne piloſo, pedunculis ſubcymoſis, foliis longe petiolatis pinnatifido-lobatis ſubtus glaucis glabriuſculis. *Ad fl. Ohio.* (St. petiolatum Nutt. Meconopſis Cand.)

diphyllum Nutt. 3. St. capſulis —, foliis ſeſſilibus obtuſis lobatis undulatis glauceſcentibus, ſetis ſparſis. *Amer. bor.* (Chelidonium diphyllum Mx. Meconopſis Cand.)

1887. CHELIDONIUM.

majus 1. Ch. foliis compoſitis ſinuato-lobatis inciſo-dentatis, floribus ſubumbellatis. *Europ. Aſia.* (Ch. laciniatum Mill. et grandiflorum Cand. varr.)

japonicum Thb. 2. Ch. foliis impari-pinnatis 2jugis, foliolis ovato-oblongis inciſo-ſerratis ciliatis, pedunculis 1floris axillaribus. *Japon.*

1888. GLAUCIUM Tourn.

luteum Scop. Sm. 1. Gl. caule glabro, foliis inferioribus lyrato-pinnatifidis dentatis hiſpidiuſculis, ſummis cordatis amplexicaulibus, ſiliquis aſperis. *Europ. med.* (Chelidonium Glaucium L. Gl. fulvum Sm. var.)

phoeniceum Sm. 2. Gl. foliis omnibus ſinuato-pinnatifidis dentatis cauleque piloſis, ſiliquis ſubſtrigoſis. *Ad lacum Mansfeldenſem. Gallia. Anglia. Italia.* (Chelidonium corniculatum L.)

rubrum Sm. 3. Gl. foliis caulinis pinnatifidis inciſis cauleque piloſis, ſiliquis villoſiuſculis. *Graecia. Aſia minor.*

meſopotamicum * 4. Gl. caule hiſpido, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus, ſiliquis ſetoſis ſubincurvis. *Meſopotamia.* (Römeria 2valvis Cand.)

refractum Stev. 5. Gl. foliis 2pinnatifidis, laciniis obtuſiuſculis, pedunculis fructiferis recurvis, ſiliquis glabris ſub-4valvibus. *Perſia bor.*

violaceum Sm. 6. Gl. foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus, pedunculis rectis, ſiliquis ſub-3valvibus. *Anglia. Europ. auſtr.* (Chelidonium hybridum L. Römeria violacea Medic., hybrida Cand.)

1889. ACTAEA.

ſpicata 1. A. foliis 3ternatis, foliolis ovato-lanceolatis inciſo-ſerratis, racemo ovato, ſtaminibus petala aequantibus, baccis ſubgloboſis. *Europ. Caucaſ. Sibir.*

brachypetala Cand. 2. A. foliis 3ternatis, foliolis ovato-lanceolatis inciſo-ſerratis, racemo ovato, ſtaminibus petala ſuperantibus, baccis ovato-oblongis. *Amer. bor.* (A. ſpicata Mx., rubra W., americana Pursh., alba Mill.)

1890. GRIAS.

cauliflora *Jamaica.* Arbor excelſa, foliis obovatis 3pedalibus, floribus per caulem ramosque ſparſis albis.

1891. CALOPHYLLUM.

Inophyllum 1. C. foliis obovatis emarginatis, racemis axillaribus. *Ind. or. Inſ. oceani auſtr.*

Tacamahaca W. 2. C. foliis elliptico-oblongis acutiuſculis, racemis axillaribus. *Inſ. Maſcaren. Madagascar.*

Calaba 3. C. foliis ellipticis retuſis, pedunculis lateralibus paucifloris. *Jamaica. Hiſpaniola.*

apetalum W. 4. C. foliis ellipticis emarginatis, pedunculis axillaribus inferioribus 1floris aggregatis, ſuperioribus paucifloris, floribus apetalis. *Ceylon.* (C. Calaba L.)

ſpectabile W. 5. C. foliis oblongis utrinque attenuatis, racemis axillaribus multifloris, fructibus acutiuſculis. *Inſ. Maſcaren.* (C. acuminatum Lam.)

acuminatum W. 6. C. foliis oblongis acuminatis, pedunculis pauciflorîs. *Nov. Granat.* (C. Madruño Kunth.)

† *longifolium* W. 7. C. foliis lineari-oblongis elongatis. *Nov. Granat.*

1892. Mammea.

americana 1. M. foliis obovato-oblongis obtuſis integerrimis coriaceis parallele venoſis, fructibus 4ſpermis. *Ind. occid.*

emarginata Seſſ. 2. M. foliis obovatis obtuſiſſimis emarginatis, fructibus 2ſpermis. *Mexico.*

1893. Sparrmannia Thunb.

africana Thb. *Afric. auſtr.* Frutex ramis hirſuto-villoſis, foliis cordatis angulatis dentatis, floribus umbellatis albis.

1894. Capparis.

I. *Fructibus oblongis ſ. brevioribus.*

* *Pedunculis ſubſolitariis.*

† *Inermes.*

mariana Jacq. 1. C. ramis ſuperne farinoſis, foliis cordato-ovatis obtuſiuſculis, pedunculis folia aequantibus. *Inſ. Marianae ſ. Latronum.* (C. cordifolia Lam.)

Sandwichiana Cand. 2. C. foliis ellipticis glabriuſculis, pedunculis folia aequantibus. *Inſ. Sandwich.*

clutiaefolia Burch. 3. C. foliis obovato-oblongis mucronatis glabris, pedunculis folio brevioribus, floribus oligandris. *Afric. auſtr.*

lineata Perſ. 4. C. ramis farinoſis, foliis ovatis acuminatis ſubtus tomentoſis venoſo-lineatis. *Braſil.*

†† *Spinis ſtipularibus uncinatis ſ. reflexis.*

ſpinoſa 5. C. foliis ſubrotundis retuſis glabris, pedunculis folia ſubſuperantibus. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (C. rupeſtris Sm. varietas inermis.)

Fontaneſii Cand. 6. C. foliis cordato-ovatis acutiuſculis. *Afric. bor.* (C. ovata Deſf.)

aegyptia Lam. 7. C. ramis junioribus villoſo-tomentoſis, foliis ſubrotundis baſi attenuatis mucronatis glabris, pedunculis folia ſuperantibus. *Aegypt. Creta.*

nepalenſis Cand. 8. C. foliis ovatis breviſſime petiolatis ramisque caneſcentibus, pedunculis folia ſuperantibus. *Nepal.*

leucophylla Cand. 9. C. foliis orbiculatis incano-villoſis breviſſime petiolatis, pedunculis folia ſuperantibus. *Syria.*

tomentoſa Lam. 10. C. foliis parvis oblongis retuſis villoſo-tomentoſis breviter petiolatis, pedunculis breviſſimis. *Senegambia.*

dealbata Cand. 11. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſupra glaberrimis ſubtus villoſis, pedunculis petiolos aequantibus. *Inſ. Timor.*

erythrocarpa Iſert. 12. C. foliis oblongis acuminatis mucronatis glabris ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis petiolos aequantibus. *Guinea.* (C. Afzelii Cand.?)

pyrifolia Lam. 13. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis demum glabris, pedunculis folio brevioribus. *Ind. or.*

††† *Spinis ſtipularibus rectis.*

herbacea W. 14. C. foliis ellipticis acutis glabris, junioribus pubeſcentibus, pedunculis folio longioribus, caule herbaceo. *Tauria. Caucaſ.* (C. ovata MB.)

rotundifolia Rottl. 15. C. foliis ſeſſilibus ſubcordato-ovatis glabris, fructibus globoſis. *Ind. or.*

caneſcens Banks. 16. C. foliis ovatis acutiuſculis petiolum longe excedentibus villoſis, pedunculis folia aequantibus. *Nov. Holl.*

breviſpina Cand. 17. C. ſpinis abbreviatis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis glabris, pedunculis petiolum 3plo ſuperantibus. *Ind. or.*

Rheedii Cand. 18. C. foliis ovali-oblongis mucronatis glabris ſubtus reticulatis breviſſime petiolatis, pedunculis folia aequantibus. *Malabar.* (Baducca Rheed.)

ſtyloſa Cand. 19. C. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis glabris, pedunculis petiolos 3plo ſuperantibns, laciniis calycis acuminatis, germine in ſtylum craſſum producto. *Coromandel.*

** *Pedunculis aggregatis unifloris: ſpinoſae.*

aphylla Roth. 20. C. aphylla, caule flexuoſo dichotomo, ramis divaricatis glaberrimis, ſpinis ſubuncinatis, pedunculis umbellatis. *Ind. or.*

pubiflora Cand. 21. C. foliis ovali-oblongis acuminatis glabris, ſpinulis minimis rectis, pedunculis ſubaggregatis petiolos ſuperântibus. *Java.*

horrida 22. C. foliis ovatis acutis mucronatis, ramis flexuoſis, ſpinis patentibus, pedunculis ſubgeminatis. *Ceylon. Coromandel.*

acuminata W. 23. C. foliis ovatis acuminatis ſubtus ramulisque ferrugineo-tomentoſis, ſpinis rectis, pedunculis geminatis petiolos ſuperantibus. *Ind. or.*

ceylanica 24. C. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, ſpinis rectis, pedunculis geminis petiolos ſuperantibus. *Ceylon. Cochinchina.*

Volkameria Cand. 25. C. foliis ovatis calloſo-mucronatis ſubtus rufo-velutinis, ſpinis uncinatis, pedunculis aggregatis, petalis ciliatis. *C. B. S.*

Billarderii Cand. 26. C. foliis ovali-oblongis venoſo-reticulatis ramulisque glabris, ſpinis rectis, pedunculis aggregatis, germine ſubſeſſili. *Inſ. Molucc.*

laſiantha R. Br. 27. C. foliis ovato-oblongis breviſſime petiolatis demum glabris, junioribus ramulis calycibusque villoſis, ſpinis rectiuſculis, pedunculis aggregatis. *Nov. Holl.*

terniflora Cand. 28. C. foliis ovatis mucronatis demum glabris, junioribus calycibusque villoſis, ſpinis uncinatis, pedunculis aggregatis. *Coromandel.*

quadriflora Cand. 29. C. foliis ovatis acuminatis calloſo-mucronatis ſupra glabris ſubtus ramulis calycibusque villoſis, pedunculis aggregatis. *Ind. orient.* (C. pyrifolia β. Lam.)

micracantha Cand. 30. C. foliis ovalibus obtuſis calloſo-mucronatis, ſpinis parvis rectis, pedunculis aggregatis. *Java.*

*** *Pedunculis racemoſis, corymboſis.*

† *Inermes.*

umbellata R. Br. 31. C. foliis ovalibus obtuſis ſubemarginatis glabris, ramulis petiolisque pubeſcentibus, pedunculis terminalibus umbellato-corymboſis. *Nov. Holl.*

obovata Hamilt. 32. C. foliis obovatis ſubtus ramulisque cinereo-villoſis, pedunculis corymboſis. *Ind. orient.* (C. maxima Roth.)

grandis 33. C. foliis ovatis acutis glabris, ramulis ſubvilloſis, pedunculis corymboſis, fructibus globoſis. *Ceylon.*

oleoides Burch. 34. C. foliis obovato-oblongis mucronatis glabris, racemis axillaribus folio ſubbrevioribus, floribus 8andris, fructibus globoſis. *Afric. auſtr.*

albitrunca Burch. 35. C. foliis obovato-oblongis obtuſiſſimis glabris, racemis axillaribus folio brevioribus, floribus 8andris. *Afric. auſtr.*

punctata Burch. 36. C. foliis oblongis baſi attenuatis ſubmucronatis glabris venoſo-reticulatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Afric. auſtr.*

frondoſa Jacq. 37. C. foliis ſubcordato-oblongis utrinque attenuatis elongatis coriaceis glabris, pedunculis terminalibus ſtrictis corymbiferis, fructibus oblongis toruloſis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (C. braſiliana Cand.)

cuneata Cand. 38. C. foliis obovatis mucronatis coriaceis glabris petiolum 3plo excedentibus, floribus racemoſis. *Inſ. Carib.*

macrophylla Humb. 39. C. foliis longe petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſubcoriaceis glabris, pedunculo terminali ſtricto racemoſo. *Ad fl. Magdalen.*

petiolaris Humb. 40. C. foliis longe petiolatis oblongis utrinque rotundatis membranaceis glabris, racemis terminalibus. *Quito.*

heterophylla R. et P. 41. C. foliis obovato-oblongis mucronatis emarginatisve glabris, axillis glanduliferis, racemis terminalibus corymboſis, fructu clavato. *Quito.*

macrocarpa R. et P. 42. C. foliis ovalibus mucronatis utrinque glabris, calycibus baſi glanduloſis, fructu ſubrotundo. *Quito.*

verrucoſa Lam. 43. C. foliis ovato-oblongis acutis ſubſeſſilibus coriaceis glabris, ramulis ruguloſis, racemis terminalibus paucifloris, fructibus oblongis verrucoſis. *Nov. Granat.*

amplissima Lam. 44. C. foliis ovalibus coriaceis nitidis, floribus axillaribus solitariis terminalibus racemosis, fructibus ellipticis pendulis. *Amer. austr.*

pulcherrima Jacq. 45. C. foliis ovato-oblongis obtusiusculis brevissime petiolatis glabris, racemo terminali stricto, calycibus reflexis, fructibus subrotundis. *Amer. austr.*

nemorosa Jacq. 46. C. foliis ovatis acuminatis supra glabris subtus villoso-tomentosis, glandula axillari obtusa, fructibus ovato-oblongis. *Amer. austr.* (C. mollis Kunth.)

incana Kunth. 47. C. foliis subpeltatis oblongis flavicantibus apice calloso-mucronatis supra aspero-punctatis subtus pube stellata tomentosis, racemis paucifloris, fructibus oblongis furfureo-floccosis. *Mexico. Hispaniola* Bertero.

odoratissima Jacq. 48. C. foliis ovato-oblongis acuminatis superne glabris subtus lepidoto-pilosis, racemis terminalibus longe pedunculatis, staminibus corollam subaequantibus. *Hispaniola. Amer. austr.*

Pachaca Humb. 49. C. foliis cordato-oblongis obtusis subemarginatis glabris coriaceis supra nitidis, floribus racemosis, fructibus globosis. *Cumana.*

avicennifolia Humb. 50. C. foliis ellipticis brevissime petiolatis subretusis coriaceis supra nitidis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis, calycibus campanulatis obtusis, fructibus globosis. *Peru.*

scabrida Humb. 51. C. foliis longe petiolatis oblongis acutiusculis coriaceis subtus incano-tomentosis, racemis terminalibus, fructibus ovato-oblongis. *Amer. austr.*

crotonoides Humb. 52. C. foliis cordato-subrotundis obtusis membranaceis supra villosis subtus tomentosis, racemis terminalibus, floribus 8andris. *Peru.*

brevisiliqua Cand. 53. C. foliis ellipticis emarginatis glabris breviter petiolatis, pedunculis terminalibus umbellatis paucifloris. *Nov. Hispan.*

ferruginea 54. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis subtus lepidoto-pilosis, ramulis tomentosis, floribus corymbosis sub-8andris, fructibus obovatis. *Jamaica. Hispaniola.* (C. 8andra Jacq.)

cordata R. et P. 55. C. foliis cordato-subrotundis utrinque pube stellata tomentosis, pedunculis racemosis paucifloris, fructibus subglobosis. *Quito.*

laurina Humb. 56. C. foliis oblongis obtusis coriaceis glabris nitidis, racemis terminalibus, fructibus globosis. *Peru.*

†† *Spinosae.*

citrifolia Lam. 57. C. foliis oblongis mucronatis glabris, spinis uncinatis, pedunculis terminalibus umbellatis. *Afric. austr.* (C. capensis Thunb.)

sepiaria 58. C. foliis obovato-ellipticis submucronatis glabris, junioribus ramisque divaricatis canescentibus, spinis uncinatis, pedunculis terminalibus

umbellatis. *Ind. or.* (C. incanefcens et Roxburghii Cand.)

corymbofa Lam. 59. C. foliis ovalibus fubtus pubefcentibus, fpinis uncinatis, floribus corymbofis terminalibus. *Senegambia.* (C. puberula Cand.)

racemifera Cand. 60. C. foliis obovatis fubtus ramulisque inermibus pubefcentibus, ftipulis ramorum fubfpinofis inaequalibus, racemis terminalibus. *Ind. or.*

Braffii Cand. 61. C. foliis ovato-lanceolatis glabris, ramulis petiolisque pubefcentibus, fpinis uncinatis, racemis corymbofis axillaribus. *Afric. occ.*

fafcicularis Cand. 62. C. foliis ellipticis demum glabris, fpinis ramorum fubuncinatis, ramulis inermibus, racemis fafciculato-corymbofis axillaribus. *Afric. occ.*

lanceolaris Cand. 63. C. foliis lanceolatis acutis, fpinis uncinatis, racemis axillaribus fubcorymbofis, pedicellis bafi utrinque fpinofo-ftipulatis. *Java.*

II. *Fructibus elongatis fubcylindricis.*

cynophallophora Mill. 64. C. foliis oblongis obtufis coriaceis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis terminalibus paucifloris, fructu longiffimo torulofo. *Ind. occ.* (C. flexuofa L.)

Euftachiana Jacq. 65. C. foliis ovatis acuminatis fubcoriaceis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis paucifloris folio brevioribus. *Inf. Carib.* (C. brevis *.)

faligna Vahl. 66. C. foliis lineari-lanceolatis utrinque rotundatis venofis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis terminalibus paucifloris, fructu tereti torulofo. *Inf. Carib.*

haftata Jacq. 67. C. foliis haftato-lanceolatis coriaceis, racemis terminalibus multifloris. *Amer. auftr.*

linearis Jacq. 68. C. foliis linearibus coriaceis glabris, axillis glanduliferis, racemis paniculatis. *Amer. auftr.*

lanceolata R. et P. 69. C. foliis lanceolatis mucronulatis glabris, pedunculis paniculatis, bracteis bafi glanduliferis, fructibus longiffimis. *Quito.*

guayaquilenfis Humb. 70. C. foliis oblongis obtufis glabris fubmembranaceis fupra nitidis, axillis glanduliferis, floribus racemofis, fructibus elongatis torulofis. *Quito.*

laeta Humb. 71. C. foliis oblongis utrinque rotundatis coriaceis eveniis glabris breviffime petiolatis, axillis glanduliferis, racemis inferne ramofis. *Nov. Granat.*

fubbiloba Humb. 72. C. foliis obcordatis coriaceis glabris, axillis glanduliferis, racemis paniculatis. *Nov. Granat.*

pauciflora Humb. 73. C. foliis ellipticis emarginatis coriaceis glabris, axillis glanduliferis, pedunculis 3floris. *Nov. Granat.*

amygdalina Lam. 74. C. foliis oblongis utrinque attenuatis callofo-mucronatis fupra glabris fubtus ramulisque lepidotis, pedunculis axillaribus corymbiferis. *Ind. occ.* (C. barcellonenfis Kunth var.)

comofa Jacq. 75. C. foliis lanceolatis petiolatis fupra glabris fubtus cinereo-tomentofis, pedunculis multifloris, ftaminibus corolla brevioribus. *Hifpaniola.*

76.

tenuisiliqua Jacq. 76. C. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, racemo terminali multifloro, fructibus elongatis. *Nov. Granat.*

commutata * 77. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque glabris, racemo terminali elongato, staminibus corolla brevioribus. *Martinic.* Sieber.

obovatifolia Kunth. 78. C. foliis subcordato-obovato-ellipticis glabris supra nitidis, racemis axillaribus, fructibus elongatis torulosis. *Nov. Granat.*

Breynia 79. C. foliis oblongis coriaceis supra glabris subtus ramisque piloso-lepidotis, pedunculis angulatis corymbosis, fructibus longissimis. *Ind. occ. Mexico.* (C. furfuracea R. et P.)

sidaefolia R. et P. 80. C. foliis cordato-ovatis supra glabris subtus stellato-pubescentibus, racemis terminalibus folio brevioribus subcorymbosis. *Peru.*

jamaicensis Jacq. 81. C. foliis oblongis emarginatis coriaceis supra glabris subtus ramisque cinereo-tomentosis, pedunculis paucifloris. *Jamaica.*

torulosa Sw. 82. C. foliis oblongo-lanceolatis supra glabris subtus lepidoto-punctatis, pedunculis terminalibus subbifloris, fructibus elongatis torulosis. *Ins. Antill.*

intermedia Kunth. 83. C foliis oblongis acutis coriaceis supra glabris subtus densissime lepidotis, paniculis terminalibus, floribus subumbellatis, fructibus lepidoto-tomentosis. *Nov. Granat.*

angustifolia Kunth. 84. C. foliis linearibus utrinque rotundatis supra glabris subtus ramisque incano-tomentosis, floribus corymbosis 8andris. *Mexico.*

longifolia Sw. 85. C. foliis lineari-lanceolatis subtus farinoso-punctatis, fructibus torulosis. *Jamaica.*

1895. ARSIS Lour.

rugosa Lour. *Cochinchina.* Arbuscula ramosissima, foliis ovato-lanceolatis rugosis integerrimis, floribus racemosis albis.

1896. SHOREA Roxb.

robusta Roxb. *Ind. or.* Arbor ingens, foliis alternis cordato-oblongis utrinque glabris, floribus paniculatis flavis.

1897. TILIA.

* *Petalis nudis.*

parvifolia Ehrh. 1. T. foliis cordato-subrotundis acutis utrinque glabris, axillis venarum subtus barbatis, fructibus subglobosis. *Europ.* (T. intermedia Hayn., microphylla Vent., ulmifolia Scop., europaea γ. L.)

rubra Cand. 2. T. foliis cordatis basi inaequalibus subtus petiolisque pilosiusculis, axillis venarum subtus bar-

batis, fructibus globosis. *Tauria.* (T. triflora Horn.)

grandifolia Ehrh. 3. T. foliis cordato-subrotundis acutis subtus villosiusculis, fructibus costatis. *Europ.* (T. platyphylla Vent., cordifolia Bess., europaea L.)

** *Petalis squama petaloidea auctis s. duplicatis.*

glabra Vent. 4. T. foliis profunde cordatis mucronato-serratis utrinque glabris, axillis venarum subtus barbatis, floribus corymbosis, stylo petala aequante, fructibus costatis. *Amer. bor.* (T. americana L., canadensis Mx.)

laxiflora Mx. 5. T. foliis basi obliquis subcordato-truncatis cuspidato-serratis utrinque glabris, axillis venarum nudis, floribus paniculatis, stylo petala superante, fructibus globosis. *Amer. bor.*

pubescens Ait. 6. T. foliis basi truncatis obsolete cordatis serratis subtus pubescentibus, axillis venarum subtus barbatis, corymbis paucifloris, stylo petala superante, fructibus globosis. *Amer. bor.* (T. caroliniana Mill., americana Walt.)

heterophylla Vent. 7. T. foliis basi truncatis cordatisque mucronato-serratis subtus albido-tomentosis, venis ferrugineis, stylis petala superantibus, fructibus costatis. *Amer. boreal.* (T. alba Ait. W., americana du Roi.)

argentea Cand. 8. T. foliis inaequaliter cordatis mucronato-serratis subtus niveo-tomentosis, venis concoloribus, stylis petala aequantibus, fructibus ovatis ecosta-*Hungar. Graecia.* (T. alba Kit.)

1898. BROWNLOWIA Roxb.

elata Roxb. *Ind. or.* Arbor foliis cordatis 7nerviis, floribus paniculatis flavis.

1899. DIPTEROCARPUS Gärtn.

turbinatus Roxb. *Ind. or.* Arbor immensa, foliis alternis ovato-oblongis glabris integerrimis, floribus racemosis albis.

1900. DIPLOPHRACTUM Desf.

auriculatum Desf. *Java.* Arbor foliis oblongis apice dentatis basi inaequaliter cordato-auriculatis, stipulis singularibus 2lobis indivisisque medio aristatis, floribus pedunculatis terminalibus.

1901. GREWIA.

* *Foliis tri - triplinerviis,*

† *ſubtus glabris.*

multiflora Juſſ. 1. Gr. foliis ovato - lanceolatis acuminatis ſerratis, pedunculis ſubaggregatis 3floris, ſtaminibus abbreviatis. *Inſ. Philippin.*

diſperma Rottl. 2. Gr. foliis oblongo - lanceolatis utrinque attenuatis ſerratis 3plinerviis, pedunculis ſolitariis 3floris, petalis breviſſimis. *Ind. or.*

apetala Juſſ. 3. Gr. foliis obovatis crenulatis ſcabris, pedunculis ſubſolitariis 3floris, floribus apetalis. *Java.*

oppoſitifolia Buchan. 4. Gr. foliis ovatis acuminatis dentatis, pedunculis oppoſitifoliis multifloris. *Nepal.*

umbellata Roxb. 5. Gr. foliis ellipticis ſubdenticulatis utrinque glaberrimis, pedunculis terminalibus 3floris. *Ind. orient.*

bicolor Juſſ. 6. Gr. foliis ovali - oblongis obtuſis argute ſerrulatis utrinque glabris ſubtus incanis, pedunculis geminatis 3floris, ſtaminibus petala aequantibus. *Senegambia.*

Rothii Cand. 7. Gr. foliis ovato - oblongis acuminatis argute ſerrulatis ſupra glabris ſubtus glabriuſculis incanis, pedunculis geminatis 3floris, ſtaminibus petala duplo ſuperantibus. *Ind. or.* (Gr. 2color Roth.)

cuneifolia Juſſ. 8. Gr. foliis obovatis ſubcoriaceis apice crenatis, pedunculis 2floris, ſtaminibus petala aequantibus. *Madagascar.*

nitida Juſſ. 9. Gr. foliis ovato - oblongis crenulatis ſupra nitidis, pedunculis ſolitariis abbreviatis ſubbifloris, ſtaminibus petala aequantibus. *China.*

Microcos 10. Gr. foliis oblongo - lanceolatis acuminatis elongatis ſubintegerrimis, junioribus ſubtus ſubfloccoſis, panicula terminali ramoſiſſima, pedunculis bracteatis, calycibus incano - tomentoſis. *Ind. or.* (Microcos paniculata L.)

glanduloſa Vahl. 11. Gr. foliis ovato - lanceolatis acuminatis utrinque laevibus crenulatis, crenis inferioribus glanduloſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *Inſ. Mascaren. Ind. or.*

laevigata Vahl. 12. Gr. foliis oblongo - lanceolatis acuminatis ſerrulatis utrinque glabris, pedunculis elongatis trifloris patentibus. *Ind. or.* (Gr. ſerrulata Cand., ovalifolia Juſſ. ?)

† *acuminata* Juſſ. 13. Gr. foliis ovato - oblongis abrupte acuminatis crenulatis, pedunculis ſubgeminatis 2floris petiolo longioribus. *Java.*

megalocarpa P. B. 14. Gr. foliis oblongis obtuſe acuminatis ſerratis laevibus, pedunculis 1-3floris, fructu glabro 4lobo. *Guinea.*

occidentalis 15. Gr. foliis ſubrotundo - ovatis obtuſe dentatis utrinque glabris, pedunculis ſolitariis 1floris. *Afric. auſtr.*

carpinifolia P. B. 16. Gr. foliis ſubcordato-ovatis acutis ſerratis ſubtus ſcabris, pedunculis brevibus ſub-3floris. *Guinea. Ind. or.* (Gr. rhamnifolia Roth.)

Mallococca 17. Gr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis crenulatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus ſub-3floris. *Inſ. Amicorum.* (Mallococca crenata Forſt.)

†† *Foliis ſubtus pubeſcentibus.*

guazumaefolia Juſſ. 18. Gr. foliis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis crenato-dentatis, dentibus inferioribus glanduloſis, pedunculis ſolitariis ſub-3floris. *Java.*

tomentoſa Juſſ. 19. Gr. foliis baſi obliquis ovato-lanceolatis utrinque tomentoſis inaequaliter dentatis, pedunculis abbreviatis ſub-4floris, petalis breviſſimis. *Java.* (Gr. hirſuta Sm.)

hirſuta Vahl. 20. Gr. foliis ovato-lanceolatis breviter petiolatis inaequaliter denticulatis transverſe venoſis utrinque villoſis, ramis villoſiſſimis, pedunculis ſub-3floris, fructu piloſo. *Ind. or.*

bracteata Roth. 21. Gr. foliis elliptico-lanceolatis obtuſe ſerratis utrinque faſciculato-piloſis ferrugineis, ramulis tomentoſis, pedunculis axillaribus 3floris, floribus involucratis. *Ind. or.*

excelſa Vahl. 22. Gr. foliis baſi obliquis oblongis obtuſe ſerratis ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis, ramulis glanduloſo-villoſis, pedunculis axillaribus ſub-2floris. *Arabia.* (Chadara arborea Forsk.)

ſalvifolia Roth. 23. Gr. foliis ovato-oblongis obtuſis crenulatis ſupra pubeſcentibus punctatis ſubtus niveo-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſub-3floris bracteatis. *Ind. or.*

flava Cand. 24. Gr. foliis obovato-oblongis obtuſiſſimis crenulatis ſupra glabriuſculis ſubtus incano-pubeſcentibus, pedunculis 1floris, petalis 2fidis calyce brevioribus. *Afric. auſtr.*

paniculata Roxb. 25. Gr. foliis elliptico-oblongis acutiuſculis obtuſe ſerratis ſubtus villoſis, floribus paniculatis terminalibus, ſtipulis ſub-2fidis. *Ind. or.* (Microcos tomentoſa Sm.)

orientalis 26. Gr. foliis ovato-oblongis crenulatis utrinque aſperis, pedunculis axillaribus 3floris. *Ind. or.*

columnaris Sm. 27. Gr. foliis ovato-oblongis crenatis utrinque aſperis, pedunculis 3floris, genitalium ſtipite elongato villoſiſſimo. *Ind. or.*

piloſa Lam. 28. Gr. foliis ovato-oblongis acutiuſculis denticulatis ſubtus faſciculato-piloſis, pedunculis ſubcorymboſis, fructibus piloſis. *Ind. orient.* (Gr. orientalis Vahl.)

flaveſcens Juſſ. 29. Gr. foliis ovato-oblongis acutis ſubangulatis inaequaliter ſerratis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis 3floris. *Ind. or.*

mollis Juſſ. 30. Gr. foliis ovato-lanceolatis denticulato-ſerratis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, pedunculis ſubſolitariis 3floris. *Senegambia.*

aſpera Roxb. 31. Gr. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis ſub-3lobis inaequaliter ſerratis utrinque ſtellato-piloſis, pedunculis ſubternis 1floris petiolo brevioribus. *Ind. or.*

commutata Cand. 32. Gr. foliis cordato-oblongis acuminatis inaequaliter ſerratis ſupra ſubrugoſis ſtellato-pubeſcentibus ſubtus ſubferrugineo-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſubcorymboſis. *Ind. or.* (Gr. carpinifolia Rottl. Roth.)

obliqua Juſſ. 33. Gr. foliis obliquis lanceolatis dentatis utrinque ſtellato-piloſis, pedunculis petiolum ſuperantibus 3floris. *Ind. or. Arabia.*

** *Foliis ſub-5nerviis.*

aſiatica 34. Gr. foliis cordato-ſubrotundis inaequaliter crenatis ſupra glabris ſubtus incanis, petiolis brevibus incraſſatis, ſtipulis ſubulatis, pedunculis ſubaggregatis 3floris petiolum 3plo ſuperantibus. *Inſ. Maſcaren. Coromandel.*

tiliaefolia Vahl. 35. Gr. foliis oblique cordatis ſubrotundis obtuſe ſerratis utrinque glabris concoloribus, petiolis aequalibus, ſtipulis ſemicordatis, pedunculis petiolo brevioribus ſubaggregatis 3floris. *Ind. or.* (Gr. arborea Roxb. Microcos lateriflora L.)

abutilifolia Juſſ. 36. Gr. foliis late cordatis apice ſinuato-angulatis inaequaliter dentatis ſupra ſcabris ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis ſubgeminatis 3floris petiolo duplo brevioribus. *Java.* (Gr. arbutifolia Poir. Perſ.)

populifolia Vahl. 37. Gr. foliis orbiculatis inaequaliter dentato-crenatis ſupra glabris ſubtus aſpero-punctatis, pedunculis ſolitariis 1floris folia ſubaequantibus. *Arabia.* (Chadara ſine nomine triviali Forsk.)

betulaefolia Juſſ. 38. Gr. foliis cordatis ſerratis ſubvilloſis, pedunculis ſolitariis elongatis 1floris. *Senegambia.*

rotundifolia Juſſ. 39. Gr. foliis ſubrotundo-ovalibus crenulatis ſupra incanis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis ſubgeminis folia ſuperantibus ſubcorymboſis. *Coromandel.* (Gr. orbiculata Rottl. Roth.)

arborea Roxb. 40. Gr. foliis ſubcordato-ovatis obtuſe ſerratis utrinque ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis aggregatis elongatis umbellato-paniculatis. *Ind. orient.* (Gr. ſubinaequalis Cand. ?)

villoſa Roxb. 41. Gr. foliis ſubcordato-ovatis angulatis duplicato-ſerratis utrinque ſtellato-pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, pedunculis confertis 1floris petiolo brevioribus. *Ind. or.*

ſcabra Cand. 42. Gr. foliis ſubcordato-oblongis ſubtus ſcabris transverſe venoſis, panicula diffuſa, floribus involucratis. *Ind. or.* (Microcos Sm.)

ſapida Roxb. 43. Gr. foliis ovalibus groſſe dentatis glabriuſculis, pedunculis ternis 3floris petiolos longe ſuperantibus. *Ind. or.*

† *eriocarpa* Juſſ. 44. Gr. foliis ovalibus obtuſe ſerratis ſubtus tomentoſis, pedunculis axillaribus 3floris. *Java.*

† *velutina* Vahl. 45. Gr. foliis ſubobliquis ovalibus obtuſe ſerratis utrinque villoſis ſubtus incanis, pedunculis ſubternis abbreviatis 3floris. *Arabia.* (Chadara velutina Forsk.)

1902. COLUMBIA Perſ.

ſerratifolia Cand. *Inſ. Philippin.* Arbor excelſa, ramulis hirſutis, foliis alternis baſi obliquis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtus glaucis 3nerviis, floribus racemoſis terminalibus bracteatis rubris. (Colona Cav.)

1903. MUNTINGIA.

Calabura 1. M. foliis ſemicordato-lanceolatis ſerratis ſubtus ramisque denſe villoſis, pedunculis geminis axillaribus 1floris, calycibus acuminatis. *Hiſpaniola. Jamaica. Amer. auſtr.*

glabra * 2. M. foliis oblique ovato-oblongis utrinque ramisque compreſſis glabris, pedunculis geminis axillaribus 1floris, calycibus obtuſiſſimis. *Braſil.* Sello.

1904. AUBLETIA Schreb.

Tiburbu Sw. 1. A. foliis cordato-lanceolatis ſerrulatis hirſutis ſubtus fuſco-tomentoſis, fructibus denſe ſetoſis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (Apeiba Tibourbou Aubl., hirſuta Lam.)

Petumo W. 2. A. foliis ſubcordato-lanceolatis ſerrulatis ſupra glabris ſubtus incanis, venis rufo-hirſutiuſculis, fructibus ſetoſis. *Guiana. Amer. auſtr.* (Apeiba Petoumo Aubl. A. ulmifolia Kunth.)

aſpera W. 3. A. foliis ſubcordato-oblongis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, fructibus muricatis. *Guiana. Cayenn.* (Apeiba aſpera Aubl.)

laevis W. 4. A. foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis glabris, petalis obtuſis, fructibus muricatis. *Guiana.* (Apeiba glabra Aubl.)

discolor * 5. A. foliis ovato-oblongis integerrimis ſubtus hirſutis caneſcentibus, pedunculis ſubternis axillaribus breviſſimis, fructibus ſetoſis. *Braſil.* Sello.

1905. ALEGRIA Seſſ.

candida Seſſ. *Mexico.* Arbor ſpecioſa, foliis ovatis ſerratis, floribus candidis roſaceis.

1906. BERRIA Roxb.

Amomilla Roxb. *Ceylon.* Arbor ramis glabris, foliis ovato-oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis.

1907. CORCHORUS.

** Capſulis ſiliquaeformibus ecornibus.*

† bivalvibus.

ſiliquoſus 1. C. foliis ovato-oblongis aequaliter obtuſe ſerratis baſi muticis glabris, pedunculis ſub-2floris, floribus vernalibus 4fidis apetalis 4andris, autumnalibus 5petalis polyandris, capſulis linearibus laevibus, caule fruticoſo. *Ind. occ.*

folioſus * 2. C. foliis minutis confertis ovato-oblongis crenulatis glabris baſi muticis, pedunculis 1floris, capſulis teretibus aſperis, caule fruticoſo. *Cuba.* (C. ſiliquoſus Pöppig.)

hirtus 3. C. foliis ovato-oblongis ſerratis baſi muticis piloſis, ramis hirtis, capſulis ſolitariis obtuſis breviſſime pedunculatis hirſutis. *Ind. occ. Japon.*

laſiolobus * 4. C. foliis ſubcordato-ovatis mucronato-dentatis utrinque hirſutiusculis, ramis capſulisque ſolitariis ſubfalcatis acutis hirſutis. *Patria?* (C. pilolobus Link.)

mompoxenſis Kunth. 5. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerratis glabriusculis, capſulis rectis ancipitibus piloſiusculis. *Ad fl. Magdalen.*

piloſus Kunth. 6. C. foliis lanceolatis acutis ſerratis utrinque villoſis, capſulis piloſis. *Nov. Granat.*

argutus Kunth. 7. C. foliis lanceolatis acutis argute ſerratis glabris, capſulis compreſſis pubeſcentibus. *Nov. Granat.* (C. orinocenſis Kunth.)

†† tri- vel plurivalvibus.

trilocularis 8. C. capſulis 3gonis 3valvibus ſcabris, foliis ovato-oblongis ſerratis, dentibus imis longe ariſtatis. *Arabia.* (C. aeſtuans Forsk.)

olitorius 9. C. capſulis oblongis ſubteretibus glabris 5locularibus, foliis ovato-oblongis ſerratis, dentibus imis longe ariſtatis. *Intra tropicos totius mundi.*

aeſtuans 10. C. capſulis oblongis 3valvibus 6ſulcatis, foliis ſubcordatis ovato-acuminatis ſerratis, dentibus imis longe ariſtatis. *Amer. tropic.*

arenarius Kunth. 11. C. capſulis oblongis 3valvibus, foliis oblongis utrinque rotundatis undulato-crenatis complicatis coriaceis ramisque tomentoſis. *Nov. Granat.*

ſerraefolius Burch. 12. C. capſulis lineari-teretibus ſcabris ſubtortuoſis 6valvibus, foliis linearibus ſerratis. *Afric. auſtr.* (C. aſplenifolius Burch.?)

*** Capſulis ſiliquaeformibus apice cornutis.*

tridens 13. C. capſulis oppoſitifoliis ſubſeſſilibus ſub-3valvibus apice 3cornibus, foliis lanceolato-linearibus ſerratis, dentibus imis ſubariſtatis. *Ind. or.* (C. patens Lehm. 3locularis N. L. Burm.)

acutangulus Lam. 14. C. capſulis oblongis acutangulis apice 3-5cornibus, foliis ovatis ſerratis, dentibus imis ſubariſtatis. *Ind. occid.*

*guadalupensis** 15. C. capsulis lineari-teretibus elongatis obtusangulis 4valvibus apice 4cornibus, foliis ovatis serratis basi muticis. *Guadalupa.* Bertero.

fascicularis Lam. 16. C. capsulis sessilibus aggregatis conoideis 3valvibus 6locularibus apice 3cornibus lanatis, foliis oblongis inaequaliter serratis basi muticis. *Ind. orient.*

*** *Capsulis globosis vel ovatis.*

capsularis 17. C. capsulis depresso-globosis rugoso-muricatis, foliis oblongis acuminatis serratis, dentibus imis aristatis. *Ind. or.*

hirsutus 18. C. capsulis ovatis subechinatis lanatis, pedunculis 3floris fructiferis deflexis, foliis subrotundo-oblongis repando-crenatis tomentosis. *Ind. occ. Japon.* (C. tomentosus Thunb.)

**** *Incertae sedis.*

flexuosus Thb. 19. C. foliis oblique cordatis ovatis cuspidatis duplicato-serratis villosis, caule flexuoso, floribus terminalibus. *Japon.*

scandens Thb. 20. C. foliis ovatis acuminatis serratis, dentibus aristatis, caule scandente, floribus terminalibus solitariis. *Japon.*

serratus Thb. 21. C. foliis oblongis serratis cuspidatis supra pubescentibus subtus glabris, dentibus aristatis, caule erecto. *Japon.*

1908. CISTUS.

* *Floribus rubris, stylo cylindrico.*

purpureus Lam. 1. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis amplexicaulibus subundulatis rugosis, pedunculis subternis terminalibus abbreviatis, petalis basi maculatis. *Asia minor.*

heterophyllus Desf. 2. C. foliis oblongis lanceolatisque utrinque attenuatis margine revolutis subtus calycibusque villosis, pedunculis hirsutis foliatis subternis. *Afr. boreal.*

parviflorus Lam. 3. C. foliis ovatis acutis subtomentosis in petiolum attenuatis subtus rugoso-venosis, petiolis vaginantibus, pedunculis terminalibus subternis. *Creta.*

complicatus Lam. 4. C. foliis confertis subrotundo-ovatis obtusiusculis tomentosis subtus reticulatis subcomplicatis, petiolis vaginantibus, pedunculis 3floris. *Asia minor. Hispania.*

villosus Lam. 5. C. foliis subrotundo-ovatis rugosis tomentoso-hirsutis, petiolis vaginantibus, pedunculis subternis terminalibus. *Europ. austr. Afr. bor.* (C. pilosus L.)

creticus 6. C. foliis spathulato-oblongis undulatis tomentoso-hirsutis in petiolum attenuatis, pedunculis

1floris. *Creta. Aſia minor. Tauria.* (C. tauricus Presl.)

incanus 7. C. foliis obovato-ſpathulatis ſub-3nerviis rugoſis tomentoſis ſeſſilibus ſubconnatis, pedunculis 1floris. *Europ. auſtr.*

criſpus 8. C. foliis lanceolatis utrinque attenuatis 3nerviis undulato-criſpis rugoſis pubeſcentibus ſubconnatis, pedunculis ſubternis abbreviatis, calycibus corollam ſubaequantibus. *Europ. auſtr.*

albidus 9. C. foliis ovali-oblongis ſeſſilibus incano-tomentoſis 3nerviis, pedunculis ſubternis, ſepalis exterioribus majoribus. *Hiſpan. Luſitan.*

candidiſſimus Dun. 10. C. foliis ovato-ellipticis acutis denſe tomentoſis 3nerviis, petiolis vaginantibus, pedunculis ſolitariis abbreviatis, ſepalis exterioribus brevioribus. *Inſ. Canar.*

vaginatus Ait. 11. C. foliis lanceolatis acutis 3nerviis hirſutis ſubtus reticulatis, petiolis vaginantibus, pedunculis axillaribus terminalibusque elongatis. *Teneriffa.* (C. ſymphytifolius Lam.)

ſericeus Vahl. 12. C. foliis ovatis obtuſis 3nerviis tomentoſis, inferioribus petiolatis, ſummis ſeſſilibus cordatis, pedunculis hirtis ſub-3floris, calycibus inaequalibus villoſo-ſericeis. *Hiſpania.*

hybridus Vahl. 13. C. foliis ovatis petiolatis incanis 3nerviis, ramis flavido-ſquamuloſis, pedunculis elongatis ſubracemoſis, ſepalis exter. caducis. *Hiſpania.* (C. cymoſus Dunal.?)

** *Floribus albidis.*

† *Stylo cylindrico.*

Cluſii Dun. 14. C. foliis linearibus margine revolutis ſub-3nerviis ſubtus caneſcentibus, floribus aggregatis breviter petiolatis, calycibus 3ſepalis. *Hiſpan. Afr. bor.* (C. Libanotis Deſf. ſtenophyllus Link.)

†† *Stigmate ſeſſili.*

ladaniferus 15. C. foliis lineari-lanceolatis elongatis baſi connatis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus ſolitariis, capſulis 10locularibus. *Hiſpan. Luſitan.*

monſpelienſis 16. C. foliis lineari-lanceolatis 3nerviis viſcoſis utrinque hirſutiuſculis, racemis terminalibus ſubſecundis calycibusque villoſiſſimis. *Ad litora maris mediterran.*

florentinus Lam. 17. C. foliis lineari-lanceolatis enerviis ſubtus reticulato-rugoſis ſubtomentoſis, pedunculis ſub-3floris villoſis. *Italia?*

cyprius Lam. 18. C. foliis anguſte lanceolatis petiolatis ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis 3nerviis, pedunculis nudis ſub-3floris, floribus baſi maculatis. *Cyprus.*

laurifolius 19. C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis 3nerviis ſupra glabris ſubtus tomentoſis, petiolis baſi con-

natis, pedunculis nudis multifloris. *Gallia auſtr. Hiſpan.*

longifolius Lam. 20. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſubtus viridibus venoſis margine villoſis, pedunculis axillaribus ſub-5floris calycibusque hirſutiusculis. *Hiſpan. Gallia narbon.* (C. nigricans Pourr.)

laxus Ait. 21. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis undulatis ſubdenticulatis glabriusculis, pedunculis cymoſis calycibusque hirſutis. *Hiſpania. Luſitania.* (C. capenſis L. ?)

Ledon Lam. 22. C. foliis lanceolatis connatis nervoſis viſcoſis ſupra glabris ſubtus incano-ſericeis, pedunculis corymboſis calycibusque villoſis. *Gallia narbon.*

ſalvifolius 23. C. foliis ovato-oblongis obtuſis rugoſis utrinque hirſutis, pedunculis elongatis 1floris tomentoſis ſuperne articulatis. *Europ. auſtr.*

hirſutus Lam. 24. C. foliis oblongis obtuſis 3nerviis hirſutis, pedunculis ſubcymoſis, calycibus fructiferis maximis pyramidatis. *Armoracia. Hiſpan.*

corbarienſis Pourr. 25. C. foliis ſubcordatis ovatis acuminatis margine fimbriatis utrinque rugoſis ſubglutinoſis, pedunculis elongatis 1-5floris. *Gallia auſtr. Hiſpan.* (C. hybridus Pourr., ſalvifolius β. Cand.)

populifolius 26. C. foliis cordatis acuminatis petiolatis laevibus, pedunculis cymoſis bracteatis hirſutiusculis. *Gallia auſtr. Hiſpan. Luſitan. Mauritan.*

1909. HELIANTHEMUM Tourn.

I. *Stylo recto abbreviato: floribus luteis.*

* *Exſtipulata, foliis trinerviis.*

† *Suffruticoſa.*

Libanotis W. 1. H. foliis linearibus revolutis nudiusculis, pedunculis ſubſolitariis 1floris, calycibus glabris. *Luſitan. Afric. bor.* (Ciſtus L.)

umbellatum Mill. 2. H. foliis lineari-oblongis revolutis viſcoſis ſubtus ramisque tomentoſis, pedunculis umbellatis, calycibus villoſiusculis. *Sicilia. Gallia auſtr. Hiſpan. Luſitan.* (Ciſtus umbellatus L., verticillatus Brot.)

ocimoides Perſ. 3. H. foliis exiguis ovatis carinatis ſubſeſſilibus caneſcentibus, pedunculis terminalibus elongatis ſubpaniculatis. *Hiſpan. Luſitan.* (Ciſtus ocimoides Lam., ſampſucifolius Cluſ. Cav.)

alyſſoides Vent. 4. H. foliis obovatis ſubhirſutis ſeſſilibus, pedunculis terminalibus paucifloris, calycibus hirſutis. *Gallia occ. Hiſpan.* (Ciſtus alyſſoides α. Lam.)

rugoſum Dun. 5. H. foliis obovatis ſubobliquis margine criſpis ſubdenticulatis utrinque rugoſo-tomentoſis ſubtus incanis, ramis leproſo-tomentoſis, pedunculis terminalibus folio brevioribus, calycibus hirſutis. *Gallia occid. Luſitan.* (Ciſtus alyſſoides β. Lam.)

scabrosum Perſ. 6. H. foliis ovato-oblongis piloſo-ſcabris ſubtus ramisque cinereo-tomentoſis, pedunculis 1floris folio brevioribus, calycibus hirſutis. *Luſitania.* (Ciſtus ſcabroſus Ait.)

algarvienſe Dun. 7. H. foliis ovato-lanceolatis piloſo-ſcabris ſubtus ramisque incanis, pedunculis ſubpaniculatis calycibusque villoſis. *Luſitan.* (Ciſtus algarvienſis Sims. elongatus Vahl. ?)

formoſum Dun. 8. H. foliis ſpathulatis ſubpetiolatis utrinque ramisque tomentoſo-villoſis, pedunculis calycibusque villoſis. *Luſitan.* (Ciſtus formoſus Curt.)

atriplicifolium W. 9. H. foliis ovatis obtuſiusculis petiolatis baſi undulatis utrinque ramisque lepidotis ſubargenteis, pedunculis racemoſis calycibusque rufo-hirſutis. *Hiſpan.* (Ciſtus Lam.)

laſianthum Perſ. 10. H. foliis ovato-oblongis obtuſiusculis carinatis ramisque cinereo-tomentoſis, pedunculis ſub-1floris breviſſimis calycibusque hirſutiſſimis. *Luſitan.* (Ciſtus Lam.)

involucratum Perſ. 11. H. foliis oblongo-lanceolatis ſeſſilibus ſcabris, inferioribus petiolatis ramisque cinereo-tomentoſis, pedunculis breviſſimis involucratis. *Hiſpan. Luſitan.* (Ciſtus Lam.)

cheiranthoides Perſ. 12. H. foliis oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis ramisque incano-tomentoſis, pedunculis brevibus ſubbifloris, calycibus villoſis. *Luſitan.* (Ciſtus cheiranthoides Lam.)

halimifolium W. 13. H. foliis obovatis glabris utrinque incanis, pedunculis elongatis ſubpaniculatis calycibusque albido-leproſis. *Hiſpan. Luſitan.* (Ciſtus L.)

†† *Herbacea.*

globularifolium Perſ. 14. H. foliis hirſutis, radicalibus ſpathulatis longe petiolatis, caulinis ſeſſilibus acutis, racemis terminalibus abbreviatis, calycibus glabris. *Luſitan.* (Ciſtus Lam.)

Tuberaria Mill. 15. H. foliis radicalibus ovato-oblongis incano-tomentoſis, caulinis lanceolatis glabriusculis ſeſſilibus, floribus ſubpaniculatis, calycibus glabris. *Europ. auſtr.* (Ciſtus L.)

bupleurifolium Dun. 16. H. foliis radicalibus oblongis piloſiusculis, caulinis lanceolatis acuminatis glabris nitidis, floribus ſubcorymboſis breviter petiolatis, calycibus pubeſcentibus. *Hiſpan.* (Ciſtus Lam.)

heterodoxon Dun. 17. H. foliis ſeſſilibus oblongo-lanceolatis tomentoſo-hirſutis, ſummis alternis ſtipulatis, ramis hirtis, floribus ſubimbricatis breviſſime pedunculatis, ſepalis externis hirſutis bracteaeformibus. *Afric. Hiſpan.*

plantagineum Perſ. 18. H. foliis oblongo-lanceolatis hirſutiusculis, ſummis ſtipulatis, racemis brevibus ebracteatis, ſepalis ſubaequalibus, petalis denticulatis. *Creta. Corſica. Hiſpan. Afric. bor.* (Ciſtus plantagineus W., ſerratus Deſf.)

guttatum Mill. 19. H. foliis oblongo-linearibus hirſutis, ſummis ſubſtipulatis, caule ſtricto ſimplici, racemo laxo

ebracteato, ſepalis inaequalibus. *Europ. med.* (Ciſtus guttatus L., ſerratus Cav. H. eriocaulon Dun. var.)

inconſpicuum Perſ. 20. H. foliis oblongo-linearibus hirſutis, ſummis ſtipulatis, caule ramoſo diffuſo, floribus racemoſis ſecundis. *Hiſpan. Corſica.*

punctatum W. 21. H. foliis ſtellato-pubeſcentibus incanis, inferioribus obovatis ſuperioribus oblongis, racemis paucifloris, petalis ſerrulatis. *Gallia occid.*

** *Exſtipulata, foliis enerviis venoſis.*

corymboſum Mx. 22. H. ſuffruticoſum, foliis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis ſubrevolutis ſubtus incano-tomentoſis, floribus corymboſis confertis, calycibus tomentoſis. *Amer. bor.*

glomeratum Lag. 23. H. ſuffruticoſum, foliis oblongo-lanceolatis baſi attenuatis ſubtus incanis, racemis axillaribus multifloris folio brevioribus. *Nov. Hiſpan.*

ramuliflorum Mx. 24. H. caule herbaceo ramoſo, ramulis virgatis floridis, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus pedunculatis ſolitariis. *Carolina.*

rosmarinifolium Pursh. 25. H. caule herbaceo ſimplici, foliis linearibus revolutis ſubtus tomentoſis, racemulis axillaribus interrupte confertifloris. *Amer. bor.*

carolinianum Mx. 26. H. caule herbaceo erecto, foliis oblongis obtuſis ſubdenticulatis tomentoſo-hirſutis, pedunculis ſolitariis 1floris calycibusque villoſis. *Carolina.* (Ciſtus Walt.)

canadenſe Mx. 27. H. caule herbaceo aſcendente, foliis lineari-lanceolatis hirſutis ſubtus incanis, racemis terminalibus paucifloris. *Amer. bor.* (Ciſtus L.)

braſilienſe Perſ. 28. H. caule baſi ſuffruticoſo ramoſo foliisque lanceolatis alternis villoſo-hirtis, pedunculis laxe racemoſis. *Monte Video.* (Ciſtus Lam.)

II. *Stylo recto ſtamina aequante: floribus luteis.*

* *Exſtipulata.*

lunulatum Cand. 29. H. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis obovato-oblongis ſubtus incanis, floribus ſubracemoſis, petalis baſi lunula notatis. *Alp. grai.* (Ciſtus Allion.)

† *petiolatum* Perſ. 30. H. caule herbaceo ramoſo foliisque oblongo-linearibus utrinque leproſo-tomentoſis, racemis paucifloris pubeſcentibus. *Hiſpania.*

** *Stipulata.*

micranthum * 31. H. caule ſuffruticoſo foliisque linearibus obtuſis margine revolutis ſtellato-pubeſcentibus, floribus racemoſis, ſepalis nervoſis petala ſuperantibus. *Ad magnam Syrtim Afric. boreal.* (Ciſtus Viv.)

villosum Perf. 32. H. caule herbaceo foliisque oblongo-lanceolatis subdenticulatis villosis, racemis elongatis secundis bracteatis. *Hispan.*

niloticum Perf. 33. H. caule herbaceo foliisque oblongis villoso-tomentosis, pedunculis erectis calycibusque hirsutis. *Europ. austr. Aegypt.* (Ciftus L.)

ledifolium W. 34. H. caule herbaceo foliisque oblongis subdenticulatis glabriusculis, pedunculis erectis calyce brevioribus pubescentibus. *Gallia austr. Lusitan.* (Ciftus L.)

salicifolium Perf. 35. H. caule herbaceo foliisque oblongis denticulatis, pedunculis horizontalibus calyce longioribus. *Gallia austr. Ital. Hispan.* (H. intermedium et denticulatum Perf. varr.)

sanguineum Lag. 36. H. caule herbaceo ramoso viscido-pubescente sanguineo, foliis oblongis obtusis superioribus stipulatis, pedunculis axillaribus 1floris fructiferis reflexis. *Hispan. Creta.* (H. retrofractum Perf.)

aegyptiacum Mill. 37. H. caule herbaceo foliisque lineari-oblongis margine revolutis subtus incanis pubescentibus, pedunculis filiformibus, calycibus inflatis petala includentibus. *Aegypt. Hispan.* (Ciftus L.)

III. *Stylo basi inflexo.*

* *Floribus luteis.*

† *Capsula pilosa: foliis stipulatis, suffruticosa.*

Lippii Perf. 38. H. caule subdichotomo, foliis lineari-oblongis glaucescentibus subtus incanis, floribus sessilibus confertis, bracteis minutissimis. *Aegypt.* (Ciftus L.)

sessiliflorum Perf. 39. H. caule ramosissimo, foliis linearibus cinereo-tomentosis margine revolutis, floribus spicatis secundis. *Afric. bor.* (Ciftus Desf.)

ellipticum Perf. 40. H. caule ramoso, foliis ellipticis margine revolutis stellata pube albo-tomentosis, floribus spicatis remotiusculis. *Atlas.* (Ciftus Desf.)

ruficomum * 41. H. caule ramoso foliisque ellipticis stellata pube canescentibus, floribus racemosis approximatis, calycibus hispidissimis rufescentibus. *Ad magnam Syrtim Afr. bor.* (Ciftus Viv.)

lanuginosum * 42. H. caule ramoso foliisque ellipticis dense lanatis, floribus racemosis secundis, sepalis petala aequantibus. *Ad magnam Syrtim Afric. bor.* (Ciftus Viv.)

cahiricum Delil. 43. H. caule ramosissimo, foliis obovatis margine revolutis incanis, floribus racemosis secundis, petalis apice cohaerentibus. *Aegypt.* (Ciftus stipulatus β. Forsk.)

confertum Dun. 44. H. ramis foliisque oblongo-lanceolatis obtusis tomentosis subtus incanis, floribus racemosis secundis subsessilibus. *Teneriffa.*

canariense W. 45. H. caule procumbente ramoso, foliis ovali-oblongis glaucis subtus ramisque incano-tomen-

tofis, racemis elongatis fecundis. *Inf. Canar.* (Ciftus Jacq.)

mucronatum Dun. 46. H. caule erectiusculo, foliis ovato-ellipticis mucronatis fupra ftellato-pubefcentibus fubtus incano-tomentofis, floribus racemofis breviter pedicellatis. *Teneriffa.*

†† *Capfula glabriuscula meiofperma patula.*

a. Exftipulata fuffruticofa.

ericoides Dun. 47. H. foliis alternis imbricatis femicylindricis abbreviatis glabriusculis, pedunculis terminalibus folitariis nutantibus. *Hifpan. Neapol.* (Ciftus Cav.)

Fumana Mill. 48. H. ramis procumbentibus, foliis linearibus involutis fcabris, pedunculis terminalibus 1floris folia fuperantibus. *Europ.* (Ciftus L.)

procumbens Dun. 49. H. ramis elongatis procumbentibus incanis, foliis alternis linearibus ftrigofis, pedunculis axillaribus folio brevioribus. *Europ. auftr.*

molle Perf. 50. H. caule erecto, foliis fubrotundo-ovatis petiolatis oppofitis remotis villofo-tomentofis, racemis terminalibus paucifloris aequalibus. *Hifpan.* (Ciftus Cav.)

origanifolium Perf. 51. H. caule erecto dichotomo, foliis fubrotundo-ovatis petiolatis oppofitis utrinque pilofis, racemis fecundis, petalis calycem aequantibus. *Hifpan.* (Ciftus Lam. Cav.)

cinereum Perf. 52. H. caule erecto, foliis ovatis acutis petiolatis denfe tomentofis, racemis aggregatis, calycibus hifpidis. *Hifpan.* (Ciftus Cav.)

dichotomum Dun. 53. H. caule erecto dichotomo, foliis minutis ovatis glabris petiolatis, racemis gracilibus paucifloris. *Hifpan.* (Ciftus Cav.)

oelandicum Cand. 54. H. foliis oblongo-lanceolatis obtufis glabris bafi ciliatis, racemis paucifloris, petalis emarginatis calycem fubaequantibus. *Inf. Oeland.* (Ciftus L.)

alpeftre Cand. 55. H. foliis oblongo-ellipticis obtufiusculis patenter pilofis fupra viridibus fubtus albidis, petalis integerrimis calycem duplo fuperantibus. *Alp. Europ. med.* (Ciftus alpeftris Crantz., oelandicus Jacq.)

penicillatum Dun. 56. H. foliis viridibus margine venisque hifpidis, inferioribus ovatis petiolatis minoribus, fuperioribus fubfeffilibus lineari-oblongis, floribus minutis. *Gallia auftr. Hifpan.*

vineale Perf. 57. H. ramis afcendentibus rubellis nudiusculis, foliis ovato-oblongis lanceolatisque fupra appreffo-ftrigofis fubtus albido tomentofis, petalis fubintegerrimis calycem hirfutum fuperantibus. *Ager halenfis.* (Ciftus vinealis W., marifolius Wohlleb., oelandicus et ferpyllifolius Roth.)

canum Dun. 58. H. ramis afcendentibus incano-tomentofis, foliis lanceolatis erectis fupra cinereis ftrigofis fubtus albido-tomentofis, floribus corymbofis, pe-

talis calycem hirſutum longe ſuperantibus. *Europ. med. et auſtr.* (Ciſtus L.)

italicum Perſ. 59. H. ramis aſcendentibus piloſo-tomentoſis, foliis ſupra cinereis ſubſtrigoſis ſubtus albido-tomentoſis, inferioribus confertis petiolatis ſubrotundo-ovatis ſuperioribus lanceolatis, petalis emarginatis pallidis calycem hirſutum longe ſuperantibus. *Ital. Hiſpan.* (Ciſtus L. H. obovatum Dun.)

marifolium Perſ. 60. H. ramis aſcendentibus virgatis, foliis omnibus ovatis ſ. ovato-oblongis acutis petiolatis remotiusculis ſupra cinereis nudiusculis ſubtus albo-tomentoſis, petalis aureis calycem hirſutum ſubſuperantibus. *Europ. auſtr. Tauria. Caucaſ.* (Ciſtus L. MB.)

β. Stipulata ſuffruticoſa.

arabicum Perſ. 61. H. ramis virgatis, foliis alternis ramulorum confertis lineari-lanceolatis pubeſcentibus, pedunculis ſubſolitariis terminalibus declinatis. *Arabia. Italia. Hiſpania.* (Ciſtus arabicus L., ferrugineus Lam. H. Savi Bertol.)

laevipes Perſ. 62. H. foliis faſciculatis filiformibus glabris, racemis ſecundis calycibusque piloſis, pedicellis laevibus. *Europ. auſtr.* (Ciſtus L.)

laeve Perſ. 63. H. foliis oppoſitis alternisque linearibus margine revolutis glabris, ſtipulis ſubulatis elongatis, pedunculis ſolitariis 1floris ſubterminalibus, calycibus laevibus. *Hiſpan.* (Ciſtus Cav.)

viride Tenor. 64. H. foliis faſciculatis linearibus nudiusculis, ſtipulis ſubulatis folio brevioribus, pedunculis racemoſis ſecundis calycibusque villoſo-glutinoſis. *Sicil.*

juniperinum Lag. 65. H. foliis lineari-ſubulatis ciliatis oppoſitis alternisque, ſtipulis ſubulatis, pedunculis racemoſis calycibusque villoſo-glutinoſis. *Hiſpan.*

Barrelieri Tenor. 66. H. foliis lineari-lanceolatis obtuſis baſi attenuatis ramisque villoſis, ſtipulis ſubulatis erectis, pedunculis paucifloris calycibusque piloſis. *Neapol. Sicil.*

thymifolium Perſ. 67. H. foliis lineari-oblongis abbreviatis pubeſcentibus aſperiusculis, ſtipulis mucronatis erectis, pedunculis paucifloris villoſo-glutinoſis. *Hiſpan.* (Ciſtus L.)

glutinoſum Perſ. 68. H. foliis linearibus revolutis cinereis villoſo-glutinoſis, pedunculis racemoſis, calycibus viſcoſiſſimis. *Hiſpan.* (Ciſtus L.)

rubellum Presl. 69. H. foliis ovato-ſubrotundis oblongisque acutis ſupra glaberrimis (rubicundis) ſubtus albo-tomentoſis, floribus racemoſis pendulis, calycibus piloſis. *Sicil.*

paniculatum Dun. 70. H. foliis ovato-ſubrotundis obtuſiusculis ſupra viridibus ſubtus incanis, racemis oppoſitis paniculatis. *Hiſpan. Sicil.*

craſſifolium Perſ. 71. H. foliis ſubcarnoſis glabris breviter petiolatis, inferioribus ovatis acutis ſuperioribus oblongo-

linearibus, racemis brevibus ſubumbellatis, calycibus baſi piloſis. *Afric. bor. Hiſpan.* (Ciſtus glaucus Desf.)

polyanthon Perſ. — 72. H. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ſtipulisque ſubſimilibus petiolatis hirſutiusculis, inferioribus ſubtus incanis, racemis ſtrictis paniculatis, calycibus hirſutis. *Afric. bor.* (Ciſtus polyanthos Desf.)

ſquamatum Perſ. — 73. H. ramis erectis foliisque petiolatis lineari-oblongis utrinque argenteo-lepidotis, floribus racemoſis ſecundis. *Hiſpan. Afr. bor.* (Ciſtus L.)

lavandulaefolium Perſ. — 74. H. foliis ſubfaſciculatis lineari-lanceolatis acutis margine revolutis ſupra cinereis ſtipulisque ſubſimilibus apice ariſtatis ſubtus ramisque albo-tomentoſis, racemis terminalibus ſubternis, floribus ſecundis. *Ad litora maris mediterr.* (Ciſtus lavandulaefolius Lam., ſyriacus et racemoſus Jacq. H. Thibaudi Perſ.)

Brouſſoneti Dun. — 75. H. foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis obtuſiusculis utrinque tomentoſis, ſtipulis linearibus ſubfalcatis, racemis abbreviatis ſecundis, ſepalis internis coloratis. *Teneriffa.*

ſtoechadifolium Perſ. — 76. H. foliis oblongo-linearibus obtuſiusculis margine revolutis utrinque ſubtomentoſis, ſtipulis lineari-lanceolatis ſubvilloſis, racemis ante antheſin revolutis, calycibus villoſo-incanis. *Luſitan.* (Ciſtus Brot.)

croceum Perſ. — 77. H. caule erecto, foliis elliptico-oblongis petiolatis ſtellato-villoſiusculis ſubtus ramisque incanis, ſtipulis lineari-ſubulatis, floribus racemoſo-confertis, calycibus coloratis. *Hiſpania. Afric. bor.* (Ciſtus Desf. H. nudicaule Dun. var.)

glaucum Perſ. — 78. H. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis glaucis utrinque tomentoſis, floribus racemoſis ſecundis, calycibus hirſutis. *Hiſpan. Ital.* (Ciſtus Cav.)

vulgare Gärtn. — 79. H. ramis aſcendentibus, foliis oblongis margine ſubrevolutis ſupra piloſis ſubtus caneſcentibus, racemis laxis, pedicellis calycibusque piloſis. *Europ.* (Ciſtus Helianthemum L., grandiflorus Scop., hirſutus Thuill., barbatus Lam.)

tomentoſum Dun. — 80. H. ramis aſcendentibus, foliis oblongis margine revolutis ſupra viridibus glabriusculis ſubtus ſtellata pube incano-tomentoſis, racemis laxis, calycibus coloratis ſulcatis. *Anglia. Carniolia.* (Ciſtus Scop. Sm.)

ſurreianum Mill. — 81. H. foliis oblongo-lanceolatis ſupra hirſutiusculis ſubtus ramisque pube ſtellata ſparſa piloſiusculis, petalis lanceolatis ſubdentatis calycem coloratum ſulcatum ſubaequantibus, ſtaminibus breviſſimis. *Anglia.* (Ciſtus L.)

leptophyllum Dun. — 82. H. foliis oblongo-linearibus margine revolutis in petiolum brevem attenuatis ſupra glabriusculis ſubtus cinereo-tomentoſis, ſtipulis ſubulatis, racemis laxis elongatis, calycibus piloſiusculis. *Hiſpan.*

acuminatum Perſ. 83. H. foliis longe petiolatis oblongis margine revolutis utrinque viridibus piloſis ſubtus ſubtomentoſis, racemis paucifloris, calycibus glabris. *Ager nicaeenſis.*

ſerpyllifolium Mill. 84. H. foliis oblongo-ellipticis ſubrevolutis ſupra nitidis ſubtus incano-tomentoſis, calycibus incanis. *Alp. Europ. med. et auſtr.* (Ciſtus L.?)

ovatum Dun. 85. H. foliis elliptico-lanceolatis obtuſiuſculis in petiolum attenuatis utrinque ramisque ſericeo-villoſis, pedunculis paucifloris terminalibus, calycibus villoſiuſculis. *Alp. maritim. Italiae.* (Ciſtus Viv.)

nummularium Mill. 86. H. ramis procumbentibus hirſutis, foliis inferioribus orbiculatis ſuperioribus oblongo-linearibus hirſutiuſculis ſubtus cinereis, racemis calycibusque piloſis. *Gallia auſtr. Ital.* (Ciſtus L.)

anguſtifolium Perſ. 87. H. ramis cinereo-tomentoſis, foliis breviter petiolatis lineari-oblongis margine revolutis ſupra hiſpidiuſculis ſubtus tomentoſo-caneſcentibus, racemis laxis, calycibus pubeſcentibus. *Patria?* (Ciſtus Jacq.)

hirtum Perſ. 88. H. foliis ovato-oblongis margine revolutis utrinque ramisque hirto-tomentoſis ſubtus caneſcentibus, calycibus hirſutiſſimis albis. *Hiſpan. Gall. auſtr.* (Ciſtus L. H. aureum Perſ.)

Lagaſcae Dun. 89. H. foliis linearibus obtuſis revolutis hirſutis virentibus, ſtipulis planis, pedicellis hiſpidis, calycibus nitidis nervoſis ciliatis. *Hiſpania.*

ſulfureum W. 90. H. caule procumbente, foliis anguſte lanceolatis planis utrinque ſtellato-pubeſcentibus ſupra viridibus ſubtus pallidis, racemo paucifloro. *Hiſpan.*

** *Floribus albis rubrisve.*

violaceum Perſ. 91. H. foliis ſpathulato-linearibus margine revolutis utrinque ſubtomentoſis ſubtus caneſcentibus, racemis paucifloris, calycibus coloratis. *Hiſpan.*

racemoſum Perſ. 92. H. foliis linearibus margine revolutis ſubtus incanis, calycibus coloratis. *Hiſpan. Afric. bor. Teneriffa.* (Ciſtus L.)

ſtrictum Perſ. 93. H. ramis ſtrictis erectis, foliis anguſtiſſimis linearibus revolutis caneſcentibus, ſtipulis ſetaceis, calycibus nervoſis glabriuſculis coloratis. *Hiſpan.* (Ciſtus Cav.)

piloſum Perſ. 94. H. foliis linearibus apice ariſtatis utrinque incanis margine revolutis, ſtipulis ſubulatis, calycibus nervoſis. *Hiſpan. Gallia auſtr.* (Ciſtus L. H. aſperum Lag. Dun.)

lineare Perſ. 95. H. foliis linearibus elongatis glabris margine revolutis caneſcentibus, ſtipulis ſubulatis, racemis laxis, calycibus coloratis glabriuſculis. *Hiſpan. Gallia auſtr.* (Ciſtus Cav.)

ſyrticum * 96. H. ramis divaricatis, foliis linearibus ſtipulisque ſubſimilibus hiſpidulis ſubtus caneſcentibus,

floribus racemosis. *Ad magnam Syrtim Afr. bor.* (Cistus Viv.)

virgatum Pers. 97. H. ramis virgatis incanis, foliis linearibus margine revolutis utrinque canescentibus, stipulis subulatis, calycibus pulverulento-pubescentibus. *Afric. bor.* (Cistus Desf.)

apenninum Pers. 98. H. foliis oblongo-linearibus planis supra glaucescentibus subtus tomentosis, stipulis subulatis, calycibus villosis striatis obtusiusculis. *Europ. med.* (Cistus apenninus L., roseus All.)

hispidum Dun. 99. H. foliis oblongis obtusiusculis submucronatis margine revolutis supra calycibusque hispidis subtus incanis. *Lusitan.* (Cistus Lam. Brot.)

pulverulentum Cand. 100. H. foliis linearibus obtusis margine revolutis albido-tomentosis, stipulis linearibus, sepalis ovatis obtusis subfloccosis. *Gallia.* (Cistus pulverulentus Pourr., polifolius Lam.)

polifolium Pers. 101. H. foliis oblongo-linearibus petiolatis utrinque stellato-pubescentibus subtus incanis, stipulis ramentaceis obtusis, calycibus glabriusculis. *Anglia. Gallia. Hispania.* (Cistus polifolius L., splendens Lam.)

mutabile Pers. 102. H. foliis lanceolatis supra glabris subtus planis incanis, stipulis linearibus calycibusque pilosiusculis. *Hispan.* (Cistus Jacq.)

foetidum Pers. 103. H. foliis oblongo-lanceolatis utrinque virentibus hirsutis, stipulis linearibus, calycibus pilosis. *Patria?* (Cistus Jacq.)

ciliatum Pers. 104. H. foliis lineari-lanceolatis supra hirsutis subtus planis incano-subtomentosis ciliatis, calycibus nervosis glanduloso-pilosis. *Afric. bor. Hispan. Ital.* (Cistus Desf.)

majoranaefolium Cand. 105. H. foliis ovato-oblongis acutiusculis margine revolutis supra virentibus hirsutis subtus incano-tomentosis, calycibus hirsutissimis. *Gall. austr.*

1910. BIXA.

Orellana *Amer. tropic.* Arbor foliis cordato-oblongis nitidis utrinque glabris, floribus racemosis carneis.

1911. WEIHEA *.

madagascarensis * *Madagascar.* Frutex foliis oppositis subdentatis, pedunculis axillaribus 1floris e bractea urceolari. (Richaeia Thuar.)

1912. SARCOCHLAENA Thuar.

grandiflora Thuar. 1. S. foliis oblongis acutis subtus ferrugineo-tomentosis, pedunculis paucifloris, involucris depressis scabris. *Madagascar.*

eriophora Thuar. 2. S. foliis oblongis obtusis, pedunculis paucifloris, involucro rufo-lanato. *Madagascar.*

multiflora Thuar. 3. S. foliis oblongis acutis ſubtus glabris, floribus paniculatis, involucris 3lobis. *Madagaſcar.*

1913. SCHIZOCHLAENA Thuar.

cauliflora Thuar. 1. Sch. racemis e trunco ortis. *Madagaſcar.*

roſea Thuar. 2. Sch. paniculis terminalibus, involucro ampliſſimo irregulariter fiſſo. *Madagaſcar.*

elongata Thuar. 3. Sch. paniculis terminalibus, involucro 5lobo capſulam excedente. *Madagaſcar.*

1914. RHODOCHLAENA Thuar.

altivola Thuar. *Madagaſcar.* Frutex arbores altiſſime ſcandens, foliis alternis oblongis glabris integerrimis, floribus axillaribus pedunculatis ſplendide puniceis.

1915. TERNSTRÖMIA L. ſuppl.

* *Foliis integerrimis.*

brevipes Cand. 1. T. foliis obovatis ſubemarginatis, pedunculis axillaribus flores ſubaequantibus. *Amer auſtr.* (T. meridionalis Mut.?)

peduncularis Cand. 2. T. foliis obovato-oblongis ſubtus ſubſericeo-nitidis, pedunculis aggregatis flores ſuperantibus. *Inſ. Carib.*

elliptica Sw. 3. T. foliis oblongis acutiuſculis, pedunculis cernuis flores ſubaequantibus. *Mexico. Inſ. Carib.* (T. lineata Cand.)

punctata Sw. 4. T. foliis oblongis ſubemarginatis margine puncto-aſperis, pedunculis ſolitariis 1floris elongatis. *Guiana.* (Taonabo Aubl.)

cluſiaefolia Humb. 5. T. foliis obovato-oblongis obtuſis nigro-punctatis, pedunculis elongatis. *Quito.*

† *corymboſa* Sm. 6. T. foliis oppoſitis oblongis acuminatis, paniculis terminalibus corymboſis, calycibus ebracteatis. *Guiana.*

** *Foliis dentatis, ſerratis.*

dentata Sw. 7. T. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis venoſis, pedunculis lateralibus petiolo longioribus. *Guiana.* (Taonabo Aubl.)

*venoſa** 8. T. foliis elliptico-oblongis utrinque ſubattenuatis ſerrulatis venoſis, pedunculis axillaribus aggregatis breviſſimis. *Braſil.* Sello.

ſalicifolia Cand. 9. T. foliis lanceolatis elongatis acutis baſi obliquis crenulatis eveniis, pedunculis ſubgeminatis axillaribus petiolo brevioribus. *Guadalupa.* Bertero. *Martinica.* Sieber.

1916. Cleyera Thunb.

japonica Thunb. 1. Cl. foliis ſpathulato - oblongis apice tenuiſſime ſerrulatis, pedunculis lateralibus alternis 1floris. *Japon.*

† *rubiginoſa** 2. Cl. foliis ovatis ſpinuloſo - ſerratis ſubtus incanis, pedunculis faſciculatis glanduloſo - piloſis. *Sumatra.* (Ternſtrömia Cand.)

† *pentapetala** 3. Cl. foliis ſpathulatis ſpinuloſo-denticulatis glabris, pedunculis faſciculatis glabris. *Inſ. orae Malacc.* (Ternſtrömia Cand.)

ochnacea Cand. 4. Cl. foliis ovali - oblongis utrinque attenuatis venoſis integerrimis. *Japon. Nepal.*

1917. Freziera Sw.

theoides Sw. 1, Fr. foliis ovato - lanceolatis acuminatis obtuſe ſerratis utrinque glabris ſupra nitidis, pedunculis ſolitariis 1floris. *Jamaica.*

undulata Sw. 2. Fr. foliis elliptico - lanceolatis acuminatis undulato - ſerratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus aggregatis. *Inſ. Carib.* (Eroteum undulatum Sw. Vahl.)

nervoſa Humb. 3. Fr. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis parallele venoſis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis faſciculatis abbreviatis. *Alp. peruv.*

ſericea Humb. 4. Fr. foliis ovato - oblongis acuminatis ſerrulatis ſubtus argenteo - ſericeis, floribus ſeſſilibus ſubternis. *Quito.*

chryſophylla Humb. 5. Fr. foliis lanceolatis integerrimis acuminatis in petiolum attenuatis ſubtus aureo - tomentoſo - ſericeis, pedunculis breviſſimis axillaribus calycibusque tomentoſis. *Quito. Peru.* (Lettſomia tomentoſa R. et P.?)

caneſcens Humb. 6. Fr. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerrulatis ſubtus incano - lanato - tomentoſis, pedunculis ſubſolitariis, fructibus 3locularibus. *Peru.* (Lettſomia lanata R. et P.)

reticulata Humb. 7. Fr. foliis elliptico - oblongis petiolatis ſerratis ſubtus reticulatis tomentoſis, pedunculis aggregatis, fructibus 4locularibus. *Peru.*

1918. Cochlospermum Kunth.

Goſſypium Cand. 1. C. foliis 5lobis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Coromandel.* (Bombax L.)

vitifolium W. 2. C. foliis 5fidis acuminatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus. *Braſil. Mexico.* (C. hibiſcoides Kunth. ſerratifolium Cand.)

1919. Ochna.

** Stigmate capitato.*

obtuſata Cand. 1. O. foliis obovatis obtuſiſſimis ſerratis, floribus 8 - 10petalis. *Ind. or.* (O. ſquarroſa L.?)

lucida Lam. 2. O. foliis obovato-oblongis acutis ſerratis, floribus 7-10petalis. *Ind. or.* (O. ſquarroſa Rottb.)

nitida Cand. 3. O. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis, racemis confertis abbreviatis, floribus 5petalis. *Ind. or.*

multiflora Cand. 4. O. foliis ovali-oblongis acutis integerrimis, racemis compoſitis longe pedunculatis, floribus 5petalis. *Sierra Leone. Ind. or.* Rottler.

ciliata Lam. 5. O. foliis oblongis obtuſiuſculis ciliato-ſerratis, pedunculis paucifloris, floribus 5petalis. *Madagaſcar. C. B. S.?* (O. atropurpurea Cand.)

parvifolia Vahl. 6. O. foliis ovatis ſerrulatis, pedunculis 1floris folio longioribus. *Arabia.* (Evonymus inermis Forsk.)

*lanceolata** 7. O. foliis lanceolatis crenulatis, pedunculis ſubſolitariis folio brevioribus. *Malabar.* Rottler.

*** Stigmate multipartito.*

mauritiana Lam. 8. O. foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis, floribus corymboſis 5petalis, petalis calyce longioribus. *Inſ. Maſcaren.*

madagaſcarenſis Cand. 9. O. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis, floribus corymboſis 5petalis, petalis calycem aequantibus. *Madagaſcar.*

† *arborea* Burch. 10. O. foliis ovali-oblongis ſubintegerrimis, floribus ſubracemoſis 5petalis, antheris linearibus apice 2poroſis. *Afric. auſtr.*

1920. DELIMA.

ſarmentoſa 1. D. foliis ellipticis ſcaberrimis rigidis ſerratis, floribus ☿ paniculatis apetalis, capſulis glabris. *Ceylon. Malabar.* (Tetracera Vahl.)

tripetala Blum. 2. D. foliis obovatis apice mucronato-dentatis ſcaberrimis, floribus ☿ paniculatis 3petalis, capſulis pubeſcentibus. *Java.*

hebecarpa Cand. 3. D. foliis obovatis ſubcrenulatis ſcabris, floribus ☿ paniculatis 5petalis, capſulis pubeſcentibus. *Java. Inſ. Philippin.*

mexicana Seſſ. 4. D. foliis ovalibus obtuſis ſerratis utrinque glabris, venis ſubtus rufo-villoſis, floribus dioecis paniculato-faſciculatis 5petalis. *Mexico.*

nitida Cand. 5. D. foliis oblongo-lanceolatis ſcabris ſubintegerrimis, floribus ☿ paniculatis 4petalis. *Inſ. Trinit.* (Tetracera Vahl.)

† *guianenſis* Rich. 6. D. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubſerratis laevibus, floribus dioecis axillaribus breviter pedunculatis, fructibus globoſis pubeſcentibus. *Guiana.*

1921. TASMANNIA R. Br.

aromatica R. Br. 1. T. foliis lanceolatis baſi attenuatis, fructibus globoſis. *Nov. Holl.* (Winterana lanceolata Poir.)

inſipida R. Br. 2. T. foliis oblongis acuminatis baſi auriculatis, fructibus ovali-oblongis. *Nov. Holl.*

1922. AEGLE Corr.

Marmelos Corr. 1. Ae. foliis ternatis petiolatis ovato-oblongis venosis serratis, petiolis teretibus, ramis inermibus, floribus paniculatis, fructu 12loculari. *Ind. or.* (Crataeva L.)

sepiaria Cand. 2. Ae. foliis ternatis ovali-oblongis serratis sessilibus, petiolo communi alato, ramis spinosis, floribus solitariis, fructu 6-7loculari. *Japon.* (Citrus trifoliata L.)

1923. BONNETIA Schreb.

racemosa Sw. 1. B. foliis oppositis oblongo-lanceolatis subtilissime venosis, racemis axillaribus, capsulis 4valvibus. *Ins. Carib.* (Marila Sw. prodr. Mahurea speciosa Chois. in Cand. prodr.)

meridionalis Sw. 2. B. foliis alternis oblongis coriaceis, racemo terminali, capsulis 3valvibus. *Guiana. Brasil.* Sello. (Mahurea palustris Aubl.)

1924. CLUSIA.

**Floribus polyandris.*

rosea 1. Cl. foliis obovatis obtusis emarginatis parallele venosis breviter petiolatis, floribus 6partitis, fructibus costatis. *Carolina. Hispaniola.*

retusa Poir. 2. Cl. foliis obovatis retusis parallele venosis breviter petiolatis, calycibus 8sepalis, corolla 6petala, fructibus globosis ecostatis. *Amer. tropic.*

alba 3. Cl. foliis obovatis obtusis parallele venosis, corolla sub-6petala, fructibus oblongis costatis. *Ind. occid.*

flava 4. Cl. foliis obovato-oblongis parallele venosis, pedunculis 3floris, calyce polysepalo, corolla 3petala. *Jamaica.*

venosa 5. Cl. foliis obovatis obtusis remote inflexo-venosis, pedunculis racemosis, floribus 4fidis. *Martinica.*

nemorosa Meyer. 6. Cl. foliis obovato-oblongis acutis parallele venosis, calycibus 6-8sepalis, corolla 4petala. *Surinam.*

parviflora Humb. 7. Cl. foliis obovatis obtusis parallele venosis, corollis 5petalis calycem subaequantibus. *Nov. Granat.*

elliptica Kunth. 8. Cl. foliis ellipticis utrinque rotundatis obsolete parallele venosis, floribus 4fidis. *Peru.*

multiflora Kunth. 9. Cl. foliis obovatis obtusis parallele venosis, pedunculis multifloris, corolla 5petala calycem 4sepalum superante. *Nov. Granat.*

pedicellata Forst. 10. Cl. foliis obovato-oblongis venosis, floribus cymosis 4fidis. *Nov. Caledon.*

sessilis Forst. 11. Cl. foliis obovato-ellipticis venosis, floribus subsessilibus solitariis 4fidis. *Ins. Amicorum.*

***Floribus oligandris.*

*microcarpa** 12. Cl. caule scandente, foliis obovatis acutis subtiliter parallele venosis, panicula terminali diffusa

trichotoma, floribus dioecis 5andris, fructibus globofis. *Guiana.* (Quapoya fcandens Aubl. Xanthe Schreb. W.)

*macrocarpa** 13. Cl. caule fcandente, foliis obovato-oblongis parallele venofis acutis, panicula terminali trichotoma, floribus dioecis, fructibus oblongis. *Guiana.* (Quapoya Pana-panapari Aubl. Xanthe parviflora W.)

*acuminata** 14. Cl. caule fcandente, foliis fubrotundis utrinque abrupte attenuatis mucronatis parallele venofis, floribus axillaribus breviffime pedunculatis. *Portorico.* Bertero.

volubilis Kunth. 15. Cl. caule volubili, foliis ellipticis utrinque rotundatis parallele venofis. *Nov. Granat.*

tetrandra W. 16. Cl. arborea, foliis obovatis acutis parallele venofis, paniculis axillaribus, floribus 4fidis 4andris. *Quito.* (Havetia laurifolia Kunth.)

1925. STERBECKIA Schreb.

lateriflora W. *Guiana.* Frutex farmentofus, foliis oppofitis oblongis, floribus cymofis axillaribus albis. (Singana guianenfis Aubl.)

1926. VATERIA.

indica *Ind. or.* Arbor excelfa, foliis fparfis oblongis coriaceis, floribus paniculatis albis. (Elaeocarpus copalliferus Retz. Vahl.)

1927. ASCIUM Schreb.

*Aubletii** 1. A. floribus fubfpicatis, cucullis clavatis elongatis longe pedicellatis, antheris minutis numerofiffimis, foliis oblongis obtufis mucronatis. *Guiana.* (A. violaceum Vahl. Norantea guianenfis Aubl.)

*Selloi** 2. A. floribus racemofis, cucullis fubfeffilibus in pedicello a flore remotis fubrotundis, antheris fub-12 oblongis, foliis obovato-oblongis retufis. *Brafil.* Sello.

*Berterii** 3. A. floribus racemofis, cucullis feffilibus flori approximatis fubtus mucronatis, foliis oblongis mucronatis fubtus discoloribus. *Ind. occid.* Bertero.

1928. LEGNOTIS Sw.

Caffipurea Sw. 1. L. foliis ovatis acutis bafi obliquis, floribus breviffime pedunculatis. *Guiana. Guadalupa.* Bertero. (Caffipourea guianenfis Aubl.)

elliptica Sw. 2. L. foliis oblongis acuminatis, floribus mediocriter pedunculatis. *Jamaica. Portorico.*

1929. VALLEA Mut.

ftipularis Mut. 1. V. ftipulis ftipitatis, ramulis foliisque glabris, axillis venarum fubtus barbatis. *Nov. Granat.*

cordifolia R. et P. 2. V. ſtipulis ſtipitatis, ramulis foliisque cordatis ſubtus hirſutis. *Peru.*

pubeſcens Kunth. 3. V. ſtipulis ſeſſilibus, ramulis foliisque ſubtus fuſco-tomentoſis. *Nov. Granat.*

1930. MYRODENDRON Schreb.

amplexicaule W. *Guiana.* Arbor procera, foliis alternis ſemiamplexicaulibus lanceolatis crenatis, floribus corymboſis albis. (Houmiri balſamifera Aubl.)

1931. LEMNISCIA Schreb.

floribunda W. *Guiana.* Arbor ramoſa, foliis oblongis acuminatis, floribus ſpecioſis paniculato-corymboſis coccineis. (Vantanea guianenſis Aubl.)

1932. SARRACENIA.

purpurea 1. S. foliis ventricoſis abbreviatis, appendice cordata erecta ſeſſili. *Amer. bor.*

rubra Walt. 2. S. foliis ventricoſis ſcapo brevioribus ſuperne reticulatis, appendice ovato-acuminata erecta. *Amer. bor.* (L. pſittacina Mx.?)

variolaris Mx. 3. S. foliis ventricoſis elongatis ſuperne dorſo maculatis, appendice brevi fornicata. *Carolina.* (S. adunca Sm. minor Walt.)

flava 4. S. foliis ſtrictis longiſſime infundibuliformibus, appendice erecta cordato-mucronata. *Amer. bor.*

leucophylla Rafin. 5. S. foliis tubuloſis ſtrictis elongatis albis rubro venoſis intus hirſutis, appendice fimbriata. *Louiſiana.*

1933. LOASA Adanſ.

(Folia omnium hirſuto-ſtrigoſa puritiva; pedunculi fere uniflori.)

* *Folia ſimplicia.*

† *cordata lobata.*

ranunculifolia Humb. 1. L. foliis radicalibus longe petiolatis ſinuato-lobatis dentatis ſupra tomentoſis ſubtus ſericeis, caule oligophyllo. *Peru.*

grandiflora Lam. 2. L. foliis cordatis 5lobis inciſo-dentatis duplicato-hirſutis, pedunculis axillaribus elongatis. *Peru.*

xanthiifolia Juſſ. 3. L. foliis cordato-ovatis angulato-dentatis, pedunculis lateralibus. *Peru.*

acerifolia Juſſ. 4. L. foliis cordatis lobatis dentatis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

triloba Juſſ. 5. L. foliis cordatis 3lobis dentatis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

nitida Lam. 6. L. foliis cordatis lobatis dentatis ſupra nitidis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

†† *Folia oblonga incisa aut lobata.*

sclareaefolia Juss. 7. L. foliis oblongis acuminatis sinuato-dentatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. *Peru. Chili.*

chenopodifolia Lam. 8. L. foliis ovalibus inciso-dentatis, pedunculis subracemosis. *Peru.*

loxensis Kunth. 9. L. foliis ovato-oblongis lobatis irregulariter dentatis subtus canescentibus, pedunculis subracemosis. *Peru.*

††† *Folia pinnatifida.*

argemonoides Juss. 10. L. foliis cordatis lobato-pinnatifidis tomentosis, pedunculis 3floris. *Nov. Granat.*

acanthifolia Juss. 11. L. foliis cordatis pinnatifidis dentatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Chili.*

contorta Juss. 12. L. foliis subcordato-oblongis sinuato-pinnatifidis dentatis, pedunculis axillaribus elongatis, fructibus extus spiratim tortis calyce coronatis. *Peru.*

palmata * 13. L. foliis cordatis palmatis pinnatifidis asperis, pedunculis lateralibus, caule volubili. *Monte Video.* Sello.

†††† *Folia bipinnatifida.*

urens Jacq. 14. L. foliis oppositis 2pinnatifidis sinuatis, laciniis obtusiusculis, ramis maculatis, pedunculis axillaribus. *Peru.*

ambrosiaefolia Juss. 15. L. foliis alternis 2pinnatifidis, laciniis acutiusculis, pedunculis lateralibus. *Peru.* (L. hispida L.)

tricolor Ker. 16. L. foliis oppositis cordatis 2pinnatifidis inciso-dentatis, pedunculis axillaribus. *Chili.*

volubilis Juss. 17. L. foliis alternis 2pinnatifidis, laciniis lanceolatis obtusis ciliatis, caule volubili. *Chili.*

** *Folia ternata.*

triphylla Juss. 18. L. foliis ternatis lanceolatis serratis, medio elongato, pedunculis lateralibus. *Peru.*

papaverifolia Kunth. 19. L. foliis ternatis oblongis dentatis, medio maximo pinnatifido, pedunculis oppositifoliis subracemosis. *Nov. Granat.*

1934. MENTZELIA.

hispida W. 1. M. floribus pedunculatis solitariis, petalis integerrimis mucronatis. *Mexico.* (M. aspera Cav., strigosa Kunth.)

aspera 2. M. floribus subsessilibus solitariis, petalis crenatis obtusis. *Ind. occid.*

oligosperma Sims. 3. M. floribus pedunculatis axillaribus, petalis acuminatis, radice tuberosa. *Louisiana.*

1935. MAYNA.

odorata Aubl. 1. M. foliis oblongis integerrimis glabris. *Cayenn.*

fericea * 2. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis fubtus fericeis. *Brafil.*

brafilienfis Radd. 3. M. foliis oblongis denticulatis fubpubefcentibus. *Brafil.*

1936. HEPTACA Lour.

africana *Ora Afric. orient.* Arbor parva, foliis alternis ovatis glabris integerrimis, pedunculis lateralibus multifloris, floribus albis.

1937. DECADIA Lour.

aluminofa Lour. *Inf. Molucc. orient. Cochinchina.* Arbor mediocris, foliis ovato-oblongis ferratis laevibus, floribus racemofis albis axillaribus et lateralibus.

1938. BRUGUIERA Lam.

gymnorrhiza Lam. 1. Br. radicibus epigaeis, foliis ovato-oblongis acutis nitidis, fructibus teretibus acutis. *Inf. Molucc. Ind. or.* (Rhizophora L.)

fexangularis * 2. Br. foliis ovato-lanceolatis, fructibus fexangularibus obtufis. *Cochinchina.* (Rhizophora Lour.)

1939. ALANGIUM Juff.

decapetalum Lam. 1. A. ramis fpinefcentibus, foliis oblongis glabriusculis, floribus 10petalis, fructibus glabris. *Ind. or.* (Grewia falvifolia L. fuppl.)

hexapetalum Lam. 2. A. inerme, foliis ovato-lanceolatis glabris, floribus 6petalis, fructibus tomentofis. *Ind. or.*

tomentofum Lam. 3. A. fubinerme, foliis oblongis obtufis, ramulis calycibusque tomentofis, fructibus pubefcentibus *Ind. or.*

1940. LECYTHIS.

* *Foliis integerrimis aut fubintegerrimis.*

Ollaria 1. L. foliis feffilibus cordato-ovatis fubintegerrimis, racemis terminalibus fafciculatis. *Brafil.*

grandiflora Aubl. 2. L. foliis petiolatis oblongis acutis, racemis lateralibus flexuofis, petalis obtufis. *Guiana. Brafil.*

amara Aubl. 3. L. foliis petiolatis oblongis acuminatis, racemis axillaribus terminalibusque, petalis acutis. *Guiana.*

Zabucajo Aubl. 4. L. foliis petiolatis lanceolatis elongatis acutis, racemis terminalibus, petalis acutis. *Guiana.*

Idatimon Aubl. 5. L. foliis petiolatis oblongis, pedunculis racemofis axillaribus glandulofis, petalis obtufis. *Guiana.*

parviflora Aubl. 6. L. foliis petiolatis oblongis acuminatis, racemis paniculatis terminalibus, petalis acutis. *Guiana.*

bracteata W. 7. L. foliis petiolatis obovato-oblongis, racemis lateralibus bracteatis, fructibus 6locularibus 2corticatis. *Cayenn.* (Couroupita guianenſis Aubl.)

***Foliis dentatis, ſerratis.*

minor Jacqu. 8. L. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis elongatis ſerratis, racemis ſpicatis multifloris. *Amer. auſtr.*

longifolia Kunth. 9. L. foliis lanceolatis utrinque attenuatis remote dentatis conduplicatis. *Ad Orinocum.*

elliptica Kunth. 10. L. foliis ellipticis abrupte acutis dentato-crenatis, racemis ſtrictis. *Ad fl. Magdalenae.*

*braſilienſis** 11. L. foliis lanceolatis obtuſiuſculis baſi attenuatis ſubtus pubeſcentibus antice crenulato-ſerrulatis, pedunculis breviſſimis 1floris, calycibus ſericeis. *Braſil.* Sello.

1941. LAGERSTRÖMIA.

indica 1. L. petalis criſpis, panicula terminali, foliis ſubrotundo-ovatis acutis glabris. *China. Cochinchina. Japon.*

Reginae Roxb. 2. L. petalis undulatis, panicula terminali, foliis amplis oblongis glabris. *Ind. or. Java.* (Adambea glabra Lam.)

hirſuta W. 3. L. petalis planis, panicula corymboſa terminali, foliis oblongis pubeſcentibus. *Malabar.* (Adambea hirſuta Lam.)

Münchhauſia W. 4. L. petalis planis, racemo ſubcompoſito terminali, foliis ovatis glabris. *China.* (Münchhauſia ſpecioſa L.)

parviflora Roxb. 5. L. petalis planis, pedunculis axillaribus 3floris, foliis oblongis obtuſis ſcabris ſubtus pallidis. *Ind. or.*

1942. THEA.

chinenſis Sims. 1. Th. pedunculis axillaribus terminalibusque ſolitariis 1floris, floribus 6-9petalis, fructibus dehiſcentibus. *China auſtr. et media. Japon.* (Th. cantonienſis Lour., viridis et Bohea L.)

cochinchinenſis Lour. 2. Th. pedunculis terminalibus ſolitariis, floribus 5petalis, fructibus dehiſcentibus. *Cochinchina.*

oleoſa Lour. 3. Th. pedunculis axillaribus 3floris, floribus 6petalis, fructibus clauſis. *China auſtr.*

1943. ESPERA W.

cordifolia W. *Jaffna in India orient.* Rottler. Frutex ſcandens, foliis cordatis integerrimis nitidis, floribus paniculatis.

1944. SANGUINARIA.

canadensis *Amer. bor.* Herba folio subreniformi sinuato-lobato glauco, scapo 1floro, floribus albis.

1945. ARGEMONE.

mexicana *Mexico. Carolina.* Herba annua foliis pinnatifidis incisis spinosis, floribus axillaribus flavis. (A. alba Rafin.)

1946. PODOPHYLLUM.

peltatum 1. P. floribus sub-20andris, fructibus virentibus ovatis. *Amer. bor.*

callicarpon Rafin. 2. P. floribus sub-10andris, fructibus carneis oblongis. *Louisiana.*

1947. MONODORA Dun.

Myristica Dun. *Jamaica.* Arbor foliis alternis oblongis coriaceis, pedunculis lateralibus unifloris. (Anona Myristica Gärtn.)

1948. ONCOBA Forsk.

spinosa Pers. *Arabia.* Arbor grandis, ramis verrucosis spinosis, foliis alternis ovatis serratis, floribus albis.

1949. VENTENATIA P. B.

glauca P. B. *Guinea.* Frutex foliis alternis ovali-oblongis supra glauco-glutinosis, floribus solitariis terminalibus pedunculatis puniceis.

1950. NYMPHAEA.

* *Antherae laterales: flores coerulescentes.*

coerulea Sav. 1. N. foliis peltatis repandis glabris, lobis baseos acutis subparallelis, petalis lanceolatis. *Aegypt. infer.*

scutifolia Cand. 2. N. foliis peltatis sinuato-dentatis glabris, lobis baseos acutis incumbentibus, petalis oblongis obtusis. *C. B. S.* (N. coerulea Andr.)

stellata W. 3. N. foliis peltatis integerrimis glabris, lobis baseos divaricatis, petalis acutis calyce brevioribus. *Malabar, Madagascar.* (N. madagascarensis Cand.)

pulchella Cand. 4. N. foliis peltatis subrepandis glabris, lobis baseos obtusis divergentibus, petalis acuminatis calyce brevioribus. *Quito.* Ruiz et Pavon.

*** Antherae terminales: flores albi aut roſei.*

† *Folia peltata.*

Lotus 4. N. foliis orbiculatis argute ſerratis ſubtus pedunculisque pubeſcentibus, lobis baſeos acutis discretis. *Aegypt.*

thermalis Cand. 5. N. foliis orbiculatis argute denticulatis ſubtus pedunculisque glaberrimis, lobis baſeos acutis approximatis. *Hungar.* (N. Lotus Kit.)

pubeſcens W. 6. N. foliis ſubreniformibus argute dentatis ſubtus villoſis maculatis, lobis baſeos rotundatis. *Ind. or.* (N. Lotus, N. L. Burm. P. B.)

rubra Roxb. 7. N. foliis peltatis argute dentatis ſubtus pubeſcentibus emaculatis. *Ind. or.* (Caſtalia magnifica Salisb.)

ampla Cand. 8. N. foliis ſuborbiculatis dentatis ſubtus glabris reticulato-areolatis, lobis baſeos acutis patentibus. *Ind. occid. Aegypt.* (N. Lotus Sieber. ad Damiat. N. Rudgeana Meyer.)

verſicolor Roxb. 9. N. foliis peltatis margine intraque fiſſuram ſinuato-dentatis punctato-puſtulatis utrinque glabris. *Bengal.*

edulis Cand. 10. N. foliis peltatis ovalibus integerrimis ſubtus pubeſcentibus. *Bengal.* (Caſtalia Salisb.)

†† *Folia cordata ſubintegerrima.*

reniformis Walt. 11. N. foliis cordato-reniformibus glabris. *Carolin.* (Nelumbium W. Cyamus Pursh.)

alba 12. N. foliis cordatis integerrimis, radiis ſtigmatis aſcendentibus. *Europ.*

odorata Ait. 13. N. foliis cordato-ſagittatis integerrimis, lobis baſeos diſtantibus mucronatis, nervis venisque ſubtus prominulis, radiis ſtigmatis inflexis. *Amer. bor.* (N. alba Walt. Caſtalia pudica Salisb.)

minor Cand. 14. N. foliis cordato-ſubhaſtatis integerrimis, nervis venisque ſubtus prominulis, lobis baſeos divaricatis acuminatis, petiolis pedunculisque piloſiusculis. *Amer. bor.* (N. odorata *β.*, minor Sims.)

nitida Sims. 15. N. foliis cordatis integerrimis, nervis lateralibus ſubtus aequatis, lobis baſeos rotundatis, petiolis laevibus, petalis obtuſis. *Sibir.* (N. odorata W.)

pygmaea Ait. 16. N. foliis cordato-ſagittatis integerrimis ſubtus coloratis, petalis acutis, ſtigmate panciradiato. *China.* (Caſtalia Salisb.)

blanda Meyer. 17. N. foliis cordatis integerrimis ſupra ſubbullatis, venis ſubtus canaliculatis, petalis acuminatis. *Surinam.*

1951. EURYALE Salisb.

ferox Salisb. *China auſtr. Ind. or.* Herba aquatica tota aculeis horrida, foliis amplis peltatis orbiculatis, floribus violaceis. (Anneslea ſpinoſa Andr.)

1952. NUPHAR Sm.

**Calyx 5ſepalus.*

luteum Sm. 1. N. ſtigmate integro umbilicato, foliis ovali-cordatis, lobis approximatis, petiolis acutangulis. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (Nymphaea L.)

pumilum Cand. 2. N. ſtigmate lobato, foliis ovali-cordatis, lobis diſtantibus, petiolis obtusangulis. *Europ. bor.* (Nymphaea lutea β. minima W., N. pumila Hofm., Nuphar minima Sm.)

Kalmianum Ait. 3. N. ſtigmate inciſo, foliis cordato-ſubrotundis, lobis baſeos ſubapproximatis, petiolis teretibus. *Amer. bor.* (Nymphaea lutea β. Kalmiana Mx., microphylla Perſ., Kalmiana Sims.)

ſericeum Lang. 4. N. ſtigmate dentato, foliis cordato-oblongis, lobis baſeos diſtantibus, pedunculis petiolisque lepidoto-ſericeis. *Danub.*

japonicum Cand. 5. N. ſtigmate multiradiato, foliis cordato-ſagittatis, lobis baſeos ſubdiſtantibus acutis, petiolis teretiusculis. *Japon.* (Nymphaea lutea Thunb.)

***Calyx 6ſepalus.*

advena Ait. 6. N. ſtigmate multiradiato, foliis erectis cordatis ſubrepandis, lobis baſeos rotundatis diſtantibus, petiolis teretibus. *Amer. bor.* (Nymphaea advena Ait. ed. 1.)

ſagittaefolium Pursh. 7. N. floribus apetalis, antheris ſubſeſſilibus, foliis cordato-ſagittatis elongatis obtuſis. *Carolina. Georgia.* (N. longifolia Sm., Nymphaea ſagittaefolia W., longifolia Mx.)

1953. THYLACIUM Lour.

lucidum Cand. 1. Th. foliis ellipticis acutiusculis glabris, ramulis petiolisque velutinis, bacca ovato-globoſa. *Inſ. Booby inter Nov. Holl. et Nov. Guin.*

africanum Lour. 2. Th. foliis ovalibus mucronulatis ramulisque glabris, bacca oblonga. *Ora Afric. orient.* (Th. ovalifolium Juſſ.)

heterophyllum Juſſ. 3. Th. foliis ovali-lanceolatis ſimplicibus ternatisque. *Madagaſcar.* (Capparis panduriformis Thuar.)

panduriforme Juſſ. 4. Th. foliis panduriformibus obtuſis ſimplicibus ternatisque. *Inſ. Maſcaren.* (Capparis Lam.)

1954. MAERUA Forsk.

racemoſa Vahl. 1. M. floribus racemoſis, corona faucis integra, foliis retuſis. *Arabia.*

uniflora Vahl. 2. M. pedunculis 1floris, corona faucis multifido-laciniata, foliis oblongis coriaceis eveniis. *Arabia. Afric. occid.* (M. angolenſis Cand. ?)

1955. RYANIA Vahl.

ſpecioſa Vahl. *Inſ. Trinit.* Arbor ſpecioſa, foliis alternis oblongis acuminatis elongatis ſubtus venoſo-reticulatis, floribus axillaribus ſubſolitariis pedunculatis. (Patriſia pyrifera Rich. Perſ.)

1956. PATRISIA Rich.

dentata Kunth. 1. P. foliis ovato-oblongis acuminatis denticulatis, venis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis unifloris. *Ad Orinocum. Cayenn.* (P. affinis Kunth., parviflora Cand.)

bicolor Cand. 2. P. foliis oblongis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis multifloris. *Cayenn.*

1957. FLACOURTIA Commerſ.

Ramontchi Herit. 1. Fl. ſpinoſa, foliis ſubrotundo-ovatis acutis crenatis, racemis paucifloris. *Madagaſcar.*

ſapida Roxb. 2. Fl. ſpinoſa, foliis ellipticis repando-ſerratis, pedunculis 3floris. *Ind. or.*

ſepiaria Roxb. 3. Fl. ſpinoſa, foliis obovato-oblongis repando-ſerratis, pedunculis 3floris. *Ind. or.*

flaveſcens W. 4. Fl. ſpinoſa, foliis obovatis ſerratis, pedunculis 3floris. *Guinea.*

rhamnoides Burch. 5. Fl. ſpinoſa, foliis ellipticis acutiuſculis ſubſerratis, pedunculis 1floris. *C. B. S.*

cataphracta Roxb. 6. Fl. inermis? foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis, pedunculis ſub-6floris. *Ind. or.*

inermis Roxb. 7. Fl. inermis, foliis elliptico-oblongis crenatis nitidis, floribus racemoſis ☿, ſtylo 5fido. *Inſ. Molucc.*

1958. ROYDSIA Roxb.

ſuaveolens Roxb. *Silhet, prov. Ind. or.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis alternis, racemis axillaribus.

1959. SEGUIERA.

americana 1. S. aculeata, aculeis recurvis, foliis ellipticis emarginatis nitidis integerrimis, floribus racemoſis. *Amer. auſtr.*

aſiatica Lour. 2. S. inermis ſcandens, foliis ovatis integerrimis aſperis, floribus racemoſis. *Cochinchina.*

1960. RHEEDIA.

lateriflora *Inſ. Antill.* Arbor foliis amplis oblongis, pedunculis axillaribus ſubdiviſis. (Mammea humilis Vahl.)

1961. CHLOROMYRON Perſ.

verticillatum Perſ. *Peru.* Arbor excelſa, ramis quaternis, foliis oblongis acuminatis integerrimis: e trunco ramisque

incisis balsamum virens stillat. (Verticillaria acuminata R. et P.)

1962. XYLOSMA Forst.

suaveolens Forst. 1. X. foliis ovatis serratis. *Ins. societ.* (Myroxylon suaveolens Forst. char.)

orbiculatum Forst. 2. X. foliis subrotundis integerrimis. *Ins. Amicorum.* (Myroxylon Forst. char.)

1963. DAVILLA Vand.

brasiliana Cand. *Brasil.* Frutex foliis oblongis obtusis, floribus subpaniculatis fructus mentientibus ob sepala interiora capsularum more genitalia foventia. (D. rugosa Poir.)

1964. SLOANEA.

dentata 1. Sl. foliis cordato-ovatis denticulatis, stipulis serratis, calycibus 5-6-7fidis. *Ins. Carib. Guiana.* (Sl. Plumerii Aubl., grandiflora Sm., Massoni Sw.)

sinemariensis Aubl. 2. Sl. foliis subrotundo-ovatis integerrimis, stipulis acuminatis, calycibus 5fidis. *Ins. Carib. Guiana.* (Sl. Aubletii Sw.)

1965. AZARA R. et P.

integrifolia R. et P. 1. A. foliis geminis integerrimis, majori obovato, floribus subspicatis pendulis. *Chili.*

dentata R. et P. 2. A. foliis geminis dentatis, majori elliptico, floribus umbellatis. *Chili.*

serrata R. et P. 3. A. foliis geminis serratis, majori lanceolato, floribus corymbosis. *Chili.*

1966. LUDIA Commers.

sessiliflora Lam. 1. L. foliis ovato-oblongis acutiusculis venosis, floribus axillaribus sessilibus, stigmatibus ternis bifidis. *Ins. Mascaren.*

myrtifolia Lam. 2. L. foliis ovatis acutis integerrimis venosis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis, stigmate 3lobo. *Ins. Mascaren.*

heterophylla Lam. 3. L. foliis ramorum juniorum exiguis ovatis spinuloso-dentatis, adultiorum obovatis nitidis integerrimis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis. *Ins. Mascaren.*

1967. PROCKIA P. Brown.

* *Stylus filiformis, stigmate capitato vel acutiusculo.*

Crucis 1. Pr. foliis ovatis acuminatis serrulatis glabriusculis 3nerviis, stipulis falcatis, racemis paucifloris. *Ins.*

Inſ. Carib. Mexico. Braſil. (Tinea triplinervia N. E.)

*ſeptemnervia** 2. Pr. foliis cordato-oblongis acuminatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus 7nerviis, ſtipulis ſemicordatis, racemis lateralibus ſub-8floris piloſis. *Braſil.* Sello.

deltoides Lam. 3. Pr. foliis deltoideo-ſubrotundis crenatis glabris, floribus ſolitariis 5partitis. *Inſ. Maſcaren.*

** *Stigmate ſeſſili plano.*

theaeformis W. 4. Pr. foliis oblongis baſi attenuatis crenulatis utrinque glabris baſi ſubrevolutis, floribus ſolitariis. *Inſ. Maſcaren.* (Lightfootia Vahl. Ludia heterophylla Bory. habet folia ramorum ſterilium pinnatifida.)

ſerrata W. 5. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis, pedunculis lateralibus aggregatis 1floris. *Inſ. Carib.* (Lightfootia Vahl. Sw.)

integrifolia W. 6. Pr. foliis obovatis oblongisque obtuſis ſubemarginatis ſubintegerrimis coriaceis, pedunculis ſubaggregatis 1floris. *Inſ. Maſcaren.* (Lightfootia Vahl.)

1968. LAËTIA.

apetala 1. L. foliis oblongis obtuſis ſerrulatis nitidis, pedunculis ſub-3floris axillaribus. *Ind. occid.*

*ſcabra** 2. L. foliis ovalibus ſubdenticulatis opacis ſubtus ſcaberrimis triplinerviis, pedunculis axillaribus ternis, calycibus ſericeis. *Hiſpaniola.* Bertero.

Thamnia Sw. 3. L. foliis oblongis ſubintegerrimis nitidis, pedunculis axillaribus diviſis. *Jamaica.*

*parviflora** 4. L. foliis obovato-oblongis utrinque villoſiuſculis, paniculis axillaribus tomentoſis, floribus glomeratis. *Braſil.* Sello.

hirtella Kunth. 5. L. foliis oblongis obtuſis argute denticulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 1floris. *Cumana.*

guazumaefolia Kunth. 6. L. foliis oblongis obtuſiuſculis obſolete denticulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis dichotomis multifloris, fructibus 6gonis. *Nov. Granat.*

completa 7. L. floribus corollatis, foliis ovatis obtuſis ſerratis rugoſis. *Amer. auſtr.*

1969. PARIANA Aubl.

campeſtris Aubl. 1. P. floribus androgynis verticillato-ſpicatis, ♀ centrali, ♂ quaternis ambeuntibus, foliis ovatis acuminatis ſtriatis, ora vaginarum longiſſime piloſa. *Cayenn.*

*anguſtifolia** 2. P. floribus dioecis elongato-ſpicatis, floſculis confertis, calycibus obtuſis, foliis linearibus glabris. *Ad Orinocum* Humb. (Panicum triticeum W. herb.)

1970. EVANDRA R. Br.

aristata R. Br. 1. E. culmo folioso, spiculis paniculatis axillaribus terminalibusque, squamis aristatis. *Nov. Holl.*

pauciflora R. Br. 2. E. culmo nudo, spiculis lateralibus geminis solitariisve sessilibus, squamis muticis. *Nov. Holl.*

1971. CHRYSITHRIX.

capensis *C. B. S.* Planta magis Aroideis affinis quam Graminibus, scapo ancipiti, e cujus latere stamina innumera aurea antheris linearibus erumpunt.

DIGYNIA.

1972. CURATELLA.

americana. *Amer. austr.* Arbor mediocris, foliis oblongis supra scaberrimis subtus venosis denticulato-aculeatis, paniculis confertis e ramo adultiori, floribus albis.

1973. HEMISTEMMA Juss.

Commersonii Cand. 1. H. foliis oppositis ovali-oblongis mucronatis, pedunculis calycibusque tomentoso-lanatis. *Madagascar.* (Helianthemum coriaceum α. Pers.)

Aubertii Cand. 2. H. foliis spathulato-lanceolatis acutis subtus venosis, pedunculis glabriusculis, calycibus sericeis. *Madagascar.* (Helianthemum coriaceum β. Pers.)

dealbatum R. Br. 3. H. foliis alternis spathulatis mucronatis subtus sericeo-candicantibus, floribus spicatis secundis. *Ora bor. nov. Holl.*

Banksii R. Br. 4. H. foliis obovato-oblongis obtusis subtus dense tomentosis, floribus sessilibus secundis. *Ora bor. nov. Holl.*

angustifolium R. Br. 5. H. foliis alternis linearibus angustissimis subtus candicantibus, floribus spicatis secundis sericeis villosis. *Ora bor. nov. Holl.*

† *Lechenaultii* Cand. 6. H. foliis spathulatis apice subemarginatis subtus albo-tomentosis, floribus axillaribus solitariis brevissime pedunculatis. *Nov. Holl. ora austr.*

1974. TEMUS Molin.

moschata Molin. *Chili.* Arbor excelsa, foliis oblongis sempervirentibus lucidis odorem nucis moschatae spirantibus, floribus carneis.

1975. BAUERA Andr.

rubioides Andr. *Nov. Holl.* Arbuscula venusta, foliis verticillatis lanceolatis glabris serrulatis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis puniceis.

1976. POTERIUM.

ſpinoſum 1. P. fruticoſum, ſpinis ramoſis divaricatis, foliolis minutis, ſpicis oblongis. *Sicilia. Creta. Syria.*

caudatum Ait. 2. P. fruteſcens inerme, ramis teretibus villoſis, ſpicis elongatis laxis. *Inſ. Canar.*

anciſtroides Desf. 3. P. ſuffruticoſum inerme, ramulis decumbentibus, foliolis ſubrotundis, ſpicis globoſis. *Afr. bor.*

agrimonifolium Cav. 4. P. herbaceum hirſutum, foliolis lanceolatis, ſpicis oblongo-ovatis. *Hiſpan.*

hybridum 5. P. herbaceum glabrum, caule ramisque ſtrictis teretibus. *Gallia auſtr.*

polygamum Kit. 6. P. herbaceum glabrum, caule ramisque diffuſis angulatis, ſpicae oblongae floribus polygamis. *Hungar.*

Sanguiſorba 7. P. herbaceum glabrum, caule ramisque ſtrictis angulatis, ſpicae ovato-oblongae floribus androgynis. *Europ.*

1977. CLIFFORTIA.

* *Foliis alternis.*

ſtrobilifera 1. Cl. foliis linearibus cuſpidatis patentibus margine ſubſerrulatis, ſtipulis membranaceis bidentatis. *C. B. S.*

graminea Thb. 2. Cl. foliis linearibus longiſſime cuſpidatis ſtrictis apice ſetaceo-ſerrulatis nervoſis, vaginis latis planis apice bidentatis. *C. B. S.*

ruſcifolia 3. Cl. foliis confertis lanceolatis cuſpidato-pungentibus nervoſis patulis, floralibus ſub-3dentatis villoſis. *C. B. S.*

tridentata W. 4. Cl. foliis cuneiformibus apice profunde 3dentatis ramisque piloſiſſimis. *C. B. S.* Hort. Kew.

cuneata Ait. 5. Cl. foliis cuneatis elongatis glabris glaucis apice acute dentatis. *C. B. S.*

ferruginea 6. Cl. foliis lanceolatis baſi attenuatis ſetaceo-ſerratis ſtriato-venoſis utrinque glabris, ſtipulis ferrugineis membranaceo-ſetaceis elongatis bifidis. *C. B. S.* (Cl. ſerrata Thb., berberidifolia Lam.)

odorata Thb. 7. Cl. foliis ovatis obtuſis aequaliter ſerratis ſubtus venoſis ramisque albo-villoſis. *Afric. auſtr.*

ilicifolia 8. Cl. foliis ſubrotundo-ovatis amplexicaulibus mucronato-dentatis venoſo-ſtriatis glaberrimis. *C. B. S.* (C. cordifolia Lam.)

** *Foliis oppoſitis.*

cinerea Thb. 9. Cl. foliis connatis ovatis obtuſiuſculis ſubtus carinatis incano-tomentoſis. *Afric. auſtr.*

pulchella 10. Cl. foliis orbiculatis integerrimis appreſſis ſtriatis glaberrimis. *Afric. auſtr.*

crenata 11. Cl. foliis orbiculatis crenatis ſtriato-nervoſis glauceſcentibus appreſſis. *C. B. S.*

*** *Foliis fasciculatis.*

ericaefolia 12. Cl. foliis subternis teretibus sulcatis obtusis petiolatis. *C. B. S.*
teretifolia 13. Cl. foliis subquinis teretibus mucronatis subtus convexis glabris. *C. B. S.*
juniperina 14. Cl. foliis 7–9nis lineari-filiformibus subulatis scabris recurvis. *C. B. S.*
†*filifolia* 15. Cl. foliis subquinis semitereti-filiformibus glabris incurvis. *C. B. S.*

**** *Foliis ternatis sessilibus.*

obcordata 16. Cl. foliis subrotundis obtusissimis integerrimis eveniis, medio minori obcordato. *Afric. austr.*
dentata W. 17. Cl. foliis obovatis venosis apice 3dentatis glabris, medio majori, ramulis pubescentibus. *Afr. austr.*
trifoliata 18. Cl. foliis confertis venosis pilosis, lateralibus lanceolatis integerrimis, medio obovato 3dentato. *Afric. austr.*
ternata 19. Cl. foliis lanceolatis acutis integerrimis pubescentibus. *C. B. S.*
falcata 20. Cl. foliis linearibus falcatis glabris. *C. B. S.*
sarmentosa 21. Cl. foliis linearibus angustissimis villosis, caule sarmentoso. *Afric. austr.*

1978. ABLANIA Aubl.

guianensis Aubl. *Guiana.* Arbor excelsa foliis oblongis undulatis, floribus corymbosis. (Trichocarpus laurifolia W.)

1979. FOTHERGILLA.

alnifolia *Carolina.* Frutex foliis oblongis obtusis vel acutiusculis apice subserratis subtus canescentibus, floribus spicatis (staminibus) albis. (F. Gardeni Jacq.)

1980. LACIS Schreb.

fluviatilis W. 1. L. foliis sessilibus sinuato-pinnatifidis crispis, floribus spicatis polyandris. *Guiana.*
fucoides Mart. 2. L. foliis multifido-laciniatis planis apice fimbriatis, floribus solitariis pedunculatis oligandris. *Brasil.* [Marathrum Humb. p. 246 huc pertinere, sero vidi.]

TRIGYNIA.

1981. HOMALIUM Jacq.

racemosum Jacq. 1. H. foliis ovato-oblongis crenato-serratis, floribus paniculatis axillaribus. *Martinic. Guadalupa.*
Racoubea Sw. 2. H. foliis oblongis crenato-dentatis, floribus subspicatis axillaribus. *Guiana.* (Racoubea guianensis Aubl.)

1982. SAURAVIA W.

excelsa W. 1. S. foliis obovato-oblongis acutiusculis integerrimis supra scabris subtus ad venas hirsutis, panicula trichotoma elongata villosa. *Nov. Granat.*

villosa Cand. 2. S. foliis ellipticis utrinque attenuatis subserratis subtus pedunculisque villosis. *Mexico.*

† *cauliflora* Cand. 3. S. foliis oblongis acuminatis aristato-serratis supra glabris subtus ferrugineo-villosis, pedunculis 1floris in trunco aggregatis. *Java.*

crenulata Cand. 4. S. foliis obovatis acutiusculis crenulato-serratis, pedunculis 1floris ramorum veterum aggregatis. *Java.*

gigantea Cand. 5. S. foliis subcordato-oblongis acuminatis serratis subtus rufo-velutinis, pedunculis axillaribus trichotomis folio brevioribus subebracteatis. *Java.*

nepalensis Cand. 6. S. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis supra glabris subtus ad nervos ramulisque strigosis, pedunculis racemosis. *Nepal.*

bracteosa Cand. 7. S. foliis subcordato-oblongis acuminatis subserratis, pedunculis axillaribus trichotomis, bracteis oblongis pedicellos aequantibus. *Java.*

bracteolata Cand. 8. S. foliis oblongis utrinque attenuatis subserratis glabris, pedunculis lateralibus subramosis, bracteolis minimis. *Java.*

tristyla Cand. 9. S. foliis ellipticis utrinque subattenuatis tenuissime serratis glabris, petiolis pedunculisque fasciculatis strigoso-squamulosis. *Ins. Molucc.*

serrata Cand. 10. S. foliis oblongis utrinque attenuatis serratis glabris, petiolis pedunculisque ferrugineo-tomentosis. *Mexico.*

lanceolata Cand. 11. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis minutissime serrulatis, junioribus squamulas rufas ad nervos gerentibus, pedunculis axillaribus umbelliferis petiolum aequantibus. *Java.*

nudiflora Cand. 12. S. foliis obovatis acutiusculis subserratis, adultis utrinque glabris, pedunculis lateralibus 1floris solitariis. *Java.*

1983. HIBBERTIA Salisb.

* *Capsulis glabris: floribus 2-5gynis.*

volubilis Andr. 1. H. foliis obovato-lanceolatis mucronatis subintegerrimis subtus pubescentibus, floribus subsessilibus, caule subvolubili. *Nov. Holl.* (Dillenia scandens W., volubilis Vent., speciosa Curt.)

dentata R. Br. 2. H. foliis oblongis acutis mucronato-dentatis subtus scaberrimis, floribus pedunculatis, caule volubili. *Nov. Holl. Ins. Diemen.*

saligna R. Br. 3. H. foliis oblongo-linearibus acuminatis calloso-mucronatis integerrimis subtus villosis, floribus sessilibus, caule erecto. *Nov. Holl.*

procumbens Cand. 4. H. foliis linearibus craſſiuſculis eveniis, caule procumbente, floribus terminalibus pedunculatis, ſeminibus pulpae immerſis. *Nov. Holl. bor.* (Dillenia procumbens Labill.)

virgata R. Br. 5. H. foliis linearibus obtuſiuſculis glabris, caule erecto gracili, floribus ſeſſilibus oligandris. *Nov. Holl.*

faſciculata R. Br. 6. H. foliis ſubfaſciculatis lineari-ſubulatis glabris, caule erecto, ramulis pubeſcentibus, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

linearis R. Br. 7. H. foliis linearibus acutis integerrimis glabris, caule erecto, ramis gracilibus, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

obtuſifolia Cand. 8. H. foliis linearibus obtuſis mucronulatis glabris, caule erecto, floribus ſeſſilibus. *Terra Diemen.*

diffuſa R. Br. 9. H. foliis obovatis apice dentatis glabris, caule humili diffuſo, floribus ſeſſilibus. *Nov. Holl.*

monogyna R. Br. 10. H. foliis ſpathulatis apice 2-3dentatis glabris, caule erecto, floribus ſeſſilibus 1gynis. *Nov. Holl.*

groſſulariaefolia Saliſb. 11. H. foliis ſuborbiculatis crenato-dentatis, floribus pedunculatis oppoſitifoliis ſub-10gynis, caule procumbente. *Nov. Holl. ad Afric.* (H. crenata Andr.)

** *Capſulis piloſis vel lepidotis: floribus 2gynis.*

pedunculata R. Br. 12. H. foliis linearibus obtuſiuſculis margine ſubrevolutis, germinibus incanis. *Nov. Holl.*

ſerpyllifolia R. Br. 18. H. foliis ellipticis coriaceis ſupra laevibus ſubtus pubeſcentibus, germinibus villoſis. *Nov. Holl.*

aſpera Cand. 14. H. foliis oblongis obtuſis margine ſubrevolutis ſupra ſcabriuſculis ſubtus villoſis, germinibus hirſutis. *Nov. Holl.*

hermanniaefolia Cand. 15. H. foliis obovatis ſupra villoſis ſubtus ſtellato-tomentoſis, germinibus tomentoſis. *Nov. Holl.*

oblongata R. Br. 16. H. foliis oblongis ſupra glabris ſubtus villoſis ſtellato-tomentoſis, germinibus lepidotis. *Nov. Holl. bor.*

ciſtifolia R. Br. 17. H. foliis oblongis ſupra ſtellato-pubeſcentibus ſubtus albido-villoſis, germinibus lepidotis. *Nov. Holl. bor.*

tomentoſa R. Br. 18. H. foliis oblongo-linearibus utrinque villoſo-tomentoſis, germinibus lepidotis. *Nov. Holl. bor.*

lepidota R. Br. 19. H. foliis linearibus acuminatis utrinque germinibusque lepidotis, pedunculis terminalibus confertis. *Nov. Holl. bor.*

1984. PAEONIA.

* *Fruticoſa.*

Mutan Sm. 1. P. foliolis diſtinctis ſubtus glaucis, laciniis ovali-oblongis, germinibus tomentoſis urceolo membra-

naceo inclufis. *Tataria orient. China. Japon.* (P. officinalis Lour. Thunb., papaveracea et fuffruticofa Andr.)

** *Herbaceae.*

† *Foliis fubtus glabris.*

albiflora Pall. 2. P. caule fub-3floro, foliolis ovato-lanceolatis confluentibus fubtus nitidis, fructibus glabris. *Tataria. China.*

anomala 3. P. caule 1floro, foliolis multipartitis, laciniis lanceolatis germinibusque glabris, flore nutante. *Sibir.* (P. laciniata Pall.)

tenuifolia 4. P. foliolis multipartitis glabris lineari-fubulatis, pedunculis breviffimis, germinibus tomentofis erectis. *Tauria.* (P. hybrida Pall.)

officinalis 5. P. foliolis inaequaliter laciniatis glabris, laciniis ovato-lanceolatis, germinibus rectiusculis tomentofis. *Europ. med.* (P. lobata Desf.)

corallina Retz. 6. P. foliolis diftinctis ovato-oblongis planiusculis glabris, medio fublobato, germinibus recurvis tomentofis. *Anglia. German. auftr. Inf. ion.*

daurica Andr. 7. P. foliolis diftinctis fubrotundis undulatis obliquis integriusculis glabris, germinibus patentibus tomentofis. *Sibir.* (P. 3ternata Pall.)

†† *Foliis fubtus pubefcentibus.*

Ruffi Bivon. 8. P. foliolis diftinctis integris ellipticis fubtus vix pubefcentibus, fructibus recurvatis pilofis. *Sicil.*

humilis Retz. 9. P. foliolis 3partito-compofitis lanceolatis acutis canaliculatis fubtus fubvillofis, germinibus rectis glabriusculis, ftigmatibus erectis. *Hifpan.*

decora Anderf. 10. P. foliolis 3partito-laciniatis oblongis obtufis canaliculatis fubtus pilofis, germinibus pubefcentibus patentibus, ftigmatibus recurvatis. *Thracia. Tauria.*

arietina Anderf. 11. P. foliolis 3lobatis pinnatifidisque decurrentibus ovali-oblongis planiusculis fubtus pilofis, fructibus tomentofis arcuato-patentibus. *Creta.* Cluf.

peregrina Mill. 12. P. foliolis 3partito-laciniatis integrisque ovato-lanceolatis planiusculis fubtus pilofis, germinibus tomentofis rectis. *Graecia.*

paradoxa Anderf. 13. P. foliolis multipartitis obtufis undulatis fubtus glaucis pilofis, germinibus appreffis tomentofis. *Europ. auftr.*

mollis Anderf. 14. P. foliolis ovali-lanceolatis planis lobatis imbricatis fubtus caefiis pilofis, lateralibus fubfeffilibus, germinibus tomentofis rectis. *Sibir.?*

1985. DELPHINIUM.

* *Annua.*

† *Monocarpa, petalis confluentibus: foliis plerumque multifidis, laciniis linearibus s. lineari-lanceolatis.*

axilliflorum Cand. 1. D. caule simplici glabriusculo, floribus axillaribus subsessilibus, bracteis foliaceis multifidis, germine villoso. *Syria.* Labillard.

Oliverianum Cand. 2. D. caule glabro ramoso, pedunculis axillaribus folia aequantibus, bracteis linearibus simplicissimis, fructibus glabris. *Persia occid.*

Aiacis 3. D. caule glabro superne ramoso, floribus dense racemosis, pedicellis bracteas aequantibus, fructibus pubescentibus. *Europ. austr. Tauria.* (D. ambiguum Mill.)

Consolida 4. D. caule glabro ramoso, ramis divaricatis, floribus laxe racemosis, pedicellis bracteas superantibus, fructibus glabris. *Europ. Amer. bor.* (D. segetum Lam.)

pubescens Cand. 5. D. caule superne ramoso, foliis fructibusque villosis, floribus laxe racemosis, pedicellis bracteas superantibus. *Gallia provinc.* (D. ambiguum Lois. Consolida Gouan.)

rigidum Cand. 6. D. caule ramosissimo, ramis patentibus rigidis paucifloris foliisque incano-villosis, pedicellis bracteas superantibus. *Syria.*

pusillum Labill. 7. D. caule erecto gracillimo paucifloro foliisque 5fido-pedatis villosiusculis, pedicellis bracteas superantibus. *Syria.* (D. pygmaeum Poir.)

tenuissimum Sm. 8. D. caule erecto gracili superne ramoso pubescente, pedicellis bracteas subulatas multo superantibus, fructibus glabris. *Attica.*

Aconiti 9. D. caule erecto ramosissimo, ramis divaricatis sub-1floris foliisque abbreviatis pubescentibus, pedunculis elongatis, calcare erecto lituiformi. *Ad Hellespontum. Syria.* (Aconitum 1gynum Forsk. D. incanum Clark. ?)

exsertum Cand. 10. D. caule erecto ramoso glabro, foliis ternato-multifidis, calcare recto obtusiusculo abbreviato, staminibus exsertis. *Syria.*

flavum Cand. 11. D. caule erecto ramoso superne pubescente, floribus rare racemosis flavis breviter pedicellatis, calcare recto patente, capsula pubescente. *Ins. mar. aegei.*

†† *Tricarpa; petalis liberis; foliis plerumque ternato-multifidis linearibus.*

ambiguum 12. D. caule erecto villosiusculo, racemis laxis, calcare recto abbreviato, germinibus villosis. *Afric. bor.*

cardiopetalum Cand. 13. D. caule erecto ramoso glabro, racemis confertis, petalis cordato-orbiculatis unguiculatis, calcare ascendente germinibusque glabris. *Pyrenaei m.* (D. peregrinum Lam.)

junceum Cand. 14. D. caule erecto ramofiffimo glabro, racemis laxis, calcare recto acuto elongato, petalis ovatis unguiculatis. *Europ. auftr. Afric. bor. Syria.* (D. peregrinum L., gracile Cand.)

nanum Cand. 15. D. caule pumilo incano-pubefcente, foliis fubcoriaceis 3-5lobis, fuperioribus linearibus indivifis, ramis paucifloris, petalis fubrotundis longe ftipitatis. *Aegypt.* (D. peregrinum Delil.)

Forskolei Reichb. 16. D. caule fuberecto pumilo, foliis appreffis inferioribus 3dentatis fuperioribus linearibus integerrimis, petalis inferioribus appendiculatis. *Ad Hellefpontum.*

† *halteratum* Sm. 17. D. caule erecto glabro, foliis floralibus 3fidis indivifisque, racemis laxis, petalis inferioribus orbiculatis ftipitatis. *Sicil.*

virgatum Poir. 18. D. caule ramofo, foliis oblongis coriaceis inferioribus 3fidis, lobis 3dentatis, fuperioribus integris, racemis virgatis, petalis inferioribus ovatis ftipitatis. *Syria.* Labillard.

macropetalum Cand. 19. D. caule ramofiffimo, foliis inferioribus 3partito-3fidis fummis integris lanceolatis, racemis laxis, petalis fuperioribus 2lobis inferioribus ovatis ftipitatis. *Afric. bor.* Brouffonet.

† *obcordatum* Cand. 20. D. foliis caulinis 3partitis, floralibus linearibus acutis, racemo laxo, petalis inferioribus obcordatis ftipitatis. *Afric. bor.*

† *tribracteolatum* Cand. 21. D. foliis inferioribus palmato-lobatis, racemo laxo, pedicellis 3bracteatis, petalis inferioribus cordato-orbiculatis ftipitatis. *Afric. bor.*

** *Biennia, tricarpa, feminibus paucis grandibus.*

Requienii Cand. 22. D. caule fimplici fuperne calycibusque villofis, foliis 5fidis, calcare calycem aequante. *Inf. Stoechad.*

pictum W. 23. D. caule fimpliciusculo fuperne foliisque palmatis 7-5lobis pubefcentibus, calcare calycem pedunculisque bracteas floresque fubaequantibus. *Europ. auftr.*

Staphis agria 24. D. caule petiolisque pilofis, foliis palmatis 7-5lobis, pedunculis bracteas floresque fuperantibus, calcare breviffimo. *Graecia.*

*** *Perennia: tricarpa: petalis liberis.*

† *Petalis inferioribus integris.*

grandiflorum 25. D. foliis palmatis multipartitis, laciniis linearibus diftantibus, racemo laxo, pedicellis elongatis, petalis inferioribus ovatis convexis integerrimis. *Sibir.* (D. virgatum Jacq. fil. et chinenfe Fifch. varr. foliis brevioribus, laciniis propioribus, petalis fuperioribus obtufis, calcare quafi fiffo.)

cheilanthon Fifch. 26. D. foliis palmato-5partitis fubtus incano-villofiusculis, laciniis lanceolatis dentatis, petalis

inferioribus rotundis obtusissimis crenulatis, capsulis pubescentibus. *Sibir.*

virescens Nutt. 27. D. caule simplici pubescente, foliis 5-3partitis subpedatis, laciniis oblongis 3fidis, racemo paucifloro, calcare horizontali florem excedente, petalis inferioribus planis barbatis. *Ad fl. Missuri.*

†† *Petalis inferioribus bifidis barbatis.*

puniceum L. 28. D. caule flaccido flexuoso superne incano, foliis digitato-3partitis incisis, laciniis linearibus, racemo elongato, pedicellis abbreviatis, calcare resupinato. *Caucas. Ad Volgam. Sibir.* (D. triste Fisch.)

albiflorum Cand. 29. D. petiolis basi dilatato-vaginantibus, foliis multipartitis, laciniis linearibus, racemo elongato conferto, bracteis lato-lanceolatis pedicellos superantibus, calcare obtuso sepalis breviori. *Armenia.*

ochroleucum Stev. 30. D. petiolis basi dilatato-vaginantibus, foliis multipartitis, laciniis angustissimis subfiliformi-subulatis, racemo conferto subspicato, bracteis lineari-lanceolatis, calcare acuto calycem superante. *Iberia.* (D. puniceum var. MB.)

hybridum W. 31. D. petiolis basi dilatatis vaginantibus, foliis digitato-partitis incisis, racemis confertis fructibusque villosis, bracteis subulatis, calcare recto calycem superante. *Tauria. Caucas. Hungar.* (D. hirsutum Pers., fissum Kit.)

pentagynum Lam. 32. D. foliis multipartitis, laciniis linearibus, racemo pubescente, calcare acuto calycem aequante, fructibus villosis quinis. *Lusitan. Afr. bor.*

Menziesii Cand. 33. D. foliis 5partitis subvillosis, laciniis linearibus integris 3fidisque, racemo paucifloro, calcare recto, radice grumosa. *Caledonia occid. Amer. bor.*

† *elegans* Cand. 34. D. foliis 5partitis glabris, laciniis lineari-lanceolatis incisis, racemo paucifloro, calcare incurvo sepalis breviori. *Amer. bor.*

amoenum Stev. 35. D. foliis 5partitis subtus pubescentibus, laciniis lanceolatis pinnatifidis, racemo paniculato, calcare recto, germinibus glabris. *Sibir.*

tricorne Mx. 36. D. caule simplici, foliis paucis longe petiolatis 5partitis pubescentibus, laciniis linearibus obtusis incisis, racemo paucifloro, calcare ascendente recto, fructibus ternis recurvis hirsutis stylo coronatis, radice tuberosa. *Amer. bor.*

azureum Mx. 37. D. foliis 3partitis longe petiolatis glabriusculis, laciniis linearibus acutis, racemo elongato stricto, petalis omnibus barbatis, inferioribus villosissimis. *Amer. bor.*

exaltatum Ait. 38. D. foliis sub-3partitis, laciniis lanceolatis 3fidis acuminatis basi attenuatis, racemo stricto, calcare recto calycem aequante, *Amer. bor.* (D. tridactylum Mx.)

urceolatum Jacq. 39. D. foliis ſubpeltatis cucullatis ſubtus pubeſcentibus, inferioribus 5-ſuperioribus 3fidis, laciniis lanceolatis dentatis divaricatis, racemo ſtricto, calcare calycem ſuperante. *Amer. bor.?*

intermedium Ait. 40. D. foliis profunde cordatis 7-5-3fidis ſubtus pubeſcentibus, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis, racemis elongatis ſtrictis fructibusque glabris. *Europ. med.* (D. alpinum Kit., revolutum Desf., elatum L.)

palmatifidum Cand. 41. D. foliis baſi ſubtruncatis ciliatis ſubtus ad nervos piloſiuſculis 5fidis, laciniis lanceolatis 3fidis integrisque, racemo ſubramoſo, fructibus glabris. *Sibir.*

cuneatum Stev. 42. D. foliis baſi cuneatis 5-7fidis, laciniis inciſis acutis, racemo laxo ramoſo glabro, calcare incurvo, fructibus pubeſcentibus. *Ad Volgam. Podol. auſtr.* (D. hybridum L. herb., villoſum Stev.)

dictyocarpon Cand. 43. D. foliis ſubcordatis 3-7fidis, laciniis oblongis acutis pinnatifido-inciſis, racemo ramoſo glabro, capſulis venoſo-reticulatis ciliatis. *Sibir.* (D. laxiflorum Cand.)

montanum Cand. 44. D. foliis ſubtruncatis 5fidis pubeſcentibus, laciniis baſi attenuatis 3fidis inciſis, racemo elongato capſulisque villoſis. *Alp. Europ. auſtr.* (D. elatum All., hirſutum Roth.)

ſpecioſum MB. 45. D. foliis peltatis 5lobis racemisque hirſutis, laciniis inciſo-ſerratis, bracteis lanceolatis villoſo-viſcoſis, capſulis reticulatis glabriuſculis. *Caucaſ.*

daſycarpon Stev. 46. D. foliis 5partitis racemisque pubeſcentibus, laciniis lanceolatis inciſo-dentatis, calcare incurvo calycem ſubaequante, fructibus villoſiſſimis. *Caucaſ. Perſia bor.*

ciliatum Stev. 47. D. foliis 5partitis racemisque pubeſcentibus, laciniis lanceolatis inciſis, calcare incurvo calycem aequante, bracteis ſubulatis ſetoſo-ciliatis, fructibus glabris. *Caucaſ.* (D. flexuoſum MB.)

1986. ACONITUM.

1. *Floribus perſiſtentibus flavidis.*

Anthora 1. A. calcare refracto, labello obcordato ſ. 2fido, galea fornicato-hemiſphaerica antice ſinuata roſtrata, foliorum laciniis anguſtis. *Europ. med. Sibir.* (A. nemoroſum MB., Candollei, Jacquini, eulophum, anthoroideum Reichenb.)

Pallaſii Reichenb. 2. A. calcare continuo, labello obcordato, galea hemiſphaerica clauſa roſtrata, caule paucifloro, foliorum laciniis anguſtiſſimis. *Caucaſ. Sibir.*

2. *Floribus deciduis ſubflavidis: galea ſubunguiculata, nectariis gracilibus.*

* *Foliis palmatis.*

Lycoctonum 3. A. calcare hamato, labello producto obtuſo, galeae fundo cylindrico, roſtro longe porrecto. *Norvegia. Lapponia. Ruſſia.* (A. ſeptentrionale Köll.)

Lamarckii Reichenb. 4. A. calcare hamato, galeae fundo elongato clavato. *Pyren. Alp. nor. et dinar.* (A. pyrenaicum Lam.)

Myoctonum Reichenb. 5. A. calcare hamato, galeae fundo cylindrico, roſtro abbreviato inflexo. *German. med. Italia.*

orientale Mill. 6. A. calcare arcuato gracili, labello integerrimo, galea cylindrica recta elongata, roſtro producto incumbente. *Perſia. Caucaſ.* (A. ochroleucum W.)

pallidum Reichenb. 7. A. calcare arcuato, galea conica elongata, ſepalis mediis imberbibus. *Ruſſia med. Bohemia.*

laſioſtomum Reichenb. 8. A. calcare arcuato, galea conica attenuata, ſepalis mediis denſe barbatis. *Ruſſia med. Podolia.*

Vulparia Reichenb. 9. A. calcare ſpirali, galeae fundo ampliato clavato, roſtro porrecto acuto, ſepalis infimis abbreviatis. *Europ. med. Sibir.* (A. Lycoctonum Jacq.: A. ſeptentrionale Wahlenb. Beſſ. eſt var. fl. purpureis.)

Phthora Reichenb. 10. A. calcare ſpirali, galeae fundo ſubclavato, roſtro abbreviato tenui. *Hungar.*

Thelyphonum Reichenb. 11. A. calcare ſpirali, galeae fundo conico elongato. *Europ. med.* (A. altiſſimum Mill., galectonum et Luparia Reichenb. . . A. auſtrale Reichenb. var. fl. violaceis.)

** *Foliis pedatis.*

pyrenaicum 12. A. calcare arcuato, galeae fundo clavato ampliato. *Pyren. Sibir.* (A. ſquarroſum L.)

disſectum Tauſch. 13. A. calcare arcuato, galeae fundo conico in apicem brevem declivi. *Sibir.*

barbatum Patr. 14. A. calcare recto obtuſo, galeae fundo conico oſtium ſubaequante, ſepalis mediis denſe barbatis, foliis opacis. *Sibir. or.*

Gmelini Reichenb. 15. A. calcare recto obtuſo, galeae fundo cylindrico rotundato, foliis nitidis ſquarroſis. *Sibir. or.* (A. Lycoctonum J. G. Gmel., nitidum Fiſch.)

leptanthum Reichenb. 16. A. calcare recto obtuſo, galeae fundo conico elongato attenuato, fructibus ventricoſis. *Davuria.*

3. *Floribus deciduis coeruleſcentibus.*

* *Nectariis inflatis, fructibus junioribus erectis.*

tortuoſum W. 17. A. calcare adunco, cucullo inflato gibboſo, labello obtuſo, galea hemiſphaerica ſubhiante, caule flexuoſo, foliorum laciniis divaricatis. *Sibir.*

volubile Pall. 18. A. calcare adunco, cucullo inflato, labello obcordato, galea hemifphaerica, roftro afcendente, caule volubili. *Imaus.*

villofum Reichenb. 19. A. calcare adunco, cucullo inflato, labello obcordato, galea conica incumbente fubhiante, roftro porrecto, floribus fubpaniculatis foliisque villofiusculis. *Sibir.* (A. ciliare Cand., flaccidum Reichenb.)

Lubarscii Reichenb. 20. A. cucullo gibberofo abbreviato, labello orbiculari, galea hemifphaerica claufa, pedunculis patulis, foliorum laciniis latis. *Camtfchatca.*

maximum Pall. 21. A. cucullo apice gibberofo, labello pendulo, galea hemifphaerico-conica pubefcente, racemo paucifloro, foliorum laciniis latis. *Camtfchatca.*

camtfchaticum Reichenb. 22. A. cucullo apice gibberofo, labello revoluto, galea claufa foliisque pilofiusculis. *Sibir. orient. Camtfchatca.* (A. ochotenfe Reichenb.)

** *Nectariis magnis elongatis.*

† *Fructibus junioribus erectis.*

Cammarum Jacq. 23. A. nectariis rectis, galea fornicato-conica recta, roftro porrecto. *Europ. med. Sibir.* (A. macranthum et Kusnezovii Reichenb.)

nafutum Fifch. 24. A. nectariis erectis, calcare arcuato, galea conica prona, roftro demiffo, racemis fubpaniculatis, foliorum laciniis latiusculis. *Europ. med. Caucaf. Sibir.* (A. Cammarum MB., Bernhardianum Wallr., Fifcheri Reichenb.)

roftratum Cand. 25. A. nectariis erectis, calcare depreffo globofo, labello elongato, galea hemifphaerica antice infracta roftrata hiante, foliorum laciniis anguftis. *Helvetia. Sibir.* (A. album Ait. et rhynchanthum Reichenb. varr.)

variegatum 26. A. nectariis fupinis, calcare arcuato, labello obcordato, galea fornicata prona hiante, roftro revoluto, racemo compofito glaberrimo. *Alp. Europ. med.* (A. glabrum Cand., bulbiferum et illinitum Reichenb.)

paniculatum Lam. 27. A. nectariis fupinis, calcare capitato, labello obcordato, galea conica roftrata antice finuata fubincumbente, panicula ramofiffima. *Helvetia. Gallia prov.* (A. hebegynum Cand.)

productum Reichenb. 28. A. nectariis erectis, calcare capitato, galeae convexae roftro producto, caule paucifloro. *Sibir. Camtfchatca.* (A. grandiflorum fibiricum Cand.)

†*ferox* Wall. 29. A. calcare capitato, cucullo elongato, labello anguftiffimo divaricato, galea hemifphaerica hiante, germinibus 5 villofis, floribus laxe paniculatis. *Nepal.*

uncinatum 30. A. calcare fupino capitato, labello obtufo fubemarginato, galea conica compreffa, roftro acuto recto, racemi ramis rigidis, foliis coriaceis 3lobis. *Amer. bor. Japon.* (A. japonicum Thunb.)

cernuum Wulff. 31. A. calcare capitato, labello emarginato revoluto, galea hemifphaerica hiante, roftro afcendente, floribus laxe paniculatis. *Alp. Europ. med.* (A. Napellus Garid., flexicaule Hopp.)

Toxicum Reichenb. 32. A. nectariis fupinis, calcare adunco, labello 2fido revoluto, galea ampliato-fornicata, roftro obtufo, racemis laxis. *Transfylvan.* (A. neomontanum Baumg.)

†† *Fructibus divergentibus.*

Napellus 33. A. nectariis figmoideis, calcare fupino capitato, labello emarginato, galea hemifphaerica claufa vel hiante, racemo ftricto, foliorum laciniis linearibus nitidis. *Europ. Sibir.* (Varietates numerofae: tauricum et neomontanum Wulff, ftrictum et anguftifolium Bernh., acutum, ambiguum, amoenum, callibotryon, Clufianum, commutatum, euftachyon, formofum, hians, Hoppeanum, laetum, laxum, patulum Reichenb., laxiflorum Schleich.)

††† *Fructibus conniventibus.*

Störkeanum Reichenb. 34. A. nectariis fupinis, calcare capitato, labello revoluto, galea fornicata incumbente, roftro acuto, floribus paniculatis. *German. auftr.* (A. Napellus Störk. Sturm., neomontanum W., medium Schrad., intermedium Cand.)

decorum Reichenb. 35. A. nectariis fupinis, calcare adunco, labello producto, galea conica, roftro porrecto. *Pyren. Sudet.?* (A. hamatum Reichenb.)

*** *Nectariis gracilibus, labello fubintegro.*

biflorum Fifch. 36. A. calcare truncato, galea depreffa, roftro producto, floribus geminis oppofitis feffilibus, caule humili, foliorum laciniis linearibus. *Sibir.*

femigaleatum Pall. 37. A. calcare fubadunco, galea convexa erecto-fupina patula, caule erecto, pedunculis elongatis. *Camtfchatca. Ora Amer. bor. occ. fub circ. arctico.*

delphinifolium Cand. 38. A. calcare adunco, galea hemifphaerica horizontali fubpatula, caule gracili paucifloro. *Orae Afiae et Amer. bor. fub circ. arctico.* (A. paradoxum Reichenb.)

Chamiffoi Reichenb. 39. A. calcare fubadunco, galea hemifphaerica claufa, floribus cauleque humili pubefcentibus. *Inf. Aleut.*

1987. LODOICEA Commerf.

Sechellarum Labill. *Inf. Sechell. S. Mahé.* Palma excelfa, foliis flabelliformibus, ftipitibus inermibus, fructibus xx librarum. (Cocos maldivica J. F. Gmel. W.)

1988. LATANIA Commerf.

rubra Jacq. 1. L. frondibus flabelliformibus, foliolis fpinofo-ferrulatis, ftipite inermi. *Inf. Mascaren.*

borbonica Lam. 2. L. frondibus flabelliformibus medio elongatis, foliolis margine laevibus, ftipite fpinofo. *Inf. Mafcaren.* (L. chinenfis Jacq.)

1989. PTYCHOSPERMA Labill.

gracile Labill. *Nov. Hibern.* Caudex gracilis altiffimus, ftipitibus bafi dilatatis, frondibus alternatim pinnatis.

1990. SEAFORTHIA R. Br.

elegans R. Br. *Nov. Holl.* Caudex mediocris annulatus, frondibus conduplicatis apice erofis.

1991. IRIARTEA R. et P.

deltoidea R. et P. 1. I. caudice fubaequali, frondibus impari-pinnatis deltoideis erofis, fpathis fubdenis deciduis, calycibus ♂ glabris, baccis fubglobofis. *Peru.*

ventricofa Mart. 2. I. caudice medio ventricofo, frondibus fubplicatis antice repando-finuatis, fpathis fubdenis deciduis, calycibus ♂ villofis, baccis fubglobofis. *Brafil.*

exorrhiza Mart. 3. I. caudice fubaequali, frondibus fubtrapezoideis antice finuato-dentatis, fpathis fubquinis deciduis, calycibus ♂ glabris, baccis ovato-ellipticis. *Brafil.*

fetigera Mart. 4. I. caudice aequali, frondibus fubrhombeis antice finuato-dentatis erofis fubtus pubefcentibus, ftipitibus fetofis, fpathis fubquinis perfiftentibus, baccis ellipticis. *Brafil.*

andicola * 5. I. caudice aequali proceriffimo, frondibus fubtus argenteo-pubefcentibus, fructibus globofis. *Alp. Amer. auftr.* (Ceroxylon Humb.)

1992. CARYOTA.

urens 1. C. caudice frondibusque inermibus. *Ind. orient. Inf. Molucc.*

horrida Jacq. 2. C. caudice frondibusque fpinofis. *Amer. auftr.*

1993. JUBAEA Humb.

fpectabilis Humb. *Chili.* Caudex craffiffimus 6orgyalis, frondibus pinnatis linearibus, fructibus obovatis.

1994. DIPLOTHEMIUM Mart.

maritimum Mart. 1. D. acaule, frondibus laxis crifpis, pinnis linearibus fubtus glaucis, drupis obovato-pentagonis. *Brafil.*

campestre Mart. 2. D. acaule, frondibus spissis rectiusculis, pinnis rigidis linearibus subtus glaucescentibus, floribus ♂ 6andris, drupis ovato-globosis. *Brasil.*

litorale Mart. 3. D. acaule, frondibus spissis rectiusculis, pinnis rigidis subtus glaucescentibus, floribus ♂ sub-10andris, fructibus obovatis subangulatis. *Brasil.* (Cocos arenarius B. A. Gomez.)

caudescens Mart. 4. D. caudice mediocri annulato, frondibus subcrispis, pinnis linearibus longe acuminatis subtus argenteis, floribus polyandris, antheris subulatis. *Brasil.*

1995. ATTALIA Humb.

amygdalina Humb. 1. A. caudice humili, frondibus plicatis, fructibus ovatis. *Nov. Granat.*

humilis Mart. 2. A. caudice humili, frondibus erecto-patentibus, fructibus ellipticis umbonatis. *Brasil.*

compta Mart. 3. A. caudice mediocri crasso superne capitato, frondibus patentibus, petiolorum basi crassa subnuda, fructibus obovatis rostratis. *Brasil.*

phalerata Mart. 4. A. caudice mediocri crasso subcapitato, frondibus erecto-patentibus, fructibus oblongis rostratis. *Brasil.*

funifera Mart. 5. A. caudice elato, frondibus phalerato-erectis, petiolorum basibus fibroso-fissis, fructibus ellipticis acutis. *Brasil.*

excelsa Mart. 6. A. caudice altissimo, frondibus patentibus, fructibus oblongo-sub-5gonis acutis. *Brasil.*

speciosa Mart. 7. A. caudice altissimo, frondibus patentibus, fructibus ovato-oblongis conico-rostratis. *Brasil.*

1996. GOMUTUS Rumph.

saccharifer * *Ins. Molucc. Cochinchina.* Caudex mediocris crassus, frondibus pinnatis longissimis, stipitibus inermibus, spadicibus pendulis. (Areng saccharifera Labill.)

1997. MANICARIA Gärtn.

saccifera Gärtn. *Guiana.* Caudex crassus, frondibus integris irregulariter findendis, spatha maxima fusiformi mire dilatanda. (Pilophora Jacq.)

1998. BEGONIA.

* *Caulescentes.*

† *Foliis inaequaliter cordatis.*

arborescens Radd. 1. B. ramosissima, foliis oblongis acuminatis dentato-serratis utrinque glaberrimis. *Brasil.*

2.

nitida Ait. 2. B. fruticoſa, foliis obſolete dentatis glaberrimis nitidis acutis, ſtipulis carinatis, capſulae ala maxima ſubrotunda. *Jamaica.* (B. obliqua Herit., minor Jacq.)

dichotoma Jacq. 3. B. fruticoſa, foliis ſubreniformibus duplicato-denticulatis ſupra glabris ſubtus ad venas hirſutiusculis, paniculae dichotomae ramis divaricatis, capſulae alis acutis inaequalibus. *Amer. auſtr.*

reniformis Dryand. 4. B. ſuffruticoſa, foliis ſubreniformibus angulatis crenato-dentatis, panicula dichotoma, capſulae alis acutis, duabus minutiſſimis. *Braſil.*

angularis Radd. 5. B. fruticoſa, ramis angulatis, foliis ſubreniformibus crenulatis glabris ſubtus ad venas hirſutiusculis, ſtipulis ovatis integerrimis, capſulae alis undulatis, una maxima obtusangula. *Braſil.* (B. ſtipulacea W.)

ſpathulata W. 6. B. herbacea, foliis obtuſis obſolete denticulatis glabriusculis, ſtipulis ſpathulatis inaequalibus ciliatis, capſulae alis obtuſis. *Patria?*

† *cucullata* W. 7. B. foliis oblongis cucullatis denticulatis glabris, ſtipulis oblongis dentatis, capſulae ala maxima acutangula. *Braſil.*

odorata W. 8. B. herbacea, foliis acuminatis ſubangulatis inaequaliter obſolete denticulatis utrinque glabris, ſtipulis ſcarioſis, panicula multiflora, capſula acute alata. *Patria?*

† *crenata* Dryand. 9. B. herbacea, foliis ſubrotundis obtuſis crenato-dentatis. *Ind. or.*

tenuifolia Dryand. 10. B. foliis ovatis acutis angulatis obſolete dentatis. *Inſ. principis prope Javam.*

ſanguinea Radd. 11. B. foliis acuminatis integerrimis glabris ſubtus ſanguineis, ſtipulis membranaceis, capſulae alis ſubaequalibus rotundatis. *Braſil.*

ferruginea 12. B. foliis oblongis ſubdentatis, capſulis apteris. *Nov. Granat.*

diſticha Link. 13. B. foliis acutis crenulatis glabris ſubtus ſtrigoſo-hirtis, cyma diſticha, capſulae ala maxima acuta, reliquis obtuſis. *Patria?*

grandis Dryand. 14. B. foliis acutis duplicato-ſerratis aſperis, floribus dioecis, capſulae alis ſubaequalibus. *Japon.* (B. obliqua Thunb.)

macrophylla Dryand. 15. B. foliis angulatis denticulatis, capſulae alis obtusangulis inaequalibus. *Jamaica.* (B. grandifolia Jacq.)

hirtella Link. 16. B. foliis angulatis inaequaliter ſerrulato-ciliatis ſubtus ad venas hirſutiusculis, ſtipulis ſcarioſis lanceolatis fimbriatis, capſulae alis rectangulis inaequalibus. *Patria?*

diſcolor R. Br. 17. B. foliis angulatis ſerrulatis ſubtus ſanguineis, caule nodoſo, capſulae alis obtusangulis inaequalibus. *China. Martinica.* Sieber. (B. Evanſiana Andr. Haw.)

pauciflora Lindl. 18. B. foliis ſubaequaliter cordatis obtuſiſſimis crenatis pubeſcentibus, ſuperioribus cucullatis, ſti-

pulis lanceolatis ſcarioſis, capſulae alis obtusangulis inaequalibus. *Patria?* (B. patula Haw.?)

erminea Herit. 19. B. foliis ſubaequaliter cordatis acuminatis ſerratis ſupra papillis acuminatis raris, caule ſimplici, radice tuberoſa, capſulae ala maxima falcata, reliquis obliteratis. *Madagascar.*

tuberoſa Dryand. 20. B. repens, foliis inaequaliter cordatis angulatis dentatis, capſulae alis parallelis. *Inſ. Molucc.*

rotundifolia Dryand. 21. B. repens, foliis reniformi-ſubrotundis crenatis. *Ind. occ.*

†† *Foliis ſemicordatis.*

iſoptera Dryand. 22. B. fruticoſa, foliis obſolete dentatis glabris, capſulae alis ſubaequalibus parallelis. *Java.*

acutifolia Jacq. 23. B. foliis oblongis acuminatis angulatis ſerratis glabris, petiolis incraſſatis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis acutangulis. *Jamaica. Hispaniola.* (B. purpurea Sw.)

acuminata Dryand. 24. B. foliis acuminatis hiſpidis inaequaliter inciſo-dentatis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis acutangulis. *Jamaica.*

maculata Radd. 25. B. fruticoſa, foliis elongatis acuminatis repandis ſupra albo-maculatis ſubtus rubris, capſulae alis rotundatis ſubaequalibus. *Braſil.* (B. argyroſtigma Fiſch. Link.)

pulchella Radd. 26. B. ſubherbacea, foliis acuminatis inaequaliter dentato-ſerratis glabris, ſtipulis venoſo-reticulatis, capſulae alis rotundatis ſubaequalibus. *Braſil.*

humilis Dryand. 27. B. carnoſa ſubpellucida, foliis duplicato-ſerratis ſupra hiſpidis ſubtus ad venas ſtrigoſis, ſtipulis ciliatis, capſulae alis rotundatis. *Ind. occ.* (B. ſuaveolens Haw.)

hirſuta Aubl. 28. B. caulescens, foliis angulato-inciſis ſerrulatis hiſpidis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis parallelis minimis. *Guiana.* (B. humilis Bonpl.)

ulmifolia Humb. 29. B. ſuffruticoſa, foliis ſemicordatis oblongis aequaliter ſerratis rugoſis piloſis, ſtipulis lanceolatis acutis, capſulae ala maxima acutangula, reliquis obtusangulis. *Amer. auſtr.*

††† *Foliis ovatis vel oblongis.*

Urticae 30. B. radicans herbacea, foliis oblique ovatis duplicato-ſerratis utrinque hiſpidis, capſulis baſi 3cornibus. *Nov. Granat.?*

bidentata Radd. 31. B. caulescens erecta, foliis ſubobliquis oblongo-lanceolatis acuminatis denticulatis glabris, capſulae alis aequalibus, angulis bidentatis. *Braſil.*

digitata Radd. 32. B. foliis digitatis ſubundenis, foliolis lanceolatis inaequaliter ſerratis ſcabris, capſulae alis rotundatis aequalibus. *Braſil.*

ſcandens Sw. 33. B. radice tuberoſa, caule ſcandente radicante, foliis ſubrotundo-ovatis obſolete dentatis gla-

berrimis nitidis, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis parallelis minimis. *Jamaica. Guiana.* (B. glabra Aubl.)

integerrima * 34. B. fruticoſa, foliis ovatis integerrimis glabris, capſulae ala maxima obtusangula, reliquis parallelis minimis. *Braſil.* Sello.

** *Acaules.*

octopetala Herit. 35. B. radice tuberoſa, foliis ſubaequaliter cordatis 5lobis inaequaliter dentatis glabris, pedunculis dichotomis, floribus ♂ 8petalis. *Peru.*

diptera Dryand. 36. B. foliis inaequaliter cordatis denticulatis, pedunculis dichotomis, capſulae alis duabus inaequalibus. *Braſil.* (B. obliqua L.)

tenera Dryand. 37. B. foliis inaequaliter cordatis, floribus umbellatis. *Ceylon.*

nana Herit. 38. B. foliis lanceolatis acuminatis ſerrulato-ciliatis, ſcapo ſub-2floro, capſula ſub-1alata. *Madagascar.*

1999. MALLOTUS Lour.

cochinchinenſis Lour. *China. Cochinchina.* Arbor foliis ſubrotundis 3fidis tomentoſis, racemis ſpicatis reflexis.

TETRAGYNIA.

2000. CARYOCAR.

* *Foliis ternatis.*

nuciferum 1. C. foliolis oblongis integerrimis glabris, fructibus maximis. *Guiana.*

glabrum Perſ. 2. C. foliolis oblongis denticulatis glabris, fructibus mediocribus. *Guiana.* (Saouari Aubl. Rhizobolus Corr.)

villoſum Perſ. 3. C. foliolis ſubrotundo-ellipticis ſubtus tomentoſis. *Guiana.* (Saouari Aubl.)

amygdaliferum Cav. 4. C. foliolis oblongis ſerratis, axillis venarum ſubtus barbatis, fructibus mediocribus. *Nov. Granat.*

** *Foliis quinatis.*

butyroſum W. 5. C. foliis glabris, fructu laevi. *Guiana.* (Pekea Aubl. Rhizobolus Schreb.)

tomentoſum W. 6. C. foliis ſubtus tomentoſis, fructu tuberculato. *Guiana.* (Pekea tuberculoſa Aubl.)

2001. PERA Mut.

arborea Mut. *Nov. Granat.* Arbor foliis alternis oblongis integerrimis, pedunculis 1floris axillaribus aggregatis. (Perula Schreb W.)

2002. MARIALVEA Vand.

guianenſis Choiſ. 1. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis 3fidis, pedicellis 3floris. *Guiana.* (Tovomita Aubl.)

fructipendula Choiſ. 2. M. foliis lanceolatis obtuſiuſculis, pedunculis elongatis 3floris. *Peru. Cayenn.* (Beauharnoiſia R. et P.)

uniflora Choiſ. 3. M. foliis lanceolatis obtuſiuſculis, pedunculis axillaribus 1floris. *Guiana.*

2003. CIMICIFUGA.

palmata Mx. 1. C. foliis ſimplicibus palmato-multifidis, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis floribus ſubcorymboſis polygynis, capſulis breviſſimis ſubgloboſo-capitatis. *Virgin. Carolina.*

cordifolia Pursh. 2. C. foliis decompoſito-2ternatis, foliolis cordatis lobatis ſerrato-dentatis, racemis paniculatis virgatis, floribus 2-5gynis, fructibus ſeſſilibus. *Carolina.*

americana Mx. 3. C. foliis ternato-decompoſitis, foliolis ovatis ſub-3lobis dentatis, racemis elongatis ſtrictis, floribus 5gynis, fructibus ſtipitatis. *Carolina.* (Actaea podocarpa Cand.)

foetida 4. C. foliis decompoſitis, foliolis ovatis inciſis dentatis, racemis paniculatis nutantibus pubeſcentibus. *Hungar. Tranſſylvan. Galicia. Sibiria. Camtſchatca. Ora occid. Amer. bor.*

Serpentaria Pursh. 5. C. foliis decompoſitis, foliolis ovato-oblongis inciſis mucronato-dentatis, racemis paniculatis elongatis, floribus 1gynis. *Amer. bor.* (Actaea racemoſa L., 1gyna Walt.)

japonica * 6. C. foliis ternatis, foliolis cordatis palmatis inciſo-ſerratis, ſpicis longiſſimis. *Japon.* (Actaea Thunb.)

2004. DRIMYS Forſt.

Winteri Forſt. 1. Dr. foliis oblongis obtuſis ſubtus glauceſcentibus coriaceis, pedunculis ſimplicibus aggregatis, floribus 4gynis. *Ad fretum Magellan.* (Wintera aromatica Murr.)

mexicana Seſſ. 2. Dr. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, pedunculis elongatis umbelliferis, floribus 4gynis. *Mexico.*

granatenſis 3. Dr. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus glaucis, pedunculis elongatis 3floris, floribus 8gynis. *Nov. Granat. Braſil.* (Wintera granatenſis Murr.)

chilenſis Cand. 4. Dr. foliis oblongis baſi attenuatis ſubtus glaucis, pedunculis umbellatis, floribus ſub-6gynis. *Chili.*

axillaris Forſt. 5. Dr. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis aggregatis 1floris, calycibus integris, floribus 4gynis. *Nov. Zeeland.* (Wintera G. Forſt.)

2005. TETRACERA.

* *Genuinae: ſub-4gynae, floribus racemoſo-paniculatis.*

volubilis 1. T. foliis obovatis obtuſis ſubſerratis utrinque ſcaberrimis, floribus paniculatis, pedunculis villoſis. *Inſ. Antill. Amer. auſtr.*

erecta Seſſ. 2. T. foliis obovatis apice dentatis, panicula terminali multiflora. *Mexico.*

oblongata Cand. 3. T. foliis oblongis baſi attenuatis ſubſerratis utrinque ſcabris, floribus racemoſis, pedunculis glabris. *Braſil.*

Lima W. 4. T. foliis obovato-oblongis integerrimis utrinque aſperis, floribus paniculatis, pedunculis pubeſcentibus. *Braſil.*

acuminata Cand. 5. T. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis utrinque ſcabris, pedunculis racemoſis pubeſcentibus. *Amer. auſtr.?*

hiſpida * 6. T. foliis lanceolatis utrinque attenuatis ſerrulatis ſupra glabris ſubtus discoloribus ad venas ſtrigoſis, pedunculis axillaribus racemoſis ramulisque hirſutis. *Braſil.* Sello.

jamaicenſis Cand. 7. T. foliis ovali-oblongis acutiusculis in petiolum longe attenuatis utrinque glabris ſubſerrulatis, pedunculis racemoſis glabris. *Jamaica.*

ovalifolia Cand. 8. T. foliis ovalibus obtuſis integerrimis coriaceis ſcabris, racemis lateralibus compoſitis, pedunculis calycibusque ſubvilloſis. *Cayenn.* (T. rotundifolia Sm.)

alnifolia W. 9. T. foliis ovali-oblongis obtuſis apice ſubdenticulatis ſubtus ſcabriusculis, panicula terminali, pedunculis ſubpubeſcentibus. *Guinea. Afric. occ.* (T. potatoria Afz.)

ſenegalenſis Cand. 10. T. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis laevibus, panicula multiflora. *Senegambia.*

laevis Vahl. 11. T. foliis oblongis acuminatis ſubintegerrimis laevibus, pedunculis racemoſis terminalibus. *Ind. or.*

Euryandra Vahl. 12. T. foliis obovato-oblongis obtuſis integerrimis glabris, paniculae multiflorae ramis pubeſcentibus, floris 3gynis. *Nov. Caledon.* (Euryandra ſcandens Forſt.)

Rheedii Cand. 13. T. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis laevibus, panicula ſubdichotoma. *Malabar.*

Aſſa Cand. 14. T. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis ſubdenticulatis ſupra laevibus ſubtus pedunculisque pubeſcentibus, corymbo paucifloro terminali. *Ind. or. Java.* (T. malabarica Lam. Wahlbomia indica Thunb.)

** *Floribus monogynis.*

multiflora Cand. 15. T. foliis obovatis repando-dentatis laevibus, paniculis axillaribus terminalibusque. *Braſil.*

Tigarea Cand. 16. T. foliis ſubrotundis ſubrepandis ſcabris, panicula ramoſa multiflora. *Guiana. Cayenn.* (Tigarea aſpera Aubl. Rhinium Schreb.)

lutea * 17. T. foliis elliptico-oblongis nitidis integerrimis, pedunculis lateralibus racemoſis. *Braſil.* Sello.

Perriniana * 18. T. foliis ellipticis obſolete ſerrulatis utrinque nitidis, corymbis axillaribus. *Amer. auſtr.?* Perrin.

cuſpidata Meyer. 19. T. foliis ovali-oblongis cuſpidatis apice argute ſerratis ſubtus tomentoſis, pedunculis 1floris axillaribus aggregatis. *Surinam.*

2006. AGDESTIS Seſſ.

clematidea Seſſ. *Nov. Hiſpan.* Frutex volubilis, foliis cordatis acuminatis, floribus paniculatis rubris.

PENTAGYNIA.

2007. AQUILEGIA.

vulgaris 1. A. calcaribus incurvis limbum petalorum ſubaequantibus, petiolis fructibusque villoſis, foliolis obtuſe lobatis crenatis. *Europ.* (A. viſcoſa Gouan. var.)

glanduloſa Fiſch. 2. A. calcaribus incurvis limbo petalorum duplo brevioribus, foliorum laciniis confertis anguſtis dentatis, caule ſuperne fructibusque glanduloſo-villoſis. *Alp. Sibir.*

ſibirica Lam. 3. A. calcaribus incurvis limbum petalorum obtuſiſſimum excedentibus, fructibus glaberrimis, caule ſub-1floro glabro. *Sibir.*

alpina 4. A. calcaribus rectis apice ſubincurvis limbo petalorum dimidio brevioribus, fructibus pubeſcentibus, caule glabro, foliorum laciniis 3crenatis anguſte oblongis. *Alp. Europ. med. et Sibir.* (A. grandiflora Pall.)

pyrenaica Cand. 5. A. calcaribus rectiſſimis gracilibus limbum ſubaequantibus, caule ſub-1floro 1phyllo, foliorum laciniis linearibus. *Pyren. et Apennin. montes.* (A. alpina Lam.)

canadenſis 6. A. calcaribus rectis limbum obtuſum ſuperantibus, genitalibus exſertis, ſepalis petala ſubſuperantibus, fructibus villoſis. *Amer. bor.*

formoſa Fiſch. 7. A. calcaribus rectis limbum breviſſimum ſtaminaque multo ſuperantibus, ſepalis lanceolatis ſtylos aequantibus petala multo excedentibus. *Camtſchatca.*

viridiflora Pall. 8. A. calcaribus rectis limbum truncatum ſuperantibus, ſtylis longe exſertis, ſepalis ovali-oblongis corolla brevioribus. *Sibir.* (A. flava Lam., atropurpurea W., davurica Patr., hybrida Sims. varr.)

parviflora Ledeb. 9. A. calcaribus rectis brevibus limbum obtuſum aequantibus, ſepalis acutis corolla longioribus, ſtylis ſtaminibusque aequalibus arcuatim deflexis. *Sibir.*

anemonoides W. 10. A. calcaribus obtuſiſſimis breviſſimis, petalis 2lobis, ſepalis ovatis corollam ſub-5ies ſuperantibus, pedunculis radicalibus 1floris, foliorum ſegmentibus linearibus. *Imaus mons.*

2008. NIGELLA.

** Stamina multiplici ſerie diſpoſita: ſemina angulata.*

damaſcena 1. N. antheris muticis, involucro florum folioſo. *Europ. auſtr.* (N. coerulea Lam., pygmaea Perſ., coarctata Hortul. var.)

ſativa 2. N. antheris muticis, floribus nudis, caule piloſiusculo, capſulis muricatis ad apicem usque nexis. *Europ. auſtr.*

ſegetalis MB. 3. N. antheris ſubmuticis, caule glaberrimo angulato, capſulis laeviusculis ultra medium nexis. *Tauria.* (N. foeniculacea Cand.)

arvenſis 4. N. antheris apiculatis, floribus nudis, caule glabro, capſulis laeviusculis ultra medium nexis. *Europ.* (N. divaricata Cand.)

ariſtata Sm. 5. N. antheris apiculatis, floribus involucratis, caule glabro. *Attica.*

hiſpanica 6. N. antheris ſubapiculatis, floribus nudis ſub-10gynis, caule glabro. *Hiſpan. Afric. bor.*

*** Stamina ſimplici ſerie: ſemina plana.*

orientalis 7. N. ſtylis ſubdenis rectis corolla longioribus, capſulis glabris, ſeminibus margine membranaceis. *Syria. Caucaſ.*

corniculata Cand. 8. N. ſtylis ſubquinis arcuatis exſertis, capſulis glabris. *Patria?*

ciliaris Cand. 9. N. ſtylis ſubdenis, capſulis hiſpidulis ſtellatim patentibus. *Syria.* Labillard.

2009. LAPLACEA Kunth.

ſpecioſa *Peru.* Arbor foliis oblongis coriaceis integerrimis, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis albis.

2010. WORMIA Rottb.

madagascarenſis Cand. 1. W. foliis ſubcordato-rotundis obtuſis repando-ſinuatis, petiolis ſubalatis, floribus corymboſis. *Madagascar.* (Lenidia Poir.)

*coromandelina** 2. W. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis, petiolis ſubalatis, pedunculis aggregatis 1floris lateralibus. *Coromandel.* (Dillenia pentagyna Roxb. Colbertia Salisb. Cand.)

triquetra Rottb. 3. W. foliis oblongis retufis apice dentatis, petiolis angulatis, pedunculis 3quetris fubcorymbofis. *Ceylon.* (Dillenia dentata Thunb.)

alata R. Br. 4. W. foliis ovalibus integerrimis, petiolis alatis, pedunculis 3quetris fubracemofis. *Nov. Holl.*

2011. PORCELIA R. et P.

nitidifolia R. et P. *Peru.* Arbor excelfa pulcherrima, foliis oblongis acuminatis nitidis, pedunculis paucifloris pendulis.

2012. REAUMURIA.

vermiculata 1. R. foliis femiteretibus obtufiusculis fubfafciculatis. *Sicilia. Aegypt. Syria.*

hypericoides W. 2. R. foliis lanceolatis planis. *Syria.* (Hypericum alternifolium Labill.)

2013. GYNOCARDIA Roxb.

odorata Roxb. *Silhet, prov. Ind. or.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis alternis, pedunculis aggregatis.

2014. ROUMEA Poit.

coriacea Poit. 1. R. fpinis trunci ramofis, foliis oblongis obtufiusculis ferratis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Hifpaniola.*

Jangomas * 2. R. fpinis trunci ♂ ramofis, foliis ovatis acuminatis ferratis, pedunculis fparfis multifloris. *Cochinchina.* (Stigmarota Lour.)

P O L Y G Y N I A.

2015. SAGITTARIA.

* *Foliis fagittatis aut haftatis.*

fagittifolia 1. S. foliis fagittato-lanceolatis acuminatis, laciniis bafeos rectis acuminatis, fcapo fimplici. *Europ. Afiae et Amer. bor. aquae.* (S. latifolia W.)

pubefcens Mühl. 2. S. foliis late ovatis fagittato-haftatis obtufiusculis multinerviis venofis fcapoque fimplici hirfutiusculis, laciniis bafeos foliorum latis fubdivaricatis acutis. *Amer. bor.*

obtufa W. 3. S. foliis late ovatis obtufis multinerviis glabris, laciniis bafeos parallelis acuminatis, fcapo fimplici, floribus dioecis, bracteis ovatis acutis. *Amer. bor.*

obtusifolia 4. S. foliis ovato-subrotundis obtusis, laciniis baseos elongatis acuminatis patentibus, scapo paniculato divaricato. *Ind. or.*

guayanensis Humb. 5. S. foliis subrotundo-ovatis obtusis multinerviis, laciniis baseos acutis distantibus, scapo simplici, floribus monoecis, fructibus cartilagineo-denticulatis. *Nov. Granat.*

hastata Pursh. 6. S. foliis oblongo-lanceolatis acutis multinerviis, laciniis baseos longissime acuminatis divaricatis, scapo simplici, floribus dioecis, bracteis obtusis. *Pensylvan.* (S. gracilis Pursh.)

heterophylla Pursh. 7. S. foliis linearibus lanceolatisque utrinque acutis, s. oblongo-sagittatis, laciniis baseos linearibus divaricatis, scapo simplici paucifloro, floribus monoecis, ♀ subsessilibus, bracteis ovatis acuminatis. *Pensylvan.*

** *Foliis subcordatis, oblongis vel linearibus.*

natans Mx. 8. S. foliis infimis subcordatis, natantibus elliptico-lanceolatis basi attenuatis obtusis 3nerviis, scapo simplici paucifloro, pedunculis inferioribus elongatis. *Carolin. austr.*

lancifolia 9. S. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nervoso-venosis, scapo paniculato, fructibus falcatis rostratis. *Ind. occ. Carolina.* (S. falcata Pursh.)

† *alpina* W. 10. S. foliis lanceolatis acuminatis basi subcordatis, scapo simplici. *Dauria.* (S. natans Pall.)

rigida Pursh. 11. S. foliis lanceolatis carinatis, petiolis 3quetris, scapis simplicibus, floribus ♀ sessilibus. *Amer. boreal.*

simplex Pursh. 12. S. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis, scapo simplici multifloro, floribus dioecis, bracteis obtusis. *Nov. Caesar.*

graminea Mx. 13. S. foliis linearibus longissimis 3nerviis, scapo simplici paucifloro, floribus monoecis, bracteis obtusis. *Amer. bor.*

pusilla Nutt. 14. S. foliis linearibus abbreviatis obtusis, scapo simplici paucifloro foliis breviori, floribus ♂ oligandris. *Pensylvan.* (Alisma subulata Pursh.)

acutifolia 15. S. foliis subulatis dorso convexis basi vaginantibus, scapo simplici paucifloro, floribus monoecis, bracteis acuminatis. *Surinam. Pensylvan.*

*** *Foliis divisis.*

chinensis Sims. 16. S. foliis 3fidis 3partitisque, lobis subaequalibus nervosis, scapo ramoso polygono, flore masculo solitario terminali. *China.* (S. sagittifolia Lour.? S. 3folia L. e Petiver.)

2016. Brasenia Schreb.

peltata Pursh. *Amer. bor.* Planta aquatica Hydrocharidi f. Nymphaeis fimilis, foliis ovalibus centro peltatis, pedunculis floribusque purpureis diu erectis noctu fubmerfis. (Hydropeltis purpurea Mx.)

2017. Limnocharis Bonpl.

Plumerii Rich. 1. L. foliis ovali-fubrotundis fubemarginatis, petiolis pedunculisque 3angularibus, floribus umbellatis, fepalis ovatis petala fubaequantibus. *Ind. occ. Nov. Granat.* (Alifma flava L.)

Humboldtii Rich. 2. L. foliis cordato-ovalibus obtufis, petiolis pedunculisque fubaggregatis 1floris teretibus fubarticulatis, fepalis corolla anguftioribus. *Amer. auftr.* (Stratiotes nymphoides W.)

Commerfonii * 3. L. foliis cordato-fubrotundis obtufis, petiolis pedunculisque folitariis 1floris teretibus articulatis, fepalis corolla anguftioribus, filamentis fterilibus nullis. *Brafil.* (Hydrocleis Rich.)

2018. Nelumbium W.

fpeciofum W. 1. N. floribus rofeis, antheris apice clavato-appendiculatis. *Afia media et auftr. Aegypt. Graecia* olim. Theophraft. Phylarch. apud Athen. (Nymphaea Nelumbo L. *α.* Cyamus Salisb.)

luteum W. 2. N. floribus luteis, antheris apice linearibus. *Amer. cor.* (N. codophyllum Rafin.)

2019. Eucryphia Cav.

cordifolia Cav. *Chili.* Arbor procera pulcra, foliis cordato-oblongis crenatis tomentofis, floxibus axillaribus pedunculatis albis. (Pellinia Molin.)

2020. Carpodon Labill.

lucidus Labill. *Nov. Holl. bor.* Arbor foliis oppofitis, floribus axillaribus folitariis pedunculatis.

2021. Guatteria R. et P.

* *Foliis fubtus glabris.*

brevipes Cand. 1. Gu. foliis oblongis acutis lucidis ramisque glabris, pedunculis axillaribus 1floris, fructibus breviter ftipitatis. *Guiana.*

Ouregou Dun. 2. Gu. foliis oblongis acuminatis fubtus glabris ferrugineis reticulatis, pedunculis axillaribus fubaggregatis, fructibus longe ftipitatis. *Guiana.* (Uvaria 1fperma Lam. W.)

podocarpa Cand. 3. Gu. foliis ovali-oblongis abrupte acuminatis subtus glabris concoloribus, pedunculis axillaribus solitariis, fructibus longe stipitatis. *Cayenn.*

suberosa Dun. 4. Gu. foliis oblongis acutis glabris, pedunculis oppositifoliis 1floris, petalis exterioribus minoribus, fructibus globosis longe stipitatis, cortice trunci suberoso. *Coromandel.* (Uvaria Roxb.)

pendula R. et P. 5. Gu. foliis lanceolatis, pedunculis axillaribus longissimis pendulis, caule fruticoso. *Peru.*

† *ovalis* R. et P. 6. Gu. foliis oblongis ovalibusque, pedunculis axillaribus. *Peru.*

† *glauca* R. et P. 7. Gu. foliis ovato-oblongis acuminatis (glaucis), pedunculis axillaribus. *Peru.*

virgata Dun. 8. Gu. foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis utrinque opacis subsessilibus, ramis virgatis, fructibus parvis ovatis brevissime stipitatis. *Jamaica. Cuba.* (Uvaria lanceolata et virgata Sw.)

laurifolia Dun. 4. Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis supra nitidis, fructibus ellipticis mucronatis. *Jamaica. Hispaniola. Amer. austr.* (Uvaria Sw. Gu. maypurensis Kunth.)

sempervirens Dun. 10. Gu. foliis ovato-oblongis acuminatis glabris nitidis, pedunculis lanatis, petalis oblongis cuspidatis, fructibus globosis. *Malabar.*

Corinti Dun. 11. Gu. foliis ovato-oblongis glabris nitidis, petalis obtusiusculis, fructibus globosis. *Malabar.*

montana Cand. 12. Gu. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis subgeminis subbifloris, petalis inflexis. *Malabar.* (Gu. malabarica Dun.)

acutifolia Dun. 13. Gu. foliis ovato-oblongis acutis crassis nitidis, calycibus obtusis, petalis acutissimis, fructibus globosis. *Malabar.*

umbilicata Dun. 14. Gu. foliis ovato-oblongis acuminatis, pedunculis bracteolatis, fructibus globosis depresso-umbilicatis stipitatis. *Amer. austr.?*

Berteriana * 15. Gu. foliis oblongis obtusis utrinque glaberrimis serratis integerrimisque, fructibus numerosis subtomentosis obliquis mucronatis stipites aequantibus. *Portorico.* Bertero.

prinoides * 16. Gu. foliis oblongo-lanceolatis obliquis utrinque attenuatis obsolete serratis supra nitidis, ramis virgatis, fructibus obliquis mucronatis brevissime stipitatis. *Hispaniola.* Bertero.

** *Foliis subtus pubescentibus.*

Aberemoa Dun. 17. Gu. foliis ovato-oblongis acutis utrinque tomentosis, fructibus numerosis oblongis utrinque attenuatis mucronatis subsessilibus. *Guiana.* (Aberemoa guianensis Aubl.)

cerasoides Dun. 18. Gu. foliis oblongo-lanceolatis acutis subtus villosis, pedunculis axillaribus solitariis, petalis subaequalibus, fructibus globosis. *Coromandel.* (Uvaria Roxb.)

rufa Dun. 19. Gu. foliis subcordato-oblongis acutis subtus rufo-tomentosis, pedunculis lateralibus brevissimis paucifloris. *Ind. or. Ins. Molucc.* (Gu. cordata Dun.)

eriopoda Cand. 20. Gu. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis ſubtus ramisque ferrugineo-villoſis, pedunculis 1floris floribusque piloſis. *Peru. Braſil. Guinea.* (Gu. hirſuta R. et P. Unona ovata Vahl. Cand.)

2022. XYLOPIA.

glabra 1. X. foliis oblongis utrinque attenuatis laevibus, pedunculis axillaribus breviſſimis ſub-1floris. *Jamaica.*

liguſtrifolia Dun. 2. X. foliis lanceolatis obtuſiusculis glabris, ramis punctato-aſperis, pedunculis brevibus pauci-floris bracteolatis, petalis linearibus. *Quito.* Humb.

nitida Dun. 3. X. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nitidis, floribus racemoſis, pedicellis bracteolatis. *Cayenn.*

martinicenſis * 4. X. foliis obovato-oblongis in petiolum attenuatis utrinque glabris ſubtus discoloribus, ramulis angulatis, pedunculis racemoſis. *Martinica.* Sieber.

acuminata Dun. 5. X. foliis oblongis baſi attenuatis abrupte longe acuminatis, ramis teretibus rugoſis, fructibus clavatis 2ſpermis. *Cayenn.*

prinoides Dun. 6. X. foliis ovato-lanceolatis obtuſiuscule acuminatis nitidis, ramis virgatis, floribus ſolitariis, fructibus 2valvibus. *Cayenn.*

ſalicifolia Humb. 7. X. foliis ovato-lanceolatis anguſtis obtuſiusculis ſubtus ſericeis, fructibus 2ſpermis ruguloſis. *Ad fl. Magdalenae.*

fruteſcens Aubl. 8. X. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis membranaceis ſubtus ſericeis, pedunculis piloſis breviſſimis, fructibus glabris. *Martinic. Guiana. Braſil.* (X. ſetoſa Poir.)

braſilienſis * 9. X. foliis lanceolatis acuminatis coriaceis ſubtus piloſis, ramulis pedunculisque erectis elongatis 1floris hirſutis, petalis craſſiusculis velutinis. *Braſil.*

muricata 10. X. foliis lanceolatis acuminatis ſubtus ſtrigoſis apice barbatis, pedunculis multifloris, fructibus muricatis. *Jamaica.* (X. fruteſcens Gärtn.)

orientalis * 11. X. foliis ovato-oblongis ſubtus rugoſis, floribus praecocibus racemoſis abortientibus, ſerioribus ſubternis. *Borneo. Celebes.* (Dammara ſelanica Rumph.)

2023. ARTABOTRYS R. Br.

odoratiſſimus R. Br. *China. Ind. or. Madagascar. Inſ. Mascaren.* Frutex foliis alternis oblongo-lanceolatis nitidis, pedunculis lateralibus uncino-cirrhiferis, floribus fructibusque pyriformibus flaveſcentibus. (Annona hexapetala L. ſuppl. Anona uncinata Lam. Uvaria uncata Lour., eſculenta Rottl., Unona eſculenta, hamata et uncinata Dun. Cand.)

2024. UNONA.

** Floribus patentibus: fructibus oblongis.*

† Petalis ſubaequalibus.

Narum Dun. 1. U. caule ſarmentoſo, foliis lanceolatis acuminatis, pedunculis ſolitariis 1floris, petalis ovatis inflexis, fructibus laeviusculis longe ſtipitatis. *Malabar.* (Uvaria ceylanica Lam.)

Muſaria Dun. 2. U. caule ſarmentoſo, foliis ſubcordato-lanceolatis acuminatis, pedunculis 1floris ſolitariis axillaribus, petalis ovatis reflexis, fructibus oblongo-teretibus ſubtoruloſis ſtipitatis. *Inſ. Molucc.*

penduliflora Seſſ. 3. U. caule arboreſcente, foliis ſubcordato-oblongis undulatis, pedunculis reflexis pendulis, petalis inflexis, fructibus leguminiformibus incurvis. *Mexico.*

Marenteria Cand. 4. U. ramulis ſcandentibus, foliis ovalibus obtuſis glaberrimis, pedunculis erectis 1floris ſubterminalibus, fructibus ventricoſis. *Madagascar.* (Marenteria Thuar.)

pachypetala * 5. U. foliis oblongis acuminatis, pedunculis ſolitariis 1floris, petalis coriaceis. *Cayenn. Braſil.* (U. craſſipetala Dun.)

fuſcata Cand. 6. U. foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus erectis 1floris, petalis oblongis acutiusculis. *Guiana.*

obtuſiflora Cand. 7. U. foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis obovatis obtuſiſſimis. *Guiana.*

acuminata Cand. 8. U. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, petalis oblongis acutis. *Guiana.*

macrocarpa Cand. 9. U. foliis ovalibus glaberrimis coriaceis, pedunculis paucifloris, petalis oblongis acutiusculis. *Guinea.*

grandiflora Lechen. 10. U. foliis cordato-oblongis ſubſeſſilibus ſupra laevibus ſubtus villoſis, pedunculis oppoſitifoliis 1floris, petalis oblongis. *Ind. or.*

violacea Dun. 11. U. foliis ovato-ellipticis acutiusculis, pedunculis oppoſitifoliis 1floris cernuis, petalis oblongis. *Mexico.*

Leſſertiana Dun. 12. U. foliis ovato-oblongis acutis ſupra laevibus nitidis ſubtus rufo-ſubfloccoſis, pedunculis 1floris bracteatis, petalis oblongis ſubcriſpis. *Patria?*

odorata Dun. 13. U. foliis oblongo-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis lineari-lanceolatis elongatis, fructibus teretibus apice umbilicatis ſtipitatis. *Inſ. Molucc. China.* (Uvaria Lam. W.)

longifolia Dun. 14. U. foliis oblongo-linearibus undulatis acutis, floribus corymboſo-umbellatis, petalis lineari-lanceolatis, fructibus ovatis ſtipitatis. *Ind. or. Java.* (Uvaria Lam. Vahl.)

nitidiſſima Dun. 15. U. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glaberrimis lucidis, pedunculis 1floris abbreviatis, petalis linearibus obtuſis. *Nov. Caledon.*

ligularis Dun. 16. U. foliis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis multifloris, petalis linearibus elongatis, fructibus ſubgloboſis ſtipitatis. *Amboina.* (Uvaria Lam.)

†† *Petalis inaequalibus.*

tripetala Cand. 17. U. foliis lanceolatis ſupra rugoſis ſubtus tomentoſis, fructibus ſub-3quetris 3ſpermis granulatis. *Amboina.* (Uvaria Lam.)

** *Floribus conniventibus: fructibus ſubmoniliformibus.*

longiflora Roxb. 18. U. foliis oblongo-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus pendulis, petalis linearibus longiſſimis, fructibus moniliformibus. *Silhet, prov. Ind. or.*

discreta 19. U. foliis oblongo-lanceolatis anguſtis ſubtus ſericeis, fructibus moniliformibus longe ſtipitatis. *Surinam.* (Uvaria monilifera Gärtn.)

discolor Vahl. 20. U. foliis ovato-oblongis glabris ſubtus glaucis, pedunculis elongatis 1floris, fructibus moniliformibus breviter ſtipitatis. *China auſtr. Ind. or.* (Deſmos chinenſis Lour.?)

cochinchinenſis Cand. 21. U. foliis lanceolatis tomentoſis, floribus ſolitariis longe pedunculatis, fructibus toruloſo-moniliformibus ſubſeſſilibus. *Cochinchina.* (Deſmos Lour.)

aromatica Dun. 22. U. foliis oblongis acuminatis glabris, floribus axillaribus ſolitariis, fructibus ſubſeſſilibus teretibus toruloſis. *Guiana.* (Uvaria aromatica Lam., ceylanica Aubl. Unona concolor W.)

aethiopica Dun. 23. U. foliis ovato-lanceolatis acutis ſubtus glaucis, fructibus teretibus toruloſis ſubſeſſilibus. *Afric. occ.* (Xylopia undulata P. B. Unona oxypetala Cand. et undulata Dun.)

leptopetala Cand. 24. U. foliis ovali-oblongis acuminatis ramisque glabris, pedunculis axillaribus ramoſis, petalis oblongo-linearibus elongatis acuminatis. *Timor.* Lechenault.

*** *Floribus conniventibus, baſi genitalia occulentibus: fructibus baccatis.*

latifolia Dun. 25. U. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus lanatis, floribus racemoſis, baccis numeroſis 2-3ſpermis. *Inſ. Molucc.*

ſylvatica Dun. 26. U. foliis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis, floribus ſolitariis breviter pedicellatis carnoſis, baccis aſperis polyſpermis. *Cochinchina.* (Melodorum arboreum Lour.)

dumetorum Dun. 27. U. foliis lanceolatis glabris, floribus ſolitariis, baccis polyſpermis. *Cochinchina.* (Melodorum fruticoſum Lour.)

lucida Cand. 28. U. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glaberrimis ſupra nitidis, ramis aſpero-punctatis, baccis oblongis obtuſis ſubtoruloſis. *Peru.*

acutiflora Dun. 29. U. foliis oblongo-lanceolatis acutis rigidiusculis, pedunculis breviſſimis 1floris, baccis oblongis breviter ſtipitatis. *Patria?*

xylopioides Dun. 30. U. foliis oblongis acuminatis baſi revolutis ſupra nitidis ſubtus ſericeis, pedunculis ſubaggregatis abbreviatis, baccis oblongis numeroſis. *Ad Orinoc.* Humb.

2025. UVARIA.

ceylanica 1. U. caule fruticoſo ſarmentoſo, foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, fructibus toruloſis breviſſime ſtipitatis. *Ceylon.*

lutea Roxb. 2. U. caule arboreo, foliis oblongis acuminatis nitidis, pedunculis ſolitariis ſub-4floris, fructibus oblongis 6ſpermis. *Coromandel.* (U. coriacea Vahl.)

Chamae P. B. 3. U. foliis ovatis acutis nitidis integerrimis, floribus racemoſis, petalis ligulatis. *Guinea.*

tomentoſa Roxb. 4. U. foliis oblongis acutis tomentoſis, pedunculis 1floris ſubſolitariis, petalis interioribus ovatis, fructibus 4ſpermis. *Coromandel.*

dulcis Dun. 5. U. foliis ſubcordato-oblongis obtuſiuſculis ſubtus ramisque villoſis, pedunculis geminis bracteatis floribusque ſtellato-pubeſcentibus. *Java.* (U. javana Dun.)

velutina Cand. 6. U. foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis acuminatis villoſis, pedunculis lateralibus corymboſis, floribus piloſis. *Ind. or.*

† *ſpectabilis* Cand. 7. U. foliis oblongis acuminatis junioribus ramisque ferrugineo-villoſis, pedunculis 1floris lateralibus, petalis obovatis, interioribus apice 2fidis. *Guiana.*

2026. ASIMINA Adanſ.

parviflora Dun. 1. A. foliis obovato-oblongis ſupra glabris ſubtus ramulisque rufo-pubeſcentibus, pedunculis lateralibus breviſſimis, floribus tomentoſis exiguis. *Carolina. Georgia.* (Orchidocarpum Mx. Porcelia Perſ. Purſh.)

triloba Dun. 2. A. foliis obovato-oblongis abrupte acuminatis glabris, pedunculis abbreviatis floribusque denſe villoſis atro-rufis. *Virginia. Carolina.* (Annona L. Orchidocarpum Mx. Porcelia Perſ. Purſh.)

pygmaea Dun. 3. A. foliis ſpathulatis obtuſis glabris, pedunculis 1floris floribusque glabris. *Georgia. Florida.* (Annona Bartr. Orchidocarpum Mx. Porcelia Perſ.)

grandiflora Dun. 4. A. foliis oblongis obtuſis ſubtus rufo-pubeſcentibus, floribus ſubſeſſilibus, petalis exterioribus obovatis calycem longe ſuperantibus. *Georgia. Florida.* (Annona Bartr. Orchidocarpum Mx., Porcelia Perſ.)

campechiana Kunth. 5. A. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus tomentoſis, pedunculis 1floris, petalis ſubaequalibus. *Nov. Hiſpan.*

2027. ANONA.

* *Foliis ſubtus glabris.*

muricata 1. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque glaberrimis nitidis, pedunculis ſolitariis 1floris, petalis exterioribus cordatis acuminatis, fructibus muricatis. *Ind. occid.*

reticulata 2. A. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, pedunculis ſub-3floris, petalis exterioribus conniventibus, interioribus minutiſſimis, fructibus ſubgloboſis areolato-reticulatis. *Ind. occ.*

mucoſa Jacq. 3. A. foliis oblongo-lanceolatis glabris, petalis exterioribus apice patulis, fructibus gibboſo-areolatis. *Martinic.*

glabra 4. A. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis oppoſitifoliis 2floris, fructibus conoideis obtuſis laevibus. *Carolina. Nov. Hiſpan.* (A. excelſa Kunth.)

grandiflora Lam. 5. A. foliis ovato-lanceolatis glabris ſupra nitidis ſubtus glauceſcentibus, pedunculis ſolitariis breviſſimis, petalis oblongis ſubaequalibus, fructibus ovatis glabriuſculis. *Inſ. Maſcaren. Madagascar.*

amplexicaulis Lam. 6. A. foliis cordato-oblongis acutis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris, petalis ſubaequalibus. *Inſ. Maſcaren. Madagascar.*

uniflora Dun. 7. A. foliis oblongis acutis duplicato-venoſis ſubtus glaucis, pedunculis 1floris tomentoſis, petalis exterioribus calycem aequantibus. *Braſil.*

paluſtris 8. A. foliis ovato-oblongis coriaceis glaberrimis, floribus ſolitariis pedunculatis, petalis omnibus acutis, fructibus ſubareolatis. *Jamaica. Amer. auſtr.* (A. atabapenſis Kunth.)

† *micrantha* Berter. 9. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, ramulis punctatis, pedunculis lateralibus ſolitariis 1floris, calyce corollam multo ſuperante. *Hiſpaniola.*

ſquamoſa 10. A. foliis lanceolatis glabris pellucido-punctatis, petalis exterioribus ſubclauſis, fructibus ovatis ſquamoſis. *Ind. occ. et or.*

aſiatica 11. A. foliis lanceolatis glabris venoſo-lineatis nitidis, petalis exterioribus ſubclauſis, fructibus ſquamoſis. *Ceylon.*

longifolia Aubl. 12. A. foliis oblongis elongatis acutis venoſo-reticulatis, pedunculis elongatis, petalis omnibus acutis, fructibus punctatis reticulatis. *Guiana. Peru.* (A. riparia Kunth.)

punctata Aubl. 13. A. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, pedunculis abbreviatis, petalis omnibus acutis, fructibus globoſis punctatis. *Guiana. Nov. Granat.* (A. quinduenſis Kunth.)

obtusiflora Tuss. 14. A. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis undulatis venosis, pedunculis 1floris nutantibus, petalis exterioribus obtusis. *Hispaniola.*

laurifolia Dun. 15. A. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis solitariis 1floris pendulis, petalis exterioribus cordatis acutis, fructibus mammaeformibus laevibus. *Ind. occ.* *Georgia.* (A. glabra β. Lam.)

Humboldtii Dun. 16. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis membranaceis punctatis, pedunculis solitariis 1floris, petalis exterioribus ovatis. *Cumana.* *Quito.* (A. Bonplandiana Kunth.)

uliginosa Kunth. 17. A. foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis punctatis, pedunculis solitariis 1floris, petalis ovatis acutis subaequalibus, fructibus globosis reticulatis. *Quito.* (A. peruviana Dun.)

laevis Kunth. 18. A. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis membranaceis subtus punctatis, pedunculis 1floris aggregatis, petalis lanceolatis acutis, fructibus laevibus. *Amer. austr.*

† *exsucca* Cand. 19. A. foliis ovali-oblongis coriaceis glaberrimis supra lucidis, pedunculis suboppositifoliis, fructibus parvis exsuccis. *Guiana.*

** *Foliis subtus pubescentibus.*

paludosa Aubl. 20. A. foliis oblongis acutis subtus rufescentibus sericeo-tomentosis venosis, pedunculis 1floris, petalis ovatis acutis, fructibus tuberculato-muricatis. *Guiana.*

Ambotay Aubl. 21. A. foliis oblongis acutis subtus ferrugineo-tomentosis, floribus brevissime pedunculatis, petalis acutis. *Guiana.* *Hispaniola.* Bertero.

purpurea Sess. 22. A. foliis oblongo-lanceolatis subsessilibus venosis subtus ferrugineo-pilosis, floribus axillaribus subsessilibus, petalis exterioribus cordatis interioribus subrotundis. *Mexico.*

xestropetala * 23. A. foliis oblongo-lanceolatis subtus petiolisque hirsutis, petalis 3 connatis, lateribus compressis dolabriformibus tomentosis. *Brasil.* (A. dolabripetala Radd.)

Manirote Kunth. 24. A. foliis obovato-ellipticis acutiusculis membranaceis punctatis glabris, fructibus globosis muricatis. *Guiana.*

cinerea Dun. 25. A. foliis oblongis obtusis cinereis pellucido-punctatis subtus pubescentibus, petalis exterioribus conniventibus, fructibus ovato-globosis squamosis. *Ins. Carib.* *Cumana.*

Cherimolia Lam. 26. A. foliis elliptico-oblongis acutis subtus tomentosis, pedunculis 1floris, petalis exterioribus lanceolatis, fructibus subglobosis subsquamosis. *Nov. Granat.* *Quito.* *Peru.* *Chili.* (A. 3petala Ait.)

echinata Dun. 27. A. foliis ovato-oblongis acutiusculis supra glaberrimis subtus tomentosis, ramis rugosis, floribus 3petalis, fructibus ovatis echinatis. *Cayenna.*

sericea Dun. 28. A. foliis ovato-oblongis acuminatis supra glabris subtus ramulisque sericeo-tomentosis ferrugineis, floribus 3petalis extus ferrugineis. *Cayenn.*

axilliflora Cand. 29. A foliis oblongis obtusiusculis subtus subpubescentibus, pedunculis axillaribus 1floris petiolos superantibus. *Hispaniola.* Bertero. *Guiana.*

†*africana* 30. A. foliis lanceolatis pubescentibus. *Amer.?*

2028. CADSURA Juss.

japonica Dun. *Japon.* Frutex humilis, cortice viscoso, foliis elliptico-oblongis rigidis serratis, pedunculis lateralibus 1floris, floribus albis. (Uvaria japonica L. Thunb.

2029. LIRIODENDRON.

Tulipifera 1. L. foliis deciduis 3lobis apice basique truncatis. *Amer. bor.*

*indicum** 2. L. foliis oblongis basi attenuatis coriaceis. *Silhet, prov. Ind. or.* (Magnolia pterocarpa Roxb.)

2030. MAGNOLIA.

* *Americanae, antheris extus dehiscentibus.*

grandiflora 1. M. foliis oblongis acutis coriaceis supra nitidis subtus ramulisque ferrugineis, petalis obovato-oblongis. *Amer. bor.*

† *mexicana* Cand. 2. M. foliis obovato-oblongis, petalis ovatis. *Mexico.*

glauca 3. M. foliis ellipticis obtusis coriaceis subtus glaucis subpubescentibus, petalis oblongis concavis. *Amer. bor.*

Plumerii Sw. 4. M. foliis ovato-subrotundis utrinque glabris coriaceis, petalis spathulatis concavis. *Ins. Carib.* (Talauma Juss.)

Umbrella Lam. 5. M. foliis lanceolatis patentissimis membranaceis, junioribus subtus pubescentibus, petalis exterioribus deflexis. *Amer. bor.* (M. 3petala L. frondosa Salisb.)

acuminata 6. M. foliis oblongis acuminatis subtus pubescentibus, petalis obovato-oblongis. *Amer. bor.*

auriculata Lam. 7. M. foliis cordato-obovato-oblongis membranaceis subtus glaucescentibus, petalis oblongis, extimis patentissimis. *Amer. bor.* (M. pyramidata Bartr.

macrophylla Mx. 8. M. foliis amplissimis cordato-obovato-oblongis membranaceis subtus albido-glaucis, petalis ovato-oblongis obtusis. *Amer. bor.*

cordata Mx. 9. M. foliis elliptico-ovatis acutis subtus subtomentosis, adultis cordatis, petalis oblongis planiusculis. *Carolina.*

***Aſiaticae, antheris intus dehiſcentibus.*

conſpicua Salisb. 10. M. foliis obovatis abrupte acuminatis membranaceis ſubtus pubeſcentibus, petalis oblongis. *China.* (M. Yulau Desf.)

gracilis Salisb. 11. M. foliis obovatis utrinque attenuatis ſerotinis membranaceis, junioribus ſubtus pubeſcentibus, floribus erectis 6petalis, ſtylis reflexis. *Japon.* (Kobus Banks., M. tomentoſa Thunb.)

obovata Thunb. 12. M. foliis obovatis acutis venoſo-reticulatis glabriusculis, floribus erectis 6petalis, petalis obovato-oblongis. *Japon.* (M. denudata et liliiflora Lam., discolor Vent., purpurea Curt. varr.)

fuſcata Andr. 13. M. foliis oblongis acutis coriaceis, junioribns ramulisque fuſco-tomentoſis, floribus erectis. *China.* (M. faſciata Vent., anonaefolia Salisb.)

pumila Andr. 14. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis venoſo-reticulatis glaucis, floribus cernuis, caule fruticoſo. *Amboina.* (Liriodendron Liliifera L.)

† *inodora* Cand. 15. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glabris, pedunculis congeſtis terminalibus, petalis conniventibus. *China auſtr.* (Liriodendron Liliifera Lour.)

† *Coco* Cand. 16. M. foliis ovatis nitidis, floribus ſolitariis, petalis 6 conniventibus, germinibus octonis. *China auſtr. Cochinchina.* (Liriodendron Coco Lour.)

2031. MICHELIA.

Champaca 1. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis baſi attenuatis membranaceis glabris, pedunculis lateralibus craſſis abbreviatis 1floris, petalis ſpathulatis acutiusculis. *Ind. or. Inſ. Maſcaren.*

Kiſopa Buchan. 2. M. foliis ovato-lanceolatis coriaceis, pedunculis lateralibus craſſis abbreviatis, petalis lanceolatis acuminatis. *Nepal.*

Doltſopa Buchan. 3. M. foliis ovali-oblongis longiſſime acuminatis coriaceis ſubtus glaucis, pedunculis craſſis tomentoſis, petalis obovatis. *Nepal.*

*Figo** 4. M. foliis lanceolatis incurvo-reflexis nitidis, petalis ovato-oblongis. *China auſtr.* (Liriodendron Lour.)

parviflora Rumph. 5. M. foliis oblongis acutis glabris, ramulis tomentoſis, petalis ovali-ſubrotundis. *Java.*

ſericea Perſ. 6. M. foliis ovato-lanceolatis acutis, junioribus ſubtus ſericeo-lanatis, pedunculis erectis abbreviatis, petalis oblongis. *Amboina.* (M. Tſiampaca L.)

velutina Cand. 7. M. foliis elliptico-oblongis acutis ſubtus albido-villoſo-tomentoſis, floribus ſubſeſſilibus. *Nepal.*

2032. ILLICIUM.

floridanum 1. I. petalis interioribus lanceolatis. *Florida.*

aniſatum 2. I. petalis interioribus lineari-ſubulatis. *Japon. China.*

parviflorum Mx. 3. I. petalis ovato-ſubrotundis concavis. *Florida.*

2033. DILLENIA.

ſpecioſa Thunb. 1. D. foliis elliptico-oblongis mucronato-ſerratis venoſis, pedunculis ſolitariis terminalibus, petalis obovatis. *Malabar. Java. Ceylon.* (D. indica L.)

aurea Sm. 2. D. foliis elliptico-oblongis ſerratis, pedunculis ſolitariis 1floris. *Ind. or.*

elliptica Thunb. 3. D. foliis elliptico-ovatis acutis ſerratis, pedunculis 1floris. *Inſ. Celebes.*

ſerrata Thunb. 4. D. foliis elliptico-ovatis acutis mucronato-ſerratis, pedunculis 3floris. *Java. Celebes.*

retuſa Thunb. 5. D. foliis obovatis apice truncatis remote dentatis, pedunculis 1floris. *Ceylon.*

† *integra* Thunb. 6. D. foliis obovato-oblongis obtuſis ſubſerratis coriaceis, pedunculis 1floris. *Ceylon.*

2034. ATRAGENE.

alpina 1. A. foliis 2ternatis ſerratis acuminatis, petalis ſpathulatis. *Alp. Europ. med.*

ſibirica 2. A. foliis 2ternatis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerratis, petalis emarginatis. *Sibir.*

ochotenſis Pall. 3. A. foliis 2ternatis oblongo-lanceolatis ſerratis, petalis paucis linearibus. *Sibir. or.*

americana Sims. 4. A. foliis quaternis ternatis, foliolis cordatis ſubintegerrimis, petalis acutis. *Amer. bor.* (Clematis verticillaris Cand.)

occidentalis Horn. 5. A. foliis oppoſitis ternatis, foliolis ſubcordatis dentatis nitidis, intermedio 3partito, petalis ſpathulatis. *Patria?*

ceylanica L. 6. A. foliis oppoſitis ovatis 5-7nerviis ſubtus villoſo-tomentoſis, petalis linearibus. *Ceylon. Coromand.* (Clematis Poir. Naravelia Cand.)

2035. KNOWLTONIA Saliſb.

rigida Saliſb. 1. Kn. foliis 2ternatis coriaceis glabriuſculis, foliolis ſubcordatis, lateralibus oblique truncatis, umbella ſupradecompoſita patentiſſima. *C. B. S.* (Adonis capenſis L., coriacea Poir., Anamenia coriacea Vent.)

veſicatoria Sims. 2. Kn. foliis 2ternatis coriaceis glabriuſculis, foliolis ſubcordatis, lateralibus oblique truncatis, umbella ſimpliciuſcula pauciflora. *C. B. S.* (Adonis veſicatoria L., laſerpitiifolia Poir., capenſis Lam. Anamenia laſerpitiifolia Vent.)

gracilis Cand. 3. Kn. foliis 2ternatis ſubcoriaceis, foliolis ovatis profunde ſerratis piloſis, ſcapis apice ramoſis, ramis erectis paucifloris. *C. B. S.* (Adonis capenſis Thunb., gracilis Poir., Anamenia gracilis Vent.)

hirsuta Cand. 4. Kn. foliis 2ternatis, foliolis lanceolatis profunde serratis hirsutis, scapis basi ramosis, ramis decumbentibus paucifloris. *C. B. S.* (Anamenia hirsuta Vent., Adonis Poir.)

daucifolia Cand. 5. Kn. foliis 3ternatis, foliolis inciso-pinnatifidis, laciniis dentatis divaricatis, scapo villoso corymbifero. *C. B. S.* (Adonis aethiopica Thunb., filia L. suppl., daucifolia Lam., Anamenia daucifolia Vent.)

2036. ADONIS.

** Annuae.*

aestivalis 1. A. caule simpliciusculo, petalis suboctonis oblongis calycem glabriusculum duplo superantibus, fructibus elongato-spicatis. *Europ. med. Asiae et Afric. bor. segetes.* (A. miniata et flammea Jacq., citrina Hofm., maculata et anomala Wallr., flava Vill., microcarpa Cand., dentata Delil. varr.)

autumnalis 2. A. caule ramoso, petalis suboctonis obovatis obtusis calycem glabriusculum subsuperantibus, fructibus ovato-capitatis. *Europ. med. et Asia.* (A. aestivalis M. B., micrantha Cand., parviflora Fisch.)

*** Perennes.*

vernalis 3. A. petalis subduodenis oblongis apice eroso-denticulatis calycem pubescentem multo superantibus, fructibus villosis uncinato-mucronatis. *Europ. Sibir. Asia media.* (A. apennina L., volgensis Stev.)

pyrenaica Cand. 4. A. petalis subdenis spathulato-oblongis integerrimis calycem subpubescentem longe superantibus, fructibus glabris uncinatis. *Pyren. Hungar.?*

**** Dubia.*

ircutiana Fisch. 5. A. petalis obovatis, calyce glaberrimo, foliis multifidis, laciniis dentatis. *Sibir. austr.*

2037. RANUNCULUS.

1. *Batrachia* Cand. *Fructus transverse rugoso-striati; flores albi.*

hederaceus 1. R. caule reptante radicante, foliis reniformibus obtuse sub-5lobis glabris, lobis integerrimis, petiolis basi stipulatis, pedunculis folio brevioribus, petalis calycem subsuperantibus. *Europ. Sibir. Ins. Aleut.*

saniculaefolius Viv. 2. R. caule natante radicante, foliis reniformibus obtuse 5lobis crenatis, petiolis basi nudis, pedunculis folia subaequantibus, petalis calycem triplo superantibus. *Afric. bor. ad magnam Syrtim.* Cella.

aquatilis 3. R. caule natante radicante, foliis emerſis 3partitis ſubdentati, ſubmerſis multifidis lineari-ſetaceis, petalis calycem ſuperantibus, fructibus ſubhiſpidis. *Europ. Aſia. Africa. Amer.* (R. tripartitus Cand., pantothrix Brot.)

peucedanifolius All. 4. R. caule natante, foliis omnibus ſubmerſis ditrichotome repetito diſſectis, laciniis longiſſimis linearibus parallelis, petalis calycem multo ſuperantibus. *Europ. Afric. Amer. bor.* (R. pantothrix γ. et aquatilis γ. Cand.)

2. *Ranunculaſtra* et *Thorae* Cand. *Fructus laeves compreſſi ſubgloboſi: radix grumoſa.*

* *Foliis inferioribus integris.*

bullatus 5. R. foliis omnibus radicalibus obovatis dentatis ſubſeſſilibus rugoſis, ſcapo 1floro piloſo. *Luſitania. Sicilia. Graecia. Afric. bor.*

Thora 6. R. foliis inferioribus reniformibus amplis crenatis ſubcoriaceis, caulino ſubſeſſili inciſo, floralibus paucis anguſtis, caule ſub-2floro. *Alp. Europ. med.* (R. ſcutatus Kit., hybridus Bir., brevifolius Tenor.)

Ficaria 7. R. foliis cordatis nitidis dentatis longe petiolatis, caule aſcendente, calyce ſub-3ſepalo. *Europ.* (Ficaria ranunculoides Mönch. Cand.)

macropetalus Cand. 8. R. foliis radicalibus orbiculatis crenatis, petiolis baſi membrana auctis, caulinis ovato-lanceolatis ſeſſilibus, caule glabro paucifloro, calyce appreſſo. *Peru.*

pedatus Kit. 9. R. foliis glabris, radicalibus 3partitis pedatis petiolatis, laciniis linearibus ſubintegris, caule pubeſcente ſtricto paucifloro oligophyllo, ſepalis appreſſis. *Hungar. Tranſſylvan.*

petroſelinus Bir. 10. R. foliis glabris ad baſin petioli villoſis bis 3partitis, laciniis linearibus inciſo-dentatis, caule multifloro, ſepalis acutis patentibus. *Inſ. Maſcaren.*

illyricus 11. R. foliis ſericeo-lanatis, primordialibus lineari-lanceolatis indiviſis reliquis 3partitis, laciniis linearibus ſubintegris, caule multifloro, ſepalis patentiſſimis. *Inſ. Oeland. Auſtria. Hungar. Tauria. Caucaſ.*

monspeliacus 12. R. foliis ſublanatis, radicalibus 3lobis, lobis cuneatis 3fido-dentatis, ſuperioribus 3partitis, laciniis linearibus, caule paucifloro, ſepalis reflexis. *Europ. auſtr.*

ſpicatus Desf. 13. R. foliis villoſis, radicalibus longe petiolatis cordato-orbiculatis lobatis, lobis cuneatis obtuſe dentatis, caulinis anguſtis ſeſſilibus, ſepalis reflexis, fructibus uncinatis ſpicatis. *Sicil. Luſitan. Afric. bor.*

creticus 14. R. foliis villoſo-hirſutis, radicalibus petiolatis cordato-orbiculatis inciſo-dentatis, caulinis ſeſſilibus 3partitis, lobis oblongis obtuſis apice ſub-

dentatis, caule multifloro, ſepalis appreſſis. *Creta. Afr. bor.*

cortuſaefolius W. 15. R. foliis piloſis, radicalibus petiolatis ſubcordato-reniformibus ſublobatis inaequaliter dentatis, caulinis 5partitis, laciniis lanceolatis ſerrulatis, floralibus linearibus integerrimis, floribus corymboſis, ſepalis patentibus. *Inſ. Canar.*

Guzmanni Humb. 16. R. foliis ſupra villoſis, radicalibus longe petiolatis ſubrotundis 3lobis dentatis, ſuperioribus tripartitis ſeſſilibus, caule piloſo paucifloro, ſepalis obtuſis villoſiſſimis petala ſubaequantibus. *Alp. Amer. auſtr.*

Krapfia Cand. 17. R. foliis radicalibus longiſſime petiolatis ſuborbiculatis 3fidis dentatis cauleque unifloro hirſutis, ſepalis obtuſis petala aequantibus, fructibus uncinatis. *Chili.*

japonicus Thunb. 18. R. foliis hirſutis, radicalibus rotundatis 3lobis, lobis inciſis dentatis, ſupremis fiſſis, caule erecto ramoſo. *Japon.* (R. aſiaticus Thunb.)

aſiaticus 19. R. foliis pubeſcentibus lanatisve, infimis ſimplicibus 3lobis inciſo-dentatis, ſuperioribus ternatis ſ. biternatis, calyce patente, corolla ampla. *Graecia. Aſia minor. Afric. bor.*

***Foliis omnibus diviſis.*

chaerophyllus 20. R. foliis ſericeo-lanatis, radicalibus ſubintegris petiolatis ovatis ſerratis, reliquis 3partito-compoſitis, laciniis ſubdivaricatis oblongis, caule 1-2floro, ſepalis lanceolatis acutis patulis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (R. flabellatus Desf., gregarius Brot., paludoſus Poir., Thomaſii Tenor.)

aſcendens Brot. 21. R. foliis lanatis, radicalibus 3partito-ternatis petiolatis, laciniis cuneatis 3fidis dentatis, caulinis ſubſeſſilibus, caule aſcendente dichotomo, pedunculis ſulcatis, ſepalis piloſis reflexis. *Luſitania.*

millefoliatus Vahl. 22. R. foliis omnibus decompoſitis multifidis glabris, laciniis abbreviatis inciſis, petiolis cauleque unifloro appreſſe piloſis, ſepalis oblongis patentibus, radicibus tuberoſis. *Sicilia. Graecia. Afric. bor.* (R. Agerii Bertol.)

gracilis Cand. 23. R. foliis omnibus glaberrimis, radicalibus orbiculatis 3-5partitis, laciniis flabelliformibus ſinuato-dentatis, caulinis multipartitis, laciniis ſublinearibus, caule ſimplici gracili, ſepalis reflexis. *Inſ. Cos.* Clarke.

fumariaefolius Desf. 24. R. foliis radicalibus decompoſitis multipartitis, laciniis oblongis, ſcapis plurimis 1floris appreſſe villoſis, calyce patente glabro. *Patria?*

myriophyllus Ruſſ. 25 R. foliis decompoſitis multifidis albido-villoſis, laciniis lanceolato-linearibus, caule erecto ramoſo hirſuto, ſepalis lanceolatis patentibus. *Syria.*

orientalis 26. R. foliis decompoſitis multifidis pubeſcentibus, laciniis linearibus, petiolis alatis, caule ramoſo villoſo, ſepalis obtuſis reflexis, fructibus longe cornutis. *Aſia minor. Inſ. maris aegei.*

leptaleus Cand. 27. R. foliis ternato-compositis glabris, laciniis linearibus, caule patule pilofo, sepalis acutis patulis, fructibus uncinato-mucronatis. *Cyprus.* Labillardière.

cicutarius Schlechtend. 28. R. foliis ternato-compositis glabris, laciniis oblongo-cuneatis inciso-dentatis, caule stricto appresse pilofo, sepalis patentibus pubescentibus. *Sibir. or.*

§. *Hecatoniae* Cand. *Radix fibrofa f. fasciculata: fructus laeves subrotundi.*

* *Foliis integris.*

† *Floribus albis.*

pyrenaeus 29. R. foliis radicalibus paucis lineari-lanceolatis integerrimis nervosis basi in petiolum attenuatis, scapo sub-1floro apice pilofo. *Alp. Europ. med.* (R. bupleurifolius Lapeyr. R. plantagineus All. var. caule paucifloro.)

angustifolius Cand. 30. R. foliis radicalibus linearibus glaucescentibus, caule oligophyllo paucifloro superne glabro. *Pyren.*

amplexicaulis 31. R. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nervosis, caulinis ovato-oblongis amplexicaulibus, caule superne glabro paucifloro. *Alp. Europ. austr.*

parnassifolius 32. R. foliis radicalibus subcordato-ovatis nervosis petiolatis cauleque paucifloro hirsutis, caulinis sessilibus ovato-lanceolatis. *Alp. Europ. med.*

crenatus Kit. 33. R. foliis radicalibus cordato-subrotundis nervosis crenato-dentatis, caule 1floro oligophyllo, petalis obtusis crenulatis. *Montes carpathi orient.*

†† *Floribus flavis.*

gramineus 34. R. foliis lineari-lanceolatis subnervosis cauleque paucifloro glaberrimis, squamis nectariferis tubulosis. *Europ. austr.*

bupleuroides Brot. 35. R. foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis nervosis glabris, caule lanato oligophyllo paucifloro, squamis nectariferis tubulosis. *Lusitan.*

Lingua 36. R. foliis lanceolato-ensiformibus denticulatis sessilibus glabriusculis, caule erecto ramoso multifloro hirsutiusculo. *Europ. Sibir. Amer. bor.*

Flammula 37. R. foliis lanceolatis acutis subintegerrimis glabris, inferioribus petiolatis, caule basi radicante ascendente, pedunculis oppositifoliis. *Europ. Asia. Afric. Amer.* (R. ovatus Perf. var. foliis plerisque ovatis petiolatis. R. reptans L. (filiformis Mx.) var. foliis linearibus.)

pusillus Poir. 38. R. foliis omnibus longe petiolatis, inferioribus ovatis subdentatis, superioribus lineari-lanceolatis, caule ramoso ascendente pilosiusculo, pedunculis oppositifoliis, corolla calycem aequante. *Nov. Caesar. Carolin.* (P. humilis Perf. Flammula Walt.)

bonarienſis Poir. 39. R. foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtuſis crenatis, ſuperioribus ſubſeſſilibus oblongo-lanceolatis ſerratis, caule ramoſo, corolla calycem ſubaequante. *Buenos Ayres.* (R. heterophyllus Sm.)

polyphyllus W. Kit. 40. R. foliis infimis numeroſiſſimis verticillatis ovato-oblongis integerrimis erectis, caulinis longe petiolatis 3dentatis, radice fibrilloſa, caule ſtricto paucifloro. *Hungar. Ad Tanaim.*

flagelliformis Sm. 41. R. foliis petiolatis cordato-orbiculatis repandis, caule ramoſo radicante, pedunculis oppoſitifoliis. *Chili. Nov. Granat.*

ſalſuginoſus Pall. 42. R. foliis radicalibus petiolatis ſubcordato-ovatis apice profunde ſub-3dentatis, ſcapo ſubramoſo paucifloro, petalis calycem excedentibus, radice ſtolonifera. *Sibir.* (R. ruthenicus Jacqu.)

halophilus Schlechtend. 43. R. foliis radicalibus numeroſis longe petiolatis obovatis obtuſis 3dentatis carnoſis, flagellis e collo ortis, ſcapo 1floro, petalis obovatis reflexis calycem ſuperantibus. *Sibir.*

Cymbalaria Pursh. 44. R. foliis radicalibus petiolatis orbiculatis groſſe crenatis ſubcarnoſis, flagellis e collo ortis, ſcapo ſub-3floro, petalis linearibus calycem aequantibus. *Sibir. Amer. bor.*

tridentatus Humb. 45. R. foliis radicalibus petiolatis ovatis apice 3dentatis glabris ſubcarnoſis, ſcapo 1floro petiolos aequante bracteato, petalis linearibus calyce longioribus. *Mexico.*

nubigenus Humb. 46. R. minutus repens, foliis radicalibus ſuborbicuculatis paucicrenatis petiolatis ſubcarnoſis, ſcapo 2floro apice pubeſcente, bracteis ſub-3dentatis, corolla 3petala. *Alp. peruv.*

** *Foliis diſſectis.*

† *Floribus albis.*

Pallaſii Schlechtend. 47. R. caule repente fiſtuloſo, foliis omnibus cuneatis tripartitis petiolatis, laciniis obtuſiuſculis, calycibus 3ſepalis, corolla 8petala. *Ora occid. Amer. bor. ſub circ. arct.*

biternatus Sm. 48. R. caule repente, foliis 3partitis, laciniis 3fidis acutis, petalis obtuſis calycem aequantibus, fructibus uncinatis. *Ad fretum Magellan.*

rutaefolius 49. R. foliis bipinnatifidis, foliolis ſeſſilibus ovatis ſubpalmato-multifidis, caule ſimpliciuſculo, corolla polypetala, petalis emarginatis, radice fuſiformi. *Alp. Europ. med.*

iſopyroides Cand. 50. R. folio radicali longe petiolato bipinnatifido, foliolis petiolatis oblongis 5fidis, laciniis 3fido-inciſis, foliis ſuperioribus 3partitis ſubſeſſilibus, corolla ſub-5petala calycem ſuperante. *Sibir.*

glacialis 51. R. foliis 3partito-ternatis craſſiuſculis glabris, laciniis obtuſiuſculis inciſis, caule ſub-1floro, calycibus obtuſis hirſutiſſimis, fructibus compreſſis marginatis. *Alp. ſumm. Europ. Lappon.*

Chamissoi Schlechtend. 52. R. foliis 3partitis, radicalibus longe petiolatis glabris, laciniis 3-5fidis obtusiusculis, caule sub-1floro superne calycibusque hirsutis, fructibus utriculosis acuminatis. *Asia bor. extrema ad fretum Beringii.*

Seguierii Vill. 53. R. foliis ternato-3partitis, foliolis ovatis acutis 3fido-incisis, caule ramoso multifloro, calycibus glabris. *Alp. Delphinat. Pedemont. Austr.* (R. Columnae All.)

alpestris 54. R. foliis radicalibus subcordato-orbiculatis tripartitis, laciniis subtrifido-dentatis obtusiusculis, caulino lineari-lanceolato subindiviso, caule sub-1floro, petalis obcordatis, fructibus utriculosis mucronatis. *Alp. Europ. med.* (R. magellensis Tenor., Traunfellneri Hopp., crenatus Baumg.)

aconitifolius 55. R. foliis palmatis 5partitis, laciniis omnibus lanceolatis serratis, inferiorum obtusis, superiorum acutis, caule alato ramoso multifloro, calycibus appressis. *Alpestria Europ. med.* (R. platanifolius L., heterophyllus et dealbatus Lapeyr.)

ternatus Thunb. 56. R. foliis ternatis, foliolis cordatis 3lobis dentatis, caule pilosiusculo multifloro, pedunculis abbreviatis sparsis, calycibus reflexis. *Japon.*

apiifolius Pers. 57. R. foliis inferioribus longe petiolatis palmato-5fidis sinuatis, laciniis 3fido-dentatis, foliis caulinis 3partitis linearibus dentatis, caule ramoso multifloro, calycibus corollam aequantibus patentibus, fructibus muticis. *Buenos Ayres.*

lacer Bell. 58. R. foliis cuneiformibus apice irregulariter acute incisis, caule glabro ramoso paucifloro, calycibus appressis. *Alp. pennin.* (R. frigidus Schrank.?)

†† *Floribus flavis.*

a. Foliis glabris.

aa. Caule uni-paucifloro.

breviscapus Cand. 59. R. foliis radicalibus petiolatis orbiculato-cordatis 3-5fidis, flagellis e collo ortis, scapis 1floris petiolo brevioribus, calycibus glabris. *Peru.*

acaulis Banks. 60. R. foliis radicalibus longe petiolatis 3partitis, lobis ovalibus integerrimis, scapo 1floro petiolis breviori, calyce patente, petalis unguiculatis lanceolatis erectis. *Nov. Zeeland.*

lapponicus 61. R. foliis longe petiolatis 3partitis, lobis obovatis obtusissimis inciso-crenatis, caule 1floro, calyce 3sepalo piloso, fructibus uncinato-rostratis. *Lappon. Island.*

hyperboreus Rottb. 62. R. caule filiformi repente glaberrimo, petiolis basi alatis, stipulis binis reflexis, foliis basi truncatis 3fidis (sub-5fidis) obtusis, pedunculis oppositifoliis, calycibus reflexis, fructibus muticis. *Norvegia arctic. Island. Grönland.*

Gmelini Cand. 63. R. caule filiformi repente, petiolis basi alatis, foliis basi truncatis 3-5fidis obtusis, pedunculis

oppofitifoliis, calycibus reflexis, fructibus roftratis. *Sibir. orient.*

pygmaeus Wahlenb. 64. R. caule afcendente fub-1floro, foliis 5lobis obtufis, pedunculis fuperne pilofis, calyce patente corollam fubexcedente, fructibus uncinatis. *Regio arctica Europ. et Amer.*

nivalis 65. R. caule erecto 1floro, foliis reniformibus 5lobis integerrimis, calyce hirfuto petalis ftriatis breviori, fructibus uncinato-roftratis. *Europ. arctic.*

frigidus W. 66. R. caule erecto 1floro, foliis radicalibus petiolatis obovatis apice 3-5dentatis, caulinis feffilibus palmatis, calyce hirfutiffimo petalis emarginatis breviori. *Sibir.* (R. altaicus Laxm.)

Efcholzii Schlecht. 67. R. caule erecto fub-2floro, foliis ciliatis, radicalibus petiolatis cordatis 3lobis, lobis late cuneatis 3dentatis, caulinis fubfeffilibus, calycibus fulvo-villofis corolla brevioribus. *Inf. Aleut.* Chamiffo.

rivularis Banks. 68. R. caule reptante, foliis longe petiolatis 3partitis, laciniis obtufiusculis dentatis, pedunculis oppofitifoliis, petalis lanceolatis, fructibus recte roftratis. *Nov. Zeeland.*

inundatus R. Br. 69. R. caule erecto fubnudo 2-4floro, foliis radicalibus petiolatis 5partitis, laciniis 3fidis dentatis, calycibus obtufis corollam aequantibus. *Nov. Holl.*

demiffus Cand. 70. R. fcapo demiffo fub-1floro, foliis radicalibus petiolatis 3-5partitis, lobis laciniatis, calyce patente pubefcente. *Libanus.* Labillard.

polyrrhizos Steph. W. 71. R. caule erecto fub-3floro, foliis radicalibus longe petiolatis 3lobo-finuatis, lobis divaricatis obtufe 3dentatis, caulinis feffilibus 3partitis acutis, calyce glabro patente, radice fafciculata. *Ad Volgam. Caucaf. Sibir.*

montanus W. 72. R. caule 1floro, foliis radicalibus petiolatis cordato-orbiculatis palmato-5lobis, caulinis feffilibus fub-3partitis acutis, pedunculis fericeis, calycibus acutiusculis glabris. *Alp. Europ. med.*

ββ. Caule multifloro.

auricomus 73. R. foliis membranaceis nitidis, radicalibus petiolatis cordato-reniformibus crenatis 3lobisque, caulinis feffilibus in lacinias lineares fubdentatas partitis, calyce appreffo pubefcente. *Europ. Amer. bor.*

caffubicus 74. R. foliis fubcoriaceis, radicalibus reniformi-cordatis crenatis 3lobisque, caulinis digitatis feffilibus, foliolis rhombeo-lanceolatis ferratis, calycibus fructibusque uncinato-mucronatis pubefcentibus. *Pomerania. Boruff. Galicia.*

abortivus 75. R. foliis membranaceis, radicalibus petiolatis cordatis crenatis 3lobisque, caulinis feffilibus in lacinias lineares fubintegerrimas divifis, corolla calycem glabrum fubaequante, fructibus muticis. *Amer. bor.*

sceleratus 76. R. foliis inferioribus 3lobis, lobis 3fidis obtuſe dentatis, caulinis 3partitis, laciniis ſublinearibus integris, calycibus glabris, fructibus ſubſpicatis. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (R. umbellatus Roxb., digitatus Gilib., Hecatonia paluſtris Lour.)

multifidus Pursh. 77. R. foliis 3partito-multifidis, laciniis linearibus acutis inciſis, caule natante, pedunculis folia ſuperantibus, calycibus glabris. *Louiſiana.*

*Langsdorſii** 78. R. foliis 3partitis, lobis ſubrotundis obtuſe inciſo-dentatis, caule repente, calycibus reflexis, fructibus uncinatis. *Japon.* (R. japonicus Cand.)

dichotomus Seſſ. 79. R. foliis radicalibus longiſſime petiolatis bipinnatifidis, laciniis anguſtis inciſis, caulinis ſeſſilibus pinnatifidis, caule dichotomo, pedunculis elongatis, calycibus reflexis, fructibus recte roſtratis. *Mexico.*

perſicus Cand. 80. R. foliis radicalibus petiolatis pinnatifidis, laciniis 3fidis dentatis, caulinis 3partitis, caule erecto dichotomo appreſſe pubeſcente, calyce patente villoſo. *Perſia.*

β. Foliis pubeſcentibus.

αα. Caule uni-paucifloro.

ſibbaldioides Humb. 81. R. caule breviſſimo 1floro hirſuto, foliis pinnatis ſubtus piloſis, foliolis 3lobis inciſo-crenatis, calycibus patulis piloſis. *Alp. Quito.*

*ſibiricus** 82. R. foliis ſubpubeſcentibus palmato-multifidis, laciniis linearibus tenuiſſimis, caule 1floro, calycibus reflexis. *Sibir. orient.* (R. Langsdorfii Cand.)

collinus R. Br. 83. R. foliis radicalibus petiolatis 3partitis, laciniis ovalibus apice dentatis, ſcapo 1floro folia ſuperante, petalis unguiculatis oblongis. *Terra Diemen.*

peruvianus Perſ. 84. R. foliis radicalibus longe petiolatis ſemiorbiculatis crenatis, caulinis ſeſſilibus in lacinias lineares ſubintegerrimas partitis, calyce villoſo, petalis obtuſiſſimis. *Peru.*

pedunculatus Viv. 85. R. foliis radicalibus ſuborbiculatis crenato-dentatis, reliquis 3partitis, lobo medio petiolato 3fido inciſo, pedunculis radicalibus aphyllis, calyce patente. *Corſica.*

pedatifidus Sm. 86. R. foliis radicalibus longe petiolatis palmato-pedatis, laciniis ſubintegris, caulinis paucis ſeſſilibus, caule ſub-2floro ſuperne villoſo, calyce patente villoſiuſculo. *Sibir. or.*

Villarſii Cand. 87. R. foliis radicalibus ſuborbiculatis 3partitis, laciniis 3fidis dentatis acutis, caulinis ſeſſilibus in lacinias lineares integras partitis, caule unifloro apice pubeſcente, calyce villoſo. *Alp. pennin. Delphinat. Tauria. Caucaſ. Sibir.* (R. lapponicus Vill., oreophilus M. B.)

anemonaeſolius Cand. 88. R. foliis radicalibus 3partitis baſi cuneatis, laciniis inciſo-dentatis, caulino 3partito ſeſſili, laciniis linearibus integris, caule erecto 1-2floro ſuperne pubeſcente, calyce reflexo. *Aſia minor.*

napellifolius Cand. 89. R. foliis radicalibus suborbiculatis 3partitis, laciniis multifidis linearibus, floralibus 3partitis, laciniis linearibus integerrimis, caule nudiusculo 1-2floro, calyce appresso hirsuto. *Asia minor.*

dissectus M.B. 90. R. foliis radicalibus multipartitis, laciniis oblongis acutiusculis sub-3fidis, caulinis digitatis linearibus, caule erecto sub-2floro pubescente, calycibus hirsutis patentibus. *Caucas. Sibir.*

cappadocicus W. 91. R. foliis radicalibus cordatis 3lobis, lobis acuminatis dentatis, caulinis binis integris, caule erecto sub-2floro, calycibus patulis. *Asia minor.*

peduncularis Sm. 92. R. foliis radicalibus longe petiolatis 3partitis subcuneatis, laciniis 3fidis patentibus, caule nudiusculo sub-1floro, calycibus demum reflexis, fructibus elongato-uncinatis. *Ad fretum Magellan.*

tomentosus Poir. 93. R. caule villosissimo sub-1floro, foliis petiolatis tomentosis 3partitis, lobis ovatis 3fidis dentatis, folio summo sessili ovato integro, calycibus reflexis hirsutis. *Carolina.*

praemorsus Humb. 94. R. caule sericeo-hirsuto sub-1floro, foliis ternatis supra pilosis subtus sericeis, foliolis sub-3fidis crenato-serratis, calycibus reflexis pilosis, petalis denis emarginatis. *Alp. Quito.*

geoides Humb. 95. R. caule villoso sub-2floro, foliis 3partitis villoso-sericeis, laciniis inciso-serratis, intermedia sub-3loba, calycibus pilosis reflexis, petalis denis. *Mexico.*

Bonplandianus Humb. 96. R. caule pilosiusculo sub-2floro, foliis ternato-3partitis supra glabris subtus pilosiusculis, foliolis sub-3lobis crenato-serratis, calycibus reflexis pilosis, petalis subduodenis. *Nov. Granat.*

delphinifolius Humb. 97. R. caule erecto paucifloro foliisque ternatis pilosis, foliolis 2-3partitis, laciniis 2-3fidis inciso-serratis, calycibus pilosis reflexis, petalis 15. *Mexico.*

grandiflorus Humb. 98. R. caule erecto villoso paucifloro, foliis radicalibus 3partitis, laciniis inaequaliter laciniatis, caulinis linearibus, calycibus reflexis, petalis obtusissimis. *Asia minor.*

geranioides Humb. 99. R. caule flagelliformi sub-2floro foliisque ternatis sericeo-pilosis, foliolis petiolatis 2-3fidis inciso-serratis, pedunculis oppositifoliis, calycibus reflexis hirsutis, fructibus laevibus recte acuminatis. *Nov. Granat.*

pilosus Humb. 100. R. caule ascendente dichotomo paucifloro, foliis ternatis appresse pilosis, foliolis ovato-rhomboideis 2-3fidis inciso-serratis, calycibus reflexis, fructibus recte acuminatis. *Nov. Granat.*

† *cantoniensis* Cand. 101. R. caule erecto ramoso piloso paucifloro, foliis ternatis lanceolatis inciso-serratis, pedunculis solitariis. *China austr.* (Hecatonia pilosa Lour.)

Pumilio R Br. 102. R. caulibus caespitosis erectiusculis villosis, foliis longe petiolatis 3partitis, laciniis oblongis integris 3fidisque, pedunculis oppositifoliis, floribus minimis, fructibus villosis. *Terra Diemen.*

ββ. Caule multifloro.

Breynianus Crantz. 103. R. caule erecto multifloro foliisque villosis, radicalibus palmatis 3-5partitis, lobis obovato-oblongis dentatis, floralibus integerrimis, pedunculis sulcatis, calycibus patentibus, receptaculis pilosis, fructibus uncinatis. *Europ. med.* (R. nemorosus β. Cand.)

polyanthemos 104. R. caule erecto multifloro foliisque villosiusculis, radicalibus palmatis 3-5partitis, laciniis multifido-incisis angustis, floralibus integerrimis, pedunculis sulcatis, calycibus patulis, receptaculis glabris, fructibus submuticis. *Europ.* (R. nemorosus α. Cand.)

Gouani W. 105. R. caule erecto submultifloro foliisque hirsutis, radicalibus cordato-orbiculatis 5lobis, lobis inciso-dentatis, caulinis palmatis dentatis sessilibus, calycibus appressis villosis. *Pyrenaei montes.* (R. pyrenaeus Gouan. var. caule 1floro.)

acris 106. R. caule erecto multifloro foliisque pubescentibus, radicalibus palmato-5partitis, caulinis 3partitis, laciniis inciso-dentatis, floralibus linearibus integerrimis, pedunculis teretibus, calycibus patulis, petalis emarginatis, fructibus mucronatis. *Europ. Asia. Amer. bor.* (R. Stevenii Bess., rufulus Brot., sylvaticus Thuill.)

bruttius Tenor. 107. R. caule erecto foliisque villosis, radicalibus palmato-3-5partitis, laciniis profunde 3partitis incisis, summis linearibus integerrimis, pedunculis teretibus sericeis, calyce appresso. *Calabria.*

caucasicus M. B. 108. R. caule elato multifloro foliisque appresse pilosis, radicalibus amplis ternatis, foliolis cuneatis 3partitis, laciniis lanceolatis 3fidis, pedunculis teretibus, calycibus patulis, fructibus uncinatis. *Caucas.*

tuberosus Lapeyr. 109. R. caule subascendente foliisque appresse pubescentibus, radicalibus amplis 3partitis, laciniis distantibus incisis, lateralibus 2fidis, intermedia cuneiformi 3partita, pedunculis teretibus, calycibus appressis, fructibus longe uncinatis, radice tuberosa. *Pyren.*

lanuginosus 110. R. caule erecto multifloro petiolis calycibusque patentissime villosis, foliis holosericeis, radicalibus amplis 3partitis, laciniis obovatis 3fidis inciso-serratis, summis sensim minoribus, pedunculis teretibus, calyce patente, fructibus uncinato-muricatis. *Europ.* (R. constantinopolitanus Urv., tuberosus Sieb.)

villosus Cand. 111. R. caule erecto dichotomo deflexo-hirsuto, foliis villosis 3partitis, laciniis ovatis inciso-dentatis, summis indivisis, calycibus hispidis reflexis. *Persia.*

sericeus Poir. 112. R. caule erecto multifloro foliisque villoso-sericeis, radicalibus subternato-3partitis, lobis latis trifido-sinuatis incisis, caulinis palmato-

5partitis, laciniis anguſtioribus, ſummis 3partitis, calycibus patentibus, fructibus ſubmuticis. *Inſ. Mascaren.*

diffuſus Cand. 113. R. caule elongato diffuſo foliisque cordato-ſubrotundis dentatis villoſis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus appreſſis, fructibus recte mucronatis. *Nepal.*

nepalenſis Cand. 114. R. caule erecto dichotomo foliisque ternato-3partitis piloſis, laciniis oblongo-cuneatis dentatis, calycibus reflexis petala ſubſuperantibus, fructibus recte mucronatis. *Nepal.*

petiolaris Humb. 115. R. caule erecto dichotomo foliisque ſericeo-pubeſcentibus, radicalibus longiſſime petiolatis 3partitis, laciniis 3fidis inciſo-dentatis, ſummis linearibus, calycibus reflexis piloſis, fructibus recte mucronatis. *Mexico.*

plebejus R. Br. 116. R. caule erectiusculo dichotomo baſi petiolisque patenter piloſiſſimis, foliis ſubternatis villoſis, foliolis ovatis inciſo-dentatis, ſummis linearibus integris, calycibus ſubreflexis, fructibus ſubuncinatis. *Nov. Holl.*

hirtus Banks. 117. R. caule erecto dichotomo piloſiſſimo, foliis piloſis, inferioribus petiolatis ternatis, ſummis ſeſſilibus 3partitis, foliolis laciniisque ovatis groſſe dentatis, floribus minimis longe pedunculatis, calycibus reflexis, fructibus recte mucronatis. *Nov. Zeeland.*

hiſpidus Mx. 118. R. caule erecto ramoſo patenter piloſiſſimo, foliis ternato-3partitis, foliolis laciniisque ovalibus acutis inciſo-dentatis, pedunculis ſtrigilloſis, calycibus appreſſis. *Virginia. Carolina.*

recurvatus Poir. 119. R. caule erecto patenter piloſiſſimo, foliis villoſis omnibus cordatis 3lobis, lobis ovatis inciſis, calycibus reflexis petala minuta longe ſuperantibus. *Amer. bor.* (R. ſaniculaeformis Mühl.)

penſylvanicus 120. R. caule ramoſo petiolisque hirtis, foliis ternatis hirſutis, foliolis lato-lanceolatis 3fidis inciſis, calycibus reflexis petala aequantibus, fructibus recte mucronatis. *Amer. bor.* (R. canadenſis Jacq.)

faſcicularis Mühl. 121. R. caule gracili patenter villoſo, foliis ſericeo-pubeſcentibus ternato-3partitis, radicalibus longe petiolatis, laciniis ſub-3fidis inaequaliter dentatis baſi attenuatis, calycibus patentibus corolla brevioribus, fructibus uncinatis. *Amer. bor.*

Belviſii Cand. 122. R. caule erecto ramoſo hirſutiusculo, foliis radicalibus ternatis longe petiolatis glabris, foliolis 3fidis, laciniis acuminatis acute inciſis, calyce glabro patente petalis breviori. *Amer. bor.*

platyſpermus Fiſch. 123. R. caule erecto, foliis radicalibus multifidis, caulinis 3partitis, laciniis linearibus, fructibus orbiculatis membranaceo-compreſſis apice uncinatis. *Ditio Kirgiſorum Aſiae med.*

rhoeadifolius Cand. 124. R. caule erecto ramoſo piloſo, foliis omnibus petiolatis ternatis glabriusculis, foliolis oblongis

3fidis inciſo-dentatis, ſummis linearibus, calycibus patentibus corollam ſubaequantibus. *Inſ. Canar.* Brouſſonet.

repens 125. R. ſarmentis radicantibus, caule aſcendente foliisque ternatis glabriuſculis vel hirſutis, foliolis 3fido-cuneatis inciſo-dentatis, pedunculis teretibus, calycibus appreſſis, fructibus recte mucronatis. *Europ. Aſia. Amer. bor.* (R. proſtratus et lucidus Poir.)

marginatus Urv. 126. R. radice fibroſa, caule baſi ramoſo patulo ſubhirſuto, foliis calloſo-marginatis, inferioribus petiolatis ternatis, foliolis obtuſis crenatis, caulinorum laciniis linearibus, calycibus reflexis corolla majoribus, fructibus uncinatis. *Aſia minor.*

chilenſis Cand. 127. R. caule decumbente radicante petiolisque hiſpidis, foliis cordato-orbiculatis 3-5fidis ſubtus hirſutis, petalis ſpathulatis calycem villoſum ſuperantibus. *Chili.*

lappaceus Sm. 128. R. caule erecto multifloro foliisque pinnatifidis hirſutis, laciniis ovatis 3fidis, calyce patente, fructibus uncinatis. *Nov. Holl.*

marilandicus Poir. 129. R. caule erecto hirſuto, foliis glabriuſculis ternatis, foliolis 3fidis, laciniis oblongis acutis inciſo-dentatis, calyce glabro patentiſſimo petalis breviori. *Amer. bor.*

carolinianus Cand. 130. R. caule erecto ſubramoſo petiolisque appreſſe pubeſcentibus, foliis glabriuſculis ternato-3fidis, laciniis ovatis obtuſis ſubinciſis, calyce reflexo glabriuſculo petalis breviori. *Carolina.* (R. ſeptentrionalis Poir.)

paluſtris L. Sm. 131. R. caule ramoſo nudiuſculo, foliis petiolatis ſubhirſutis 3lobis ſinuatis, lobis ovatis obtuſis inciſo-dentatis, fructibus recte acuminatis, radice fibroſa. *Graecia. Corſica.* (R. corſicus Cand.)

bulboſus 132. R. caule baſi bulboſo multifloro foliisque ternato-3partitis villoſis, foliolis 3fidis inciſo-dentatis, pedunculis ſulcatis, calycibus reflexis. *Europ. Amer. bor.*

4. *Echinellae* Cand. *fructus muricati.*

* *Foliis indiviſis.*

ophiogloſſifolius Vill. 133. R. caule fiſtuloſo glaberrimo, foliis omnibus petiolatis, inferioribus ſubcordatis ſuperioribus oblongis obtuſis nervoſis, petiolis late vaginantibus, pedunculis oppoſitifoliis, fructibus granulatis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (R. ophiogloſſoides W., cordifolius Bat., fiſtuloſus Brignol.)

uliginoſus W. 134. R. caule ſimpliciuſculo humili, foliis inferioribus ſubcordato-ovatis angulato-dentatis, ſuperioribus lanceolatis ſerratis, pedunculis oppoſitifoliis, fructibus granulatis. *Teneriffa.* (R. cochlearifolius Horn.)

nodiflorus 135. R. caule ramoſo foliisque oblongo-lanceolatis ſubdentatis glabris, floribus axillaribus ſubſeſ-

ſeſſilibus, fructibus roſtellatis. *Europ. auſtr.* (R. lateriflorus Cand.)

** *Foliis diviſis.*

ſeſſiliflorus R. Br. — 136. R. caule procumbente, foliis ſubvilloſis reniformibus 3partitis ſ. groſſe dentatis, floribus ſeſſilibus oppoſitifoliis, fructibus granulatis. *Nov. Holl.*

trilobus Desf. — 137. R. caule erecto foliisque glabris, primordialibus ſubintegris, reliquis 3partitis pinnatifidisque, laciniis cuneatis obtuſe dentatis, pedunculis oppoſitifoliis, fructibus granulatis. *Afric. bor. Sicilia. Graecia. Teneriffa.*

pauciflorus — 138. R. caule foliisque villoſis, radicalibus cordato-orbiculatis ſublobatis crenatis, ſummis oblongis integerrimis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus reflexis petala aequantibus, fructibus granulatis. *Anglia. Europ. auſtr.*

cordigerus Viv. — 139. R. foliis ſericeis, radicalibus cordato-ſubrotundis ſub-3lobis crenatis, caulinis inciſis integrisque, caule ſub-2floro, calycibus reflexis. *Corſica.*

pinnatus Poir. — 140. R. caule foliisque pinnatis villoſis, foliolis ſub-3jugis inciſo-lobatis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus patentibus, fructibus granulatis mucronatis. *Ind. or. C. B. S.*

cornutus Cand. — 141. R. caule ramoſo foliisque 2ternatis glabris, foliolis 3fidis, laciniis oblongo-linearibus acutis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus reflexis, fructibus granulatis cornutis. *Syria.* Labillard.

oxyſpermus MB. — 142. R. caule erecto villoſiſſimo, foliis radicalibus ſubcordato-ovatis 3lobis ſinuatis villoſis, lobis inciſo-dentatis, caulinis linearibus, calycibus ſubreflexis, fructibus muricato-ariſtatis, radice grumoſa. *Tauria. Caucaſ. Syria.*

muricatus — 143. R. caule foliisque ſubreniformibus baſi truncatis 3lobis glabris, lobis ſub-3dentatis, ſummis integerrimis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus patentibus, fructibus muricato-cornutis. *Europ. auſtr. Afric. bor. Amer. bor. et auſtr.* (R. echinatus et ventricoſus Vent.)

chius Cand. — 144. R. caule foliisque cordato-orbiculatis late dentatis villoſis, pedunculis oppoſitifoliis, calycibus reflexis, fructibus muricatis uncinato-cornutis. *Inſ. Chios.*

Philonotis Retz. — 145. R. caule foliisque ſubternato-3partitis hirſutiusculis, lobis inferiorum obtuſiusculis inciſo-dentatis, ſuperiorum integerrimis, pedunculis ſulcatis, calycibus reflexis, fructibus muticis margine tuberculatis, radice fibroſa. *Europ.* (R. hirſutus Ait., ſardous Crantz., agrarius All. . . . R. intermedius Poir., pumilus Thuill., parvulus L., parviflorus Gouan. varr.)

arvenſis — 146. R. caule erecto multifloro foliisque 3partito-multifidis glabris, laciniis lineari-lanceolatis

ſubintegerrimis, fructibus utrinque aculeatis. *Europ.* (R. echinatus Crantz., tuberculatus Kit. Cand.)

laciniatus Baumg. 147. R. caule erecto foliisque ternato-3partitis ſericeo-villoſis, laciniis 3fidis linearibus dentatis, pedunculis elongatis filiformibus denſe piloſis, calycibus patentibus, fructibus muricatis mucronatis. *Transſylvan.*

2038. HAMADRYAS Commerſ.

magellanica Lam. 1. H. foliis ſupra glabris 5lobis inciſo-dentatis, ſcapo folia ſuperante hirſutiuſculo, calycibus glabris. *Ad fretum Magellan.*

tomentoſa Cand. 2. H. foliis ſupra arachnoideo-villoſis 5-7fidis, lobis oblongis ſub-3fidis, ſcapo petiolos ſuperante calycibusque tomentoſis. *Inſ. ſtatuum ad terram ignis.* Menzies.

2039. TROLLIUS.

europaeus 1. Tr. ſepalis 15 conniventibus, nectariis ſtamina aequantibus. *Europ. prata.* (Tr. altiſſimus, medius et minimus Wender., napellifolius Röpert.)

aſiaticus 2. Tr. ſepalis 10 patentibus, nectariis ſtamina ſuperantibus. *Sibir.*

patulus Saliſb. 3. Tr. ſepalis 5 patentibus, nectariis paucis ſtamina aequantibus. *Sibir. Aſia minor.*

caucaſicus Stev. 4. Tr. ſepalis 10 patentibus, ſtaminibus nectaria ſuperantibus. *Caucaſ.*

americanus Mühlenb. 5. Tr. ſepalis 5 abbreviatis patulis, ſtaminibus nectaria ſuperantibus. *Amer. bor.* (Tr. laxus Saliſb. Purſh.)

2040. HELLEBORUS.

hyemalis 1. H. ſcapo 1floro, flore involucrato, foliis radicalibus peltatis multifidis, laciniis integerrimis. *Europ. auſtr.* (Eranthis Saliſb. Köllea Bir. Robertia Merat.)

ſibiricus * 2. H. ſcapo 1floro, flore involucrato, foliis radicalibus ſuborbiculatis 5partitis, laciniis cuneatis apice inciſo-dentatis. *Sibir. orient.* (Eranthis Cand.)

niger 3. H. ſcapo ſub-1floro, flore bracteato, foliis radicalibus pedatis coriaceis apice ſerratis. *Europ. med. et auſtr.*

orientalis Lam. 4. H. caule paucifloro, foliis radicalibus pedatis ſerratis ſubtus pubeſcentibus, floralibus ſubſeſſilibus palmatis, pedunculis ſub-2fidis, (floribus purpuraſcentibus). *Graecia. Aſia minor.* (H. officinalis Saliſb.)

purpuraſcens Kit. 5. H. caule 2floro folioſo, foliis caule altioribus digitatis argute ſerrulatis ſubtus ſubpubeſcentibus,

foliolis floralibusque 3fidis, (floribus livide purpurascentibus). *Hungar. austr. Transsylvan.*

odorus Kit. 6. H. caule sub-2fido, ramis foliatis 2floris, foliis digitatis subtus pubescentibus, foliolis indivisis basi integerrimis, (floribus virentibus). *Hungar.*

viridis 7. H. caule 2fido, ramis foliatis 1floris, foliis digitato-pedatis serratis subtus glabris, (floribus virentibus). *Europ. med.* (H. dumetorum Kit. var. foliolis rigidiusculis mucronato-serratis.)

atrorubens Kit. 8. H. caule florifero praecoci 2fido, ramis angulatis foliatis paucifloris, foliis digitato-palmato-pedatis serratis utrinque glaberrimis, (subquaternis denis, flore livide rubente). *Croatia.*

foetidus 9. H. caule folioso multifloro, foliis multipartito-pedatis serratis glabris, floribus (subvirentibus) 3gynis. *Europ. med.*

lividus Ait. 10. H. caule folioso multifloro, foliis ternatis glaberrimis subtus glaucis serratis, (floribus livide rubentibus). *Corsica.* (H. 3phyllus Lam., argutifolius Viv.)

2041. COPTIS Salisb.

trifolia Salisb. 1. C. foliis ternatis glaberrimis, foliolis obovatis sublobatis mucronato-dentatis, scapo 1floro. *Grönland. Amer. bor. Camtschatca. Sibir. arctic.* (nusquam in Europa, nec in Norveg. nec in Island., testibus Gunnero, Oedero et Hornem.) (Helleborus 3folius L., 3lobus Lam., Anemone grönlandica Oed.)

asplenifolia Salisb. 2. C. foliis 2ternatis, foliolis subpinnatifidis argute serratis, scapo 2fido 2floro. *Ora occ. Amer. bor.* Menzies.

2042. CALTHA.

* *Sepalis deciduis.*

palustris 1. C. caule erecto, foliis cordato-orbiculatis crenatis, sepalis oblongis obtusis. *Europ. Asia et Amer. bor.*

radicans Furl. Forst. 2. C. caule repente ascendente, foliis 3angulari-cordatis serrato-crenatis, sepalis oblongis apice attenuatis. *Scotia.*

flabellifolia Pursh. 3. C. caule procumbente, foliis dilatato-reniformibus acute dentatis, sepalis obovatis, capsulis adunco-rostratis. *Pensylvan.*

natans Pall. 4. C. caule natante, foliis cordatis crenatis, lobis subparallelis, sepalis ovalibus, capsulis recte rostratis. *Sibir. or.*

integerrima Pursh. 5. C. caule erecto corymboso, foliis cordato-orbiculatis integerrimis, sinu baseos clauso, floralibus basi obsolete crenatis, sepalis obovatis. *Amer. bor.*

asarifolia Cand. 6. C. caule suberecto 1floro, foliis cordato-reniformibus crenatis, sepalis ovalibus. *Ins. Aleut.*

parnassifolia Rafin. 7. C. caule 1floro 1folio, foliis radicalibus cordatis obtusissimis paucidentatis multinerviis, sepalis ellipticis. *Nov. Caesar.* (C. ficarioides Pursh. Ranunculus Ficaria Walt.)

biflora Cand. 8. C. caule 2floro 1folio, foliis radicalibus reniformibus crenatis, sinu baseos latissimo, sepalis oblongis. *Ora occ. Amer. bor.*

*** Sepalis persistentibus*

† quinis.

appendiculata Pers. 9. C. scapo 1floro brevissimo, foliis cuneiformibus 3lobis, lobo medio obovato sub-3fido, sepalis oblongo-lanceolatis. *Ad fretum Magellan.* (C. paradoxa Furl. Forst.)

†† pluribus.

sagittata Cav. 10. C. scapo 1floro, foliis sagittatis undulato-crenatis, auriculis sursum inflexis, stylis numerosis. *Ins. Falkland. Patagon.*

leptosepala Cand. 11. C. caule 1-2floro 1folio, foliis radicalibus cordato-ovatis crenatis multinerviis, sepalis 10 linearibus acutis. *Ora occid. Amer. bor.* 60° lat. bor.

† *glacialis* * 12. C. scapo 1floro, foliis ovatis obtusis subcrenatis, sepalis externis 5, internis sub-12nis oblongo-linearibus petaloideis. *Davuria.* (Ficaria glacialis Fisch. Cand.)

† *camtschatica* * 13. C. scapo 1floro, foliis ovatis integerrimis sub-3nerviis, sepalis externis 5, internis deciduis, germinibus 1spermis. *Camtschatca.* (Ranunculus camtschaticus Cand.)

2043. ANEMONE.

1. *Hepaticae* Dill. Cand. *Involucrum 3phyllum flori proximum calycem mentiens. Herbae acaules.*

integrifolia Humb. 1. A. foliis ovatis integerrimis subtus lanatis, petiolis scapisque villosissimis. *Mexico.*

Hepatica 2. A. foliis 3lobis, lobis ovatis obtusiusculis, petiolis scapisque villosis. *Europ. Amer. bor.* (Hepatica 3loba Cand. . H. americana Ker. et acutiloba Cand. varr.)

† *angulosa* Lam. 3. A. foliis palmato-angulatis dentatis venosis, petiolis scapisque villosis. *Patria? Nov. Caesar.?* (A. pedata Rafin.?)

2. *Stephanomata. Involucra remota foliacea multifida: pedunculi subsolitarii uniflori: Caryopses lanatae, villosae.*

** Radice tuberosa.*

palmata 4. A. foliis cordatis lobatis dentatis, involucro sessili 3fido, sepalis oblongis obtusis. *Europ. austr. Afric. bor.*

ſtellata Lam. 5. A. foliis radicalibus cordato-orbiculatis 3-5partitis, laciniis cuneatis inciſis mucronato-dentatis, involucro inciſo, ſepalis obtuſiusculis. *Italia. Gallia. Aſia minor.* (A. hortenſis L.)

coronaria 6. A. foliis radicalibus ternato-decompoſitis, laciniis lanceolatis obtuſiusculis inciſis mucronato-dentatis, involucro multifido ſeſſili vaginante. *Europ. auſtr. Aſia minor.*

puſilla Cand. 7. A. foliis radicalibus ternato-decompoſitis, laciniis linearibus acutis, involucro ſeſſili apice inciſo. *Cyprus.* Labillard.

pavonina Lam. 8. A. foliis radicalibus ternato-3partitis, laciniis cuneatis 3fidis inciſis, involucro ſeſſili ſubintegro, ſepalis lanceolatis acutis. *Aquitania. Gallo-provincia.*

decapetala 9. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis ovatis obtuſis 3lobis, involucro 3partito multifido, laciniis linearibus, ſepalis oblongis obtuſis. *Braſil. Peru. Chili.* (A. 3lobata Juſſ.)

parviflora Mx. 10. A. foliis radicalibus 3partitis, laciniis cuneatis apice truncato-crenatis, involucris ſimilibus, ſepalis ſenis ovali-oblongis. *Amer. bor.* (A. cuneifolia Juſſ.)

caroliniana Walt. 11. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis 3fidis acute dentatis, involucro 3partito, laciniis inciſis, petalis 12-15 linearibus. *Carolina. Ad fl. Miſſuri.* (A. tenella Pursh.)

triternata Vahl. 12. A. foliis radicalibus 3ternatis, foliolis ovatis 3dentatis, involucro multifido, laciniis lineari-ſetaceis, ſepalis 10-12 oblongis obtuſis. *Monte Video.* (A. fumariaefolia Juſſ.)

biflora Cand. 13. A. foliis radicalibus ternatis, laciniis linearibus obtuſis inciſis, involucro ſeſſili multipartito, pedunculis geminis. *Perſia?* Mx.

formoſa Clark. 14. A. foliis radicalibus craſſis 3partitis ſubrotundis flabelliformibus ſub-3lobis acute dentatis, involucro 3partito, laciniis lanceolatis, ſepalis late ovatis. *Aſia minor.*

apennina 15. A. foliis ſub-3ternatis hirſutiusculis, foliolis oblongis inciſo-dentatis, involucri foliis ternis ternatis petiolatis. *Anglia. Italia. Graecia. Caucaſ.*

** *Radice ſublignoſa.*

coerulea Cand. 16. A. foliis involucri ternis palmato-5fidis, laciniis lineari-lanceolatis inciſo-dentatis, ſepalis 5 ovalibus. *Sibir.* (A. uralenſis Fiſch.)

baldenſis 17. A. foliis 2ternatis, foliolis abbreviatis cuneatis 3-5fidis, involucri foliis ternis multifidis, petiolis late vaginantibus, caule lanato, ſepalis 10 ovalibus. *Alp. Europ. med.* (A. alpina Scop., fragifera Jacq.)

nemoroſa 18. A. foliis ternatis, foliolis 3fidis lanceolatis inciſo-dentatis, involucri foliis ternis petiolatis ſimilibus, ſepalis 6 ellipticis, fructibus villoſis.

Europ. Asia et Amer. bor. (A. 5folia L. var. americana. A. Fischeriana Cand. var. sibirica.)

isopyroides Juss. 19. A. foliis 2ternatis, foliolis cuneatis inciso-3dentatis, involucri foliis petiolatis 3partitis, laciniis lateralibus 2fidis, media 3fida, sepalis 5 oblongis. *Sibir.* Ex Imao (Altai) misit Ledebour nomine A. reflexae.

trifolia 20. A. foliis omnibus petiolatis ternis ternatis, foliolis indivisis ovato-lanceolatis acutis dentatis, sepalis 5 ellipticis obtusis. *Europ. med. Amer. bor.* (A. lancifolia Pursh.)

minima Cand. 21. A. foliis involucri petiolatis 3partitis, laciniis ovatis acuminatis extus et ad apicem serratis, sepalis 5 oblongis obtusis. *Virginia.*

reflexa Steph. W. 22. A. foliis omnibus petiolatis ternis ternatis, foliolis indivisis lanceolatis basi cuneatis inciso-serratis, sepalis linearibus obtusis reflexis. *Sibir.*

ranunculoides 23. A. caule subbifloro, foliis involucri ternis subpetiolatis 3partito-ternatis, foliolis lanceolatis inaequaliter serratis, sepalis 5, fructibus glabris. *Europ. Sibir.*

Commersoniana Rich. 24. A. foliis omnibus 3partitis, laciniis multifidis, involucri oppositis petiolatis cauleque villosis, sepalis 8. *Ad fret. Magell.* (A. multifida γ. Cand.)

*** *Radice fibroso-fasciculata.*

sylvestris 25. A. foliis omnibus petiolatis ternatis sub-5partitis subtus hirsutis, laciniis lanceolatis inciso-serratis, sepalis 6 ellipticis. *Europ. Asia boreal.* (Al. alba Juss. ochotensis Fisch.)

sibirica 26. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis palmatis incisis ciliatis, involucro 3partito, laciniis lanceolatis, sepalis 6 subrotundis, germinibus glabris. *Sibir. or.*

3. *Diplocalymmata: involucrum universale triflorum, partialia 2 uniflora, pedunculus ergo medius nudus praecocius florens, laterales iterum involucrati: caryopses lanatae vel glabrae.*

virginiana 27. A. foliis involucri univ. ternis ternatis petiolatis, foliolis late ovatis lateralibus 2partitis, medio 3fido, sepalis 5 ellipticis, fructibus lanatis. *Amer. bor.*

pensylvanica 28. A. foliis involucri univ. ternis sessilibus amplis cuneatis 3fidis, laciniis inciso-serratis, sepalis obovatis, fructibus villosis. *Amer. bor. Sibir.* (A. irregularis Lam., aconitifolia Mx.)

dichotoma 29. A. caule superne 2fido, foliis omnibus oppositis amplexicaulibus 3fidis inciso-serratis, sepalis 5 ellipticis, fructibus glabris. *Sibir. Canada.*

mexicana Humb. 30. A. foliis radicalibus ternatis, foliolis rhomboideo-ovatis 3fidis crenato-serratis, involucri oppositis sessilibus inciso-dentatis, sepalis 5, germinibus pubescentibus. *Mexico.*

rivularis Buchan. 31. A. foliis omnibus 5partitis, laciniis radicalium ovatis inciſo-dentatis, dentibus ſubariſtatis, involucri foliis ſeſſilibus, laciniis pinnatifidis. *Nepal.*

vitifolia Buchan. 32. A. foliis involucri petiolatis obtuſe cordatis 5lobis ſubtus albo-tomentoſis, involucris partialibus 3foliis 3floris, germinibus glabris. *Nepal.*

helleborifolia Cand. 33. A. foliis radicalibus digitato-pedatis ſubcoriaceis glabris, foliolis cuneatis 3fidis ſerratis, involucri utriusque foliis ternis 3fidis ſerratis, germinibus glabris. *Chili?* Dombey.

multifida Poir. 34. A. foliis radicalibus bis vel ter 3partitis, lacinulis 3fidis cuneatis, involucrorum foliis ternis breviter petiolatis multifidis, ſepalis obtuſis. *Ad fretum Magellan.*

4. *Petaſodes: pedunculi umbellati uniflori: fructus glaberrimi.*

narciſſiflora 35. A. foliis radicalibus palmato-digitatis ſubpedatis, laciniis ſub-3fidis, involucri foliis ſeſſilibus cuneatis 3-5fidis, pedunculis ſubnumeroſis. *Alp. Europ. Sibir. et Amer. bor.*

umbellata 36. A. foliis radicalibus 3partitis, laciniis 3fidis integerrimis, involucri foliis 3partitis, pedunculis paucis. *Aſia minor.* (A. faſciculata Vahl.)

2044. PULSATILLA Tourn.

(Involucrum uniflorum.)

alpina Arbr. 1. P. involucro 3phyllo foliisque ternatis ſupradecompoſitis villoſis, laciniis pinnatifidis inciſo-ſerratis, ſepalis 6 patulis. *Alp. Europ. med.* (Anemone alpina et ſulfurea L., apiifolia Scop. W., millefoliata Bertol.)

Nuttalliana * 2. P. involucro 3phyllo foliisque ternato-palmatis multifidis ſericeo-villoſis, laciniis linearibus elongatis, flore erecto, ſepalis 6 erecto-conniventibus. *Louiſiana. Ad fl. Columbiam orae occ. Amer. bor.* (Clematis hirſutiſſima Pursh. Anemone ludoviciana Nutt. Nuttalliana Cand.)

davurica * 3. P. foliis ternatis, foliolis ternis, lateralibus ſeſſilibus inaequaliter 3fidis, terminali petiolato 3partito, laciniis linearibus acutis 2-3fidis, ſepalis 6 erecto-conniventibus. *Davuria.* (Anemone Fiſch. Cand.)

albana * 4. P. foliis 2pinnatifidis, foliolis multipartitis, laciniis oblongo-linearibus, pedunculo involucrum aequante, ſepalis erectis apice ſubreflexis. *Caucaſ.* (Anemone Stev.)

pratenſis Mill. W. 5. P. foliis 2pinnatis hirſutiſſimis, foliolis multipartitis, laciniis linearibus inciſo-dentatis, flore pendulo, ſepalis 6 apice reflexis. *Europ.* (Anemone pratenſis L., ſylveſtris Vill.)

vulgaris Mill. W. 6. P. foliis 2pinnatis hirſutis, foliolis multipartitis, laciniis linearibus ſubintegerrimis, flore ſubnu-

tante, ſepalis 6 erecto-patulis. *Europ. Sibir.* (Anemone Pulſatilla L., rubra Lam., intermedia Hopp. Schult.)

patens Mill. W. 7. P. foliis ſerotinis ternato-digitatis rigidiuſculis, foliolis latiuſculis 3fidis, flore erecto patente. *Europ. Sibir.* (Anemone L.)

Halleri W. 8. P. foliis pinnatis ſericeo-villoſiſſimis, foliolis 3partitis, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis, flore erectiuſculo. *Alp. Europ. auſtr.* (Anemone All. Vill.)

vernalis Mill. W. 9. P. involucro multifido villoſiſſimo, laciniis linearibus integerrimis, foliis pinnatis ſubhirſutis, foliolis ſeſſilibus ovato-oblongis obtuſe dentatis, flore erecto patente. *Europ.* (Anemone vernalis L., ſulfurea All.)

cernua * 10. P. involucro villoſo, laciniis elongatis, foliis pinnatis ſubtomentoſis, foliolis pinnatifidis, laciniis oblongis inciſis, flore ſubcernuo. *Japon.* (Anemone Thunb.)

africana Herm. 11. P. involucro flori proximo, foliis ternatis rigidis glabris, foliolis ovato-acuminatis inciſo-dentatis baſi cuneatis, ſepalis numeroſis. *C. B. S.* (Atragene capenſis L. Clematis Poir.)

tenuifolia * 12. P. involucro 3phyllo 2floro, foliolis oblongis inciſis villoſis, foliis radicalibus 3ternatis rigidis glabris, foliolis multipartitis, laciniis lineari-filiformibus, ſepalis 7-9 oblongis obtuſis. *C. B. S.* (Atragene L. fil. Clematis Poir. Anemone Cand.)

2045. CLEMATIS.

* *Pedunculis unifloris,*

† *involucratis, involucro bifido.*

cirrhoſa 1. Cl. ſcandens, foliis ſempervirentibus ſimplicibus ternatisque ovato-oblongis obtuſis crenatis, ſepalis extus ſericeo-villoſis. *Hiſpan. Sicil. Graec. Aſia minor. Afric. bor.* (Atragene cirrhoſa et Cl. balearica Perſ.)

ſemitriloba Lag. 2. Cl. ſcandens, foliis ſimplicibus cordatis ſub-3lobis profunde ſerratis, ſepalis extus tomentoſis. *Hiſpania. Corſica.* (Cl. polymorpha α. Viv.)

balearica Rich. 3. Cl. ſcandens, foliis ſempervirentibus ternatis profunde inciſis, medio 3partito, ſepalis extus pubeſcentibus intus maculatis. *Minorca. Corſica.* (Cl. calycina Ait. Atragene Perſ. Cl. polymorpha γ. Viv.)

nepalenſis Cand. 4. Cl. ſcandens, foliis ternatis, foliolis oblongis acuminatis baſi ſubdentatis, lateralibus ſubſeſſilibus, terminali baſi 3nervio, ſepalis extus villoſis. *Emodi montes.*

†† *Pedunculis nudis.*

α. *Foliis ſimplicibus, caule herbaceo erecto.*

integrifolia 5. Cl. foliis ovato-oblongis acutiusculis nervoſis ciliatis, floribus nutantibus coriaceis. *Europ. med. auſtr. Caucaſ. Sibir.*

ochroleuca Ait. 6. Cl. foliis ovatis obtuſis, junioribus ſericeis, floribus ſuberectis. *Amer. bor.* (Cl. ſericea Mx.)

ovata Pursh. 7. Cl. foliis ovatis acutis glabris utrinque venoſo-reticulatis, infimis ſubcordatis. *Carolina.*

gentianoides Cand. 8. Cl. foliis ovatis acutis coriaceis glabris baſi 3nerviis apice ſubdentatis, floribus erectis dioecis, ſepalis membranaceis. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

β. *Foliis ternatis: ſcandentes.*

αα. *Fructibus caudatis plumoſis.*

montana Buchan. 9. Cl. foliis faſciculatis, foliolis oblongis utrinque attenuatis ſerratis pubeſcentibus, ſepalis obovatis. *Emodi montes.*

comoſa Cand. 10. Cl. foliis villoſis, foliolis oblongis acuminatis 3nerviis integerrimis, pedunculis axillaribus ſuperne confertis. *Ind. or.*

japonica Thb. 11. Cl. foliis villoſis oblongis acuminatis aequaliter ſerratis, ſepalis conniventibus. *Japon.*

diverſifolia Cand. 12. Cl. foliis glabris ternato-3partitis integrisque, foliolis lanceolatis acutis integerrimis, lateralibus confluentibus, medio petiolato, floribus erectis, ſepalis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Patria?*

Pluknetii Cand. 13. Cl. foliis glabris, foliolis obovatis obtuſis mucronatis integerrimis, floribus erectis dioecis. *Florida?*

davurica Perſ. 14. Cl. foliis glabris, foliolis ovatis baſi obliquis mucronatis integerrimis, floribus nutantibus ☿. *Davuria.*

javana Cand. 15. Cl. pedunculis ſub-1floris, foliis pubeſcentibus ſubbiternatis, foliolis ſubcordato-lanceolatis acuminatis ſubdentatis integris 3fidisve. *Java.*

havanenſis Humb. 16. Cl. pedunculis ſub-1floris, foliis pubeſcentibus, foliolis ovato-oblongis acuminatis groſſe ſerratis. *Cuba.*

Noronhiana Cand. 17. Cl. pedunculis ſub-1floris, foliis piloſis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis 3nerviis, ſepalis villoſis. *Java.*

ββ. *Cauda fructuum abbreviata nuda.*

Viticella 18. Cl. foliis integris ternatis 2ternatisque, foliolis ellipticis mucronatis integerrimis, pedunculis nutantibus, ſepalis obovatis patentibus. *Europ. med. et auſtr. Aſia minor.* (Cl. baccata Perſ.)

criſpa 19. Cl. foliis integris 3lobis ternatisque glabris ovali-lanceolatis acutiſſimis, ſepalis undulato-criſpis apice reflexis. *Amer. bor.*

florida Thb. 20. Cl. foliis ternato-decompofitis, foliolis ovatis acutis integerrimis, fepalis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Japon.*

campaniflora Brot. 21. Cl. foliis 2ternato-decompofitis, foliolis integris 3lobisque ovato-lanceolatis, fepalis undulatis apice dilatatis. *Lufitan.*

parviflora Cand. 22. Cl. foliis ternato-decompofitis, foliolis integris 3partitisque ovatis mucronatis integerrimis, fepalis ellipticis apice fubdilatatis. *Patria?*

γ. *Foliis pinnatis aut decompofitis; fcandentes f. erectae.*

leariloba Cand. 23. Cl. foliis ternato-2pinnatis, foliolis linearibus elongatis acuminatis glabris, flore erecto, fepalis lanceolatis acutis margine lanatis. *Carolin. auftr.*

anguftifolia Jacq. 24. Cl. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis integris 3fidisque, fepalis obtufis margine lanatis. *Carniolia. Sibir.* (Cl. fibirica Lam., hexapetala Pall.)

Walteri Pursh. 25. Cl. foliis pinnatis, foliolis divaricatis lineari-lanceolatis acutis integerrimis fubtus glaucis. *Carolina.*

clitorioides Cand. 26. Cl. foliis pinnato-ternatis glabris, foliolis oblongis acutis integerrimis, fepalis acutis glabris. *Nov. Holl.*

reticulata Walt. 27. Cl. foliis pinnatis coriaceis reticulato-venofis glabris, foliolis ovalibus obtufis integris 3lobisque, fepalis conniventibus. *Carolin.*

cylindrica Sims. 28. Cl. foliis pinnatis fubbijugis glabris, foliolis ovato-oblongis acutis integerrimis, floribus cernuis, fepalis acuminatis apice reflexis. *Amer. bor.* (Cl. crifpa Lam. Viorna Andr. divaricata Jacq.)

villofa Cand. 29. Cl. foliis pinnatis villofis, foliolis oblongis apice obtufe dentatis, medio 3fido, caule erecto villofo. *Ind. or.?*

fcabiofaefolia Cand. 30. Cl. foliis pinnatis pubefcentibus, foliolis 3partitis incifis, laciniis oblongis acutis bafi attenuatis, caule erecto villofiufculo. *Ind. or.?*

Viorna 31. Cl. foliis 2pinnatis glabris, foliolis ternatis ovatis integris 2-3fidisque, floribus nutantibus conniventibus. *Virgin. Carolin.*

** *Pedunculis paucifloris.*

chinenfis Retz. 32. Cl. foliis pinnatis 2jugis, foliolis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis oppofitis 3-5floris, floribus parvis, caule 4gono debili. *China.* Bladh.

terniflora Cand. 33. Cl. foliis pinnatis fub-3jugis, foliolis ovatis obtufis mucronatis integerrimis, pedunculis 3floris. *China.*

grewiaeflora Cand. 34. Cl. foliis pinnatis 2jugis utrinque villofis, foliolis cordatis acutis ferratis reticulato-venofis, pedunculis oppofitis folio brevioribus 3floris brac-

teatis, ſepalis oblongis erectis extus villoſis. *Nepal.*

peruviana Cand. 35. Cl. foliis 2pinnatis villoſis, foliolis cordato-ovatis ſub-3fido-inciſis, pedunculis folio longioribus paucifloris bracteoſis, floribus polygamis patentiſſimis. *Peru.*

montevidenſis * 36. Cl. foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis divaricatis ovato-lanceolatis acuminatis 3fidis, pedunculis paucifloris patentiſſimis folia aequantibus, ſepalis patentibus lanceolatis villoſis. *Monte Video.* Sello.

dominica Lam. 37. Cl. foliis ternatis coriaceis ſubtus pubeſcentibus, foliolis ſubcordato-ovatis ſubintegerrimis, pedunculis 3floris folio longioribus, floribus parvis patentibus extus ferrugineis. *Hiſpaniola. Cuba.* (Atragene polygama Jacq.)

brachiata Ker. 38. Cl. foliis quinato-pinnatis ſupra nitidis, foliolis ovato-oblongis ſubdentatis, pedunculis paucifloris, floribus nutantibus patentiſſimis. *C. B. S.* Niven.

grandiflora Cand. 39. Cl. foliis pinnatis glabris ſubcoriaceis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus venoſo-reticulatis nervoſis, pedunculis 3floris folio brevioribus, floribus maximis villoſis. *Sierra Leone.* Afzel.

Lechenaultiana Cand. 40. Cl. foliis ternatis ſericeis, foliolis ovato-lanceolatis ſerratis 5nerviis, pedunculis 3floris folio brevioribus. *Java.*

mauritiana Lam. 41. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis cordato-ovatis acutis mucronato-ſerratis, pedunculis 3floris folia ſubaequantibus, ſepalis ellipticis mucronatis nervoſis. *Inſ. Mascaren. Madagascar.*

*** *Pedunculis multifloris corymboſo-paniculatis.*

† *Floribus hermaphroditis.*

erecta 42. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erectiusculo, floribus umbellato-paniculatis. *Europ. med. Sibir.* (Cl. corymboſa Poir.)

Flammula 43. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovali-oblongis obtuſiusculis integris 3lobisque, caule ſcandente. *Europ. auſtr. Caucaſ. Afric. bor.* (Cl. maritima L.? Lam., fragrans Tenor., rubella Perſ.)

Maſſoniana Cand. 44. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis inciſo-dentatis ſublobatis glauceſcentibus, panicula trichotoma ampla. *Afric. auſtr.*

orientalis 45. Cl. foliis pinnatis glabris glaucis, foliolis lanceolatis acutis 3fido-dentatis baſi cuneatis, pedunculis bis 3fidis, ſepalis patulis intus villoſis. *Aſia minor. Caucaſ.*

glauca W. 46. Cl. foliis ternato-pinnatis glaucis, foliolis ovatis obtuſis mucronatis ſublobatis, pedunculis bis 3fidis, ſepalis intus glabris margine tomentoſis. *Sibir. auſtr.*

paniculata Thb. 47. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis acutiusculis integerrimis 3-5nerviis, floribus corymboſo-paniculatis, ſepalis lanceolatis obtuſiuſculis nervoſis, germinibus villoſiſſimis breviſſime caudatis. *Japon.* (Ex horto kew. 1790.)

triloba Roth. 48. Cl. foliis ternatis pubeſcentibus, foliolis ovato-acuminatis integerrimis ſub-3fidis, petiolis pedunculisque corymboſis tomentoſis, floribus patentibus extus ſericeis. *Ind. or.*

minor Lour. 49. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis obtuſiuſculis 3nerviis integerrimis, pedunculis axillaribus multifloris, floribus minimis 4gynis. *China auſtr.*

brevicaudata Cand. 50. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis groſſe ſerratis, pedunculis patentibus folio brevioribus conferte paniculatis. *China bor.*

heracleifolia Cand. 51. Cl. foliis pinnatis coriaceis glabris, foliolis ovato-lanceolatis inciſis mucronato-dentatis, ultimis 3lobis, pedunculis erectis cinereo-villoſis. *China bor.*

gouriana Roxb. 52. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis cordato-ovatis acuminatis ſubdentatis, pedunculis trichotomo-paniculatis pubeſcentibus folio ſublongioribus. *Ind. or.*

Vitalba 53. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ſubcordato-ovatis acuminatis inciſo-dentatis, pedunculis multifloris folia aequantibus. *Europ. med. et auſtr. Aſia minor.*

Buchanani Cand. 54. Cl. foliis pinnatis ſubtus villoſis, foliolis ſubcordatis crenatis, pedunculis multifloris folia aequantibus. *Nepal.*

connata Cand. 55. Cl. foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis groſſe ſerratis, petiolis baſi dilatatis connatis. *Nepal.*

† *loaſaefolia* Cand. 56. Cl. foliis utrinque villoſiſſimis, inferioribus cordatis palmatis, ſuperioribus ternatis, foliolis ſubcordatis 3fidis. *Nepal.*

† *indiviſa* W. 57. Cl. foliis ternatis coriaceis glabris, foliolis ovatis mucronatis integerrimis, pedunculis axillaribus paniculatis. *Nov. Zeeland.* (Cl. integrifolia Forſt.)

hedyſarifolia Cand. 58. Cl. foliis ternatis coriaceis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis baſi attenuatis 3nerviis, panicula elongata pendula trichotoma. *India transganget.*

acuminata Cand. 59. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis longe acuminatis medio ſubſerratis 3-5nerviis glabris, pedunculis trichotomo-paniculatis. *Nepal.*

apiifolia Cand. 60. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis inciſo-dentatis ſubtus nervoſis, pedunculis paniculatis folia aequantibus, floribus 6gynis. *Japon.*

biternata Cand. 61. Cl. foliis 2ternatis glabris, foliolis ſubcordatis acutis, pedunculis 3fidis corymboſis folio brevio-

ribus, floribus 6gynis. *Japon. Cochinchina. Timor.* (Cl. virginica Thunb., virginiana Lour.)

† *trifoliata* Thb. 62. Cl. foliis ternato-decompofitis glabris, foliolis ovatis obtufis repando-dentatis. *Japon.*

†† *Floribus dioecis.*

dioeca 63. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis fubcordato-ovatis acuminatis triplinerviis integerrimis. *Ind. occ.* (Cl. glabra Cand.)

brafiliana Cand. 64. Cl. foliis fimplicibus ternatis pinnatisque pubefcentibus, foliolis ovatis acutis 5nerviis fubdentatis, caule tereti, ftaminibus fepala aequantibus. *Brafil.*

virginiana 65. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis fubcordato-ovatis incifo-dentatis lobatisque, corymbis dichotomis paucifloris, ftaminibus calyce brevioribus. *Amer. bor.*

Catesbiana Pursh. 66. Cl. foliis 2ternatis fubtus pubefcentibus, foliolis fubcordatis 3lobis, paniculis divaricatis, ftaminibus calyce brevioribus. *Carolin. auftr.*

americana Mill. 67. Cl. foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis cordato-ovatis acuminatis fubintegerrimis 5nerviis, paniculis amplis. *Amer. trop.* (Cl. Guadalupae Perf.)

Loureirii Cand. 68. Cl. foliis ternatis, foliolis ovatis acutis integerrimis 5nerviis, paniculis axillaribus, fructibus 3gonis. *Cochinchina.* (Cl. dioeca Lour.)

fericea Humb. 69. Cl. foliis ternato-pinnatis pubefcentibus fubtus fericeis, foliolis fubovatis acuminatis groffe ferratis fubtus fericeo-villofis, floribus umbellato-racemofis. *Quito.*

holofericea Pursh. 70. Cl. foliis ternatis utrinque holofericeis, foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis, corymbis dichotomis paucifloris, fepalis linearibus ftamina fuperantibus. *Carolina.*

bonarienfis Juff. Cand. 71. Cl. foliis ternatis glabriusculis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis paniculatis pubefcentibus petiolo brevioribus, floribus polygamis. *Buenos Ayres.*

glycinoides Cand. 72. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis bafi 3nerviis, pedunculis folio brevioribus, ftaminibus calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

hexafepala Cand. 73. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis cordato-ovatis crenatis venofo-reticulatis, pedunculis paniculatis folia fuperantibus, floribus 6fepalis. *Nov. Zeeland.* (Cl. hexapetala Forft.)

coriacea Cand. 74. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis cordato-ovatis incifo-crenatis, pedunculis corymbofo-paniculatis folio brevioribus, floribus 4fepalis. *Nov. Holl.*

ftenofepala R. Br. 75. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis cordatis acuminatis 3nerviis fubdentatis, pedunculis trichotomis, fepalis linearibus obtufis, fructibus pubefcentibus. *Nov. Holl.*

microphylla Cand. 76. Cl. foliis ternatis glabris coriaceis, foliolis obovato-oblongis integerrimis 1nerviis, fructibus glabris. *Inſ. ad Nov. Holl.*

ariſtata R. Br. 77. Cl. foliis ternatis, foliolis ſubcordato-ovatis acutis groſſe dentatis 3nerviis, ſepalis oblongis, antheris apice ariſtatis. *Nov. Holl.*

cordata Pursh. 78. Cl. foliis pinnatis 2jugis, foliolis cordatis acuminatis lobatis inciſo-dentatis, dentibus mucronatis, racemis compoſitis elongatis multifloris, ſepalis ſtamina aequantibus. *Virginia.*

caripenſis Kunth. 79. Cl. foliis pinnatis 2jugis pubeſcentibus, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, floribus paniculatis ſericeis. *Cumana.* (Cl. caracaſana Bonpl. Cand. ſyſt.)

2046. THALICTRUM.

1. *Genuina; foliis decompoſitis, radice fibroſa vel repente, ſepalis anguſtis deciduis.*

* *Fructibus triquetris ſtipitatis.*

aquilegifolium 1. Th. foliolis obtuſe lobatis glabris, petiolis baſi ſtipulatis, floribus corymboſo-paniculatis erectis, fructibus alatis pendulis. *Europ. Sibir.* (Th. atropurpureum Jacq. formoſum Sims.)

Chelidonii Cand. 2. Th. petiolis exſtipulatis, foliorum axillis gemmiferis, floribus laxe paniculatis, fructibus pendulis. *Nepal.*

contortum 3. Th. foliolis parvis ſubrotundis obtuſis 3lobis glaucis, petiolis exſtipulatis, caule ſubancipiti, floribus erectis, fructibus pendulis. *Sibir. or.*

** *Fructibus inflatis ſtipitatis, floribus polygamis.*

clavatum Cand. 4. Th. foliolis ſubcordato-ſubrotundis obtuſe lobatis ſubtus glaucis, petiolis exſtipulatis, ſepalis ſubrotundis ſtamina ſubſuperantibus, filamentis clavatis, fructibus compreſſis mucronatis. *Amer. bor.* Michaux.

podocarpon Humb. 5. Th. foliolis ſubcordato-ſubrotundis glabris ſubtus glaucis dentato-lobatis, petiolis exſtipulatis, paniculae ramis divaricatis, antheris elongatis apice ariſtatis, fructibus ſtriatis cuſpidatis. *Nov. Granat.*

longiſtylum Cand. 6. Th. foliolis cordatis integris dentatisque, venis ſubtus pubeſcentibus, petiolis baſi ſtipulatis, antheris apice ariſtatis ſepala ſuperantibus, ſtylis elongatis filiformibus. *Amer. auſtr.*

mexicanum Cand. 7. Th. foliolis cordato-ſubrotundis lobato-dentatis, antheris longe ariſtatis, ſtylis elongatis. *Mexico.* (Th. peltatum Cand. cordifolium W. herb.)

rytidocarpon Cand. 8. Th. foliolis ſubtus pubeſcentibus, petiolis exſtipulatis, fructibus rugoſis. *Amer. auſtr.*

*** *Fructibus ſolidis oblongis utrinque attenuatis ſtriatis ſeſſilibus.*

† *Floribus dioecis ſ. polygamis.*

corynellum Cand. — 9. Th. foliolis obtuſe 3lobis ſubtus glaucis veniſque pubeſcentibus, panicula terminali, floribus dioecis, filamentis clavatis. *Amer. bor.* (Th. Cornuti L.?)

polygamum Mühlenb. — 10. Th. foliolis obtuſe lobatis ſubtus glabris glaucis, pedunculis terminalibus corymboſis, floribus polygamis, filamentis filiformibus, ſtylis elongatis filiformibus. *Penſylvan.*

revolutum Cand. — 11. Th. foliolis ovatis 3dentatis ſubtus revolutis pubeſcentibus, floribus dioecis, filamentis filiformibus. *Amer. bor.* (Th. pubeſcens Pursh.)

dioecum — 12. Th. foliolis ſubreniformibus groſſe crenatis obtuſe lobatis glabris, ♀ ſubcordatis, ♂ baſi truncatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, floribus dioecis, filamentis filiformibus. *Amer. bor.* (Th. laevigatum Mx.)

carolinianum Boſc. Cand. — 13. Th. foliolis ellipticis integris obtuſeque dentatis ſubtus glaucis glabriuſculis, panicula terminali, floribus dioecis, filamentis filiformibus. *Amer. bor.* (Th. rugoſum Pursh.)

purpuraſcens — 14. Th. foliolis orbiculatis groſſe dentatis glabris ſubtus glaucis, panicula contracta ſubaphylla, floribus monoecis dioeciſque, filamentis filiformibus cauleque coloratis. *Amer. bor.*

† *folioloſum* Cand. — 15. Th. foliolis orbiculatis obtuſe 3dentatis, panicula corymboſa, floribus erectis, filamentis filiformibus, caule tereti laevi. *Nepal.*

†† *Floribus hermaphroditis,*

α. erectis.

petaloideum — 16. Th. foliolis obovatis glabris integris 3lobiſque, caule ſimplici ſuperne nudo, floribus corymboſis, ſepalis rotundatis, filamentis ſubclavatis. *Sibir. auſtr. Mongolia.* (Th. ſtamineum L. ſuppl.)

† *ſaniculaeforme* Cand. — 17. Th. caule teretiuſculo ramoſo, floribus paucis paniculatis, pedunculis rigidis divaricatis, ſepalis reflexis, fructibus ſtylo elongato acuminatis. *Nepal.*

acutilobum Cand. — 18. Th. foliolis parvis ovatis 3-5dentatis acutiuſculis viſcidulo-pubeſcentibus, antheris mucronatis. *Sibir.*

divergens Link. — 19. Th. foliolis ovato-oblongis ſubtus pubeſcentibus obtuſe 3lobis, ramis petioliſque divaricatis, paniculae ramis patentiſſimis. *Sibir.* (Th. divaricatum pug. 1.)

Schweiggeri * — 20. Th. foliolis ovatis ſubcuneatis multifidis acute dentatis, petiolis baſi ſtipulatis, caule ſtricto ſulcato, filamentis capillaribus elongatis, antheris mucronatis. *Patria?*

calabricum * — 21. Th. foliolis ſubrotundis obtuſe lobatis ſubtus glauceſcentibus, panicula ſubracemoſa contracta

terminali, antheris elongatis, fructibus ſulcatis baſi attenuatis ſtylo coronatis. *Calabria. Sicil.*

elatum Jacq. 22. Th. foliolis ſubcordato-ovatis obtuſe dentatis utrinque glabris viridibus, panicula diffuſa, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique roſtratis, caule elato. *Germania. Dania. Hungar.* (Th. majus Wallr.)

ambiguum Schleich. 23. Th. foliolis ſubcordatis acute lobatis dentatisque ſubtus glaucis venoſis, panicula ſtricta ramoſiſſima, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique roſtratis, caule angulato elato. *Helvet.*

ſaxatile Cand. 24. Th. foliolis ſubovatis baſi cuneatis 3fidis acute dentatis ſubtus glaucis, fructibus utrinque attenuatis. *Ital. ſuper. Helvet.*

trigynum Fiſch. 25. Th. foliolis ovato-ſubrotundis acutiusculis integris 3dentatisque ſubtus venoſis, petiolis baſi ſtipulato-auriculatis, panicula ramoſiſſima, antheris apice uncinato-mucronatis, fructibus oblongis apice oblique roſtellatis. *Sibir.*

medium Jacq. 26. Th. foliolis oblongis baſi cuneatis acute 3fidis ſubtus glauceſcentibus, ſummis indiviſis lanceolatis, panicula ſubfolioſa, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique roſtratis. *Europ. med. Tauria. Sibir.* (Th. diffuſum Schrad. concinnum W.)

flavum 27. Th. foliolis ovato-oblongis 3fidis acutis ſubtus glauceſcentibus, petiolis baſi vaginantibus, caule ſulcato, panicula corymboſa, fructibus ovato-ſubrotundis ſubmuticis. *Europ. Sibir.* (Th. vaginatum Desf., nigricans Jacq., rugoſum Poir.)

Bauhini Crantz. 28. Th. foliolis inferioribus lanceolato-linearibus, ſuperioribus linearibus anguſtiſſimis revolutis, ultimo ſeſſili, caule ſimpliciſſimo angulato, panicula congeſta, fructibus ovato-oblongis muticis. *Europ.* (Th. anguſtifolium fl. hal. et al.)

lucidum Jacq. 29. Th. foliolis lanceolatis vel linearibus ſubrevolutis nitidis, ultimo 3partito petiolato, caule ſimplici angulato, panicula patula, fructibus ovato-oblongis roſtratis. *Germania auſtr. Italia. Gallia. Hiſpania.* (Th. anguſtifolium Jacq., laſerpitiifolium W.)

galioides Neſtl. 30. Th. foliis ſubſimpliciter compoſitis, ſuperioribus faſciculatis, foliolis filiformibus, caule ſtricto teretiusculo, panicula ſtricta, fructibus lineari-oblongis muticis. *Alſatia.*

divaricatum W. 31. Th. foliis ſeſſilibus baſi vaginantibus, foliolis linearibus anguſtiſſimis, caule ſtriato ramoſo, ramis divaricatis, panicula diffuſa. *Patria?*

rosmarinifolium Nocett. 32. Th. foliis ſupradecompoſitis, foliolis lanceolatis acutis integerrimis ſupra opacis ſubtus glaucis, panicula diffuſa. *Italia?*

Thunbergii Cand. 33. Th. foliolis ſubcordato-ovatis 3-5fidis glauceſcentibus, caule tereti ramoſo, paniculis axillaribus, fructibus ſubrotundis ſubmuticis. *Japon.* (Th. flavum Thunb.)

34.

ſimplex 34. Th. foliis ſubſimpliciter compoſitis, foliolis oblongo-linearibus obtuſiusculis 3fidis ſubtus glaucefcentibus, caule ſimplici ſubangulato, racemis axillaribus terminalibusque paucifloris, fructibus ovato-oblongis ſulcatis oblique mucronatis. *Scandinavia. Delphinatus. Helvetia. Ital. ſuper.* (Th. tenuifolium Sw.)

cinereum Deſf. 35. Th. foliolis oblongis acute dentatis baſi attenuatis ſubtus venoſo-reticulatis, caule tereti, panicula ramoſiſſima, fructibus acuminatis. *Patria?*

rugoſum Ait. 36. Th. foliolis ſubcordato-oblongis apice ſub-3-dentatis ſupra rugoſis nitidis ſubtus reticulatis glaucis, caule tereti, panicula ſtricta compoſita, fructibus ovato-oblongis ſulcatis mucronatis. *Amer. bor.* (Th. discolor W.)

glaucum Deſf. 37. Th. foliolis ſubcordato-oblongis obtuſe 3dentatis utrinque glaucis, caule tereti glauco-pruinoſo, panicula ſtricta conferta. *Europ. auſtr.* (Th. ſpecioſum Poir.)

denſiflorum Humb. 38. Th. foliis pinnatis glabris, foliolis inferioribus ternatis, ſuperioribus ſimplicibus obovatis 3-5fidis ſubtus glaucefcentibus, floribus capitato-glomeratis. *Mexico.*

β. Floribus cernuis, nutantibus.

alpinum 39. Th. foliolis obovatis obtuſe 3lobis utrinque glaberrimis, caule ſimpliciſſimo humili paucifloro, antheris ariſtatis. *Alp. totius Europ. Sibir. Amer. boreal.*

foetidum 40. Th. foliolis ovatis ſub-3fidis irregulariter obtuſe dentatis cauleque ſimplici viſcido-pubeſcentibus, panicula patente, antheris elongatis cuſpidatis. *Alp. Europ. med. Sibir.* (Th. ſtyloideum L. ſuppl., ſaxatile Vill.)

pubeſcens Cand. 41. Th. foliolis ovatis ſub-3fidis acute dentatis viſcido-ſubpubeſcentibus, caule ſuperne glabro ramoſo, panicula diffuſa, antheris apiculatis. *Alp. grai. pennin. Gall. occ. auſtr.* (Th. Cornuti Poir.)

ſquarroſum Steph. W. 42. Th. foliolis ovatis 3fidis glabris, petiolis baſi dilatatis auriculatis, caule ramoſo, paniculae ramis patentibus, antheris apiculatis, fructibus oblongo-linearibus mucronatis. *Sibir.*

ſibiricum 43. Th. foliolis ſubimbricatis ovatis inciſo-dentatis glabris, radice repente, caule aſcendente, antheris elongatis apiculatis, fructibus ovatis mucronatis. *Sibir.*

minus 44. Th. foliolis ſubcordato-ſubrotundis 3fidis dentatis ſubtus glaucis, caule flexuoſo pruinoſo, panicula diffuſa, fructibus oblongis utrinque contractis. *Europ. Sibir.*

majus Jacq. 45. Th. foliolis ſubcordato-late ovatis 3fidis ſubtus glaucis, caule glabro elato, panicula diffuſa folioſa, antheris cuſpidatis, fructibus ovato-oblongis oblique mucronatis. *German. med. et auſtr. Anglia. Gallia.*

nutans Desf. 46. Th. foliolis ſubcuneatis 3fidis ſubtus glaucis, dentibus acuminatis, foliolis ſummis cuſpidatis, panicula diffuſa, fructibus ovato-oblongis muticis. *Alp. pennin.* (Th. acuminatum pug. 2.)

glauceſcens Cand. 47. Th. foliolis ovatis 3dentatis cauleque ſtricto glaucis, petiolis baſi ſtipulatis, panicula laxa elongata, fructibus ovatis mucronatis. *Ruſſia?*

2. *Deſciſcentia.*

* *Sepalis petaloideis ſtamina ſuperantibus, foliis compoſitis, radice tuberoſa.*

tuberoſum 48. Th. foliolis ſubrotundis obtuſis 3lobis glabris, petiolis baſi alatis, floribus corymboſo-umbellatis, ſepalis oblongis. *Hiſpania.*

anemonoides Mx. 49. Th. foliis radicalibus 2ternatis, foliolis ſubrotundis obtuſe 3dentatis, floralibus verticillatis petiolatis ſimplicibus majoribus ſubcordatis, caule ſimplici debili, floribus umbellatis, fructibus linearibus oblique mucronatis. *Amer. bor.* (Anemone thalictroides L.)

** *Foliis ſimplicibus.*

† *carolinianum* Walt. 50. Th. foliis radicalibus palmatis longe petiolatis, ſcapo 1floro, ſepalis 5, radice tuberoſa. *Carolina.* (Anemone Walteri Pursh.)

palmatum Walt. Mühlb. 51. Th. foliis 5lobis ſerratis, floribus corymboſis, filamentis clavatis. *Carolina.* (Th. ranunculinum W.)

rotundifolium Cand. 52. Th. foliis radicalibus petiolatis reniformi-orbiculatis ſinuato-crenatis multinerviis, ſcapo ſuperne ramoſo corymboſo, fructibus oblongis mucronatis. *Nepal.*

2047. GYROSTEMON Desf.

ramuloſus Desf. 1. G. foliis linearibus. *Nov. Holl. occ.*
cotinifolius Desf. 2. G. foliis obovatis. *Nov. Holl. occ.*

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Labiatae: Cor. 2labiata, germina 4 gynobaſi inſerta ſtyli lateribus affixa. Caryopſes 2-4, vel nuculae.

1. *Calyx 2-labiatus.*

2048. *Lumnitzera* Jacq. Cal. $\frac{1}{4}$, lab. ſuper. ovato incumbente. Cor. $\frac{3,4}{1}$. Stam. declinata edentula.

2049. *Ocimum.* Cal. $\frac{1}{4}$, lab. ſuper. ſubrotundo incumbente. Cor. $\frac{4}{1}$, lab. infer. majore porrecto. Stam. declinata, interiora baſi proceſſu inſtructa.

2050. *Plectranthus* Herit. Cal. $\frac{1}{3,4}$, fructifer baſi gibbus. Cor. $\frac{3,4}{1}$, lab. infer. integro porrecto ſubconcavo. Stam. declinata edentula.

2051. *Prunella.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. ſuper. plano incumbente. Cor. $\frac{1}{3}$. Filamenta aſcendentia apice bidentata. Antherae didymae.

2052. *Meliſſa.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. ſuper. planiuſculo. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. fornicato 2fido ſ. emarginato. Stam. aſcendentia.

2053. *Dracocephalum.* Cal. $\frac{3}{2}$ ſ. 5dentatus. Cor. faux inflata.

2054. *Praſium.* Cal. $\frac{3}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſuper. emarginato, inferioris lobo medio maximo. Caryopſes drupaceae.

2055. *Phryma.* Cal. $\frac{3}{2}$, fructifer reflexus, dentibus lab. ſup. elongatis ſetaceis. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſuper. abbreviato, inf. porrecto. Caryopſis ſolitaria.

2056. *Cleonia.* Cal. $\frac{3}{2}$, lab. ſuper. planiuſculo. Cor. $\frac{2}{3}$, labii inferioris lobo medio emarginato. Filamenta apice bifurca. Stigma 4fidum. Caryopſes 4.

2057. *Trichoſtemma.* Cal. $\frac{2}{3}$, lab. infer. duplo majori. Cor. $\frac{4}{1}$, lab. infer. falcato. Filamenta longiſſima incurva.

2058. *Thymus.* Cal. $\frac{3}{2}$, fauce villis clauſa. Cor. $\frac{2}{3}$. Stam. aſcendentia.

2059. *Gardoquia* R. et P. Cal. $\frac{3}{2}$, fauce nuda. Cor. $\frac{2}{3}$. Stam. diſtantia.

2060. *Thymbra.* Cal. $\frac{3}{2}$. Cor. $\frac{2}{3}$, lobis ſubaequalibus. Stylus bifidus.

2061. *Lepechinia* W. Cal. $\frac{3}{2}$. Cor. $\frac{2}{3}$ calyci aequalis. Stam. diſtantia.

2062. *Clinopodium*. Cal. $\frac{3}{2}$, dentibus ariſtatis, involucris ſetaceis. Cor. $\frac{2}{3}$, lab. ſuper. obcordato.
2063. *Melittis*. Cal. $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$. Antherae 2loculares, loculis ſuperiorum ſuper, inferiorum juxta ſe poſitis.
2064. *Scutellaria*. Cal. labia indiviſa, fructiferi clauſa, ſuperius operculatum. Cor. ſubperſonata.
2065. *Chilodia* R. Br. Cal. 2bracteatus $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$, lobo medio labii inf. emarginato.
2066. *Proſtanthera* Labill. Cal. labia indiviſa, fructiferi clauſa. Cor. $\frac{2}{3}$, lab. inf. expanſo, lobo medio 2lobo. Stam. declinata. Antherae calcaratae.
2067. *Cryphia* R. Br. Cal. 2bracteatus, labiis indiviſis, fructifer clauſus. Cor. incluſa $\frac{1}{3}$, lab. ſup. breviſſimo. Antherae muticae.
2068. *Perilomia* Kunth Cal labiis indiviſis, dorſo gibberoſo, fructifer clauſus. Cor. tubo arcuato, $\frac{2}{3}$. Antherae didymae. Caryopſes alatae.
2069. *Hemiandra* R. Br. Cal. $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{2}{3}$, labii inf. lobo medio bilobo. Stam. aſcendentia, antheris didymis, loculo altero caſſo.
2070. *Synandra* Nutt. Cal. $\frac{2}{2}$. Cor. $\frac{1}{3}$, fauce inflata. Filamenta tomentoſa, antherae ſuperiores loculis ſuperioribus caſſis cohaerentes.

2. *Calyx aequalis.*

2071. *Aiuga*. Cal. 5fidus. Cor. lab. ſup. minimum emarginatum. Stam. exſerta aſcendentia. Antherae 1loculares. Caryopſes reticulatae.
2072. *Aniſomeles* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. minori integro. Stam. exſerta aſcendentia. Antherae 2loculares. Caryopſes laeves.
2073. *Teucrium*. Cal. 5fidus. Cor. lab. ſup. fiſſum abbreviatum, laciniis lateralibus reflexis, lobo medio lab. inf. lato emarginato. Stam. in fiſſura lab. ſup. aſcendentia.
2074. *Weſtringia* Sm. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{2}{3}$, lab. ſup. plano, lobis lab. inf. aequalibus. Stam. diſtantia, antherae inferiores abortientes.
2075. *Microcorys* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. abbreviato, lab. inf. lobo medio latiori. Stam. ſuperiora incluſa, antherarum lobo pollinifero glabro, abortiente barbato, inferiora antheris 2partitis caſſis.
2076. *Hemigenia* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. abbreviato, lab. inf. lobo medio 2fido. Stam. aſcendentia, antherarum lobo altero pollinifero, altero deſcendente caſſo, ſuperiorum barbato.
2077. *Colebrookia* Roxb. Flores aggregati. Involucrum imbricatum polyphyllum. Cal. 5partitus, laciniis anguſtiſſimis plumoſis. Cor. lab. ſup. emarginatum. Stam. incluſa. Stylus bifidus exſertus.
2078. *Leucoſceptrum* Sm. Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. 5loba irregularis. Stam. exſerta inclinata. Stigma 2fidum.
2079. *Lavandula*. Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. $\frac{2}{3}$. Stam. incluſa.
2080. *Sideritis*. Cal. 5dentatus. Cor. $\frac{2}{3}$. Stam. incluſa. Antherae 2loculares. Stigma alterum vaginans alterum.
2081. *Phytoxys* Molin. Cal. 5fidus. Cor. ringens, lab. ſup. abbreviato emarginato, inf. laciniis lateralibus pinnatifidis. Stam. intra tubum.
2082. *Origanum*. Flores ſpicati bracteati. Cal. 5dentatus, raro bilabiatus. Cor. $\frac{1}{3}$. Stamina incluſa.

2083. *Pycnanthemum* Mx. Flores verticillati bracteati. Cal. tubuloſus 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$. Stam. ſubaequalia incluſa vel exſerta.
2084. *Isanthus* Mx. Cal. campanulatus 5fidus. Cor. ſubregularis 5partita. Stam. ſubaequalia ſubexſerta, antheris 2locularibus. Stigma 2fidum.
2085. *Satureia.* Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$, lobis ſubaequalibus, ſuper. emarginato. Stamina diſtantia.
2086. *Byſtropogon* Herit. Cal. dentibus 5 ſubulatis, intus villoſis. Cor. $\frac{2}{3}$.
2087. *Pogoſtemon* Desf. Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. $\frac{3}{1}$. Stam. exſerta declinata transverſe barbata. Stigma bifidum.
2088. *Hyſſopus.* Cal. 5dentatus. Cor. $\frac{2}{3,4}$. Stam. diſtantia exſerta recta, antherae 2loculares.
2089. *Elsholtzia* W. Cal. 5dentatus bracteatus. Cor. ciliata $\frac{4}{1}$. Stam. diſtantia.
2090. *Mentha.* Cal. 5dentatus. Cor. 4loba ſubregularis, lobo latiori emarginato. Stamina diſtantia recta.
2091. *Galeobdolon* Sm. Cal. 5fidus inaequalis ariſtatus. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. fornicato, laciniis lab. inf. acutis.
2092. *Galeopſis.* Cal. 5dentatus ariſtatus. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. fornicatum, inf. lobi laterales ad faucem tuberculati, medius crenatus. Antherarum valvae ciliatae.
2093. *Lamium.* Cal. 5dentatus. Cor. tubo inflato, lab. ſup. fornicato, inf. laciniis lateralibus in dentes reflexos mutatis, lobo medio emarginato. Antherarum loculi barbati ſ. fimbriati.
2094. *Glechoma.* Cal. 5fidus. Cor. tubus elongatus, limbus $\frac{2}{3}$, lab. inf. lobo medio emarginato. Antherarum paria approximata cruciata.
2095. *Nepeta.* Cal. 5dentatus. Cor. $\frac{1}{3}$, lobo medio lab. inf. cucullato. Stam. approximata.
2096. *Hyptis* Jacqu. Cal. 5fidus. Cor. $\frac{2}{3}$, lobo medio lab. inf. cucullato. Stam. declinata.
2097. *Stachys.* Cal. 5fidus. Cor. $\frac{1}{3}$, lobis lab. inf. lateralibus reflexis. Stam. demum extrorſum verſa.
2098. *Leonurus.* Cal. 5dentatus ariſtatus. Cor. $\frac{1}{3}$, lobis indiviſis. Antherarum loculi paralleli.
2099. *Ballota.* Cal. pentagonus 5dentatus. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. recto, lobo medio lab. inf. emarginato.
2100. *Betonica.* Cal. 5dentatus. Cor. tubus elongatus cylindricus, lab. ſup. verticale planiusculum, lobus medius lab. inf. crenatus.
2101. *Marrubium.* Cal. 10ſtriatus 5-10dentatus. Cor. lab. ſup. rectum lineare.
2102. *Phlomis.* Cal. 5gonus 5dentatus. Cor. lab. ſup. fornicatum incumbens lab. inf. ſubaequali, lobo medio majore.
2103. *Leucas* R. Br. Cal. 10ſtriatus ſub-10dentatus. Cor. lab. ſup. fornicatum inferiori elongato brevius. Anth. lobis divaricatis.
2104. *Leonotis* R. Br. Cal. 10ſtriatus ſub-10dentatus. Cor. lab. ſup. fornicatum elongatum, inf. abbreviatum 3fidum. Antherae lobis divaricatis.
2105. *Moluccella.* Cal. campanulatus cor. amplior, dentibus ſpinoſis. Cor. $\frac{1}{3}$.
2106. *Rizoa* Cav. Cal. tubuloſus ſtriatus 5dentatus. Cor. tubus elongatus, limbus $\frac{3}{2}$. Stam. ſubincluſa. Stigmata 2 diſtantia exſerta.

2107. *Colquhounia* Wall. Cal. tubulosus 5dentatus. Cor. lab. sup. 2dentatum, inf. 3lobum, lobis lateralibus fauci ampliatae insertis, medio minori integro. Stam. ascendentia. Caryopses alatae.
2108. *Selago*. Cal. 4fidus. Cor. tubo gracili, limbo 5fido subaequali. Caryopses 2.

ANGIOSPERMIA.

1. *Verbeneae*.

2109. *Verbena*. Cal. 5fidus, dente unico subbreviori. Cor. limbus irregulariter 5lobus. Stam. inclusa. Utriculus 4spermus cito rumpens, ut maturi fructus caryopses sistant.
2110. *Aeollanthus* Mart. Cal. 2labiatus $\frac{1}{2}$. Cor. lab. sup. ascendens, inf. stamina declinata demum exserta condens. Utriculus circumscissus sub-2spermus.
2111. *Lippia*. Cal. 4-5dentatus demum 2valvis. Cor. limbus 2labiatus $\frac{2}{3}$. Stam. inclusa. Drupa exsucca calyce 2valvi tecta 2locularis 2sperma.
2112. *Priva* Adans. Cal. ventricosus 5dentatus. Cor. limbo 5fido. Drupa exsucca calyce inflato tecta 4locularis 4sperma.
2113. *Hebenstreitia*. Cal. tubulosus emarginatus ultra medium bifidus. Cor. 1labiata, tubo lateraliter dehiscente, limbo 4fido. Caps. membranacea 1locularis 2valvis 2sperma.
2114. *Tamonea* Aubl. Cal. 5aristatus. Cor. limbo $\frac{1}{3}$. Stam. inclusa, antheris 2 abortientibus. Stigma 4fidum. Drupa sicca, putamine 4loculari 4sperma.
2115. *Congea* Roxb. Involucrum 3phyllum sub-8florum. Cal. tubulosus 5dentatus. Cor. 2labiata, lab. sup. elongato 2fido. Stam. elongata stricta. Drupa baccata 1sperma.
2116. *Streptium* Roxb. Cal. 5dentatus. Cor. tubo torto, limbo 2labiato. Antherae 2lobae. Nuces 2 2loculares.
2117. *Holmskioldia* Retz. Cal. campanulatus coloratus ampliatus repandus. Cor. infundibuliformis, lab. sup. 2lobo, inf. 3fido, lacinia media producta. Bacca 4sperma.
2118. *Premna*. Cal. subcampanulatus 5dentatus. Cor. limbo $\frac{2}{3}$. Stam. exserta. Stigma 2fidum. Drupa putamine 4loculari, 4sperma, axi perforato.
2119. *Chloanthes* R. Br. Cal. campanulatus 5fidus aequalis. Cor. fauce ampliata, limbo $\frac{2}{3}$, lobo medio lab. inf. longiori. Stam. exserta. Drupa exsucca 2pyrena, pyrenis 3locularibus, loculis lateralibus 1spermis, intermedio aspermo farcto.
2120. *Vitex*. Cal. brevis 5dentatus. Cor. 2labiata $\frac{2}{3}$, lacinia media lab. inf. longiore. Stam. ascendentia. Drupa putamine 4loculari 4spermo.
2121. *Clerodendron*. Cal. 5fidus s. 5dentatus, fructifer subampliatus. Cor. tubo cylindrico, limbo 5partito subaequali. Stam. exserta. Bacca 4pyrena.
2122. *Wallrothia* Roth. Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, lobo medio lab. sup. cucullato. Stam. declinata. Antherae 2lobae. Bacca 1-4sperma.
2123. *Pyrostoma* Meyer. Cal. 5lobus. Cor. tubo subventricoso, limbo $\frac{2}{3}$. Stam. exserta. Stigma bifidum. Fructus?

2124. *Volkameria.* Cal. 5fidus. Cor. tubo cylindrico, limbo 5partito, laciniis aequalibus ſubſecundis. Stam. exſerta aſcendentia. Bacca 2pyrena, pyrenis 2locularibus.

2125. *Petrea.* Cal. campanulatus coloratus limbo duplici, ext. 5partito ſcarioſo elongato, int. 5dentato breviſſimo. Cor. calyce brevior, limbo 5fido aequali. Stam. incluſa. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis 2ſperma.

2126. *Lantana.* Cal. breviſſimus obſolete dentatus. Cor. tubuloſa, limbo inaequaliter 4lobo. Stam. incluſa. Drupa baccata 1pyrena, pyrene 2loculari 2ſpermo, rima loculis interpoſita.

2127. *Spielmannia* Medic. Cal. 5fidus. Cor. 5loba, fauce barbata. Drupa nuce 2loculari 2ſperma.

2128. *Citharexylon.* Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. infundibuliformis ſubrotata, lobis 5 ſubaequalibus. Bacca 2pyrena, pyrenis 2locularibus 2ſpermis.

2129. *Duranta.* Cal. tubuloſus 5dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo inaequali. Stam. incluſa. Drupa 4pyrena, pyrenis 2locularibus 2ſpermis.

2130. *Amaſonia.* Cal. 5fidus. Cor. tubuloſa, limbo 5lobo ſubaequali. Stigma 2partitum. Drupa 2-4pyrena, pyrenis 1locularibus 1ſpermis.

2131. *Gmelina.* Cal. ſub-4dentatus. Cor. 4fida campanulata. Antherae 2 bipartitae, 2 ſimplices. Drupa nuce 2loculari.

2132. *Mendozia* R. et P. (Mendoncia Velloz. Vand.) Cal. 2ſepalus perſiſtens. Cor. baſi gibba, fauce conſtricta, limbo 5lobo reflexo. Antherae elongatae cuſpidatae. Drupa 1ſperma.

2133. *Myoporum* Banks. Cal. 5partitus. Cor. ſubhypocrateriformis, limbo 5lobo aequali. Stigma obtuſum. Drupa baccata 4locularis 4ſperma.

2134. *Pholidia* R. Br. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, fauce ampliata, limbo $\frac{2}{3}$. Antherae barbatae. Stigma capitatum. Drupa exſucca 4locularis 4ſperma.

2135. *Stenochilus* R. Br. Cal. 5partitus. Cor. ringens, lab. ſup. erecto ſemi-4fido, inf. indiviſo anguſto deflexo. Stam. exſerta. Stigma obtuſum. Drupa baccata 4locularis 4ſperma.

2136. *Bontia.* Cal. 5partitus. Cor. ringens, lab. ſup. emarginatum, inf. 3fidum longitudinaliter barbatum. Stigma 2lobum. Drupa putamine 2loculari, loculis 2partitis 4ſpermis.

† 2137. *Eremophila* R. Br. Cal. 5partitus, fructifer alienatus ſcarioſus. Cor.? Stigma indiviſum. Drupa exſucca 4locularis 4ſperma.

Deſciſcentes ſ. dubiae ſedis.

2138. *Xenopoma* W. Cal. duplex, ext. inf. tubuloſus 5dentatus, int. ſuperus 5partitus ciliatus. Cor. tubo cylindrico, fauce ampliata, limbo $\frac{2}{3}$. Stam. incluſa. Stigma 2fidum. Bacca?

2139. *Tozzia.* Cal. tubuloſus 4-5partitus. Cor. limbo ſub-2labiato, lobis 5 aequalibus. Antherae calcaratae. Nucula 2valvis 1ſperma. Semen ſtrophiolatum.

2140. *Hemiphragma.* Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Stam. ſubaequalia. Bacca exſucca ſemi-2locularis, diſſepimento ſuperne fiſſo.

2141. *Joſephinia* Vent. Cal. 5partitus. Cor. tubo brevi, fauce ampliata, limbo 5lobo, lacinia media lab. inf. elongata. Stigma 4fidum. Drupa echinata, 4-8locularis, loculis 1ſpermis.

2142. *Pedalium.* Cal. 5fidus. Cor. campanulata, limbo ſub-2labiato 5lobo. Filamenta piloſa, antheris per paria cruciatis; filam. 5 ſterile. Nux ſpinoſa 4gona 2locularis, ſeminibus arillatis.

2143. *Avicennia.* Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 4partito. Stam. ſubaequalia. Stigma 2fidum. Fructus 2valvis coriaceus 1ſpermus, ſemine germinante, embryone nudo.

2. *Primuleae:* placenta libera.

2144. *Limoſella.* Cal. 5partitus. Cor. 5loba. Capſ. polyſperma 2valvis, placenta libera centrali.

2145. *Erinus.* Cal. 5fidus. Cor. tubuloſa, limbo 5fido aequali, laciniis bifidis. Capſ. 2locularis, placenta libera centrali.

2146. *Lindernia.* Cal. 5partitus corolla longior. Cor. tubo ventricoſo, limbo 4lobo ſub-2labiato. Stam. incluſa. Capſ. 2valvis, placenta libera.

2147. *Manulea.* Cal. 5fidus. Cor. tubuloſa, limbo ſub $\frac{4}{1}$. Capſ. 2locularis, placenta libera centrali.

2148. *Hornemannia* W. Cal. 5fidus. Cor. perſonata $\frac{2}{3}$. Antherae 2loculares. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2valvis, placenta libera ſubgloboſa.

2149. *Conobea* Aubl. Cal. tubuloſus 5dentatus baſi 3bracteatus. Cor. 2labiata, lab. ſup. emarginato, infer. 3lobo. Capſ. 4valvis. Placenta demum libera.

3. *Perſonatae.*

* *Rhinantheae:* diſſepimento aequali.

2150. *Rhinanthus* M. B. Cal. compreſſus 2labiatus. Cor. lab. ſup. tubuloſum apice appendiculatum. Capſ. 2locularis compreſſa.

2151. *Alectorolophus* M B. Cal. ventricoſus 4dentatus. Cor. lab. ſup. compreſſum emarginatum. Antherae bipartitae. Capſ. compreſſa 2locularis, ſeminibus marginatis.

2152. *Gymnandra* Pall. Cal. longitudinaliter fiſſus 3dentatus. Cor. lab. ſup. indiviſum, inf. 2-3partitum. Stam. 2 abortientia margini faucis inſerta. Capſ. 2locularis 2ſperma.

2153. *Bartſia.* Cal. 4fidus 4partitus. Cor. tubuloſa, limbo $\frac{1}{3}$. Capſ. ovata compreſſa. Sem. angulata.

2154. *Lamourouxia* Kunth. Cal. 4fidus aequalis. Cor. fauce ventricoſa, lab. ſup. fornicato, inf. 3lobo. Antherae bifidae, lobis mucronatis. Capſ. compreſſa, ſeminibus membrana reticulata obvelatis.

2155. *Caſtilleia* Mut. Cal. tubuloſus compreſſus hinc fiſſus. Cor. tubuloſa compreſſa 2labiata, lab. ſup. lineari, inf. breviori dentato. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis. Sem. membrana laxa veſtita.

2156. *Lafuentea* Lag. Cal. 5partitus. Cor. 2labiata $\frac{2}{3}$. Capſ. 2locularis polyſperma.

2157. *Euphraſia.* Cal. 4fidus. Cor. 2labiata, lab. ſup. emarginato ſ. denticulato. Antherae 2fidae mucronatae. Stigma capitatum. Semina ſtriata.

2158. *Pedicularis.* Cal. ventricoſus 5fidus. Cor. tubuloſa 2labiata, lab. ſup. galeato compreſſo, inf. 3lobo. Capſ. roſtrata 2locularis.

2159. *Melampyrum.* Cal. 2labiatus 4fidus. Cor. lab. ſup. galeatum margine reflexo, inf. 3lobum. Antherae loculis acuminatis. Capſ. acuminata 2locularis, loculis oligoſpermis.

2160. *Orthocarpus* Nutt. Cal. tubuloſus ſemi-4fidus. Cor. lab. ſup. compreſſum margine inflexo, inf. concavum obſolete 3dentatum. Antherae loculis divaricatis. Capſ. ſtricta 2locularis, ſeminibus margine alatis.

2161. *Gomaria* R. et P. Cal. 5partitus. Cor. medio conſtricta, limbo 2labiato $\frac{4}{1}$, appendice urceolata. Stigma capitatum. Capſ. 2locularis, valvis 2fidis.

** *Scrofularinae:* diſſepimento medio incraſſato placentifero.

2162. *Scrofularia.* Cal. 5fidus. Cor. ventricoſa, limbo contracto inaequaliter 5lobo. Stam. declinata. Capſ. acuminata, valvis introflexis diſſepimentum formantibus.

2163. *Digitalis.* Cal. 5partitus, laciniis ſubinaequalibus. Cor. campanulata, limbo 4fido. Stam. declinata. Antherae 2partitae. Capſ. acuminata, valvis introflexis diſſepimentum formantibus.

2164. *Linaria* Tourn. Cal. 5partitus. Cor. perſonata calcarata. Capſ. 2locularis apice dentibus dehiſcens. Semina ſubmarginata.

2165. *Nemeſia* Vent. Cal. 5partitus. Cor. perſonata calcarata. Capſ. 2locularis 2valvis, ſeminibus 4ſeriatis marginatis.

2166. *Antirrhinum.* Cal. 5partitus. Cor. perſonata baſi gibba. Capſ. 2locularis apice poris dehiſcens.

2167. *Anarrhinum* Deſf. Cal. 5fidus. Cor. baſi gibba fauce aperta. Capſ. valvis 4 inaequalibus dehiſcens.

2168. *Mimulus.* Cal. prismaticus 5dentatus. Cor. ſubcampanulata, limbo $\frac{2}{3}$, lobis ſubaequalibus. Stigma 2lamellatum. Diſſepimenta lateribus placentifera.

2169. *Torenia.* Cal. 2labiatus. Cor. tubuloſa oblique fiſſa. Filamenta arcuata: antherae geminae unitae. Capſ. 2locularis.

2170. *Vandellia* P. Br. Cal. 4partitus. Cor. $\frac{2}{3}$. Capſ. diſſepimentum medio placentam fungoſam demum ſejunctam proferens.

2171. *Diaſcia* Link. Cal. 5partitus. Cor. 5loba, lobo infimo concavo, baſi utrinque ſinu ſaccato. Capſ. 2locularis 2valvis.

2172. *Tittmannia* Reichenb. Cal. 5partitus aequalis. Cor. perſonata, lab. inf. 3lobo porrecto. Filamenta arcuata, antherae ſuperiores cohaerentes. Capſ. 2locularis 2valvis, diſſepimento medio in placentam incraſſato.

2173. *Herpeſtes* Gärtn. Cal. 5partitus inaequalis, laciniis interioribus minoribus obtectis. Cor. tubuloſa 2labiata. Stam. incluſa. Capſ. 2locularis 2valvis, valvis 2partitis.

2174. *Limnophila* R. Br. Cal. tubuloſus 5fidus aequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido ſubaequali. Stam. incluſa. Antherae per paria cohaerentes. Stigma dilatatum. Capſ. 2locularis 2valvis.

2175. *Uvedalia* R. Br. Cal. prismaticus 5dentatus. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, lacinia media lab. inf. baſi 2gibboſa. Antherarum lobi divaricati. Capſ. 2locularis 4valvis.

2176. *Morgania* R. Br. Cal. 5partitus aequalis. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, lobis ſubaequalibus. Stam. incluſa. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2locularis, valvis 2partitis, diſſepimento ex inflexis valvarum marginibus.

2177. *Mazus* Lour. Cal. campanulatus 5fidus aequalis. Cor. ringens $\frac{2}{3}$, baſi 2gibboſa. Stigma 2lamellatum. Capſ. 2locularis 2valvis, valvis integris medio ſeptiferis.

2178. *Ourisia* Commers. Cal. 5fidus subaequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo subaequali. Caps. 2locularis 2valvis. Semina membrana laxa obvoluta.
2179. *Dichroma* Cav. Cal. 5partitus. Cor. tubo elongato, limbo $\frac{2}{3}$. Stigma simplex capitatum. Caps. 2locularis, placentis dissepimento adnatis.
2180. *Loxonia* Jack. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 2labiato. Stigma 2lobum. Caps. calyce inclusa 2locularis.
2181. *Centranthera* R. Br. Cal. hinc fissus, laciniis 5 inde cohaerentibus. Cor. infundibuliformis, limbo inaequaliter 5lobo. Stamina inclusa. Antherae basi calcaratae. Caps. 2locularis 2valvis, dissepimento contrario placentifero demum libero.
2182. *Büchnera.* Cal. tubulosus 5dentatus 10striatus. Cor. hypocrateriformis limbo 5partito, vel 2labiata. Stam. inclusa. Antherae lineares. Stigma subclavatum. Caps. 2locularis 2valvis, valvis medio septiferis.
2183. *Gerardia.* Cal. 5fidus aequalis. Cor. campanulato-infundibuliformis, limbo 2labiato 5lobo. Stam. inclusa. Antherae sagittato-2lobae. Caps. 2locularis 2valvis.
2184. *Schwalbea.* Cal. ventricosus 4fidus, lacinia summa brevissima, infima elongata. Cor. ringens $\frac{1}{3}$. Caps. 2locularis 2valvis, dissepimento duplicato.
2185. *Escobedia* R. et P. Cal. pentagonus 5dentatus. Cor. tubus elongatus, limbus $\frac{2}{3}$, lobis subaequalibus. Stam. inclusa. Antherae sagittatae, lobis aristatis. Stigma ligulatum. Caps. 2locularis 2valvis.
2186. *Browallia.* Cal. tubulosus 5fidus. Cor. tubo apice subinflato, limbo hypocrateriformi, lobis subaequalibus. Stam. inclusa. Antherae inaequales. Caps. 2locularis 2valvis.
2187. *Hemimeris.* Cal. 5partitus aequalis. Cor. rotata 2labiata $\frac{2}{3}$. Stam. declinata glabra. Antherae didymae. Caps. 2locularis, placenta septis adnata.
2188. *Celsia.* Cal. 5partitus. Cor. rotata. Filamenta barbata. Caps. 2locularis, dissepimento placentifero.
2189. *Seymeria* Pursh. Cal. 5partitus. Cor. rotato-campanulata, aequaliter 5loba. Stam. brevissima subaequalia prope faucem inserta, quinto accessorio sterili. Stylus declinatus. Caps. ventricoso-ovata 2locularis 2valvis.
2190. *Angelonia* Humb. Cal. 5partitus. Cor. irregularis patens, fauce fornicata, limbo $\frac{2}{3}$, lobo medio labii inf. basi saccato. Antherae loculis divergentibus. Caps. 2locularis 2valvis, valvis 2fidis.
2191. *Stemodia.* Cal. 5partitus. Cor. 2labiata. Stamina 2fida, singula dianthera. Caps. 2locularis, placenta demum libera.
2192. *Russelia.* Cal. 5partitus. Cor. fauce ventricosa barbata, limbo 2labiato, lab. sup. emarginato, inf. 3lobo. Antherae loculis patulis. Caps. rostrata 2locularis, placenta demum libera.
2193. *Achimenes* Vahl. Cal. 5partitus. Cor. limbo subaequali plano 4fido. Antherae connexae. Caps. 2locularis.
2194. *Razumovia**. Cal. 4angularis sub-2partitus. Cor. campanulata 5fida. Stamina hirsuta. Caps. turgida 2locularis.
2195. *Treviranía* W. Cal. 5sepalus. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Filamentum quintum sterile. Caps. semi-2locularis.
2196. *Chelone.* Cal. 5partitus bracteatus. Cor. ventricosa 2labiata. Filamentum quintum sterile. Caps. 5locularis, dissepimento lateribus placentifero.

2197. *Capraria.* Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 5fido aequali. Stam. inclufa. Stigma 2lobum. Capf. 2locularis, valvis fub-2fidis, placenta demum libera.
2198. *Leucophyllum* Humb. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo $\frac{2}{3}$, palato convexo. Stam. inclufa, antheris divaricatis. Capf. 2locularis.
2199. *Maurandia* Jacq. Cal. 5partitus. Cor. perfonata, tubo ventricofo, limbo $\frac{2}{3}$. Stam. inclufa, antheris divaricatis. Capf. 2locularis, apice dentibus 10 dehifcens.

Defcifcentes.

2200. *Sefamum.* Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo inaequali 5lobo. Filamentum 5 fterile. Capf. 4locularis, bivalvis, valvis inflexis loculos formantibus.
2201. *Dodartia.* Cal. 5dentatus. Cor. 5labiata, lab. inf. porrecto. Stigma 2fidum. Capf. 2locularis, disfepimento placentifero.
2202. *Cymbaria.* Cal. 10dentatus. Cor. 2labiata. Capf. 2locularis, disfepimento per proceffus laterales in placentas abeunte.
2203. *Calytriplex* R. et P. Cal. triplex, intermedius 3partitus latior. Cor. irregularis, limbo 5fido, laciniis 2 fuperioribus latioribus. Stigma capitatum. Capf. 2locularis, 2valvis, valvis 2fidis.
2204. *Sibthorpia.* Cal. 5partitus. Cor. calycem aequans fubregularis 5fida. Capf. 2locularis obcordata 2valvis, disfepimento valvis contrario.

*** *Orobancheae:* placentatio valvaris.

2205. *Orobanche.* Cal. 4-5fidus bracteatus. Cor. perfiftens tubulofa 2labiata, lab. fup. fornicato emarginato, inf. 3fido reflexo. Capf. 1locularis 2valvis, feminibus minutis ad inflexos valvarum margines infertis.
2206. *Phelipaea* Tourn. Cal. 5fidus. Cor. 2labiata 5loba. Antherae barbatae. Capf. prioris.
2207. *Hyobanche.* Cal. 5partitus bracteis binis fuffultus. Cor. lab. fup. fornicatum, inf. obfoletum. Capf. prioris.
2208. *Lathraea.* Cal. 4partitus coloratus bracteatus. Cor. 2labiata, lab. fup. integro, inf. 3dentato. Antherae fagittatae pilofae. Capf. 2valvis, valvis fepti- et femiferis.
2209. *Epiphegus* Nutt. Cal. abbreviatus 5dentatus. Flores polygami. Cor. ♂ ringens compreffa 4fida, lab. inf. plano. Cor. ☿ exigua fubregularis 4fida citiffime marcida et capfulam coronans. Capf. obliqua 1locularis hinc hiafcens.
2210. *Alectra* Thunb. Cal. 2labiatus $\frac{2}{3}$. Cor. tubulofa, limbo 5partito. Filamenta barbata, antheris didymis. Capf. 2valvis 2locularis.
2211. *Aeginetia* Roxb. Cal. 1phyllus fpathaceus. Cor. campanulata, limbo 5lodo. Capf. 2locularis.

4. *Acantheae:* capfula 2locularis, femina retinaculis fubtenfa.

2212. *Acanthus.* Cal. 4fidus inaequalis, laciniis oppofitis minoribus. Cor. 1labiata. Antherae 1loculares pilofae. Capf. loculi 1fpermi.
2213. *Blepharis* Juff. Cal. duplex uterque 4fepalus, ext. ciliatus bracteatus. Cor. 1labiata 3loba.

2214. *Ruellia.* Cal. 5partitus aequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido ſubaequali patente. Antherae 2loculares. Capſ. polyſperma, diſſepimento adnato.
2215. *Blechum* Juſſ. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Antherae 2loculares. Capſ. 1locularis 2valvis, valvis infra fiſſis. Placentae liberae retinacula adhaerent.
2216. *Aphelandra* R. Br. Cal. 5partitus inaequalis. Cor. 2labiata. Antherae 1loculares. Capſ. 2locularis, diſſepimento contrario adnato.
2217. *Harrachia* Jacqu. Cal. 5partitus inaequalis. Cor. 1labiata lobata. Stam. incluſa, antheris 1locularibus. Capſ. 2locularis, diſſepimento contrario adnato.
2218. *Aetheilema* R. Br. Cal. 5partitus inaequalis, lacinia dorſali maxima. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Capſ. 2-4ſperma, diſſepimenti ſegmentis 2partibilibus.
2219. *Lepidagathis* W. Cal. 4 ſepalus, ſepalis alternis majoribus ciliatis. Cor. 2labiata, lab. ſup. emarginato, inf. 3fido.
2220. *Barleria.* Cal. 4partitus aequalis. Cor. 2labiata 5loba. Capſ. 4angula 2locularis 2ſperma.
2221. *Hygrophila* R. Br. Cal. ſemi-5fidus aequalis. Cor. ringens. Antherarum loculi paralleli. Diſſepimentum adnatum et valvis et retinaculis.
2222. *Thunbergia.* Cal. duplex, ext. 2ſepalus, int. 12fidus. Cor. campanulata, limbo 5lobo. Stigma 2lobum. Capſ. roſtrata 2locularis. Retinaculorum vices gerunt lobuli carnoſi.
2223. *Adenosma* R. Br. Cal. 5partitus, lacinia ſuprema majori. Cor. ringens ½. Antherae approximatae. Stigma dilatatum. Capſ. roſtrata 2partibilis: placentae ſuturis adnatae: retinacula 0.

5. *Bignonieae.*

2224. *Bignonia.* Cal. campanulatus integerrimus repandus vel ſubdentatus. Cor. campanulata, limbo 2labiato 5lobo. Filamentum 5 ſterile. Stigma bilamellatum. Capſ. ſiliquaeformis 2locularis, diſſepimento valvis parallelo. Sem. transverſa 2ſeriata membranaceo-alata.
2225. *Tecoma* Juſſ. Character Bignoniae, praeter diſſepimentum valvis contrarium.
2226. *Jacaranda* Juſſ. Cal., cor. et ſtam. Bignoniae. Capſ. ſuborbicularis lignea compreſſa 2locularis 2valvis, diſſepimento valvis contrario. Semina transverſa imbricata membranaceo-alata.
2227. *Spathodea* P. B. Cal. ſpathaceus hinc fiſſus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido inaequali. Filamentum quintum ſterile. Stigma bilamellatum. Capſ. ſiliquaeformis falcata ſub-4locularis, diſſepimento valvis contrario ſuberoſo.
2228. *Amphilophium* Kunth. Cal. campanulatus, limbo duplici, ext. patente undulato-criſpo, int. 2labiato. Cor. ſubcoriacea, fauce ventricoſa, limbo 2labiato, lab. ſup. galeato 2-inf. recto 3dentato. Filam. quintum ſterile. Capſ. ſublignea 2locularis.
2229. *Eccremocarpus* R. et P. Cal. magnus laxus 4-5fidus. Cor. tubuloſa, limbo reflexo 5fido. Filam. quintum ſterile. Capſ. ovata 1locularis, placentis valvaribus: ſem. imbricata membranaceo-alata.
2230. *Salpigloſſis* R. et P. Cal. 5partitus ſubinaequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Filam. quintum ſterile. Stylus apice linguaeformis, dentibus utrinque oppoſitis. Capſ. 2locularis, diſſepimento valvis parallelo.

2231. *Incarvillea* Juss. Cal. 5fidus 3bracteatus. Cor. tubuloso-ventricosa, limbo 5lobo. Filam. quintum sterile 0? Caps. siliquaeformis, dissepimento valvis contrario: sem. alata.
2232. *Gelsemium* Juss. Cal. 5dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Stam. quintum saepe perfectum. Caps. ovata compressa, valvis inflexis dissepimentum constituentibus. Sem. apice alato.

Desciscentes.

2233. *Tourrettia* Domb. Cal. 2labiatus, lab. sup. acuminato, inf. latiori 4crenulato. Cor. tubulosa 1labiata, lab. sup. in cucullum producto. Antherae bilobae. Caps. spinoso-echinata sublignea sub-4locularis. Sem. marginata.
2234. *Martynia.* Cal. 5fidus inaequalis. Cor. ventricosa, limbo 5lobo. Filam. quintum sterile. Drupa acuta, nuce 4loculari, seminibus apteris.
2235. *Didymocarpus* Jack. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, limbo irregulari 5lobo. Caps. siliquaeformis sub-4locularis.
2236. *Aeschynanthus* Jack. Cal. 5fidus ventricosus. Cor. limbo subirregulari. Stam. exserta: filam. quintum sterile. Caps. longissima siliquaeformis sub-4locularis: sem. aristata.

6. *Gesnereae* Rich.

2237. *Gesnera.* Cal. 5partitus. Cor. tubuloso-campanulata, limbo $\frac{2}{3}$. Stigma 2lobum. Caps. 1locularis 2valvis, placentis parietalibus bilamellatis.
2238. *Besleria.* Cal. 5partitus. Cor. tubuloso-ventricosa, limbo $\frac{2}{3}$. Stigma 2lobum. Bacca 1locularis, placentis parietalibus bilamellatis.
2239. *Parentucellia* Viv. Cal. ventricoso-tubulosus 5fidus. Cor. ringens, lab. sup. fornicato, inf. 3fido bituberculato. Caps. subbilocularis polysperma, placentatio parietalis.
2240. *Anthocercis* Labill. Cal. 5fidus. Cor. campanulata, limbo 5partito aequali. Stam. inclusa, cum rudimento quinti. Caps. 2locularis 2valvis, valvarum marginibus inflexis placentae parallelae insertis. Sem. reticulata.

7. *Baccatae.*

2241. *Brunfelsia.* Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. infundibuliformis, tubo longissimo incurvo, limbo 5lobo. Caps. globosa baccata 2locularis: sem. peripherica, placenta tamen centrali.
2242. *Crescentia.* Cal. 2partitus aequalis. Cor. infundibuliformis, limbo 2labiato, lab. sup. breviori crenato, inf. 3fido. Bacca corticata 1locularis, sem. in pulpa nidulantia.
2243. *Tanaëcium* Sw. Cal. truncatus integerrimus. Cor. tubus longissimus, limbo 5lobo subregulari. Antherae horizontales, lobis divaricatis. Bacca 2locularis polysperma.
2244. *Tripinnaria* Pers. Cal. urceolatus 5crenatus. Cor. campanulata, limbo 5fido villoso. Antherae bicornes incumbentes. Stigma acutum 2fidum. Bacca 1locularis polysperma.
2245. *Columnea.* Cal. 5partitus. Cor. tubulosa, limbo 2labiato, lab. sup. fornicato, inf. 3fido, laciniis angustis divaricatis. Antherae per paria nexae. Bacca 2locularis polysperma, dissepimento placentifero.

2246. *Duboiſia* R. Br. Cal. 2labiatus brevis. Cor. ſubcampanulata, limbo 5partito ſubaequali. Stam. incluſa cum rudimento quinti. Bacca 2locularis polyſperma. Sem. reniformia.

2247. *Mitraria* Cav. Cal. duplex, ext. mitraeformis irregulariter fiſſus, int. 5partitus. Cor. tubuloſo-ventricoſa, limbo $\frac{2}{3}$. Stam. exſerta. Bacca 1locularis polyſperma.

2248. *Teedia* Rudolph. Cal. 5partitus. Cor. hypocrateriformis 5loba. Stylus perſiſtens. Bacca bilocularis, placenta utrinque incraſſata.

2249. *Halleria*. Cal. 3lobus perſiſtens. Cor. infundibuliformis, limbo 4fido, lacinia ſumma majore emarginata. Stylus perſiſtens. Bacca globoſa 1locularis polyſperma, funiculis ſeminum umbilicalibus centrum petentibus.

2250. *Diplanthera* R. Br. Cal. 3fidus, lacinia poſtica integra, lateralibus bifidis. Cor. 2labiata $\frac{2}{3}$. Stam. ſubaequalia, antherarum loculis divergentibus. Germen biloculare polyſpermum.

2251. *Linnaea*. Cal. duplex, ext. inferus 4fidus, int. ſuperus 5fidus. Cor. campanulata, limbo ſubaequaliter 5lobo. Bacca exſucca 3locularis, loculis 2 abortientibus.

8. *Fructus inferi*.

2252. *Picria* Lour. Cal. 4ſepalus deciduus, ſepalis 2 corolla longioribus. Cor. ringens, lab. ſup. ſpathulato, inf. trilobo. Filam. longiora ſeorſim vaginantia, antheris 1locularibus, breviorum 2locularibus connexis. Stigma 2fidum. Bacca 2locularis polyſperma.

2253. *Gloxinia* Herit. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo obliquo. Filam. quintum ſterile. Capſ. 2valvis.

9. *Pleiopetalae*.

2254. *Melianthus*. Cal. inaequaliter 5fidus perſiſtens coloratus baſi nectariferus. Pet. 5, quorum 4 nectario inſerta medio cohaerent. Capſ. 4 alatae 2ſpermae. *Familia?*

2255. *Krameria*. Cal. 4ſepalus. Pet. 4, 2 lateralia ſeſſilia, 2 unguiculata longiora. Stam. breviora baſi juncta. Antherae apice 2poroſae. Stigma indiviſum. Fructus ſubgloboſus muricatus 1ſpermus. *Polygaleae*.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

2048. LUMNITZERA Jacq.

ocimoides Jacq. 1. L. ramis asperiusculis, foliis ovatis crenatis glabris, verticillis spicatis nudis. *Patria?* (Ocimum polycladon Link.)

polystachya Jacq. 2. L. ramis glabris, foliis ovatis crenato-dentatis, verticillis spicatis nudis. *Ind. or.* (Ocimum polystachyon L.)

moschata * 3. L. foliis rhombeo-lanceolatis crenatis pubescentibus, verticillis spicatis secundis. *Nov. Holl.* (Plectranthus moschatus R. Br.)

prostrata * 4. L. ramis divaricatis prostratis pilosis, foliis ellipticis lineatis argute serratis hirsutiusculis, verticillis multifloris spicatis. *Ind. orient.* (Ocimum L.)

fastigiata * 5. L. ramis brachiatis piloso-viscosis, foliis oblongis obtusis crenatis basi attenuatis integerrimis, verticillis paniculatis terminalibus. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

tenuiflora * 6. L. foliis longe petiolatis oblongis serratis villosiusculis, bracteis cordatis concavis, verticillis spicatis, spicis filiformibus. *Malabar. Ceylon.* (Ocimum L.)

densiflora * 7. L. ramis tomentosis, foliis ovatis obtuse serratis breviter petiolatis subtus tomentosis, panicula terminali ramosissima foliosa, calycibus subaequalibus. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

salvioides * 8. L. ramis piloso-viscosis, foliis ovato-oblongis crenulatis utrinque pilosis, verticillis racemosis bracteatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

† *capitata* * 9. L. foliis oblongis obtuse serratis in petiolum decurrentibus pubescentibus, capitulis multifloris involucratis. *Ind. or. China.* (Ocimum capitatum Roth., capitellatum L.)

2049. OCIMUM.

* *Foliis ſerratis, dentatis, crenatis.*

thyrſiflorum 1. O. ramis piloſis, foliis oblongis utrinque attenuatis groſſe ſerratis, verticillis paniculatis bracteatis. *Ind. or. et occ.*

gratiſſimum 2. O. ramis teretibus piloſo-tomentoſis, foliis ovato-lanceolatis, verticillis ſpicatis. *Ind. or.*

Baſilicum 3. O. ramis ſubpubeſcentibus, foliis ovato-oblongis ſubſerratis, verticillis hirſutiusculis. *Ind. or. Perſia.* (O. piloſum et aſcendens W., racemoſum Thunb.)

micranthum W. 4. O. ramis glabris, foliis ovatis utrinque attenuatis ſerratis, verticillis glabriusculis, calycis labio ſuperiori latiſſimo. *Patria?*

viride W. 5. O. ramis piloſiusculis, foliis ovatis utrinque attenuatis ſerratis ſubtus ſcabris, racemis paniculatis. *Patria?* (O. viridiflorum Roth.)

ſuave W. 6. O. ramis pubeſcentibus, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſerratis utrinque villoſiusculis ſubtus incanis, verticillis paniculatis, corolla calycem ſubaequante. *Patria?* (O. urticaefolium Roth.)

ſanctum 7. O. ramis hirſutis, foliis ovato-oblongis obtuſis glabriusculis, racemis terminalibus hirſutis, bracteis cordatis. *Ind. or.*

febrifugum Ker. 8. O. ramis hirſutiusculis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis crenatis glabriusculis, verticillis paucifloris, corolla calycem ſubaequante. *Sierra Leone. Guinea.* (O. heptodon P. B.?)

album 9. O. ramis glabris, foliis ovatis craſſiusculis obtuſe ſerratis, verticillis racemorum approximatis, ante antheſin ſpicam 4gonam formantibus, corollis magnis crenatis. *Ind. or. Java.*

americanum 10. O. ramis teretiusculis glabris, foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis utrinque nudis, verticillis remotis racemoſis, corolla calycem excedente. *Amer. trop.*

grandiflorum Herit. 11. O. foliis oblongis ſerratis ſcabris ſubviſcoſis, racemo terminali, filamentis longiſſimis. *Abyſſinia. Arabia.* (O. filamentoſum Forsk.)

tomentoſum Lam. 12. O. ramis villoſis, foliis ſubrotundis dentatis tomentoſis, verticillis remotiusculis hirſutis. *C. B. S.*

verticillatum 13. O. foliis ovatis obtuſis ſubſerratis laevibus, pedunculis quaternis verticillatis. *C. B. S.*

virgatum Thb. 14. O. foliis obovato-oblongis ſerratis ſubtomentoſis, verticillis racemoſis, racemis virgatis. *Japon.*

inflexum Thb. 15. O. foliis ovatis acutis ſerratis ſcabris, ramis tomentoſis flexuoſis, racemis paniculatis. *Japon.*

ſcabrum Thb. 16. O. foliis oblongis acutis ſerratis ſubtus punctatis, ramis piloſis, racemis ſimplicibus, floribus oppoſitis. *Japon.* (O. punctatum Thb. jap.)

17.

rugoſum Thb. 17. O. foliis ovatis acuminatis ſerratis ſubtus rugoſis, ramis tomentoſis, racemis terminalibus contractis. *Japon.*

criſpum Thb. 18. O. foliis ovatis ſerratis criſpis glabris, ramis villoſis, racemis terminalibus laxis, calycibus hiſpidis. *Japon.*

acutum Thb. 19. O. foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris, racemis filiformibus, racemis hiſpidis. *Japon.*

madagascarenſe Perſ. 20. O. foliis cordato-ovatis crenatis ramisque pubeſcentibus, bracteis ſubrotundis ſubtus villoſis. *Madagascar.*

paniculatum Perſ. 21. O. foliis ovatis acuminatis crenatis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſubpaniculatis, pedicellis ramoſis. *Madagascar.*

macroſtachyon Poir. 22. O. foliis ovato-oblongis obtuſis ſubdentatis glabriusculis, ſpica denſa terminali, calycibus hiſpidis. *Ind. or.*

† *menthoides* 23. O. foliis lineari-lanceolatis ſerratis, verticillis ſpicatis, ſtaminibus longe exſertis. *Ceylon.*

† *tereticaule* Poir. 24. O. foliis lineari-lanceolatis remote ſerratis, ramis teretibus ſtrictis pubeſcentibus, floribus oppoſitis axillaribus minimis. *Patria?*

** *Foliis integerrimis.*

integerrimum W. 25. O. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glabris, verticillis remotiusculis ſubpiloſis, bracteis corollisque calyces ſuperantibus. *Ind. or.*

minimum 26. O. foliis ovatis integerrimis, ramis confertis caeſpitoſis, verticillis raris. *Ceylon.*

ſerpyllifolium Forsk. 27. O. foliis lanceolatis incano-villoſis ſubfaſciculatis, verticillis racemoſis, ſtaminibus longiſſimis. *Arabia. Afric. or.* (O. africanum Lour.)

2050. PLECTRANTHUS Herit.

* *Floribus calcaratis.*

fruticoſus Herit. 1. Pl. caule fruticoſo, foliis ovatis inaequaliter dentatis, racemi pedicellis ſubternis villoſiusculis, calcare aſcendente. *C. B. S.* (Germanea urticaefolia Lam.)

** *Corollae labio inf. gibboſo concavo.*

ſcutellarioides R. Br. 2. Pl. foliis ovatis obtuſe ſerratis ſubtus rubentibus, racemi pedicellis geminis ramoſis, bracteis cordatis, labio corollae inf. falcato. *Nov. Holl. Nov. Hebrid. Inſ. Molucc.* (Ocimum L.)

galeatus Vahl. 3. Pl. foliis cordato-ovatis acuminatis ſerratis villoſiusculis, racemo terminali compoſito, bracteis nullis, labio corollae inf. falcato. *Java. Nepal.*

congeſtus R. Br. 4. Pl. foliis ovatis crenatis villoſis rugoſis, verticillis congeſtis multifloris, pedicellis calyce pubeſcente brevioribus. *Nov. Holl.*

graveolens R. Br. 5. Pl. foliis ovatis crenatis villosis rugosissimis, verticillis distinctis, pedicellis calyce longioribus. *Nov. Holl.*

australis R. Br. 6. Pl. foliis ovatis inciso-crenatis subrugosis pubescentibus, verticillis distinctis, pedicellis calycem subaequantibus. *Nov. Holl.*

amboinensis * 7. Pl. foliis subcordatis obtusis crenatis carnosis pilosis incanis, verticillis spicatis, filamentis basi connatis stylum vaginantibus. *Ins. Molucc. Cochinchina.* (Coleus amboinicus Lour.)

monadelphus Heyn. 8. Pl. foliis ovatis obtusis grosse serratis pubescentibus, verticillis racemosis, filamentis basi connatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

incanus Link. 9. Pl. foliis cordatis obtusis crenatis hirtis, verticillis spicatis, bracteis hirsutis florem subaequantibus. *Patria?*

monachorum * 10. Pl. foliis ovatis obtusiusculis serratis glabris, verticillis racemosis, staminibus basi villosis. *Ind. or.* (Ocimum L.)

mollis * 11. Pl. foliis profunde cordatis ovatis acutis serratis rugosis villosiusculis, lobis baseos approximatis inflexis, verticillis remotis paucifloris, bracteis subrotundo-cuneiformibus. *Ind. or.* (Ocimum molle Ait.)

nudiflorus W. 12. Pl. foliis cordatis acuminatis grosse dentatis rugosis glabris, superioribus amplexicaulibus, verticillis paniculatis, bracteis cordatis sessilibus, corollae tubo refracto. *China?*

asper * 13. Pl. foliis ovali-oblongis crenatis asperis subtus cinereo-tomentosis, verticillis simpliciter racemosis, bracteis ovatis acuminatis reflexis, calycibus pilosissimis, tubo corollae refracto. *Ind. or.* (Ocimum asperum Roth.)

Forskolei W. 14. Pl. foliis ovatis obtusis crenatis utrinque villosis, verticillis racemosis ebracteatis, tubo corollae refracto. *Arabia.* (Ocimum hadiense Forsk.)

crassifolius Vahl. 15. Pl. foliis ovatis acutis crenatis carnosis rigidis, verticillis remotiusculis bracteatis. *Aegypt. Arabia.* (Ocimum Zatarhendi *α.* Forsk.)

punctatus Herit. 16. Pl. foliis ovatis acutis dentatis rugosissimis villosis, caule maculato-punctato, verticillis approximatis, calycibus glandulosis, corolla villosa. *Abyssinia.* (Ocimum punctatum L. suppl.)

rotundifolius * 17. Pl. foliis cauleque glabris, inferioribus petiolatis rotundato-ovalibus crenatis, superioribus sessilibus cordatis, floribus racemosis confertis subsessilibus. *Ins. Mascaren.* (Germanea Poir.)

thymiflorus * 18. Pl. foliis subrotundo-ovatis mucronatis grosse serratis glabris, venis subtus fusco-pubescentibus, caule superne calycibusque coloratis, racemis laxis filiformibus, bracteis subrotundo-ovatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

tristis * 19. Pl. foliis ovatis obtusis serratis supra strigoso-scabris subtus fusco-tomentosis, verticillis racemosis bracteatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

maypurensis * 20. Pl. foliis ovatis grosse serratis, serraturis crenulatis, supra scabriusculis subtus cinereo-tomentosis, racemi compositi pedunculis oppositis sub-3floris bracteatis. *Ind. orient.* (Ocimum Roth.)

indicus * 21. Pl. foliis obovatis remote serratis glabris subtus punctatis, racemo nudo simplici apice foliis linearibus undulatis comoso, bracteis obtusis sessilibus. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

viscosus * 22. Pl. viscoso-pilosissimus, foliis obovato-subrotundis obtuse serratis subtus reticulato-rugosis, verticillis racemosis bracteatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

caninus Roth. 23. Pl. foliis obovatis obtusis carnosis integerrimis subpubescentibus in petiolum attenuatis, fasciculis florum racemoso-spicatis dense congestis ebracteatis. *Ind. or.*

† *Barrelieri* * 24. Pl. foliis ovatis utrinque attenuatis medio grosse serratis scabris subtus punctatis, verticillis bracteatis dense spicatis. *Ind. or.* (Ocimum Roth.)

parviflorus W. 25. Pl. foliis ovatis dentatis pubescentibus, pedunculis verticillatis calycibusque glabris. *Amer. austr.*

micranthus * 26. Pl. foliis rhombeo-lanceolatis crenatis calycibusque glandulosis glabris, spicis secundis. *Nov. Holl.* (Pl. parviflorus R. Br.)

nankinensis * 27. Pl. foliis reniformibus concavis fimbriatis coloratis, spicis axillaribus 4gono-prismaticis. *China.* (Dentidia nankinensis Lour.)

dubius * 28. Pl. foliis cordato-ovatis serratis carnosis, verticillis spicatis, calycis labii inf. dentibus conniventibus. *Ind. or.* (Lavandula carnosa L. fil.)

2051. PRUNELLA.

vulgaris 1. Pr. foliis ovato-oblongis subdentatis, labio calycis sup. truncato subdentato, corolla calycem duplo superante. *Europ. Asia. Amer. bor. Nov. Holl.*

pensylvanica W. 2. Pr. foliis ovato-lanceolatis basi dentatis, labio calycis sup. truncato 3aristato labium inf. aequante, corolla calycem duplo superante. *Amer. bor.* (Pr. laciniata Walt.)

grandiflora 3. Pr. foliis ovato-oblongis basi dentatis, labio calycis sup. 3fido, corolla calycem quadruplo superante. *Europ. Caucas.*

alba Pall. 4. Pr. foliis lanceolatis basi subpinnatifido-incisis, caule hirsutissimo, labio calycis sup. truncato 3mucronato, corolla calycem subduplo superante. *Europ. med. austr. Caucas.* (Pr. laciniata Mill. Lam.)

intermedia Link. Brot. 5. Pr. foliis inferioribus lanceolatis sinuato-pinnatifidis, superioribus lanceolato-linearibus, labio calycis colorati sup. truncato. *Ital. sup. Lusitan.* (Pr. incisa Link.)

hastata Brot. 6. Pr. foliis subhastato-cordato-oblongis subdentatis, caule basi repente, labio calycis sup. 3fido. *Lusitan.*

hyssopifolia 7. Pr. caule erecto ramoso, foliis lanceolatis integerrimis, labio calycis sup. 3mucronato. *Gallia austr.*

aequinoctialis Humb. 8. Pr. caule erecto ramoso, foliis oblongis dentato-crenatis, labio calycis sup. 3lobo, lobis mucronatis. *Nov. Granat.*

2052. MELISSA.

officinalis 1. M. foliis ovatis acutis serratis, verticillis dimidiatis. *Europ. austr.* (M. hirsuta Balb. Horn. cordifolia Pers. var.)

grandiflora 2. M. foliis ovatis acutis serratis, pedunculis sub-3floris axillaribus bracteatis, corollis infundibuliformibus elongatis. *Carniolia. Italia. Graecia. Asia minor.* (Thymus Scop. W. Cand.)

altissima Sm. 3. M. foliis cordatis crenatis subtus lanatis, pedunculis paucifloris axillaribus abbreviatis, bracteis cuspidatis pedunculatis. *Graecia.*

pyrenaica Jacq. 4. M. foliis oblongis obtuse dentatis rugosis, caule subaphyllo, floribus verticillatis. *Austria. Pyren.* Horminum L.)

† *rugosa* Lour. 5. M. foliis ovatis acuminatis serratis rugosissimis, racemis confertis axillaribus terminalibusque. *Cochinchina.*

2053. DRACOCEPHALUM.

* *Spicata s. subspicata, (floribus capitatis vel verticillis approximatis).*

virginianum 1. Dr. floribus spicatis confertis, bracteis subulatis, foliis lineari-lanceolatis serratis. *Amer. boreal.*

denticulatum Ait. 2. Dr. floribus spicatis remotiusculis, bracteis subulatis, foliis obovato-lanceolatis apice denticulatis. *Virginia. Carolina.*

variegatum Vent. 3. Dr. spicis brevibus 4gonis, bracteis ovatis acutis, foliis arcte sessilibus ovali-oblongis apice denticulatis. *Carolina austr.*

cordatum Nutt. 4. Dr. floribus spicatis secundis, bracteis late ovatis, foliis cordatis crenatis, radice stolonifera. *Ins. fl. Ohio.*

cochinchinense Lour. 5. Dr. floribus spicatis, bracteis subrotundis acutis, foliis ovato-lanceolatis integerrimis villosis. *Cochinchina.*

fruticulosum W. 6. Dr. floribus subspicatis, bracteis ellipticis denticulato-mucronatis, calycis laciniis aequalibus, foliis ellipticis integerrimis mucronatis. *Sibir.*

lamiifolium Desf. 7. Dr. floribus spicato-capitatis, calycis laciniis subaequalibus, foliis ovatis obtusis crenatis hirsutis. *Creta.*

Ruyſchiana 8. Dr. verticillis approximatis, foliis bracteisque lineari-lanceolatis integerrimis. *Europ.*

auſtriacum 9. Dr. verticillis approximatis, foliis linearibus mucronatis, caulinis bracteisque 3partitis. *Auſtria. Hungar. Transſylvan. Caucaſ.*

origanoides W. 10. Dr. floribus ſpicato-capitatis, bracteis ſpathulatis coloratis dentatis corollam ſubſuperantibus, foliis cordato-ſubrotundis ſinuato-dentatis ſubtus tomentoſis. *Sibir.*

botryoides Stev. 11. Dr. floribus ſpicatis, bracteis inferioribus oblongis 3dentatis mucronatis ſuperioribus lanceolatis corolla brevioribus, foliis ſubcordatis ſinuato-lobatis incano-tomentoſis. *Caucaſ.*

palmatum W. 12. Dr. floribus ſubſpicatis, calycis labio ſuperiori indiviſo mucronato, foliis ſubrotundo-oblongis baſi attenuatis ſinuato-dentatis pubeſcentibus. *Sibir.*

canarienſe 13. Dr. floribus ſpicatis, foliis ternatis lanceolatis ſerratis, lateralibus ſub-2lobis. *Inſ. Canar.*

pinnatum 14. Dr. floribus ſpicatis, bracteis lanceolatis coloratis ciliatis, calycibus corollae tubum ſuperantibus, foliis cordatis pinnatifido-ſinuatis. *Sibir.*

** *Verticillata.*

peregrinum 15. Dr. verticillis remotiuſculis ſubſecundis, bracteis lineari-lanceolatis ſpinuloſo-ſubdenticulatis, foliis lanceolatis remote mucronato-dentatis. *Sibir.*

argunenſe Fiſch. 16. Dr. verticillis remotiuſculis, foliis bracteisque lineari-lanceolatis acutis integerrimis, calycis laciniis aequalibus. *Sibir.*

grandiflorum 17. Dr. verticillis remotiuſculis, bracteis lanceolatis integerrimis, calycis lab. ſup. elliptico obtuſo integerrimo, foliis oblongis obtuſis dentatis petiolatis. *Sibir.*

altaienſe Laxm. 18. Dr. verticillis remotiuſculis, bracteis oblongis mucronato-dentatis, calycis laciniis aequalibus, foliis radicalibus cordato-oblongis obtuſis dentatis, caulinis amplexicaulibus ſubrotundis crenatis. *Imaus.*

Moldavica 19. Dr. verticillis remotiuſculis, bracteis lanceolatis ſerratis, denticulis ciliato-ariſtatis, foliis oblongo-lanceolatis profunde crenatis ſubtus punctatis. *Podolia auſtr. Moldavia. Sibir.*

parviflorum Nutt. 20. Dr. verticillis ſubcapitatis, bracteis ovatis mucronato-ſerratis, calycis corollam ſubaequantis labio ſup. ovato emarginato, foliis ovato-lanceolatis profunde ſerratis. *Ad fl. Miſſuri.*

caneſcens 21. Dr. verticillis remotiuſculis, bracteis oblongis ciliato-ſpinuloſis, calycibus ſtriatis tubo corollae brevioribus foliisque oblongis obtuſis dentatis caneſcentibus. *Aſia minor.*

ibericum Stev. 22. Dr. verticillis remotiuſculis, bracteis ſpathulatis elongato-ciliatis, calycibus ſtriatis tubum corollae ſubexcedentibus, foliis oblongis integerrimis. *Iberia. Tauria?* (Dr. odoratiſſimum Poir.)

peltatum 23. Dr. verticillis remotis, bracteis orbiculatis ciliatis, labio ſup. obtuſo calycis tubum corollae ſuperantis, foliis oblongis obtuſis ſerratis. *Aſia minor.*

thymiflorum 24. Dr. verticillis remotis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis oblongis dentatis. *Sibir.*

nutans 25. Dr. verticillis remotis, bracteis ovato-oblongis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus nutantibus, foliis oblongis dentatis. *Imaus.*

*** *Infloreſcentia aliena.*

chamaedryoides Balb. 26. Dr. pedunculis axillaribus geminis, calycis dentibus ſuperioribus brevioribus, foliis lineari-lanceolatis crenatis rugoſis. *Patria?*

ſibiricum 27. Dr. pedunculis oppoſitis axillaribus cymoſis, bracteis ſubulatis, genitalibus incluſis, foliis cordato-lanceolatis acuminatis ſerratis. *Sibir.*

mexicanum Kunth. 28. Dr. pedunculis axillaribus cymoſis, bracteis ſubulatis, genitalibus exſertis, foliis ſubcordato-lanceolatis ſerratis. *Mexico.*

2054. PRASIUM.

majus 1. Pr. foliis cordato-ovatis acutis crenatis glabris, dentibus calycis ovatis acutis mucronatis. *Neapol. Sicil. Afric. bor. Peloponneſ. Aſia minor.*

minus 2. Pr. foliis ſubcordato-oblongis crenatis hirſutis, dentibus calycis obtuſis. *Corſica. Gallia auſtr. Creta.*

2055. PHRYMA.

leptoſtachya *Amer. bor.* Herba cubitalis, caule gracili pubeſcente, foliis ovato-oblongis acutis ſerratis, floribus oppoſitis racemoſo-ſpicatis purpuraſcentibus.

2056. CLEONIA.

luſitanica *Hiſpan. Luſitan. Afric. bor.* Herba hirta, foliis pinnatifidis, floribus ſpicato-capitatis violaceis, bracteis pectinato-ciliatis.

2057. TRICHOSTEMMA.

dichotomum 1. Tr. foliis oblongis integerrimis, racemis laxis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Tr. piloſum Roth.)

lineare Mühlb. 2. Tr. foliis linearibus craſſiuſculis glabris, racemis laxis viſcido-pubeſcentibus. *Amer. boreal.* (Tr. dichotomum Roth.)

ſpirale Lour. 3. Tr. foliis ovatis acutis integerrimis tomentoſis, floribus ſpicatis, ſtaminibus ſpiratim convolutis. *Cochinchina.*

2058. THYMUS.

* *Floribus arcte capitatis.*

villosus 1. Th. bracteis imbricatis ovato-lanceolatis subdentatis, foliis setaceis fasciculatis pilosis, caule villoso. *Lusitan.*

capitellatus Link. 2. Th. capitulis subglobosis, bracteis ovatis obtusis subtus incanis, foliis linearibus abbreviatis margine revolutis glabriusculis. *Lusitan.*

cephalotus 3. Th. capitulis oblongis, bracteis ovato-oblongis integerrimis coloratis imbricatis, foliis linearibus fasciculatis, caule villoso. *Hispania. Lusitania.*

numidicus Poir. 4. Th. capitulis oblongis, bracteis lanceolatis acutis ciliatis, calycibus villosis, foliis linearibus subtus nervosis punctatis. *Afric. bor. Hispania.* (Th. capitatus Lag. hispanicus Poir.)

laevigatus Vahl. 5. Th. capitulis subglobosis, bracteis lanceolatis obtusis, foliis spathulato-linearibus obtusis punctatis basi ciliatis, caule procumbente. *Arabia.* (Th. Serpyllum Forsk.)

striatus Vahl. 6. Th. capitulis ovatis, bracteis subovatis striatis, foliis lineari-lanceolatis margine punctatis. *Neapol.* (Th. Marinosci Tenor.)

Richardi Pers. 7. Th. bracteis ovatis calycibusque rigidis, foliis late ovatis subtus nervosis. *Ins. balear.*

creticus Brot. 8. Th. bracteis oblongis ciliatis corolla brevioribus, staminibus exsertis, ramis tomentosis, foliis lineari-lanceolatis fasciculatis glabris ciliatis. *Ad oras maris mediterranei omnes.* (Satureia capitata L. Th. capitatus Link.)

hirsutissimus Poir. 9. Th. capitulis ovatis villosissimis, bracteis lanceolatis ciliatis, foliis ovato-lanceolatis subsessilibus hirsutis, caule ramoso. *Asia minor.*

** *Floribus laxe capitatis aut verticillato-spicatis.*

odoratissimus MB. 10. Th. floribus laxiuscule capitatis, staminibus exsertis, ramis virgatis pubescentibus, foliis lineari-setaceis ciliatis. *Podolia austr. Tauria. Ad Volgam.*

acicularis Kit. 11. Th. floribus laxiuscule capitatis, bracteis ovatis coloratis, ramis virgatis pubescentibus, foliis linearibus obtusis lineato-venosis punctatis ciliatis. *Croatia.*

hirsutus MB. 12. Th. floribus subcapitatis, dentibus calycis subulatis subaequalibus, foliis linearibus undique pilosissimis, caule repente. *Croatia. Hispania?* (Th. hirtus W.)

Zygis 13. Th. floribus verticillato-capitatis, ramis erectis calycibusque hirsutis, foliis linearibus obtusis basi attenuatis ciliatis subtus revolutis incanis. *Hispan. Lusitan.*

Marschallianus W. 14. Th. verticillis subracemosis, dentibus calycis subaequalibus subulatis hirsutis, ramis erectis villosis, foliis lineari-oblongis obtusis subtus pla-

nis lineatis glabriusculis. *Europ. auſtr. Tauria.* (Th. glabratus Link.)

anguſtifolius Schreb. 15. Th. floribus glomerato-capitatis, dentibus calycis inaequalibus, inferioribus ſubulatis, ramis aſcendentibus hirſutis, foliis lineari-oblongis obtuſis ſubtus planis pallidis lineatis ciliatis. *Europ.*

Serpyllum 16. Th. floribus glomerato-capitatis verticillatisque, calycis hirſuti limbo discolore, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, foliis ovalibus baſi ciliatis, caule decumbente, ramis aſcendentibus. *Europ. Aſia.* (Th. includens Ehrh.)

exſerens Ehrh. 17. Th. floribus glomerato-capitatis verticillatisque, calyce glabriusculo, ſtaminibus corollam excedentibus, ramis erectis, foliis ovali-oblongis baſi ſubciliatis. *Europ.*

collinus MB. 18. Th. floribus laxe verticillato-capitatis, calycis limbo concolore, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, foliis ellipticis glabriusculis baſi ſubciliatis, caule undique hirto. *Podolia. Tauria. Caucaſ.* (Th. Serpyllum MB. tom. 2.)

montanus Kit. 19. Th. floribus verticillato-ſpicatis, calycibus nudiusculis, ſtaminibus corollam ſubexcedentibus, foliis ovato-ellipticis glabris, caule ramisque erectis pubeſcentibus. *Hungar. Transſylvan.* (Th. majoranaefolius Deſf. Poir. nummularius MB.)

lanuginoſus Schk. 20. Th. floribus verticillato-racemoſis, ſtaminibus exſertis, foliis ſubrotundis ramisque undique hirtis. *Europ.* (Th. pannonicus Schult.)

lucidus Ehrh. 21. Th. floribus verticillato-racemoſis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ovali-oblongis acutiusculis glaberrimis ſupra lucidis ſubtus lineatis, caule erecto ramoſo. *Patria?*

vulgaris 22. Th. floribus verticillato-racemoſis, ſtaminibus corollam aequantibus vel ſuperantibus, foliis ovatis glabris ſubtus revolutis, caule erecto. *Europ. auſtr. Sibir.*

Maſtichina 23. Th. floribus verticillato-capitatis, calycis lanati dentibus ſubulatis elongatis pectinato-ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris ſubintegerrimis. *Hiſpania.*

tomentoſus W. 24. Th. floribus verticillato-ſpicatis, calycis lanati dentibus ſetaceo-ciliatis, foliis ellipticis integerrimis utrinque tomentoſis. *Hiſpania.*

albicans Link. 25. Th. floribus verticillato-capitatis, dentibus calycis ſubulatis ſubaequalibus, foliis lanceolatis acutis ſubtus albidis, ramulis filiformibus. *Luſitania.*

lanceolatus Desf. 26. Th. floribus verticillato-ſpicatis, dentibus calycis linearibus ſubinaequalibus, ſtaminibus corolla longioribus, foliis oblongis pubeſcentibus, caule erecto. *Atlas. Graecia.*

caeſpiticius 27. Th. capitulis paucifloris, ſtaminibus corollam ſuperantibus, foliis lineari-lanceolatis revolutis glabriusculis, ramis diffuſis proſtratis radicantibus. *Luſitan.* (Th. repens Link.)

*** *Floribus verticillatis, verticillis distinctis.*

Acinos. 28. Th. verticillis 6floris, calycibus basi gibbosis hirsutis corolla dimidio brevioribus, foliis oblongis acutis subserratis, caule erecto ramoso villoso. *Europ. Asia med.*

graveolens MB. Sm. 29. Th. verticillis 6floris, calycibus basi gibbis hirsutissimis corollam subaequantibus, foliis ovatis acutis serratis. *Tauria. Caucas. Graecia.* (Th. canus Stev.)

acinoides Tenor. 30. Th. verticillis 6floris subapproximatis, calycibus subsessilibus basi gibbosis hirsutis corolla duplo brevioribus, foliis inferioribus ovatis obtusis superioribus lanceolatis acutis subintegerrimis, caule ascendente simpliusculo. *Neapol. Helvetia.* (Th. heterophyllus Poir.)

patavinus Ait. 31. Th. verticillis sub-6floris, calycibus pubescentibus basi gibbosis corolla fauce inflata subtriplo brevioribus, foliis subrotundo-ovatis acutis serratis subtus lineatis. *Europ. austr.* (Acynos rotundifolius Pers.)

alpinus 32. Th. verticillis paucifloris, calycibus hirsutis basi subgibbosis corolla fauce inflata subtriplo brevioribus, foliis subrotundis obtusiusculis concavis serratis. *Alp. Europ. med. et austr.* (Acynos purpurascens Pers.)

corsicus Pers. 33. Th. verticillis paucifloris, calycibus hirsutis basi subaequalibus corolla duplo brevioribus, foliis orbiculatis integerrimis margine subcartilagineis glabriusculis, ramis repentibus. *Corsica.*

Herba barona Lois. 34. Th. verticillis sub-3floris, calycibus subcampanulatis glabriusculis basi aequalibus corolla dimidio brevioribus, foliis lanceolatis utrinque attenuatis glabris, ramis erectiusculis. *Corsica.*

syrticus * 35. Th. verticillis sub-4floris, ramis floriferis subaphyllis, calycibus hispidissimis corolla minoribus, foliis linearibus margine revolutis undulatis hispidis, caule erecto ramoso. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.* (Th. hirtus Viv.)

Tragoriganum 36. Th. verticillis sub-6floris bracteatis, calycibus cylindricis hispidis corolla subbrevioribus, foliis lineari-lanceolatis rigidis hirsutis. *Creta. Graecia. Cyprus.*

suaveolens Sm. 37. Th. verticillis paucifloris, foliis elliptico-lanceolatis mucronatis subserratis hirtis, caule suffruticoso. *Parnassus Graeciae.*

exiguus Sm. 38. Th. verticillis paucifloris, foliis oblique rhombeis mucronatis subintegerrimis, corolla filiformi. *Cyprus.*

**** *Pedunculis subsolitariis unifloris.*

Brownei Sw. 39. Th. pedunculis oppositis capillaribus demum deflexis, calycibus cylindricis, dentibus aequalibus lanceolatis, caule ascendente gracili foliisque subrotundis crenatis glaberrimis. *Jamaica.*

filiformis Ait. 40. Th. caule filiformi decumbente, foliis cordatis acutis integerrimis. *Inſ. balear.*

fruticuloſus Bertol. 41. Th. caule ſuffruticoſo ramoſiſſimo aſcendente, foliis lanceolatis nervoſis margine revolutis hirſutiusculis, pedunculis ſolitariis 2bracteatis. *Sicilia.* (Satureia faſciculata Rafin.)

nubigenus Humb. 42. Th. caule ſuffruticoſo proſtrato, foliis ſubrhombeo-ovatis obtuſis integerrimis, pedunculis abbreviatis, calycibus corolla ſuperne ampliata duplo brevioribus. *Alp. Quito.*

xalapenſis Humb. 43. Th. caule herbaceo procumbente filiformi, foliis ſubcordatis obtuſis crenatis piloſiusculis, pedunculis elongatis, calycibus corolla brevioribus. *Mexico.*

*† *Pedunculis axillaribus 3-multifloris ſubcymoſis.*

Teneriffae Perſ. 44. Th. pedunculis folia aequantibus ſub-3floris, calycibus hirſutiusculis, dentibus ſubaequalibus, foliis oblongo-lanceolatis glabris, ramis filiformibus decumbentibus. *Teneriffa. Sicil. auſtr.* Guſſone. (Th. terebinthaceus W.)

Barrelieri * 45. Th. pedunculis folia ſubaequantibus verticillalatis bracteatis 2-3floris, dentibus calycis ſubulatis inaequalibus, foliis ovatis obtuſiusculis ſubdentatis cauleque erecto albido-villoſis. *Gallia auſtr. Sicil. Graecia.* (Meliſſa cretica L. Thymus creticus Cand.)

ſubnudus * 46. Th. pedunculis ſub-3floris axillaribus folio brevioribus, caule erecto foliisque ovatis obtuſis ſubdentatis glabriusculis. *Hungar.* (Meliſſa ſubnuda Kit.)

inodorus Deſf. 47. Th. pedunculis 2-3floris confertis racemoſis folio brevioribus, dentibus calycis ſubulatis inaequalibus ſtaminibusque corolla brevioribus, foliis linearibus faſciculato-confertis pubeſcentibus, caule fruticuloſo erecto. *Afric. bor. Neapol. Hiſpan.* (Th. ericaefolius Roth. W.)

micranthus Brot. 48. Th. pedunculis verticillatis ſub-3floris folio brevioribus, calycibus ſtaminibusque corolla ſubbrevioribus, caule erecto ſtricto foliisque ovato-oblongis ſubtus venoſis pubeſcentibus. *Luſitan. Neapol.* (Th. virgatus Tenor.)

microphyllus Urv. 49. Th. pedunculis ſub-3floris folia ſuperantibus, calycibus corolla duplo brevioribus, foliis minimis ovatis nervoſis, caule proſtrato, ramis filiformibus. *Inſ. Melita.*

incanus Sm. 50. Th. pedunculis ſub-6floris, calycibus corollam ſubaequantibus, foliis ſubrotundis integerrimis incano-tomentoſis. *Attica. Inſ. maris aegei.*

† *veronicaefolius* * 51. Th. pedunculis elongatis ramoſis, calycibus glabris, foliis ovatis ſerratis, caule ramoſo diffuſo. *Inſ. baham.*

Piperella 52. Th. pedunculis multifloris lateralibus ſecundis, calycibus coloratis, foliis ſubrotundis obtuſis nervoſis glabris, caule aſcendente. *Hiſpania. Italia. Croatia.* (Th. croaticus Perſ.)

Calamintha Scop. Sm. 53. Th. pedunculis cymosis, inferioribus folio brevioribus, floribus glomeratis, foliis ovatis subserratis cauleque erecto hirsutiusculis. *Anglia. Europ. austr.* (Melissa Calamintha L. umbrosa MB. Th. Moscatella Pollin. varr.)

Nepeta Scop. Sm. 54. Th. pedunculis dichotomo-corymbosis folio longioribus, foliis ovatis serratis cauleque ascendente hirsutis. *Anglia. Europ. austr.* (Melissa Nepeta L. Th. multiflorus Pers.)

2059. GARDOQUIA R. et P.

* *Pedunculis solitariis unifloris.*

grandiflora Kunth. 1. G. foliis obovatis obtusis subdentatis subtus incano-tomentosis, pedunculis abbreviatis, corolla (flava) calycem 4plo superante. *Quito.*

argentea Kunth. 2. G. foliis oblongo-lanceolatis obtusis integerrimis margine revolutis utrinque argenteo-sericeis, pedunculis abbreviatis, corolla (coccinea) calycem 3plo excedente. *Peru.*

glabrata Kunth. 3. G. foliis oblongo-lanceolatis subserratis revolutis supra nitidis subtus glandulosis, pedunculis abbreviatis, corolla calycem duplo excedente. *Quito.*

taxifolia Kunth. 4. G. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris subtus punctatis, ramis villosis, pedunculis abbreviatis. *Nov. Granat.*

discolor Kunth. 5. G. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis venosis subtus incano-sericeis, pedunculis bracteatis. *Nov. Granat. Peru.* (G. striata R. et P.?)

microphylla Kunth. 6. G. foliis cordato-ovatis obtusis revolutis ciliatis, corolla (rubra) calycem multoties superante. *Peru. Quito.* (G. revoluta R. et P.)

** *Pedunculis unifloris subverticillatis.*

obovata R. et P. 7. G. foliis obovato-ellipticis integerrimis utrinque stellato-pubescentibus, floribus subternis axillaribus brevissime pedunculatis. *Peru. Monte Video.*

elliptica R. et P. 8. G. foliis ovato-ellipticis serratis, floribus subternis axillaribus. *Peru.*

thymoides Kunth. 9. G. foliis subcordato-ovatis acutis subserratis margine revolutis subtus incano-pubescentibus, verticillis multifloris distantibus. *Quito.*

*** *Pedunculis trifloris.*

tomentosa Kunth. 10. G. foliis subrotundo-ovatis acutiusculis subserratis subtus albido-tomentosis, pedunculis axillaribus 3floris. *Quito.* (G. incana R. et P.)

elegans Kunth. 11. G. foliis subrotundo-ovatis obtusis crenatis subtus albido-tomentosis, pedunculis axillaribus 3floris. *Peru. Quito.* (G. pulchella Kunth.)

**** *Pedunculis multifloris.*

multiflora R. et P. 12. G. foliis ovatis ſerratis, pedunculis multifloris. *Chili.*

2060. THYMBRA.

ſpicata 1. Th. ramis lignoſis rigidis, foliis linearibus glabris acutis, junioribus faſciculatis obtuſis ciliatis, floribus ſpicatis, bracteis lanceolatis albo-fimbriatis. *Graecia. Creta. Aſia minor. Syria. Palaeſtina.*

† *ambigua* Clark. 2. Th. floribus verticillato-ſpicatis, bracteis lanceolatis flores ſuperantibus, foliis 4fariam imbricatis linearibus obtuſiſſimis punctatis ciliatis. *Ad Thermopylas Graeciae.* (Th. verticillata L.)

ciliata Desf. 3. Th. floribus capitatis, bracteis ovato-oblongis ſtriatis, foliis linearibus ciliatis punctatis, ramis erectis lanatis. *Afric. bor.*

2061. LEPECHINIA W.

ſpicata W. 1. L. ſpicis pedunculatis bracteatis, foliis ovato-oblongis baſi truncatis crenatis. *Mexico.* (Horminum cauleſcens Orteg.)

clinopodifolia W. 2. L. floribus verticillato-capitatis, foliis oblongis baſi attenuatis remote ſerratis. *Sibir.* (Horminum Perſ.)

2062. CLINOPODIUM.

vulgare 1. Cl. capitulis verticillatis, bracteis ſetaceis hiſpidis, foliis ſupra piloſis remote dentatis. *Europ. Aſia. Amer. bor.*

aegyptiacum Lam. 2. Cl. capitulis terminalibus, bracteis ſetaceis hiſpidis, foliis ſupra glabris ſubintegerrimis. *Aegypt.*

origanifolium Labill. 3. Cl. capitulis verticillatis, bracteis lineari-lanceolatis hiſpidis, foliis ovatis integerrimis hirſutis. *Libanus.*

aſiaticum Lour. 4. Cl. verticillis ſpicatis, bracteis hirſutis, foliis ovato-oblongis obtuſis ſubſerratis rugoſis ſubtus tomentoſis. *Cochinchina.*

2063. MELITTIS.

Meliſſophyllum 1. M. foliis ovatis aequaliter ſerratis, calyce glabro 3fido, laciniis integerrimis. *Europ.*

grandiflora Sm. 2. M. foliis ovatis aequaliter ſerratis, calyce glabro 4fido, labio corollae ſup. emarginato. *Anglia.*

caroliniana * 3. M. foliis rhombeo-ovalibus apice ſubdentatis glabriuſculis, calyce villoſo inaequaliter 3fido. *Georgia. Carolina.* (Thymbra caroliniana Walt. Thymus carolinianus Mx. Th. grandiflorus Sims. Calamintha grandiflora Pursh. Macbridea pulcra Ell. Nutt.)

† *japonica* Thb. 4. M. foliis alternis ovatis obtufis inaequaliter ferratis villofis, pedunculis axillaribus folitariis, calycibus 3fidis hirfutis. *Japon.*

2064. SCUTELLARIA.

* *Floribus axillaribus folitariis.*

galericulata 1. Sc. caule deorfum pubefcente, foliis cordato-lanceolatis crenato-ferratis, floribus fecundis. *Europ. Afia.*

haftifolia 2. Sc. caule furfum pubefcente, foliis fubhaftatis fubintegerrimis, floribus fecundis. *Europ.*

minor 3. Sc. caule glabro gracili, foliis inferioribus cordato-ovatis fubcrenatis fuperioribus lanceolatis integerrimis, floribus fecundis. *Europ.*

gracilis Nutt. 4. Sc. caule fimpliciusculo, foliis late ovatis dentatis feffilibus, fuperioribus anguftioribus, floribus exiguis. *Penfylvania.*

ambigua Nutt. 5. Sc. caule decumbente ramofo, foliis ovatis remote dentatis fupra hirfutiusculis, floribus exiguis. *Ad fl. Ohio.*

havanenfis Jacq. 6. Sc. caule procumbente tenello, foliis cordato-ovatis crenatis, corollae labio utroque trifido. *Cuba.*

parvula Mx. 7. Sc. caule humili foliisque omnibus ovatis integerrimis denfe pubefcentibus. *Amer. bor.*

humilis R. Br. 8. Sc. foliis cordato-ovatis groffe crenatis fubtus punctatis pubefcentibus. *Nov. Holland. Terra Diemen.*

mollis R. Br. 9. Sc. foliis cordato-oblongis incifo-crenatis glandulofo-pilofis, pedunculis petiolos aequantibus. *Nov. Holl.*

rumicifolia Kunth. 10. Sc. caule erecto ramofo glabro, foliis cordato-fagittatis integerrimis, fuperioribus lanceolatis. *Mexico.*

cumanenfis Kunth. 11. Sc. caule fruticofo glabro, foliis fubrotundis obtufis crenatis utrinque hirfutis fubtus incanis. *Cumana.*

volubilis Kunth. 12. Sc. caule volubili, ramis 4angulis pilofis, foliis ovalibus crenatis utrinque villofis fubtus incanis. *Nov. Granat.*

anguftifolia Pursh. 13. Sc. caule fimplici tenuiffime pubefcente, foliis linearibus, floribus oppofitis axillaribus, genitalibus fubexfertis. *Ad montes fcopulofos Amer. boreal.*

† *Adamfii* * 14. Sc. foliis lineari-lanceolatis, infimis fubferratis, corollis villofis. *Inter Cafan. et Permiam.* (Sc. anguftifolia Adam.)

** *Racemis fpicatis axillaribus.*

malvaefolia Humb. 15. Sc. floribus axillaribus fubfpicatis, foliis fubrotundo-ovatis obtufe groffe crenatis fupra ftrigofis. *Nov. Granat.*

grandiflora Sims. 16. Sc. fpicis breviffimis 4gonis, corollis hirfutis bracteas quater fuperantibus, foliis cordatis in-

ciſo-crenatis utrinque pubeſcentibus petiolo brevioribus. *Sibir.*

lateriflora 17. Sc. racemis laxis bracteatis axillaribus, bracteis pedicellos ſuperantibus, caule ramoſo foliisque ovato-oblongis acutis profunde ſerratis glaberrimis, radice repente. *Amer. bor.*

*** *Racemis terminalibus*

† *ſimplicibus.*

orientalis 18. Sc. racemis laxiusculis folioſis ſubtetragonis, bracteis calyces ſuperantibus, foliis ſubcordato-ovato-oblongis inciſo-crenatis ſubpinnatifidis ſubtus albidis. *Aſia minor.*

hirta Sm. 19. Sc. racemis ſpicatis ſubſecundis, bracteis petiolatis flore duplo brevioribus, caule decumbente foliisque ſubcordato-ovatis crenatis villoſiſſimis. *Creta. Libanus.* (Sc. decumbens Sieber. utriculata Labill.)

alpina 20. Sc. racemis ſpicatis rotundato-4gonis, bracteis imbricatis ſeſſilibus flore duplo brevioribus, caule aſcendente villoſiusculo, foliis ſubcordato-ovatis crenatis. *Alp. Europ. med. Cochinchina.*

peregrina 21. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis, bracteis petiolatis ovatis calycem ſuperantibus, foliis cordatis ſerratis glabris. *Italia. Hungar. Sibir.*

altiſſima 22. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis pubeſcentibus, bracteis petiolatis ovatis calycem ſubaequantibus, foliis cordatis crenato-ſerratis acutis glabriusculis. *Tauria. Caucaſ. Sibir.*

pallida MB. 23. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis piloſo-hiſpidis, bracteis petiolatis ovatis calycem ſuperantibus, foliis cordatis obtuſiusculis crenato-ſerratis villoſis. *Tauria.*

Columnae All. 24. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis, bracteis petiolatis ovatis calyce brevioribus, foliis cordatis oblongis ſerratis pubeſcentibus. *Italia.*

rubicunda Hornem. 25. Sc. racemis ſpicatis elongatis ſecundis, bracteis petiolatis ovatis flores ſuperantibus, foliis ovatis groſſe ſerratis glabris. *Patria?*

nigreſcens * 26. Sc. racemis ſpicatis ſecundis, bracteis ſubſeſſilibus oblongis calyces villoſiſſimos ſuperantibus, foliis cordato-ovatis crenatis ſubtus ramisque caneſcentibus. *Creta.* (Sc. hirta Sieb.)

albida 27. Sc. racemis ſpicatis ſecundis elongatis, bracteis remotiusculis ovatis petiolatis calyces villoſiusculos ſuperantibus, foliis ovato-oblongis obtuſiusculis crenatis. *Graecia. Aſia minor. Cochinchina.*

lupulina 28. Sc. racemis laxis ſubſpicatis aequalibus, bracteis oblongis glabris coloratis calyces piloſiſſimos longe ſuperantibus deciduis, foliis ovato-oblongis obtuſis crenatis glaberrimis. *Sibir.*

integrifolia 29. Sc. racemis laxis aequalibus folioſis, calycibus glabris, foliis inferioribus oblongis obſolete ſer-

ratis, ſuperioribus lanceolatis integerrimis. *Amer. bor.* (Sc. hyſſopifolia L.)

purpuraſcens Sw. 30. Sc. racemis laxis, bracteis ſubrotundis minutis longe petiolatis, calycibus glabris, corollae labio utroque 3fido, foliis ovato-ſubrotundis repandis glaberrimis. *Ind. occ.*

coccinea Humb. 31. Sc. racemis laxis, bracteis lanceolatis obtuſis pedicellos aequantibus, foliis oblongis obtuſis integerrimis glabris ſubtus purpuraſcentibus. *Nov. Granat.*

incarnata Vent. 32. Sc. racemis ſpicatis ſubſecundis, bracteis lineari-lanceolatis pedicellos aequantibus, calycibus villoſis, foliis cordatis dentatis ſubtus tomentoſis. *Amer. auſtr.*

† *caroliniana* Lam. 33. Sc. racemis laxis folioſis, calycibus obtuſis, foliis lineari-lanceolatis acutis integerrimis cauleque ramoſo glaberrimis. *Carolina.*

nervoſa Pursh. 34. Sc. racemo laxo folioſo, foliis ſeſſilibus ovatis dentatis nervoſis cauleque ſimplici glabris. *Virginia.*

†† *Racemo terminali compoſito.*

piloſa Mx. 35. Sc. bracteis ovatis petiolatis pedicellos ſuperantibus, foliis remotis oblongis obtuſis baſi attenuatis crenatis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Sc. elliptica Mühlenb., ovalifolia Perſ., caroliniana Walt.)

ſerrata Andr. 36. Sc. bracteis lanceolatis pedicello brevioribus, foliis ovatis acuminatis ſerratis pubeſcentibus ſubtus incanis. *Amer. bor.* (Sc. pubeſcens Mühlenb.)

caneſcens Nutt. 37. Sc. bracteis ovato-lanceolatis calyce longioribus, foliis ſubcordato-ovatis acutis ſerratis ſubtus racemisque incano-villoſis. *Ad fl. Ohio.*

verſicolor Nutt. 38. Sc. bracteis ovatis viſcido-pubeſcentibus, foliis late cordatis obtuſe dentatis glabriusculis. *Ad fl. Ohio.*

2065. CHILODIA R. Br.

ſcutellarioides R. Br. *Nov. Holl.* Fruticulus foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis.

2066. PROSTANTHERA Labill.

* *Floribus axillaribus ſubſolitariis.*

denticulata R. Br. 1. Pr. foliis linearibus apice denticulatis ſubtus revolutis glanduloſis, calycibus piloſiusculis. *Nov. Holl.*

marifolia R. Br. 2. Pr. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis piloſis, calycis hirſuti labio inf. retuſo, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holl.*

rhombea R. Br. 3. Pr. foliis rhombeo-orbiculatis integerrimis ſubtus glanduloſis, calycibus pubeſcentibus, antherarum calcaribus abbreviatis. *Nov. Holl.*

retuſa R. Br. 4. Pr. foliis orbiculatis crenatis utrinque glanduloſis, calycis labio inf. retuſo, antherarum calcaribus abbreviatis. *Terra Diemen.*

** *Racemis paucifloris.*

coerulea R. Br. 5. Pr. foliis lanceolatis dentatis glabris. *Nov. Holl.*

rotundifolia R. Br. 6. Pr. foliis orbiculatis craſſiuſculis glabris ſubintegerrimis, ramulis tomentoſis. *Terra Diemen.*

inciſa R. Br. 7. Pr. foliis obovatis inciſis utrinque glanduloſis, calycis labio inf. anguſtiori duplo longiori. *Nov. Holl.*

ſaxicola R. Br. 8. Pr. foliis lineari-oblongis integerrimis piloſiuſculis, racemo foliato, calycis hirſutiuſculi labio utroque integerrimo ſubaequali, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holl.*

violacea R. Br. 9. Pr. foliis ſubrotundis crenatis glanduloſis pubeſcentibus, calycis labio inf. duplo longiori anguſtiori. *Nov. Holl.*

*** *Racemis ſubcompoſitis terminalibus.*

linearis R. Br. 10. Pr. foliis linearibus integerrimis ſubtus revolutis laevibus, calycibus glabris. *Nov. Holl.*

ovalifolia R. Br. 11. Pr. foliis ovalibus ſubintegerrimis glabris, ramulis corollisque extus pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

prunelloides R. Br. 12. Pr. foliis ovatis acutis inciſo-dentatis glabris, bracteis deciduis, corollis extus hirſutis, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holl.*

laſiantha Labill. 13. Pr. foliis lanceolatis dentato-ſerratis glabris, racemis paniculatis, corollis hirſutis, antherarum calcaribus elongatis. *Nov. Holland. Terra Diemen.*

2067. CRYPHIA R. Br.

ſerpyllifolia R. Br. 1. Cr. foliis lineari-oblongis planiuſculis calycibus ramulisque glabriuſculis. *Nov. Holl. auſtr.*

microphylla R. Br. 2. Cr. foliis ovalibus convexis minutiſſimis faſciculatis calycibus ramulisque piloſiuſculis. *Nov. Holl. auſtr.*

2068. PERILOMIA Kunth.

ſcutellarioides Kunth. 1. P. foliis ovatis acuminatis crenatis, calycibus glabriuſculis, fructibus verruculoſo-aſperis. *Peru.*

ocimoides Kunth. 2. P. foliis ſubrotundo-ovatis acutis crenatis, calycibus pubeſcentibus, fructibus laevibus. *Quito.*

dubia * 3. P. foliis ovato-oblongis acutis ſerratis, calycibus fructibusque pubeſcentibus. *Braſil.* Sello.

2069. HEMIANDRA R. Br.

pungens R. Br. *Nov. Holl. auſtr.* Suffrutex humilis, foliis integerrimis calycisque labiis nervoſis mucronatis, floribus axillaribus ſolitariis albo-purpureis.

2070. SYNANDRA Nuttall.

grandiflora Nuttall. *Ad fl. Ohio.* Herba foliis cordato-ovatis amplexicaulibus dentatis, floribus axillaribus ſeſſilibus ochroleucis purpureo-ſtriatis.

2071. AIUGA.

* *Foliis indiviſis.*

oblongata MB. 1. A. foliis oblongis obtuſiuſculis integerrimis, calycibus oppoſitis ſubrotundo-ovatis corollae tubo triplo brevioribus, caule ramoſo aſcendente. *Caucaſ.* (A. ſalicifolia Stev.)

ſalicifolia Schreb. 2. A. foliis lanceolato-ellipticis obtuſiuſculis ſubintegerrimis, calycibus oppoſitis oblongis tubo corollae ſubduplo brevioribus, caule ſimplici diffuſo. *Aſia minor. Armenia. Caucaſ.* (Teucrium ſalicifolium L.)

Iva Schreb. 3. A. foliis linearibus ſubdentatis integerrimisque albido-villoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſolitariis. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (A. moſchata Schreb. Pſeudo-iva Cand.)

reptans 4. A. foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis ſubdentatis cauleque glabris, ſtolonibus reptantibus, floribus axillaribus ſeſſilibus, lobo medio labii inf. obcordato. *Europ. Cochinchina.*

alpina 5. A. foliis uniformibus glabriuſculis oblongis baſi attenuatis dentatis, verticillis multifloris remotis, lobo medio lab. inf. oblongo integerrimo. *Europ.*

geneveńſis 6. A. foliis cauleque ſubvilloſis, caulinis radicalia ſubſuperantibus inciſo-dentatis, floribus verticillatis, lobo medio labii inf. abbreviato. *Europ.*

pyramidalis 7. A. verticillis multifloris pyramidato confertis, lobo medio labii inf. producto emarginato, foliis radicalibus maximis obovato-oblongis crenatis. *Europ.*

† *decumbens* Thb. 8. A. floribus verticillatis, foliis obovatis dentatis cauleque decumbente villoſis. *Japon.*

† *Tenorii* Presl. 9. A. floribus axillaribus congeſtis, foliis oblongis angulato-dentatis, floralibus majoribus, lobo medio labii inf. emarginato, caule humili villoſo. *Neapol. Sicil.*

auſtralis R. Br. 10. A. caule erectiuſculo ſimplici, foliis radicalibus oblongis repando-dentatis longe petiolatis, floralibus ſeſſilibus integerrimis. *Nov. Holl.*

ſinuata R. Br. 11. A. caule decumbente hirſuto, foliis omnibus oblongis ſinuatis baſi attenuatis, calycibus hirſutiſſimis, corollis piloſiuſculis. *Nov. Holl.*

orientalis 12. A. caule erecto villoſo, foliis oblongis dentatis, corollis inverſis. *Thracia. Aſia minor.*

** *Foliis diviſis.*

chia Schreb. 13. A. foliis 3fidis piloſis, floribus axillaribus folia ſuperantibus, caule diffuſo. *Inſ. Chios. Aſia minor.*

Chamaepitys Schreb. 14. A. foliis 3fidis piloſis, floribus axillaribus ſolitariis folio brevioribus, caule ramoſo erecto. *Europ. med. auſtr. Aſia minor. Afric. et Amer. bor.* (Teucrium L.)

2072. ANISOMELES R. Br.

ovata R. Br. 1. A. caule erecto, foliis ovatis acutis crenatis denſe villoſis, verticillis ſubcymoſis multifloris, bracteis linearibus. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (Nepeta indica et amboinica L. Ballota diſticha L. Ait.)

malabarica R. Br. 2. A. caule erecto foliisque ovato-lanceolatis ſerratis baſi integerrimis lanato-tomentoſis, verticillis ſubſpicatis, bracteis filiformibus. *Ind. or.* (Nepeta malabarica L.)

*nepalenſis** 3. A. foliis ſubcordato-ovatis dentatis hirſutis, cymis pedunculatis axillaribus. *Nepal.* (Aiuga furcata Link. Craniotome verſicolor Reichenb.)

ſalviſolia R. Br. 4. A. foliis lanceolatis ſupra laevibus ſubtus rugoſis cauleque incano-tomentoſis, verticillis multifloris. *Nov. Holl.*

moſchata R. Br. 5. A. foliis ellipticis cauleque cinereo-pubeſcentibus, verticillis paucifloris, calycibus glanduloſis. *Nov. Holl.*

inodora R. Br. 6. A. foliis ellipticis glabriuſculis ſubtus punctatis, verticillis remotis, calycibus glanduloſis. *Nov. Holl.*

2073. TEUCRIUM.

1. *Floribus axillaribus ſolitariis, geminis oppoſitis.*

fruticans 1. T. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus calycibusque albo-tomentoſis, dentibus calycis lanceolatis, caule fruticoſo. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (T. latifolium L. var.)

heterophyllum Herit. 2. T. foliis ellipticis integerrimis crenatisque ſubtus albido-tomentoſis, dentibus calycis abbreviatis, caule fruticoſo. *Inſ. Canar.* (T. canarienſe Lam.)

Laxmanni Murr. 3. T. foliis oblongis nervoſis integerrimis ſubſerratisque villoſis, calycibus breviter pedunculatis villoſiſſimis, dentibus obtuſiuſculis, caule herbaceo. *Hungar. Transſylvan. Podol. Tauria. Caucaſ. Sibir.*

ſeſſilifolium Clark. 4. T. foliis ſeſſilibus obtuſis hirſutis, inferioribus lanceolatis integerrimis floralibus ſubellipticis crenatis, floribus ſubſeſſilibus. *Thracia.*

alpeſtre Sm. 5. T. foliis ſubrotundis baſi attenuatis inciſo-crenatis tomentoſis, caule fruticoſo ramoſiſſimo. *Creta.*

brevifolium Schreb. 6. T. foliis lanceolatis revolutis integerrimis obtuſis incanis, calycibus longe pedunculatis obtuſe dentatis, caule fruticoſo. *Creta.*

microphyllum Desf. 7. T. foliis ovatis crenulatis ſubtus revolutis incanis, dentibus calycis acutis, caule fruticoſo ramoſo. *Creta.*

aſiaticum 8. T. foliis lineari-lanceolatis patentiſſimis repando-ſerratis ſubtus tomentoſis, calycis lab. ſup. cordato. *Ind. or.?*

cubenſe 9. T. foliis oblongis baſi attenuatis ſubtrifido-inciſis glaberrimis, calycis dentibus lanceolatis cuſpidatis. *Cuba.*

africanum Thunb. 10. T. foliis 3fidis ſubtus albo-tomentoſis, laciniis linearibus obtuſis, pedunculis 1floris folio brevioribus *Afric. auſtr.*

Niſſolianum 11. T. foliis ſub-3fidis glabris, laciniis obtuſiuſculis, dentibus calycis longe ariſtatis, caule herbaceo decumbente. *Hiſpania.*

Pſeudo-Chamaepitys 12. T. foliis 3partitis hirſutis rigidiuſculis, laciniis linearibus acutis ſubtus revolutis, laciniis calycis elongatis pungentibus. *Hiſpan. Gallia auſtr. Sicil. Afric. bor.* (T. mauritanum Schreb. var.)

laevigatum Vahl. 13. T. foliis tri-multipartitis glabris, laciniis ſubdentatis ſubtus planis, laciniis calycis lanceolatis mucronatis, caule erecto herbaceo. *Ad fl. Plata.* Sello.

campanulatum 14. T. foliis multifidis glabris, laciniis linearibus inciſis, calycibus campanulatis piloſis, dentibus ſubariſtatis, caule herbaceo. *Italia. Graecia.*

2. *Floribus verticillatis, verticillis utplurimum dimidiatis.*

regium 15. T. foliis inferioribus petiolatis ovatis ſub-2dentatis, floralibus ſeſſilibus lanceolatis integerrimis, calycis piloſi dentibus cuſpidatis, caule fruticoſo. *Hiſpania.*

multiflorum 16. T. foliis inferioribus ovalibus apice dentatis, floralibus integerrimis petiolatis, verticillis approximatis multifloris, calycibus piloſis acutis, caule decumbente fruticoſo. *Hiſpania.*

lucidum 17. T. foliis omnibus ovatis baſi cuneatis inciſo-dentatis glaberrimis, calycis laevis dentibus acutis, caule ſuffruticoſo. *Italia. Graecia. Cyprus.*

Chamaedrys 18. T. foliis obovato-oblongis inciſo-crenatis piloſiuſculis, verticillis paucifloris, calycis campanulati dentibus acutis, caule procumbente. *Europ. Aſia med.*

Scordium 19. T. foliis oblongis ſeſſilibus baſi attenuatis groſſe ſerratis glabriuſculis, verticillis dimidiatis, caule

villoſo. *Europ. Aſia media.* (T. caucaſicum W. herb. var. verticillis multifloris.)

ſcordioides Schreb. 20. T. foliis cordato-oblongis ſemiamplexicaulibus crenatis rugoſis lanatis, verticillis dimidiatis. *Creta. Luſitania.* (T. Scordium Brot.)

lanuginoſum Link. 21. T. foliis lanceolatis acutiusculis ſeſſilibus crenatis ſubfaſciculatis villoſis, verticillis dimidiatis, dentibus calycis abbreviati ovatis, caule ramoſo. *Luſitania.*

bracteatum Desf. 22. T. foliis omnibus petiolatis ovatis cauleque erecto villoſis, inferioribus cordatis ſerratis, ſummis floralibus integerrimis, verticillis aequalibus ſub-6floris, dentibus calycis ovatis acutis. *Afr. bor.*

ſpinoſum 23. T. foliis oblongis pinnatifidis ſerratis integrisque ramisque divaricatis ſpinoſis lanatis, verticillis paucifloris, calycis lab. ſup. ovato, corollis inverſis. *Hiſpania. Luſitan. Aſia minor.*

Botrys 24. T. foliis multifidis glabriusculis, laciniis linearibus obtuſiusculis dentatis, verticillis dimidiatis, calycibus campanulatis piloſis. *Europ. Aſia med.*

3. *Pedunculis axillaribus trifloris.*

Thea Lour. 25. T. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis glabris, caule fruticoſo procumbente. *Cochinchina.*

trifidum Retz. 26. T. foliis 3fidis hirſutiusculis, laciniis lanceolatis ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis folia aequantibus. *C. B. S.* (T. capenſe Thunb.)

4. *Floribus capitatis.*

* *Foliis integerrimis.*

anguſtiſſimum Schreb. 27. T. foliis linearibus revolutis teretiusculis ſubglabris, capitulis piloſiusculis, calyce colorato campanulato, caule tereti incano. *Hiſpania. Luſitan.* (T. Chulilia Cav.)

coeleſte Schreb. 28. T. foliis linearibus revolutis calycibusque incano-tomentoſis. *Hiſpania.* (T. Maiorana Perſ.)

pumilum 29. T. foliis linearibus patentibus rigidiusculis ſubglabris, floribus capitato-verticillatis foliatis, caule humili tomentoſo. *Hiſpan.*

Libanitis Schreb. 30. T. foliis linearibus revolutis confertis cauleque tomentoſis, ſpicis capitatis foliatis. *Hiſpan.*

verticillatum Cav. 31. T. foliis verticillatis linearibus revolutis rigidis, caule fruticoſo ramisque denſe niveo-tomentoſis, calycibus obtuſis. *Hiſpan. auſtr.*

thymifolium Schreb. 32. T. foliis ovato-oblongis petiolatis ſubtus revolutis tomentoſis, calycibus campanulatis glabris mucronatis. *Hiſpan. auſtr.*

ſupinum 33. T. foliis linearibus ſubtus revolutis incanis, floribus faſciculato-capitatis, calycis dentibus elongatis cuſpidatis. *Auſtria. Transſylvan.*

montanum 34. T. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus albido-tomentoſis, floribus faſciculato-capitatis, calycis campanulati incani dentibus mucronatis. *Europ. Aſiae minoris colles calcar.*

***Foliis crenatis.*

Polium 35. T. foliis lineari-lanceolatis obtufis crenatis tomentofis, capitulis pedunculatis denfe lanatis, caule decumbente. *Europ. med. Afia. Cochinchina.* (T. Teuthrion Schreb.)

Achaemenis Schreb. 36. T. foliis lanceolatis obtufis bafi attenuatis apice crenatis planis, floralibus elongatis, capitulis denfe lanatis. *Ager venetus.*

trifoliatum W. 37. T. foliis ternis oblongis obtufis groffe crenatis bafi attenuatis integerrimis cauleque lanatis, capitulis albo-lanatis foliatis. *Hifpan. Afric. bor.* (T. fub-3phyllum Lag. var. capitulis fpicatis oblongis.)

cuneifolium Sm. 38. T. foliis obovato-fubrotundis crenatis denfe tomentofis, caule fruticofo erecto, capitulis laxis, calycibus obtufis. *Creta.*

compactum Clem. 39. T. foliis obovatis incifo-crenatis villofiffimis, floralibus lanceolatis petiolatis ciliatis calycem fuperantibus, capitulis fpicatis, calycis inflati dentibus inaequalibus. *Granata Hifpaniae auftr.*

Pfeudhyffopus Schreb. 40. T. foliis lineari-oblongis obtufis crenulatis, capitulis foliatis corymbofis denfe lanato-tomentofis. *Italia. Hifpania. Creta.* (T. lanigerum Lag., cymofum Perf.?)

capitatum 41. T. foliis lineari-lanceolatis revolutis crenatis tomentofis, capitulis pedunculatis aphyllis, calycibus obtufis denfe lanatis. *Hifpan. Gallia. Inf. ion. Afia med. Aegypt.* (T. aegyptiacum Perf.)

lufitanicum Schreb. 42. T. foliis lineari-lanceolatis obtufis crenatis fubtomentofis, caule corymbifero, capitulis paucifloris denfe lanatis. *Lufitan.*

pycnophyllum Schreb. 43. T. foliis linearibus abbreviatis verticillato-confertis revolutis crenatis, capitulis pedunculatis denfe tomentofis. *Hifpania.*

valentinum Schreb. 44. T. foliis linearibus revolutis fubcrenatis incanis remotiusculis, caule erecto fruticofo, capitulis corymbofis foliatis, calycibus incanis. *Hifpan. auftr. Ager tergeft.?* W. herb.

gnaphalodes Herit. 45. T. foliis linearibus obtufiffimis abbreviatis craffis revolutis fubcrenatis tomentofis, capitulis paucifloris feffilibus ramisque denfe niveo-lanatis. *Hifpan.*

aureum Schreb. 46. T. foliis oblongis obtufis crenatis cauleque albido-tomentofis, fummitatibus capitulisque denfe lanatis aureis. *Hifpan. Sicil. Gallia auftr. Graecia.* (T. flavicans Lam. et flavefcens Schreb. varr.)

buxifolium Schreb. 47. T. foliis ovalibus breviffimis apice crenatis villofis, ramis divaricatis rigidis tomentofis, capitulis foliatis paucifloris denfe lanatis. *Hifpan. auftr. Creta.* (T. faxatile Cav.)

5. *Floribus fpicatis.*

lamiifolium Urv. 48. T. foliis fubcordatis obtufis crenatis petiolatis hirfutis, fpica terminali denfa, bracteis fubu-

latis, calycis dente ſupremo latiusculo. *Moeſia infer.*

*Commerſonii** 49. T. foliis ſubrotundo-ovatis crenatis glabris longe petiolatis, ſpica terminali pauciflora longe pedunculata, caule ſimplici 4gono. *Ad fl. Plata.* (T. rotundifolium Poir.)

hyrcanicum 50. T. foliis cordato-oblongis crenatis ſubtus lanatis, ſpicis terminalibus cylindricis elongatis, floribus ſpiratim congeſtis, bracteis linearibus. *Perſia bor. Caucaſ.*

inflatum Sw. 51. T. foliis oblongis acuminatis inaequaliter groſſe ſerratis, ſpicis terminalibus ſubſecundis, calycibus inflatis. *Jamaica.*

faſciculatum Poir. 52. T. foliis faſciculatis ſeſſilibus linearibus glabris ſubtuberculato-dentatis, ſpica brevi terminali, bracteis oblongis mucronatis calycem ſuperantibus. *Patria?*

6. *Floribus racemoſis.*

villoſum Forſt. 53. T. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis ramisque villoſis, racemo ſpicato terminali, bracteis lanceolatis calycem villoſiſſimum inflatum aequantibus. *Inſ. Amicorum.*

paluſtre Kunth. 54. T. foliis ovato-oblongis ſerratis pubeſcentibus, ramis glabriusculis, racemis ſpicatis verticillatis, bracteis linearibus calyce inflato hirſuto brevioribus. *Nov. Granat.* (T. hirtum W. herb.)

japonicum W. 55. T. foliis ovato-oblongis duplicato-ſerratis, racemo compoſito terminali, bracteis linearibus calycem aequantibus. *Japon.* (T. virginicum Thunb.)

virginicum 56. T. foliis ſubternis oblongis acuminatis baſi attenuatis ſimpliciter ſerratis, racemo ſimplici terminali, bracteis calyce campanulato brevioribus. *Amer. bor.*

canadenſe 57. T. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ramisque incano-hirſutiſſimis, verticillis racemoſo-ſpicatis confertis, bracteis calycem duplo excedentibus. *Amer. bor.*

Arduini 58. T. foliis ovatis crenatis hirſutiusculis, racemo ſpicato tereti ſeſſili flavicante. *Olymp. Aſiae minoris.*

abutiloides Herit. 59. T. foliis amplis cordatis crenatis ramisque villoſis, racemis axillaribus laxiusculis aequalibus ebracteatis. *Madera.*

Scorodonia 60. T. foliis cordato-oblongis crenatis pubeſcentibus, racemis axillaribus ſecundis erectis laxiusculis, bracteis petiolatis abbreviatis, calycis lab. ſup. ovato, caule herbaceo. *Europ. med. et auſtr.*

Pſeudo-Scorodonia Desf. 61. T. foliis cordato-oblongis dentatis rugoſis ſubtus incanis, racemis axillaribus ſecundis, bracteis abbreviatis, calycis lab. ſup. ovato, caule fruticoſo. *Numidia.*

betonicum Herit. 62. T. foliis oblongis baſi cuneatis crenatis ſubtus calycibusque incanis, bracteis lanceolatis ſubre-

flexis pedicello brevioribus, calycis dente fupremo erecto inaequali. *Madera.* (T. betonicaefolium Jacqu., canefcens Forft., maderenfe Lam.)

racemofum R. Br. 63. T. foliis oblongis repandis revolutis incano-tomentofis, racemo terminali. *Nov. Holl.*

flavum 64. T. foliis ovatis crenatis opacis ramisque pubefcentibus, floralibus integerrimis, verticillis racemofis. *Europ. auftr. Afric. bor.*

nitidum Schreb. 65. T. foliis ovatis crenatis nitidis, floralibus integerrimis pilofis, verticillis dimidiatis racemofis, caule bifariam barbato. *Mauritania.*

Salviaftrum Schreb. 66. T. foliis ovalibus rugofis crenulatis fubtus incanis, racemo laxo foliato, calycis labio fup. ovato inaequali. *Lufitania.*

maffilienfe 67. T. foliis ovato-oblongis rugofis erofo-dentatis incanis, racemis ftrictis fubfecundis, dentibus calycis pilofi inaequalibus. *Gallia auftr. Creta. Cochinchina.*

refupinatum Desf. 68. T. foliis oblongis incifo-ferratis bafi cuneatis villofis, racemis axillaribus confertis fecundis foliatis, dentibus calycis fubaequalibus, corolla inverfa. *Afric. bor.*

Marum 69 T. foliis ovatis integerrimis fubtus incanis, racemis fecundis laxis foliatis, calycibus hirfutis. *Hifpania.*

fubfpinofum Pourr. 70. T. foliis lanceolatis integerrimis fubtus revolutis incanis, ramis fpinefcentibus, floribus racemofis. *Inf. balear.*

quadratulum Schreb. 71. T. foliis ovato-rhombeis dentatis fubtus revolutis incanis, ramulis filiformibus, racemis paucifloris. *Hifpan. Afric. bor. Creta.* (T. ramofiffimum Desf., myrtifolium Poir.)

creticum 72. T. foliis linearibus obtufis elongatis fubtus revolutis albo-tomentofis, racemis virgatis laxis, calycis dentibus aequalibus rigidis. *Creta. Aegypt. Cyprus.* (T. rosmarinifolium Lam., hyffopifolium Schreb.)

7. *Floribus corymbofis, paniculatis.*

pyrenaicum 73. T. foliis orbiculatis crenatis hirfutis, corymbo fimplici terminali fubfeffili, calycis hifpidi dentibus inaequalibus. *Pyrenaei m.*

rotundifolium Schreb. 74. T. foliis fubreniformi-orbiculatis crenatis utrinque villofis fubtus incanis, corymbis termiualibus paucifloris, calycibus 10ftriatis. *Hifpan. auftr.*

undulatum Lour. 75. T. foliis ovato-oblongis obtufis undulatis fubcrenatis glabris, corymbis terminalibus. *Cochinchina.*

argutum R. Br. 76. T. foliis triangularibus incifo-ferratis, corymbo terminali coarctato, bracteis lanceolatis acuminatis calycem glandulofo-pilofum fuperantibus, dentibus calycis inaequalibus. *Nov. Holl.*

corymbofum R. Br. 77. T. foliis ovato-lanceolatis incifis pubefcentibus, corymbis axillaribus, calycibus glandulofis. *Nov. Holl.*

orientale 78. T. foliis multifidis glabris, laciniis linearibus, panicula diffuſa trichotoma, calycibus patentibus corolla multo minoribus, dentibus lanceolatis. *Aſia minor. Caucaſ.*

parviflorum Schreb. 79. T. foliis multifidis ramisque caneſcentibus, laciniis linearibus ſubtus revolutis, panicula diffuſa trichotoma, calycibus corollam aequantibus, dentibus lineari-ſubulatis divergentibus. *Armenia.*
Teucrium filiforme Poir. (filifolium W. herb.) longe alienum, videtur eſſe altera ſpecies Campylanthi Roth. ſpec. nov. p. 89.

2074. WESTRINGIA Sm.

rosmariniformis Sm. 1. W. foliis quaternis lanceolatis ſupra glabriuſculis ſubtus revolutis calycibusque argenteis, dentibus tubo dimidio brevioribus. *Nov. Holl.*

Dampieri R. Br. 2. W. foliis quaternis linearibus ſupra glabriuſculis ſubtus revolutis calycibusque cinereis, dentibus tubo dimidio brevioribus. *Nov. Holl.*

rubiaefolia R. Br. 3. W. foliis quaternis elliptico-lanceolatis planiuſculis nitidis calycibusque glabris. *Terra Diemen.*

glabra R. Br. 4. W. foliis ternis lineari-lanceolatis planis utrinque calycibusque glabris. *Nov. Holl.*

longifolia R. Br. 5. W. foliis ternis linearibus elongatis ſupra ſcabris ſubtus revolutis calycibusque piloſiuſculis, dentibus tubum aequantibus. *Nov. Holl.*

anguſtifolia R. Br. 6. W. foliis ternis linearibus patentibus ſupra ſcabris ſubtus revolutis calycibusque cinereis, dentibus calycis tubo dimidio brevioribus. *Terra Diemen.*

cinerea R. Br. 7. W. foliis ternis linearibus mucronatis patentibus revolutis utrinque calycibusque cinereis, dentibus calycis breviſſimis. *Nov. Holl. auſtr.*

rigida R. Br. 8. W. foliis ternis lineari-lanceolatis mucronato-pungentibus divaricatis ſupra glabriuſculis ſubtus revolutis calycibusque cinereis, dentibus tubo dimidio brevioribus. *Nov. Holl. auſtr.*

2075. MICROCORYS R. Br.

purpurea R. Br. 1. M. foliis ternis ovali-oblongis pubeſcentibus ſubrevolutis ſubtus punctatis, ramulis ſericeis, floribus axillaribus ſolitariis, bracteis ſetaceis perſiſtentibus. *Nov. Holl. auſtr.*

barbata R. Br. 2. M. foliis ternis linearibus obtuſis, caule diffuſo, floribus axillaribus ſolitariis, bracteis caducis, calycibus corollisque hirſutis. *Nov. Holl. auſtr.*

virgata R. Br. 3. M. foliis ternis linearibus obtuſis calycibusque glabris, bracteis caducis, caule erecto, ramis filiformibus. *Nov. Holl. auſtr.*

2076. HEMIGENIA R. Br.

purpurea. *Nov. Holl.* Fruticulus glaber, foliis ternis teretiuſculis, floribus axillaribus ſolitariis 2bracteatis violaceis.

2077. COLEBROOKIA Roxb.

ternifolia Roxb. *Myſore*, *Ind. or.* Fruticulus, foliis ternis lanceolatis acutis villoſis obtuſe ſerratis, floribus ſpicato-paniculatis.

2078. LEUCOSCEPTRUM Sm.

canum Sm. *Nepal.* Herba foliis lanceolatis ſerratis glabris, floribus denſe ſpicatis bracteatis albis.

2079. LAVANDULA.

Spica W. 1. L. foliis linearibus ſubtus revolutis, verticillis ſpicatis inferne remotiuſculis, bracteis ovatis acutis ſcarioſis. *Europ. auſtr.* (L. anguſtifolia Ehrh., Spica α. L., vera Cand., L. pyrenaica Cand. var.)

latifolia Ehrh. 2. L. foliis lineari-lanceolatis ſubtus planiuſculis, verticillis ſpicatis approximatis, bracteis linearibus. *Europ. auſtr.* (L. Spica β. L. L. Spica Cand.)

Stoechas 3. L. foliis linearibus confertis margine revolutis albido-tomentoſis, ſpica imbricata oblonga comoſa, bracteis ſubreniformibus 3dentatis coloratis. *Europ. auſtr. Afric. bor.*

viridis Herit. 4. L. foliis linearibus margine revolutis rugoſis villoſis, ſpica comoſa, bracteis viridibus. *Madera.*

dentata 5. L. foliis linearibus revolutis crenato-pinnatifidis, ſpica imbricata comoſa, bracteis latis obtuſis ſtriatis calyces ſuperantibus. *Hiſpan. Afric. bor. Inſ. ion.*

ſtricta Delil. 6. L. foliis pinnatifidis ſcabris, laciniis linearibus integerrimis, ſpicis filiformibus elongatis interruptis, floribus oppoſitis, bracteis lanceolatis calyce brevioribus. *Aegypt.* (L. coronopifolia Poir.)

pinnata L. fil. 7. L. foliis pinnatifidis caneſcentibus, laciniis linearibus obtuſis, ſpica imbricata, bracteis lanceolatis calycem ſuperantibus. *Madera.*

heterophylla Viv. 8. L. foliis linearibus oblongisque pinnatifido-inciſis integris, ſpicis cylindricis. *Patria?*

multifida 9. L. foliis bipinnatifidis incanis, laciniis linearibus, ſpica ſimplici 4gona ſpirali, bracteis ovatis nervoſis villoſis. *Hiſpan. Afric. bor.*

abrotanoides Lam. 10. L. foliis bipinnatifidis glabriuſculis, laciniis linearibus, ſpica ramoſa interrupta 4gona, bracteis ovatis nervoſis glabris. *Inſ. Canar.*

2080. SIDERITIS.

**Ebracteatae.*

canarienſis 1. S. foliis ſubcordato-lanceolatis acutis crenatis rugoſis petiolatis ſubtus ramisque albo-tomentoſis, verticillis multifloris ſubſpicatis lanatis, caule fruticoſo. *Inſ. Canar.* (S. macroſtachya Poir.)

candicans Ait. 2. S. foliis ſubcordato-lanceolatis ſubcrenatis petiolatis, junioribus utrinque tomentoſis, adultis glabriusculis, corollae lab. ſup. retuſo breviſſimo, caule fruticoſo. *Madera.*

cretica 3. S. foliis cordato-oblongis obtuſiusculis crenatis petiolatis utrinque tomentoſis, corollae lab. ſup. ovato integerrimo, caule fruticoſo. *Creta.*

montana 4. S. foliis oblongis ſeſſilibus obtuſis dentatis, verticillis remotis, calycibus ſpinuloſis corolla majoribus, corollae lab. ſup 3fido, caule erecto herbaceo hirſuto. *Europ. med. et auſtr.*

† *remota* Urv. 5. S. foliis oblongis, verticillis remotiſſimis, calycibus denſe tomentoſis ſpinoſis corolla majoribus, ramis divaricatis rigidis. *Inſ. Samos.*

elegans Murr. 6. S. foliis ovato-oblongis obtuſis crenatis, verticillis remotis paucifloris, calycibus villoſiſſimis inermibus corolla ſubbrevioribus, dentibus lanceolato-linearibus elongatis, caule herbaceo villoſo. *Patria?* (S. nigricans Lam.)

romana 7. S. foliis obovato-oblongis dentatis in petiolum decurrentibus, verticillis paucifloris cauleque proſtrato hirſutis, calycibus rigidis ſpinoſis, dente ſupremo ovato. *Italia.*

decumbens Thunb. 8. S. foliis lanceolatis rugoſis tomentoſis, calycibus lanatis muticis, caule aſcendente villoſo. *Afric. auſtr.*

rugoſa Thunb. 9. S. foliis lanceolatis ſeſſilibus ſerrulatis rugoſis tomentoſis, calycibus ſpinuloſis, caule erecto denſe tomentoſo. *Afric. auſtr.*

** *Bracteatae.*

† *Bracteis integerrimis.*

calycantha M. B. 10. S. foliis lanceolatis obtuſis integerrimis lineatis ſericeo-villoſis, verticillis remotis, bracteis lanceolatis reflexis, calycis hirſutiſſimi dentibus ſubulatis patentiſſimis elongatis, caule erecto herbaceo. *Gruſia ruſſica.* (Stachys Vahl. Zietenia orientalis Gleditſch.)

ſyriaca 11. S. foliis lanceolatis obtuſis ſubcrenulatis cauleque aſcendente denſe lanato-tomentoſis, verticillis remotis, bracteis cordatis acutis venoſo-reticulatis. *Italia. Graecia. Tauria.* (St. taurica et diſtans W., brutia Tenor.)

libanotica Labill. 12. S. foliis obovato-oblongis ſerratis tomentoſis, ramis ſimpliciſſimis glabris, verticillis remotis, bracteis ovatis acuminatis nervoſo-reticulatis piloſiusculis. *Libanus.*

mucronata Sieb. 13. S. foliis lanceolatis cuſpidatis rigidis ſeſſilibus rugoſis incanis, bracteis cordatis rugoſis ſpinoſis, calycibus pungentibus, caule erecto lanato. *Palaeſtina.*

perfoliata 14. S. foliis cordato-lanceolatis cuſpidatis amplexicaulibus denticulatis, bracteis cordatis cuſpidatis membranaceis venoſo-reticulatis ciliatis, verti-

cillis approximatis ſpicatis, dentibus calycis ſubulatis, caule erecto hirſuto. *Aſia minor.*

ciliata Thunb. 15. S. foliis petiolatis ovatis erectis ſerratis punctatis, verticillis ſpicatis, bracteis nervoſis ciliatis. *Japon.*

pullulans Vent. 16. S. foliis ovato-lanceolatis petiolatis incanis, ſummis ſeſſilibus, verticillis remotis, bracteis cordatis mucronatis, tubo corollae calycem ſuperante. *Aſia minor.*

rugoſa Poir. 17. S. foliis oblongis obtuſis obſolete dentatis ſubtomentoſis, verticillis diſtantibus, bracteis ovatis acuminatis, calycibus apice barbatis, caule fruticoſo glabro. *Syria.*

laſiantha Juſſ. 18. S. foliis ovato-oblongis acutis glabriusculis ſpinoſo-dentatis, verticillis ſpicatis villoſiſſimis, bracteis ovatis calycibusque ſpinoſis. *Aſia minor.*

leucantha Cav. 19. S. foliis lanceolatis abbreviatis apice ſpinoſis villoſis, verticillis ſpicatis, bracteis ſpinoſis, caule humili fruticoſo. *Hiſpan. auſtr.*

ſalviaefolia Kunth. 20. S. foliis oblongis obtuſiusculis crenatis ſupra rugoſis ſubtus pulverulento-incanis, verticillis ſpicatis, bracteis oblongis acutis, dentibus calycis lanceolatis acuminatis, caule fruticoſo. *Quito.*

paniculata Kunth. 21. S. foliis cordato-ſagittatis oblongis acutis crenato-dentatis ſupra rugoſis glabris ſubtus incano-pubeſcentibus, verticillis ſpicato-paniculatis, bracteis ovatis venoſo-reticulatis calycibusque acutis. *Quito.*

roſea Desf. 22. S. foliis ovato-oblongis obtuſis ſeſſilibus crenatis, floribus axillaribus geminis, bracteis lanceolatis, calycibus muticis. *Aegypt.* (S. aegyptiaca Perſ.)

†*parvifolia* Lam. 23. S. foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis, verticillis remotis, bracteis ſubulatis, caule hiſpido. *Patria?*

†† *Bracteis dentatis.*

incana 24. S. foliis ſpathulato-linearibus integerrimis albido-tomentoſis, verticillis remotis, bracteis latis dentatis, laciniis lab. inf. corollae abbreviatis acutis, caule fruticoſo. *Hiſpania.*

virgata Desf. 25. S. foliis linearibus integerrimis tomentoſis, ramis virgatis, verticillis remotis, bracteis dentatis, lobis lateralibus lab. inf. cor. obtuſis. *Afr. bor.*

foetens Clem. 26. S. foliis linearibus acutis glabris, ramis virgatis, verticillis denſe ſpicatis, bracteis calyce brevioribus dentatis ſubulato-ariſtatis. *Granata Hiſpan.*

glauca Cav. 27. S. foliis ſpathulato-linearibus glaucis ſubvilloſis, verticillis remotis, brateis dentatis, laciniis lab. inf. corollae acutis, caule herbaceo. *Hiſpan. auſtr.*

anguſtifolia Lag. 28. S. foliis linearibus acutiusculis confertis incanis, verticillis remotis, bracteis ſpinoſo-dentatis calyce brevioribus, caule fruticoſo. *Hiſpan. auſtr.*

Tragoriganum Lag. 29. S. foliis lineari-lanceolatis ſubſerratis obtuſiusculis mucronatis, verticillis ſpicatis, bracteis dentato-ariſtatis. *Hiſpan. auſtr.*

ſpinoſa 30. S. foliis lanceolatis acutis lanatis bracteisque cordatis ſpinoſo-2dentatis, verticillis approximatis bractea ſubbrevioribus. *Hiſpan. Afric. bor.* (S. ſubſpinoſa Cav.)

ilicifolia W. 31. S. foliis lanceolatis ſpinoſo-dentatis hirſutis, verticillis remotis, bracteis calyce brevioribus dentato-ſpinoſis. *Aſia minor.*

ſerrata Lag. 32. S. foliis anguſte lanceolatis hirſutis argute ſerrato-mucronatis 3nerviis, bracteis ſpinoſo-dentatis. *Murcia.*

hyſſopifolia 33. S. foliis lanceolatis glabris integerrimis, verticillis ſpicatis, bracteis ſpinoſo-dentatis, caule lanato. *Helvetia. Gallia. Italia.* (S. foetida Poir.)

pyrenaica 34. S. foliis obovato-oblongis apice dentatis hirſutiusculis, ſpica oblonga continua hirſuta, bracteis ſpinoſo-dentatis. *Alp. Europ. med.* (S. alpina Vill. var.)

chamaedryfolia Cav. 35. S. foliis obovatis inciſo-crenatis, verticillis remotis bracteas ſpinoſo-dentatas ſuperantibus, dentibus calycis mucronatis, caule villoſo. *Hiſpan. Luſitan.* (S. hirtula Brot.)

ſcordioides 36. S. foliis lanceolatis baſi attenuatis ſubdentatis vel integerrimis acutis vel obtuſis glabriuſculis, verticillis approximatis, bracteis calycibusque longe ſpinuloſis, caule erecto hirſutiuſculo. *Europ. auſtr.* (S. hirta Roth. var.)

hirſuta 37. S. foliis obovato-oblongis dentatis in petiolum attenuatis ramisque aſcendentibus hirſutis, verticillis remotis paucifloris lanatis, bracteis reflexis ſpinoſo-dentatis. *Europ. auſtr.*

criſpata W. 38. S. foliis obovato-oblongis dentatis undulatis ſubtus tomentoſis, verticillis diſtantibus, bracteis orbiculatis ſpinoſo-dentatis. *Hiſpan.* (S. Cavanilleſii Lag.)

bullata Kunth. 39. S. foliis cordato-oblongis obtuſis crenatis ſupra rugoſis ſubtus incano-tomentoſis, verticillis denſe congeſtis, bracteis ovatis apice 2dentatis venoſo-reticulatis calyces ariſtatos ſuperantibus. *Nov. Granat.*

ovata Cav. 40. S. foliis ellipticis crenatis petiolatis pubeſcentibus, ſpica 4gona, bracteis ovatis dentato-ſpinoſis. *Peru.*

lanata 41. S. foliis cordatis obtuſis obſolete crenatis villoſis, verticillis ſpicatis lanatis, bracteis obſolete ſerratis, calycibus muticis. *Aſia minor. Aegypt.*

2081. PHYTOXYS Molin.

acidiſſima Molin. *Chili.* Frutex ſuborgyalis, foliis ſubſeſſilibus lanceolatis denticulatis ſcabris, floribus axillaribus coeruleis. (Algue-laguen Feuill.)

2082. ORIGANUM.

vulgare 1. O. ſpicis aggregatis pedunculatis elongatis, bracteis glabris coloratis calyces aequantibus, foliis

ovato-oblongis integerrimis glabriusculis, caule erecto. *Europ. Aſia med. Amer. bor.*

humile Poir. 2. O. ſpicis aggregatis ſubſeſſilibus oblongis, bracteis glabris apice coloratis calyces ſuperantibus, foliis ovatis ciliatis, caule baſi radicante divaricato hiſpido. *Patria?*

virens Link. 3. O. ſpicis axillaribus confertis abbreviatis, bracteis viridibus glabris calycem campanulatum ſuperantibus, foliis ovato-oblongis remote ſerratis cauleque erecto piloſis. *Luſitan.*

heracleoticum 4. O. ſpicis digitatis laxe imbricatis elongatis pedunculatis, bracteis ſubcoloratis calycem aequantibus, caule erecto ramoſo foliisque ovato-oblongis glabriusculis. *Europ. auſtr. Cochinchina?*

creticum 5. O. ſpicis faſciculatis ſubſeſſilibus prismaticis elongatis, bracteis membranaceis hiſpidiusculis acutis calyces ſuperantibus, foliis ovatis aſperis, caule erecto hiſpido. *Graecia. Creta. Cochinchina?* (O. megaſtachyon Link.)

macroſtachyon Link. 6. O. ſpicis aggregatis axillaribus compreſſis longiſſimis, bracteis lanceolatis acutis glaberrimis calyce longioribus, foliis ovatis inciſo-ſerratis cauleque erecto glabris. *Luſitania.*

punctatum Poir. 7. O. ſpicis globoſo-capitatis ſubpedunculatis, bracteis lanceolatis pubeſcentibus calyces ſuperantibus, foliis ovato-lanceolatis punctatis cauleque glabris. *Patria?*

ſmyrnaeum 8. O. ſpicis congeſtis umbellato-faſtigiatis, bracteis incano-hirſutis arctiſſime imbricatis late ovatis calyces ſuperantibus, foliis ovatis venoſis breviter petiolatis, caule erecto villoſo. *Graecia. Creta. Aſia minor. Afric. bor.* (O. pallidum Perſ., oblongatum et hirtum Link., glanduloſum Desf.)

Onites 9. O. ſpicis oblongis aggregatis ſubſeſſilibus, bracteis arcte imbricatis late ovatis hirſutiusculis ciliatis, foliis ovato-oblongis ſubtomentoſis ſubtus venoſo-lineatis, caule ramoſiſſimo hirto. *Sicil.*

ſyriacum 10. O. ſpicis ternis quinisque oblongis ſeſſilibus, bracteis arctiſſime imbricatis albo-villoſiſſimis, foliis ovatis ſubtus tomentoſis, caule erecto villoſo. *Palaeſtina.*

Maru 11. O. ſpicis ternis ſubgloboſis pedunculatis baſi foliatis, bracteis arcte imbricatis obtuſis, ramis filiformibus, foliis ovatis obtuſis incano-tomentoſis. *Creta. Palaeſtina.* (O. veſtitum Clark. Majoranoides W. parviflorum Urv.)

Majorana 12. O. ſpicis ternis ſubrotundis pedunculatis, bracteis imbricatis pubeſcentibus, foliis petiolatis ellipticis glabriusculis, radice annua. *Ind. orient. Graecia.*

indicum Roth. 13. O. glomerulis interrupte ſpicatis pedunculatis baſi foliatis, bracteis arcte imbricatis mucronatis incano-pubeſcentibus, foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis ſubtus cinereo-tomentoſis. *Ind. or.*

Tournefortii Ait. 14. O. ſpicis ſubternis oblongis 4gonis, bracteis maximis ſubrotundis nervoſis laevibus, foliis ſubſeſſilibus orbiculatis coriaceis punctatis glabris. *Inſ. maris aegei.*

ſipyleum 15. O. ſpicis ſolitariis ſubgloboſis terminalibus nutantibus, foliis ovatis glabris glaucis. *Aſia minor. Euboea.*

Dictamnus 16. O. ſpicis ſubſolitariis ſubrotundis nutantibus, bracteis maximis obtuſis coloratis laevibus laxiusculis, foliis orbiculatis utrinque albo-lanatis. *Creta. Cochinchina.*

† *ciliatum* W. 17. O. ſpicis ſolitariis axillaribus ſeſſilibus ovatis erectis, bracteis ſubrotundis ſetoſo-ciliatis, foliis ovatis obtuſis glabris. *Guinea.*

† *bengalenſe* Garcin. 18. O. ſpicis ſolitariis axillaribus pedunculatis baſi foliatis oblongis denſe imbricatis, bracteis ovatis lanatis, foliis ovatis utrinque attenuatis duplicato-dentatis glabris. *Bengal.*

aegyptiacum 19. O. floribus faſciculatis ebracteatis, foliis oblongis carnoſis tomentoſis. *Aegypt.*

2083. PYCNANTHEMUM Mx.

linifolium Pursh. 1. P. foliis linearibus acuminatis patentiſſimis nervoſis glabris, capitulis ſubgloboſis umbellato-corymboſis, bracteis cuſpidatis pubeſcentibus arcte imbricatis. *Amer. bor.* (Satureia virginiana L. Thymus virginicus Murr. Origanum flexuoſum Walt. Brachyſtemum virginicum Mx., linifolium W. en.)

lanceolatum Pursh. 2. P. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſubtus venoſis glabris, capitulis terminalibus faſciculato-corymboſis, bracteis arcte imbricatis acutis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Brachyſtemum lanceolatum W. en.)

muticum Perſ. 3. P. foliis ovato-lanceolatis ſubdentatis glabriusculis, capitulis terminalibus faſciculatis, bracteis arcte imbricatis acutis. *Carolina bor.* (Brachyſtemum Mx.)

nudum Nutt. 4. P. foliis ovato-oblongis integerrimis laevibus venoſis ſeſſilibus, capitulis aggregatis paucifloris, bracteis calycibusque reſinoſo-punctatis. *Carolina. Georgia.*

piloſum Nutt. 5. P. foliis lanceolatis ſubintegerrimis piloſis, capitulis terminalibus, bracteis lanceolatis calycibusque incano-villoſis. *Tenneſſee Amer. bor.*

montanum Mx. 6. P. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, capitulo ſubſolitario ſeſſili prolifero, bracteis ciliatis, calycibus glabris. *Carolina.*

ariſtatum Mx. 7. P. foliis ovato-lanceolatis ſubſerratis caneſcentibus, capitulis ſolitariis ſubproliferis, bracteis laxiusculis calycibusque longe ariſtatis. *Amer. bor.* (Nepeta virginica L.)

verticillatum Perſ. 8. P. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, verticillis paucis remotis baſi foliatis, bracteis acu-

minatis. *Penſylvan. Carolina.* (Brachyſtemum Mx. Origanum clinopodioides Walt.)

Monardella Mx. 9. P. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis hirſutis, floralibus integerrimis coloratis, capitulo ſolitario laxiuſculo baſi folioſo, bracteis ciliatis. *Virginia. Carolina.* (Origanum incanum Walt.)

incanum Mx. 10. P. foliis ovato-oblongis acutis ſubſerratis ſubtus floralibusque utrinque incano-tomentoſis, capitulis laxiuſculis ſubaggregatis baſi folioſis, bracteis ſetaceis. *Amer. bor.* (Clinopodium incanum L.)

2084. ISANTHUS Mx.

coeruleus Mx. *Virginia. Carolina.* Herba annua ſubviſcido-pubeſcens, foliis lanceolatis integerrimis trinerviis, floribus ſubſolitariis axillaribus coeruleis. (Trichoſtemma brachiatum L., ſoli Dillenio notum, quod Nuttallius huc trahit, alienum eſt et valde dubium.)

2085. SATUREIA.

* *Floribus ſubſolitariis.*

approximata Bivon. 1. S. caule fruticoſo ramoſo, ramis ligneſcentibus, foliis faſciculatis abbreviatis lineari-lanceolatis piloſiuſculis, pedunculis bracteatis folio brevioribus. *Sicil.* (S. faſciculata Rafin.)

ſpinoſa 2. S. caule fruticoſo, ramis ligneſcentibus ſpinoſis, foliis oblongo-lanceolatis mucronatis hiſpidiuſculis, pedunculis bracteatis folio brevioribus. *Creta.*

incana * 3. S. caule fruticoſo, ramis vimineis, foliis elliptico-oblongis utrinque ſtellato-pubeſcentibus incanis ſubtus revolutis, pedunculis axillaribus breviſſimis. *Jamaica.* Bertero.

americana Poir. 4. S. caule fruticoſo, ramis hiſpido-aculeatis, foliis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis nervo medio aculeatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus oppoſitis. *Hiſpaniola.* Desportes.

** *Pedunculis paucifloris cymoſis.*

viminea 5. S. caule fruticoſo, ramis vimineis, foliis oblongis integerrimis baſi attenuatis ſupra glabris ſubtus hiſpidis, pedunculis 3floris, bracteis linearibus. *Jamaica.*

filiformis Desf. 6. S. caule fruticuloſo, ramis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis villoſis, pedunculis axillaribus breviſſimis ebracteatis 1-3floris. *Atlas.*

montana 7. S. caule fruticoſo, ramis ſcabris, foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis nitidis punctatis, pedunculis axillaribus ſubſecundis paucifloris folia ſubaequantibus, bracteis calyces ſuperantibus. *Europ. auſtr.*

rupestris Wulff. 8. S. caule fruticoso, ramis glabriusculis, foliis obovato-subrotundis obtusis subdentatis glabris, pedunculis axillaribus cymosis ebracteatis folio brevioribus. *Carniolia.* (S. thymifolia Scop.)

obovata Lag. 9. S. caule fruticoso, foliis obovatis obtusis integerrimis carinatis, pedunculis axillaribus subcymosis secundis bracteatis. *Hispan. austr.*

tenuifolia Tenor. 10. S. caule suffruticoso, ramis filiformibus, foliis lanceolatis acuminatis revolutis hispidis, pedunculis paucifloris, bracteis calyce brevioribus. *Apulia.*

Juliana 11. S. caule fruticoso, foliis petiolatis ovato-lanceolatis scabris subtus revolutis venosis, pedunculis dense cymosis brevissimis, calycibus hispidis. *Etruria. Graecia.* (Thymbra S. Juliani Lobel.)

graeca 12. S. caule herbaceo, foliis ovatis hispidis subtus venosis, pedunculis paucifloris oppositis, bracteis calyce brevioribus. *Ins. maris aegei.*

hirsuta Presl. 13. S. caule herbaceo simplici hirsuto, foliis ovato-lanceolatis hispidis, pedunculis brevissimis paucifloris, bracteis calycem aequantibus. *Sicil.*

Teneriffae W. 14. S. caule herbaceo, foliis ovatis acutis pubescentibus subtus revolutis, pedunculis multifloris, bracteis calyce minoribus. *Teneriffa?*

hortensis 15. S. caule herbaceo erecto, ramis brachiatis, foliis lineari-lanceolatis patentissimis, pedunculis cymosis axillaribus paucifloris, bracteis calyces superantibus. *Tauria. Caucas.*

*** *Floribus verticillatis.*

nervosa W. 16. S. caule fruticoso erecto, ramis pubescentibus, foliis subsessilibus ovatis acutis glabris subtus venosis, pedunculis cymoso-verticillatis subebracteatis, calycibus villosissimis. *Atlas. Ins. ion. Sicil.* (S. capitata Desf.)

Thymbra 17. S. caule fruticoso, ramis lignescentibus, foliis spathulato-lanceolatis acutis hispidis punctatis eveniis, verticillis densis basi foliatis, calycibus cuspidatis hispidis. *Graecia. Asia minor. Afric. boreal.*

congesta Horn. 18. S. caule fruticoso, foliis ovatis obtusis glabris, floralibus reflexis, verticillis congestis, calycibus hispidis. *Patria?*

2086. BYSTROPOGON Herit.

origanifolius Herit. 1. B. foliis ovatis integerrimis subtus niveis, pedunculis dichotomis, calycibus plumosis. *Ins. Teneriffa. Nivaria Plinii.*

plumosus Herit. 2. B. foliis ovatis subserratis subtus villoso-lanatis, paniculárum axillarium ramis divaricatis, calycibus plumosis. *Ins. Canar.* (Mentha plumosa L. suppl.)

3.

canarienſis Herit. 3. B. foliis ovato-oblongis crenatis ſubtus villoſiſſimis, paniculae dichotomae floribus congeſtis villoſis. *Inſ. Canar. Madera.* (Mentha canarienſis L.)

punctatus Herit. 4. B. foliis ovatis dentato-crenatis glabris punctatis, pedunculis dichotomis, floribus congeſto-capitatis, calycibus villoſis. *Madera.*

† *ſidaefolius* Herit. 5. B. foliis cordatis, pedunculis verticillato-paniculatis filiformibus. *Peru.*

mollis Kunth. 6. B. foliis ovatis ſubſerratis reticulato-venoſis ſubtus albido-tomentoſis, verticillis ſubgloboſis approximatis, caule volubili. *Quito.*

bipinnatus Roth. 7. B. foliis 2pinnatis linearibus ſtrigoſis ſubtus caneſcentibus, floribus ſpicatis, bracteis ariſtatis. *Ind. or.*

2087. POGOSTEMON Desf.

plectranthoides Desf. *Patria?* Fruticulus foliis oblongis ſubſerratis caneſcentibus, floribus ſpicatis ſecundis albis, bracteis integerrimis ovalibus imbricatis calyces ſuperantibus.

2088. HYSSOPUS.

officinalis 1. H. faſciculis axillaribus multifloris ſecundis, dentibus calycis erectis ſubaequalibus, lobo medio lab. inf. 2lobo integerrimo, foliis lanceolatis. *Europ. auſtr. Sibir.*

anguſtifolius MB. 2. H. faſciculis axillaribus paucifloris ſecundis, dentibus calycis patulis inaequalibus, lobo medio lab. inf. 2lobo integerrimo, foliis linearibus. *Tauria. Caucaſ.* (H. orientalis W.)

Lophanthus 3. H. pedunculis axillaribus cymoſis, corollae inverſae lobo maximo crenulato, foliis ſubcordato-oblongis obtuſis crenatis. *China bor.*

nepetoides 4. H. verticillis ſpicatis elongatis, lobo medio corollae crenulato, ſtylis corolla brevioribus, foliis ſubcordatis ovatis acuminatis acute dentatis. *Amer. bor.*

ſcrofularifolius W. 5. H. verticillis ſpicatis elongatis, lobo corollae medio crenato, ſtylis corolla longioribus, foliis cordato-ovatis acuminatis obtuſe dentatis. *Amer. boreal.*

2089. ELSHOLTZIA W.

criſtata W. 1. E. ſpica ſubſolitaria unilaterali erecta. *Sibir.* (Hyſſopus ocimifolius Lam. Mentha Patrini Pall. ovata Cav.)

† *paniculata* W. 2. E. ſpicis unilateralibus reflexis paniculatis. *Ind. or.* (Hyſſopus criſtatus Lam.)

† *ocimoides* Perſ. 3. E. ſpicis aequalibus, bracteis reflexis. *Coromandel.* (Mentha ocimoides Lam.)

2090. MENTHA.

* *Verticillis ſpicatis.*

ſtellata Lour. 1. M. ſpicis cylindricis gracilibus, verticillis denſiſſime congeſtis, filamentis exſertis barbatis, foliis quaternis linearibus remote ſerratis glabris. *Cochinchina. Ind. or.* (M. quaternifolia Roth.)

myosuroides Roth. 2. M. ſpicis cylindricis gracilibus, verticillis denſiſſime congeſtis tomentoſis, filamentis exſertis barbatis, foliis oppoſitis petiolatis lineari-oblongis ſerrulatis ſericeo-tomentoſis. *Ind. or.*

quadrifolia Roxb. 3. M. ſpicis cylindricis longiſſimis, verticillis denſiſſime congeſtis hirſutis, filamentis exſertis nudis, foliis quaternis lanceolatis integerrimis lineatis utrinque ſericeo-lanatis. *Ind. or.*

viridis 4. M. ſpicis baſi interruptis, bracteis calycibusque piloſiuſculis, pedicellis glaberrimis, ſtaminibus exſertis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerratis cauleque laevibus. *Europ.* (M. laevigata W. en.)

tenuis Mx. 5. M. ſpicis gracilibus baſi interruptis, ſtaminibus incluſis, foliis ovato-lanceolatis ſubſeſſilibus glabriuſculis. *Amer. bor.* (M. viridis Walt.)

criſpata Schrad. 6. M. verticillis ſpicatis diſtinctis, pedicellis calycibusque glabriuſculis, ſtaminibus exſertis, foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis cuſpidato-ſerratis undulatis cauleque glabris. *Patria?*

nepetoïdes Lejeun. 7. M. verticillis ſubcymoſis denſe interrupte ſpicatis, calycibus ſubulatis pedicellisque hirſutis, ſtaminibus corollam aequantibus, foliis petiolatis ellipticis acutiuſculis ſerratis ciliatis ſubtus ad venas hirſutis. *Ad fontem Spadanum in Belgio.*

piperita 8. M. verticillis diſtinctis obtuſe ſpicatis, pedicellis calycibusque apice piloſiuſculis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis petiolatis oblongis acutis ſerratis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus. *Anglia.* (M. balſamea W.)

niliaca Jacq. 9. M. verticillis approximatis ſpicatis, pedicellis calycibusque hirſutiuſculis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus ſubcordato-lanceolatis ſerratis glabris ſubtus cauleque caneſcentibus. *Aegypt.* Sieber.

ſylveſtris 10. M. verticillis ſpicatis baſi diſtinctis, pedicellis calycibusque hirſutis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ſubcordato-oblongis ſubſeſſilibus ſerratis ſubtus ſubvilloſo-lanatis. *Europ.* (M. caneſcens Roth. nemoroſa, gratiſſima, hirta et pubeſcens W.)

Auricularia 11. M. verticillis continuo ſpicatis, pedicellis calycibusque hirſutiuſculis, ſtaminibus exſertis, foliis cordato-oblongis acutis ſerratis utrinque piloſis. *Inſ. Molucc. Ind. or.*

divaricata Lag. 12. M. verticillis diſtinctis ſpicatis paucifloris, pedunculis calycibusque hirſutiuſculis, ſtaminibus exſertis, foliis breviter petiolatis ovato-lanceo-

latis ſerratis utrinque incano-tomentoſis. *Hiſpania.*

criſpa 13. M. verticillis diſtinctis ſpicatis; pedicellis calycibusque baſi glabris, ſtaminibus corollam aequantibus, foliis ſubſeſſilibus cordato-ovatis cuſpidato-ſerratis undulatis glabriuſculis. *Helvetia. Germania.* (M. hercynica Röhling.)

tomentoſa Urv. 14. M. ſpicis numeroſiſſimis elongatis baſi interruptis, calycibus villoſis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus lanceolato-linearibus groſſe dentatis criſpis tomentoſis, caule ramoſiſſimo. *Inſ. maris aegei.* (M. incana et undulata W. en.)

rotundifolia 15. M. verticillis ſubdiſtinctis ſpicatis, pedicellis calycibusque hirſutiuſculis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus ovato-ſubrotundis rugoſis hirſutis dentatis. *Europ.* (M. macroſtachya Tenor., rugoſa Roth., fragrans Presl.)

lavandulacea W. 16. M. verticillis ſubdiſtinctis ſpicatis, pedicellis calycibusque villoſis, ſtaminibus exſertis, foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis ſubintegerrimis complicatis utrinque incano-tomentoſis. *Hiſpan. C. B. S.* (M. lavandulaefolia Perſ.? capenſis Thb.)

** *Verticillis capitatis.*

aquatica 17. M. verticillis capitatis, pedicellis calycibusque piloſis; ſtaminibus corollam aequantibus vel ſuperantibus, foliis ovatis ſerratis petiolatis utrinque cauleque villoſis. *Europ.* (M. hirſuta L., piloſa Wallr., pyramidalis Tenor., acutifolia Sm. varr.)

citrata Ehrh. 18. M. verticillis capitatis, pedicellis calycibusque glaberrimis, ſtaminibus incluſis, foliis ſubcordato-ovato-oblongis petiolatis ſerratis utrinque glabris. *Europ.* (M. odorata Sm., aſperſa Mönch.)

*** *Verticillis axillaribus remotis.*

arvenſis 19. M. pedicellis glabriuſculis, calycibus ſubcampanulatis hirſutis, dentibus abbreviatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis petiolatis ovatis acutis ſerratis cauleque aſcendente ſubvilloſis. *Europ.* (M. agreſtis Sm., dentata Mönch.)

auſtriaca Jacq. 20. M. pedicellis pubeſcentibus, calycibus oblongis hirſutis, dentibus ſubulatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis cordato-ovatis acutis ſerratis cauleque aſcendente hirtis. *Europ. Caucaſ.* (M. parviflora Schultz.)

gentilis 21. M. pedicellis glabris, calycibus glabriuſculis, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, foliis ovato-oblongis ſerratis hirſutiuſculis. *Europ.* (M. rubra Sm.)

elegans Lejeun. 22. M. verticillis paucifloris remotis, pedicellis glabris, calycibus reſinoſo-punctatis ſuperne hirſutiuſculis, ſtaminibus incluſis, ſtylo longe exſerto, foliis ovato-oblongis utrinque attenua-

tis venofis argute ferratis hirfutiusculis. *Ad fontem Spadanum in Belgio.*

badenfis C. C. Gmel. 23. M. pedicellis glabris, calycibus hirfutiusculis, ftaminibus corolla duplo longioribus, foliis petiolatis rhombeo-lanceolatis utrinque attenuatis fubdentatis glabris. *Palatinatus. Lapponia.* (M. lapponica Wahlenb.)

borealis Mx. 24. M. pedicellis calycibusque villofiusculis, ftaminibus longe exfertis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis argute ferratis ciliatis, caule retrorfum pilofo. *Amer. bor.*

gibraltarica W. 25. M. pedicellis calycibusque villofis, foliis ovatis fubintegerrimis petiolatis utrinque incano-pubefcentibus, caule procumbente. *Ad Calpen Hifpan. auftr.*

canadenfis 26. M. pedicellis calycibusque fubpubefcentibus, ftaminibus corollam aequantibus, foliis petiolatis lanceolatis profunde ferratis pilofiusculis. *Amer. bor.*

tomentella Link. 27. M. pedicellis calycibusque villofiffimis, ftaminibus exfertis, foliis fubrotundo-oblongis denticulatis petiolatis cauleque erecto denfe villofis. *Lufitan. Calabria.*

Pulegium 28. M. pedicellis calycibusque hifpidiusculis, ftaminibus exfertis, foliis fubovalibus fubdentatis obtufis in petiolum decurrentibus pilofiusculis. *Europ.*

diemenica * 29. M. calycibus tomentofo-barbatis, ftaminibus inclufis, foliis ovato-lanceolatis fubtus punctatis, caule erecto. *Terra Diemen.* (M. gracilis R. Br.)

auftralis R. Br. 30. M. calycibus tomentofis, ftaminibus exfertis, foliis lanceolatis, caule angulis marginatis fcabro. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

cervina 31. M. pedicellis calycibusque glabris, bracteis palmatis, foliis lanceolatis fubintegerrimis laeviusculis. *Gallia auftr.*

**** *Pedunculis cymofis vel corymbofis.*

fativa 32. M. pedunculis axillaribus cymofo-glomeriferis, pedicellis calycibusque hirfutiusculis, ftaminibus inclufis, foliis ovatis ferratis pubefcentibus petiolatis. *Europ.* (M. verticillata L., gentilis f. gracilis Engl. bot. 449.)

numidica Poir. 33. M. pedunculis axillaribus cymofo-glomeriferis, calycibus glabriusculis, ftaminibus exfertis, foliis lanceolatis fubferratis glabris fubtus punctatis. *Afric. bor.*

glabrata Vahl. 34. M. pedunculo fubcorymbofo-umbellifero, ftaminibus corolla brevioribus, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ferratis glabris. *Aegypt.* (M. kahirina Forsk.)

fatureioides R. Br. 35. M. pedunculis axillaribus fubcorymbofis paucifloris, calycibus glabriusculis, ftaminibus inclufis, foliis ellipticis repandis fubnudis, caule angulis afpero. *Nov. Holl.*

2091. GALEOBDOLON Sm.

luteum Sm. *Europ. nemora.* Herba foliis ſubcordato-ovatis dentatis, floribus verticillatis luteis. (Galeopſis Galeobdolon L., Leonurus W. ſpec., Lamium Hofm., Pollichia Perſ. Schrank., Cardiaca Lam.)

2092. GALEOPSIS.

Ladanum 1. G. internodiis caulinis ſubaequalibus ſuperne ramisque glanduloſo-villoſis, calycibus pungentibus tubo corollae triplo brevioribus, bracteis ſubulatis ſubreflexis, foliis oblongis utrinque attenuatis remote ſerratis utrinque virentibus, floralibus lanceolatis ſerrulatis. *Europ. Aſia med.* (G. intermedia Vill. anguſtifolia Perſ. et parviflora Lam. var.)

caneſcens MB. 2. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, ramis foliisque lanceolatis utrinque attenuatis remote ſerratis integerrimisque, calycibus pungentibus incano-villoſis corolla triplo brevioribus, bracteis ſubulatis revolutis. *German. med.*

pubeſcens Beſſ. 3. G. internodiis caulinis ſubincraſſatis foliisque ovatis acuminatis ſerratis pubeſcentibus, bracteis ſubglanduloſis minutis, calycibus piloſis corolla triplo brevioribus. *German. Galicia.* (G. Walterina Schlechtend.)

ochroleuca Lam. 4. G. internodiis caulinis aequalibus foliisque oblongo-lanceolatis ſerratis appreſſe pubeſcentibus ſubtus ſubtomentoſis, calycibus villoſis pungentibus inaequalibus corolla quadruplo brevioribus, galea apice 2ſida. *Europ.* (G. grandiflora Ehrh., villoſa Hudſ. Sm.)

Tetrahit 5. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, ramis ſubretrorſum hirtis, foliis ovato-oblongis dentatis hirſutis, verticillis ſummis ſubcontiguis, calycibus longiſſime ariſtatis tubum corollae aequantibus. *Europ. Amer. bor.*

verſicolor Curt. 6. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis ramisque hirtis, foliis ovato-oblongis dentatis hirſutis, verticillis ſummis ſubcontiguis, corolla fauce inflata galea apice crenulata calycem pungentem multo ſuperante. *Europ.* (G. cannabina Roth. W.)

† *hiſpida* Thb. 7. G. internodiis caulinis ſubaequalibus ramisque retrorſum aculeato-hiſpidis, foliis cordato-oblongis obtuſiusculis crenatis aſperis, calycibus acutis tenuiſſime villoſis corolla triplo brevioribus. *Afric. auſtr.*

2093. LAMIUM.

Orvala 1. L. foliis cordatis acuminatis duplicato-dentatis utrinque cauleque glabris, calyce colorato, lab. corollae inf. utrinque 3dentato. *Ital. Hungar. Transſylvan.*

rugoſum Ait. 2. L. foliis cordatis acuminatis inaequaliter dentatis rugoſis cauleque piloſis, calycibus ariſtatis, lab. corollae inf. utrinque dente unico ſetaceo. *Italia. Sicilia.* (L. longiflorum Tenor.)

garganicum 3. L. foliis cordatis acutiusculis inaequaliter crenatis cauleque incano pubeſcentibus, corollae tubo recto, dente utrinque gemino. *Ital. Peloponneſ. Creta. Aſia minor. Cochinchina.*

maculatum 4. L. foliis cordatis acuminatis inaequaliter dentatis cauleque glabriusculis, verticillis 10floris, galea apice acute emarginata. *Europ. med. et auſtr.* (L. flexuoſum Tenor.)

album 5. L. foliis cordatis acuminatis dentato-ſerratis cauleque piloſiusculis, verticillis 20floris, galea apice obtuſa integerrima. *Europ.*

ſtriatum Sm. 6. L. foliis cordatis obtuſiusculis, galea corollae 2fida, laciniis divaricatis dentatis, fauce utrinque 2dentata. *Graecia.*

bifidum Cyr. 7. L. foliis cordatis acutis inciſo-crenatis, galea corollae 2fida, laciniis divaricatis integerrimis, fauce utrinque 1dentata. *Neapol.*

calycinum Urv. 8. L. foliis cordatis rugoſis lanatis, floralibus petiolatis, caule glaberrimo, calycibus reticulatis laevibus longiſſime ariſtatis corollam ſubaequantibus. *Inſ. Samos.*

moſchatum Mill. 9. L. foliis cordatis crenatis glabris, floralibus ſubſeſſilibus, calycis dentibus corollam ſubaequantibus. *Aſia minor.*

molle Ait. 10. L. foliis petiolatis ſubdentatis vel integerrimis ciliatis, inferioribus ſubcordatis ſuperioribus ovatis, verticillis paucifloris. *Patria?*

tomentoſum W. 11. L. foliis cordato-ſubrotundis obtuſe dentatis utrinque tomentoſis petiolatis, verticillis multifloris, calycibus denſe lanatis, fauce corollae utrinque dente unico ſetaceo. *Armenia. Caucaſ.*

hirtum Poir. 12. L. foliis cordato-ovatis crenatis hirſutis caneſcentibus, verticillis paucifloris, calycibus corollam ſubaequantibus cauleque hirſutiſſimis. *Patria?*

hirſutum Lam. 13. L. foliis cordatis acuminatis inaequaliter dentatis cauleque hirſutis, calycibus inaequalibus acuminatis corolla pubeſcente longe brevioribus. *Gallia.* (L. grandiflorum Pourr. — L. ſtoloniferum Lapeyr. var.?)

laevigatum 14. L. foliis cordatis rugoſis ſerratis glabriusculis, verticillis paucifloris, calycibus tubum corollae aequantibus cauleque laevibus. *Ital. Sibir.*

purpureum 15. L. foliis cordatis petiolatis obtuſis inaequaliter obtuſe dentatis cauleque hirſutis, corollae tubo intus barbato. *Europ.*

inciſum W. 16. L. foliis cordatis petiolatis inaequaliter inciſis glabriusculis, ſuperioribus confertis, corollae tubo intus imberbi, lobis lab. inf. lateralibus obtuſe dentatis. *Europ.* (L. purpureum β. Lam., diſſectum Wither., gueſtphalicum Weih.)

amplexicaule 17. L. foliis floralibus amplexicaulibus subrotundis crenato-incisis, fauce corollae utrinque 2dentata. *Europ. Amer. bor.* (Pollichia Roth.)

hispidulum Mx. 18. L. foliis late cordatis longe petiolatis pubescentibus, caule hispido, axillis 1floris. *Tennessee Amer. bor.*

multifidum 19. L. foliis multipartitis glabriusculis, superioribus amplexicaulibus, laciniis lanceolatis dentatis, galea corollae barbata, faucis dentibus porrectis. *Asia minor et media.*

2094. GLECHOMA.

hederaceum 1. Gl. foliis reniformi-subrotundis crenatis caule-que glabriusculis, verticillis paucifloris, calycibus subulatis. *Europ. Amer. bor.* (Gl. hirsutum Kit., magnum Merat. var.)

indicum * 2. Gl. foliis cordato-subrotundis crenatis cauleque hirsutis, pedunculis corymbosis axillaribus, calycibus longe aristatis. *Ind. or.* (Gl. hindostana Roth.)

2095. NEPETA.

* *Floribus cymosis axillaribus.*

marifolia Cav. 1. N. cymis laxiusculis erectis, calycis fauce villosa, foliis ovato-oblongis subintegerrimis incanis subtus fusco-punctatis, ramis virgatis, caule suffruticoso. *Hispan. austr.* (Melissa fruticosa L., cretica Lam., Thymus marifolius W. en.)

croatica * 2. N. cymis erectis paucifloris, calycis fauce nuda, foliis obovatis subdentatis utrinque glabris punctatis, caule herbaceo. *Croatia.* (Melissa alba Kit.)

serpyllifolia MB. 3. N. cymis laxis multifloris folia superantibus, dentibus calycis abbreviatis obtusis, foliis subrotundo-ovalibus integerrimis utrinque cauleque albido-subtomentosis. *Tauria.*

acinifolia * 4. N. cymis congestis multifloris folia superantibus, calycibus striatis glabriusculis, foliis petiolatis ovatis dentatis subtus incanis, caule erecto villoso. *Patria?*

parviflora MB. 5. N. cymis erectis paucifloris folia superantibus, calycis hirsuti striati dentibus bracteisque elongatis subulato-aristatis, foliis lanceolatis remote serratis subtus ramisque brachiatis hirsutis. *Podolia. Tauria. Caucas.*

sibirica MB. 6. N. cymis trichotomis subpaniculatis, calycis dentibus subulato-aristatis elongatis, foliis cordato-oblongis obtusis dentatis cauleque glabriusculis. *Sibir.* (Teucrium sibiricum L.)

grandiflora MB. 7. N. cymis racemosis multifloris, calycibus cylindricis incurvis pubescentibus coloratis bracteas subulatas superantibus, tubo corollae calycem multo superante, foliis cordatis crenatis subtus

incanis rugoſo-nervoſis. *Caucaſ.* (Sub N. colorata W. plures ſpecies confuſae.)

meliſſaefolia Lam. 8. N. cymis ſubumbellatis trichotomis ſtrictis, pedunculis elongatis folia multo ſuperantibus, calycibus cylindricis pubeſcentibus, foliis cordato-ſubrotundis crenatis glabriusculis, ſummis ſeſſilibus, radicibus faſciculatis. *Creta.*

longiflora Vent. 9. N. cymis ſub-6floris, ſuperioribus racemoſis, calycibus cylindricis lanato-tomentoſis tubo corollae duplo brevioribus, foliis cordato-oblongis obtuſis crenatis incano-tomentoſis. *Armenia. Caucaſ. Perſia.* (N. ſalviaefolia Perſ. Muſſini Henck. MB.)

incana Ait. 10. N. cymis dichotomis multifloris, calycibus albo-tomentoſis incurvis tubum corollae ſuperantibus, foliis petiolatis ſubcordato-oblongis ſerratis pubeſcentibus, ſuperioribus baſi attenuatis, caule diffuſo. *Caucaſ.* (N. cyanea Stev.)

graveolens Vill. 11. N. cymis pedunculatis ſecundis ſub-6floris, calycibus ſubincurvis villoſis, foliis ſubcordato-oblongis obtuſis baſi attenuatis profunde ſerratis tomentoſis. *Gallia auſtr. Italia ſuper.* (N. Nepetella Allion.)

Nepetella 12. N. cymis pedunculatis racemoſis, calycibus nudis, foliis cordato-lanceolatis anguſtis acute ſinuato-dentatis tomentoſis. *Europ. auſtr.* (N. amethyſtina Poir.)

teucriifolia W. 13. N. cymis paucifloris racemoſis, foliis longiſſime petiolatis cordato-ovatis obtuſis utrinque paucidentatis glabris. *Armenia.*

lamiifolia W. 14. N. cymis paucifloris hirſutiſſimis, ſummis breviſſime pedunculatis ſubſpicatis corollae tubo filiformi longiſſimo curvato, foliis cordato-ovatis obtuſis ſerratis pubeſcentibus, radice lignoſa fuſiformi. *Armenia.*

anguſtifolia Vahl. 15. N. cymis pedunculatis ſuperne congeſtis ſubſpicatis, calycibus ſtriatis acutis, foliis lanceolatis obtuſis baſi attenuatis obtuſe ſerratis rugoſis. *Hiſpania.* (N. arragonenſis Lam.)

Cataria 16. N. cymis pedunculatis ſuperne congeſtis ſpicatis, calycibus incanis cuſpidatis, foliis cordato-ovatis ſerratis caneſcentibus. *Europ. Amer. bor.*

ucranica 17. N. cymis racemoſo-paniculatis multifloris, calycibus incano-piloſis tubum corollae ſubaequantibus, foliis cordato-lanceolatis ſerratis nudiusculis. *Podolia. Tauria. Caucaſ.*

nuda 18. N. cymis racemoſis multifloris, calycibus nudiusculis collo coarctatis tubum corollae ſubaequantibus, foliis ſeſſilibus cordato-oblongis ſerratis glabris. *Europ. med. et auſtr. Aſia med.* (N. pannonica Jacq., violacea Vill.)

pannonica 19. N. cymis multifloris, floribus congeſtis, calycibus nudiusculis patentibus tubo corollae brevioribus, foliis petiolatis cordato-oblongis obtuſis crenatis glabris. *Europ. med. Sibir.* (N. nuda Jacq., paniculata Crantz.)

violacea 20. N. cymis ſubcapitatis paniculatis, calycibus abbreviatis patentibus tubo corollae brevioribus, lobis corollae lateralibus patentibus, foliis cordato-oblongis breviſſime petiolatis dentatis glabriusculis. *Europ. med. Sibir.*

coerulea Ait. 21. N. cymis breviſſime pedunculatis multifloris verticillato-ſpicatis hirſutis, lobis corollae lateralibus reflexis, foliis cordato-oblongis ſubſeſſilibus villoſis. *Patria?*

latifolia Cand. 22. N. cymis decompoſitis multifloris paniculato-congeſtis nudiusculis, calycibus ciliatis profunde dentatis, foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis crenatis cauleque glabriusculis. *Pyren. m.* (N. grandiflora Lapeyr.)

macrura Ledeb. 23. N. cymis multifloris patentibus paniculatis ſubaphyllis, calycibus incanis ſtriatis, foliis ſubcordato-triangularibus longe petiolatis ſerratis caneſcentibus, ſummis integerrimis. *Sibir.*

criſpa W. 24. N. cymis breviſſime pedunculatis paucifloris ſubverticillatis villoſis, foliis petiolatis cordatis crenatis rugoſis undulatis incanis. *Aſia minor?*

diffuſa Fiſch. 25. N. cymis breviſſime pedunculatis ſubverticillatis ebracteatis, calycibus villoſo-barbatis inaequaliter dentatis, foliis petiolatis ſubcordato-oblongis obtuſis crenulatis incanis. *Sibir. or.*

imbricata Lag. 26. N. cymis breviſſime pedunculatis compactis ſubverticillatis, bracteis patentibus rigidis lineari-ſubulatis calyces ſuperantibus, foliis petiolatis cordatis ſubdentatis villoſiusculis apice ſummisque ſubintegerrimis. *Hiſpania.*

** *Floribus verticillatis.*

teucrioides Lam. 27. N. verticillis diſtinctis compactis, bracteis lanceolatis villoſis calyces aequantibus, foliis petiolatis cordatis crenatis tomentoſis internodio brevioribus. *Aſia minor.*

italica 28. N. verticillis remotis compactis, bracteis lanceolatis acuminatis margine ſcarioſis calycem aequantibus, foliis petiolatis cordatis obtuſis crenatis. *Italia.* (N. marrubioides W. var.)

multibracteata Desf. 29. N. verticillis approximatis, bracteis lanceolatis pubeſcentibus calycem excedentibus, foliis petiolatis cordatis acutis crenatis ſubtus villoſis. *Atlas.*

ſupina Stev. 30. N. verticillis approximatis capitato-aggregatis, bracteis ſubulatis calyces aequantibus, foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-oblongis inaequaliter crenatis villoſis, caule decumbente. *Caucaſ.*

hirſuta 31. N. verticillis approximatis denſe ſpicatis, bracteis acuminatis calycibusque tomentoſis, foliis ſubſeſſilibus cordatis dentatis. *Sicil.* (N. Apuleii Ucr.)

lanata Jacq. 32. N. verticillis approximatis ſpicatis, bracteis ovatis nervoſo-rugoſis, corollae lobis lateralibus patentibus, foliis cordato-oblongis crenula-

tis rugoſis utrinque incano-tomentoſo-lanatis, radice tuberoſa. *Hiſpan.*

tuberoſa 33. N. verticillis diſtinctis, bracteis arcte imbricatis oblongis acutis coloratis venoſis calyces ſubſuperantibus, corollae lobis lateralibus reflexis, foliis cordato-oblongis dentatis pubeſcentibus, radice tuberoſa. *Hiſpan. Luſitan.*

reticulata Desf. 34. N. verticillis diſtinctis, bracteis patentibus oblongis reticulato-venoſis ſubcoloratis, corollae lobis lateralibus reflexis, foliis cordatis lanceolatis elongatis dentatis pubeſcentibus. *Atlas.*

Scordotis 35. N. verticillis ſuperne approximatis folioſis, bracteis ovatis acutis calycem ſuperantibus, foliis cordato-ovatis crenatis incano-tomentoſis. *Creta. Afric. bor.*

amboinica 36. N. verticillis ſpicatis, bracteis ovatis calyce brevioribus, foliis petiolatis cordatis obtuſis crenatis tomentoſis. *Amboina.*

madagascarenſis Lam. 37. N. verticillis ſpicatis aphyllis, foliis petiolatis ovato-ſubrotundis crenatis villoſis, radice tuberoſa. *Madagascar. Inſ. Mascaren. Ind. or.*

**** Floribus ſpicatis.*

lavandulacea L. ſuppl. 38. N. ſpica ovato-oblonga compacta, bracteis imbricatis ovatis calycem aequantibus, foliis oblongis ſuperioribus inciſo-ſerratis. *Sibir.* (N. multifida L.)

botryoides Ait. 39. N. ſpica elongata compacta, dentibus calycis ſubariſtatis, foliis ſubbipinnatis glabris, radice annua. *Sibir.* (N. annua Pall., bipinnata Cav., multifida L. ſuppl.)

nepalenſis * 40. N. ſpicis compoſitis ſubſecundis, calycibus incanis, foliis lanceolatis medio ſerratis petiolatis ſubreflexis utrinque attenuatis integerrimis. *Nepal.*

***** Corymbis terminalibus.*

heliotropifolia Lam. 41. N. corymbis pedunculatis paucifloris, foliis ovato-oblongis integerrimis caneſcentibus petiolatis, floralibus linearibus calycibusque ſubulatis. *Aſia minor.*

japonica W. 42. N. corymbis 3fidis ſubſeſſilibus, foliis ovato-oblongis acutis ſerratis utrinque tomentoſis ſubtus albidis. *Japon.* (N. incana Thb.)

racemoſa Lam. 43. N. corymbis laxis ſubverticillatis paucifloris, foliis petiolatis cordatis ſubcrenatis incanis. *Aſia minor.*

2096. HYPTIS Jacq.

** Capitulis pedunculatis axillaribus.*

ebracteata R. Br. 1. H. pedunculis paucifloris folio brevioribus, involucris nullis, calycibus hirſutis truncatis, dentibus ariſtatis, foliis cordatis duplicato-ſerratis,

ſummis ovatis. *Ind. occ.* (H. ſuaveolens Poit. Ballota ſuaveolens Jacq.)

lurida * 2. H. capitulis breviſſime pedunculatis, involucris abbreviatis, calycibus acuminatis foliisque ovatis ſerratis glanduloſo-viſcoſis. *Braſil.* Sello.

Pſeudo-Chamaedrys Poit. 3. H. pedunculis abbreviatis, involucris linearibus calyces hirſutos aequantibus, foliis ovato-oblongis ſerratis ramisque hirſutis. *Ind. occ.*

Chamaedrys W. 4. H. pedunculis internodia aequantibus, capitulis multifloris compactis, involucris lanceolatis piloſis calyces aequantibus, foliis ovato-oblongis crenatis ramisque villoſis. *Cayenn. Guiana.* (Clinopodium Chamaedrys Vahl.)

radiata W. 5. H. pedunculis internodia aequantibus, involucris lanceolatis denticulatis calyces hiſpidos ſubulatos ſuperantibus, foliis oblongis baſi attenuatis integerrimis medio glabriusculis. *Carolin. Mexico. Inſ. Philippin.*

microcephala Berter. 6. H. pedunculis internodio brevioribus, capitulis globoſis, involucris ſetaceis hiſpidis radiantibus calyces multo ſuperantibus, foliis ovato-oblongis crenatis glabriusculis. *Ad fl. Magdalenae.*

capitata Jacq. 7. H. pedunculis internodio brevioribus, capitulis compactis, involucris lanceolatis acutis calyces aequantibus, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis medio ſerratis glabriusculis. *Ind. occ.* (Clinopodium capitatum Sw.)

lantanaefolia Poit. 8. H. pedunculis internodia ſubaequantibus, capitulis globoſis multifloris, involucris ovato-oblongis calyces ſubſcarioſos ariſtatos aequantibus, foliis oblongis ſerratis ſubtus venoſis tomentoſis. *Hiſpaniola. Portorico. Nov. Granat.* (H. meliſſoides Kunth.)

polyanthos Poit. 9. H. pedunculis crebris internodio brevioribus, capitulis laxiusculis, involucris ſetaceis calyce fructifero ampliato brevioribus, foliis ovalibus ſerratis ſubtus ſubtomentoſis. *Quito. Peru. Braſil.* (H. lamiifolia Weinm.)

inflata * 10. H. pedunculis alternis internodio brevioribus, capitulis ſubmultifloris laxiusculis, involucris lanceolatis calyces fructiferos inflatos membranaceos ſubſuperantibus, foliis ovato-oblongis dentatis utrinque ramisque piloſiusculis. *Braſil.* (Marſypianthus hyptoides Mart.)

brevipes Poit. 11. H. pedunculis oppoſitis abbreviatis, capitulis multifloris compactis, involucris lineari-lanceolatis calyces ſuperantibus, foliis rhomboideo-ovatis inaequaliter dentatis ramisque aſperis. *Amer. auſtr.* (H. globifera Meyer.)

atrorubens Poit. 12. H. pedunculis oppoſitis internodio brevioribus, capitulis globoſis multifloris compactis, involucris lanceolatis calyce ariſtato rigido multo brevioribus, foliis ovato-oblongis inaequaliter dentatis glabriusculis. *Cayenn.* Richard. *Portorico* Bertero. *Martinica* Sieber.

recurvata Poit. 13. H. pedunculis internodio brevioribus, capitulis compactis, involucris ſetaceis calyce fructifero elongato incurvo brevioribus, foliis cordato-ovatis inaequaliter ſerratis. *Cayenn.*

urticoides Kunth. 14. H. pedunculis crebris internodia ſubaequantibus, involucris ſetaceis calyce brevioribus, foliis oblongis acutis ſerratis ſupra ramisque hiſpidis. *Mexico.*

lanceolata Poir. 15. H. capitulis alternis ſeſſilibus globoſis, involucris lanceolatis calyces aequantibus, foliis lanceolatis ſubſerratis glabris. *Patria?*

** *Floribus cymoſis.*

polyſtachya Humb. 16. H. faſciculis racemoſo-ſpicatis, involucris lanceolatis calyce brevioribus, foliis ovatis duplicato-ſerratis ſubtus cano-tomentoſis. *Mexico. Martinica.*

caneſcens Humb. 17. H. cymis ſubcapitatis racemoſis, involucris lanceolatis calyces ſubaequantibus, foliis rhombeo-ovatis duplicato-ſerratis ſubtus incano-tomentoſis. *Caracas.* (Teucrium rhombifolium W. herb.)

tomentoſa Poit. 18. H. cymis umbellatis pedunculatis albo-tomentoſis, involucris ſubnullis, foliis ovato-oblongis acutis crenatis tomentoſo-incanis reticulato-venoſis. *Mexico.*

albida Kunth. 19. H. cymis umbellatis oppoſitis ſeſſilibus albo-lanatis, involucris nullis, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſerratis utrinque albo-tomentoſis. *Mexico.*

nepetoides Fiſch. 20. H. cymis axillaribus oppoſitis breviter pedunculatis ſuperne paniculatis, involucris ſetaceis breviſſimis, calycibus ariſtatis, foliis ovato-oblongis inaequaliter dentatis pubeſcentibus. *Ind. occid.* (Brotera perſica *. Hyptis perſica W. Poit.)

ſpicata Poit. 21. H. cymis oppoſitis breviſſime pedunculatis racemoſo-ſpicatis, involucris abbreviatis, calycibus ariſtatis, foliis ovatis acuminatis inaequaliter dentatis utrinque glabris. *Hiſpaniola. Nov. Granat.*

*** *Floribus verticillatis.*

verticillata Jacq. 22. H. verticillis ſub-6floris, involucris nullis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis inaequaliter dentatis glabriusculis. *Hiſpaniola.*

Plumerii Poit. 23. H. verticillis denſis foliatis, inferioribus diſtinctis ſuperioribus confluentibus, foliis inferioribus cordatis angulato-ſerratis ſubtus tomentoſis, floralibus ovatis. *Ind. occ.* (Ballota foliis cordatis Plum.)

hirſuta Kunth. 24. H. verticillis laxiusculis diſtinctis foliatis, involucris lanceolatis calyces ſubaequantibus, foliis ſeſſilibus oblongis utrinque attenuatis crenatis hirſutis. *Nov. Granat.*

Pohliana Jacq. 25. H. verticillis approximatis, involucris ſubulatis calyce brevioribus, foliis petiolatis ovato-oblongis ſerratis glabriuſculis. *Braſil.*

ſtachyoides Link. 26. H. verticillis diſtinctis aphyllis ſpicatis, involucris ſetaceis patulis calyces ſuperantibus, foliis rhombeo-ovatis ſerratis pubeſcentibus. *Braſil.*

**** *Floribus ſpicatis.*

ſpicigera Lam. 27. H. ſpicis axillaribus elongatis denſe floriferis longe pedunculatis, calycibus ariſtatis, foliis oblongis ſerratis, ramis ſubaculeato-aſperis. *Ind. occid.*

pectinata Poit. 28. H. ſpicis axillaribus ſecundis ſubpaniculatis, bracteis ſubulatis calyces ariſtatos aequantibus, foliis ſubcordato-oblongis inaequaliter ſerratis glabris. *Ind. occid.* (Nepeta L. Byſtropogon Herit.)

***** *Floribus axillaribus ſubſolitariis.*

ſcoparia Poit. 29. H. floribus axillaribus oppoſitis breviſſime pedunculatis ebracteatis, calycibus muticis, foliis linearibus obtuſis glabris. *Hiſpaniola.*

2097. STACHYS.

* *Floribus ſubſolitariis ſ. oppoſitis.*

ſpinoſa 1. St. fruticoſa ramoſa ſericeo-lanata, ramis trichotomis patentibus ſpina terminatis, foliis lanceolatis ſubintegerrimis, floribus oppoſitis axillaribus ſeſſilibus. *Creta.*

mucronata Sieb. 2. St. fruticoſa ramoſa lanata, ramis 3fidis inermibus, foliiis oblongis obtuſis crenulatis, floribus oppoſitis axillaribus ſeſſilibus, calycibus campanulatis ſpinoſis. *Creta.*

glutinoſa 3. St. fruticoſa ramoſiſſima glabra, ramis trichotomis ſubglutinoſis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus ſubſolitariis breviſſime petiolatis 2bracteatis. *Creta. Corſica.*

fruticuloſa MB. 4. St. fruticoſa ramoſiſſima, ramis caneſcentibus, foliis lineari-lanceolatis apice dentatis, floribus oppoſitis dentatis, calycibus inermibus. *Caucaſ.*

aethiopica 5. St. herbacea tenera villoſa, foliis cordatis rugoſis crenatis, floribus oppoſitis ſubſpicatis, calycibus ariſtatis 5partitis. *Afric. auſtr.*

corſica Perſ. 6. St. herbacea aſcendens hirſuta, foliis ſubcordato-ovatis crenatis, floribus ſolitariis axillaribus, calycibus ſpinuloſis. *Corſica.* (Glechoma grandiflora Cand.)

anguſtifolia MB. 7. St. herbacea glabra, ramis virgatis diffuſis, foliis linearibus infimis pinnatifidis, floribus geminis pedunculatis remotis. *Tauria.* (St. tenuifolia Pall.)

*** Verticillis pauci-4floris.*

nivea Labill. 8. St. fruticoſa denſiſſime albo-tomentoſa, foliis ovato-ſubrotundis obtuſis integerrimis ſubtus nervoſis, verticillis ſub-4floris remotis, calycibus muticis. *Syria.*

rugoſa Ait. 9. St. fruticoſa tomentoſa, foliis lineari-lanceolatis ſubſerratis rugoſis, ſummis integerrimis, floribus pedicellatis, calycibus muticis. *Afric. auſtr.*

betonicaefolia Desf. 10. St. herbacea villoſa, foliis petiolatis cordato-oblongis rugoſis crenatis, floribus ſubſeſſilibus, calycibus muticis, galea corollae denſe lanata. *Creta.*

hyſſopifolia Mx. 11. St. herbacea glabriuſcula, foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis ſubdentatis, verticillis ſub-4floris. *Carolina.* (St. paluſtris Walt.)

**** Verticillis 6floris*

† diſtinctis.

a. Floribus albidis, ochroleucis, flavis.

ſtenophylla * 12. St. ſuffruticoſa hirſutiuſcula, ramis virgatis, foliis linearibus trinerviis, infimis ſublanceolatis utrinque 1dentatis, verticillis foliatis, calycibus pungentibus. *Hiſpan. auſtr.* (Sideritis linearifolia Lam.)

orientalis 13. St. ſuffruticoſa albo-tomentoſa, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis venoſo-rugoſis, floralibus verticillos aequantibus, calycibus muticis. *Aſia minor. Palaeſtina.*

ſcordioides Poir. 14. St. ſuffruticoſa villoſa, foliis lineari-lanceolatis ſubintegerrimis obtuſis, floralibus inciſo-laciniatis calycibusque ſpinuloſis. *Afric. bor.?*

ſpinuloſa Sm. 15. St. herbacea ramoſa, angulis caulis ramorumque ſpinuloſo-aſperrimis, foliis cordatis crenatis piloſis, verticillis foliatis, calycibus campanulatis ſubmuticis. *Creta.*

maritima 16. St. caule herbaceo erecto ſubſimplici villoſo-lanato, foliis obovato-oblongis in petiolum attenuatis crenatis nudiuſculis, floralibus lanceolatis integerrimis, calycibus villoſis ſubmuticis. *Ad litora maris mediterran.*

annua 17. St. caule herbaceo ramoſo glabriuſculo, foliis oblongo-lanceolatis acutiuſculis trinerviis dentatis, ſummis integerrimis, calycibus villoſis ſubpungentibus. *Europ.* (St. pubeſcens Tenor. et Balbiſii Link. var.)

hirta 18. St. caule diffuſo villoſo, foliis inferioribus petiolatis cordato-oblongis obtuſis crenatis rugoſis hirſutis, floralibus abbreviatis ſeſſilibus, calycibus ſubpungentibus, galea corollae 2fida, laciniis divaricatis, lab. inf. plano elongato, lobis lateralibus obſoletis. *Italia. Afric. bor. Hiſpan. Aſia minor.* (St. inſcripta Reichenb.)

β. *Floribus rubentibus.*

arvenſis 19. St. caule erecto hirſuto debili, foliis petiolatis cordatis obtuſis crenatis, tubo corollae calycem ſubmucronatum aequante. *Europ.* (St. purpurea Poir. var. italica et africana, corollis majoribus.)

arenaria Vahl. 20. St. caule aſcendente ſuperne villoſiſſimo, foliis lanceolatis ſeſſilibus obtuſis crenatis rugoſis baſi ſublanatis, calycibus villoſiſſimis pungentibus, galea corollae emarginata. *Calabria. Afric. bor. Aſia minor.*

iberica MB. 21. St. caule decumbente hirſuto, foliis oblongo-lanceolatis obtuſis ſubdentatis venoſis, calycibus villoſiusculis ſpinoſis. *Caucaſ.* (St. ſcordifolia W.)

aſpera Mx. 22. St. caule erecto ramisque ſubretrorſum hiſpidis, foliis ſubpetiolatis lanceolatis acuminatis ſerrulatis glabris, calycibus divaricato-ariſtatis. *Amer. bor.* (St. tenuifolia W. (var. caule glabro), arvenſis Walt.)

hiſpida Pursh. 23. St. caule erecto foliisque petiolatis ovato-oblongis obtuſe ſerratis ſtrigoſo-hiſpidulis, calycibus glabriusculis ſpinuloſis. *Amer. bor.*

nepetaefolia Desf. 24. St. caule erecto glabriusculo, foliis cordato-oblongis obtuſis crenulatis, calycibus ſubpungentibus. *Aſia minor.* (Nepeta circinata W. Cataria cappadocica humilior lamii folio. Tourn. in W. herb.)

arabica Hornem. 25. St. caule erecto ſuperne hirto inferne angulis muricato-aſperis, foliis ſubcordato-oblongis ſerratis rugoſis ſubtus nervoſis, ſummis ſeſſilibus acutis, calycibus amplis villoſis ſpinuloſis. *Arabia?*

ambigua Sm. 26. St. caule erecto villoſo fiſtuloſo, foliis ſubcordato-oblongis acute ſerratis villoſiusculis, calycibus acuminatis. *Scotia. Inſ. Orcades.*

ſylvatica 27. St. caule erecto villoſo-hirſuto ſolido, foliis cordato-ovatis dentato-crenatis villoſis, verticillis ſubaphyllis, calycibus acuminatis. *Europ.*

bogotenſis Humb. 28. St. caule erecto piloſo, foliis obſolete cordatis ſubrotundis obtuſis ſubtus caneſcentibus, calycibus mucronatis. *Nov. Granat.*

elliptica Kunth. 29. St. caule erecto hirſuto, foliis petiolatis ellipticis crenatis venoſo-reticulatis utrinque hirſutis, calycibus mucronatis. *Quito.*

hirſuta Kunth. 30. St. caule aſcendente hiſpido, foliis petiolatis cordato-oblongis acutis crenatis utrinque hirſutis, calycibus ſubpungentibus, galea emarginata. *Mexico.*

†† *Verticillis contiguis ſubſpicatis.*

Foeniculum Pursh. 31. St. caule erecto glaberrimo, foliis ſubcordato-oblongis acutis ſerratis ſubtus albicantibus, calycibus coloratis muticis. *Ad fl. Miſſuri.*

palaestina 32. St. caule erecto suffruticoso tereti foliisque lanceolatis integerrimis rugosis albido-tomentosis, calycibus muticis sub-10gonis. *Graecia. Syria.*

circinata Herit. 33. St. caule ascendente pilosissimo, foliis petiolatis cordatis obtusis crenatis utrinque villosis, bracteis calycibusque spinulosis. *Afric. bor. Hispan. Ins. ion.* (St. canariensis Jacq., velutina et mollissima W., decumbens Desf.)

coccinea Jacq. 34. St. caule erecto, foliis cordato-lanceolatis acutis serratis rugosis villosis, superioribus sessilibus, verticillis subaphyllis, calycibus pungentibus. *Patria?*

olympica Poir. 35. St. caule basi stolonifero lanato, foliis elliptico-oblongis obtusis argute serratis subtus lanuginosis, verticillis tomentosis spicatis, calycibus spinosis. *Olymp.*

congesta Urv. 36. St. caule basi ramoso prostrato tomentoso, foliis ovato-oblongis crenulatis incanis, floribus dense spicatis, calycibus densissime lanatis, corolla extus pilosa. *Asia minor. Palaestina.* (Marrubium undulatum Sieber.)

aegyptiaca Pers. 37. St. incana, foliis ovatis rugosis, bracteis late ovatis acuminatis, spica densa, calycibus campanulatis laevibus. *Aegypt.*

† *betaefolia* Pers. 38. St. foliis petiolatis cordatis inciso-crenatis, spica compacta villosa. *Patria?*

**** *Verticillis sub-10floris.*

recta 39. St. caule ascendente foliisque subsessilibus lanceolatis subdentatis hirsutis, calycibus pungentibus. *Europ.*

heraclea All. 40. St. caule ascendente villosissimo sublanato, foliis petiolatis subcordato-oblongis crenato-serratis rugosis utrinque villosis, bracteis summis integerrimis, verticillis distinctis, calycibus villosissimis pungentibus, galea corollae lanata. *Italia. Croatia. Gallia austr.* (St. obliqua Kit. phlomoides W.)

debilis Kunth. 41. St. caule debili laevi, foliis profunde cordatis obtusis crenatis subtus pubescentibus, calycibus subpungentibus, galea corollae 2fida. *Quito.*

glaucescens Mussin. 42. St. caule erecto villoso, foliis cordatis acuminatis serratis utrinque hirsutis, verticillis aphyllis spicatis, laciniis calycis divaricatis pungentibus. *Caucas.* W. herb.

palustris 43. St. caule erecto retrorsum hispido, foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis pubescentibus, verticillis hirsutis, calycibus pungentibus. *Europ.*

***** *Verticillis multifloris.*

germanica 44. St. caule erecto lanato, foliis oblongis crenatis lanato-villosis, bracteis lanceolatis integerrimis patulis, dentibus calycis ovatis, galea cor. rotundata, lobo med. lab. inf. emarginato. *Europ.*

45.

intermedia Ait. 45. St. caule erecto ſublanato, foliis ſubcordato-oblongis crenatis villoſis, bracteis lanceolatis integerrimis, interioribus longioribus, calycibus pungentibus, galea ſubretuſa, lobo medio lab. inf. integerrimo. *Sibir.* (St. ſibirica Link.)

polyſtachya Tenor. 46. St. caule ramoſo ſublanato, foliis ſubcordato-oblongis inaequaliter crenatis rugoſis tomentoſis, bracteis ovato-oblongis abbreviatis ſerratis, calycibus ſpinoſis, galea cor. crenulata. *Neapol.*

ſalviaefolia Tenor. 47. St. caule ſimplici tomentoſo, foliis anguſte oblongis obtuſis crenatis incanis ſubtus lanatis, verticillis ſubſpicatis, calycibus longe ſpinoſis. *Calabria.*

cretica 48. St. caule erecto hirſuto, foliis ſubcordato-oblongis crenatis rugoſis pubeſcentibus, verticillis villoſo-lanatis, calycibus pungentibus, galea cor. demum reflexa. *Creta. Sicilia.* (St. daſyantha Rafin.)

alpina 49. St. caule erecto villoſo, foliis ſubcordato-oblongis cartilagineo-dentatis hirſutis, verticillis foliatis, calycibus coloratis ſubpungentibus, galea cor. horizontali. *Alp. Europ. med.*

lanata Jacq. 50. St. caule baſi procumbente radicante foliisque oblongis obſcure crenulatis denſiſſime lanatis, calycibus acutis denſa lana occultis. *Ad Volgam. Tauria. Graecia. Aſia minor.*

latifolia Ait. 51. St. foliis late cordatis rugoſis piloſis, verticillis ſubſpicatis, galea 2fida acuta. *Patria?*

† *Tournefortii* Poir. 52. St. caule erecto tomentoſo, foliis cordato-ovatis ſubcrenatis obtuſis rugoſis, petiolis dilatatis baſi connatis, calycibus ſpinoſis tubum corollae aequantibus. *Creta.*

Artemiſia Lour. 53. St. caule ſimplici albicante, foliis ſubtus tomentoſis, radicalibus ſubrotundis crenatis, caulinis pinnatifidis inciſis, calycibus pungentibus. *China. Cochinchina.*

2098. LEONURUS.

Cardiaca 1. L. foliis oblongis 3fidis baſi cuneatis glabriusculis, laciniis acutis, corolla calycem pungentem ſuperante, lobo med. lab. inf. oblongo. *Europ. Aſia minor. Amer. bor.*

villoſus Desf. 2. L. caule erecto villoſo, foliis oblongis 3fidis hirſutis, laciniis elongatis acutis dentato-laciniatis, tubo corollae villoſae calycem pungentem triplo ſuperante. *Tauria.* d'Urville.

Marrubiaſtrum 3. L. foliis oblongis groſſe dentatis utrinque attenuatis, calycibus longe ſpinoſis corollae tubum ſubſuperantibus, lobo medio lab. inf. ſubrotundo. *Europ. praeſertim orient.* (Chaiturus Ehrh.)

criſpus Murr. 4. L. caule erecto glabro, foliis ſubcordato-ovatis ſubtus incanis lobatis, lobis acutis inciſo-dentatis, corolla denſe lanata calycem glabrum ſpinuloſum multo ſuperante. *Sibir.*

ſupinus 5. L. caule aſcendente pubeſcente, foliis ſub-5lobis utrinque pubeſcentibus, lobis obtuſis apice dentatis, calycibus pubeſcentibus ſpinoſis tubum corollae ſubaequantibus. *Sibir.*

tataricus 6. L. foliis 3partitis, laciniis ſubinciſis, calycibus inermibus, galea corollae plana ſubreflexa. *Aſia media.*

ſibiricus 7. L. foliis 3partitis, laciniis ſubinciſis obtuſiuſculis, calycibus inermibus, galea cor. fornicata erecta. *Sibiria. China.*

condenſatus Hornem. 8. L. foliis 3partitis, laciniis pinnatifidis dentatis lanceolatis acutiuſculis, calycibus glabris ſpinoſis, galea cor. planiuſcula recta pubeſcente. *Sibir.*

altaicus * 9. L. foliis palmato-pedatis glabris, laciniis linearibus pinnatifidis acuminatis, floralibus 3partitis hirſutis, verticillis denſe lanatis, calycibus ſpinoſis, galea cor. demum reflexa. *Imaus.*

lanatus Perſ. 10. L. caule erecto denſe lanato, foliis palmatis ſubtus albido-lanato-villoſis, calycibus ſpinoſis, galea cor. concava denſe villoſa. *Sibir. China.* (Ballota L. Panzera multifida Mönch.)

2099. BALLOTA.

nigra L. ſp. ed. 1. 1. B. foliis ovatis obtuſis crenatis baſi ſubattenuatis hirſutiuſculis, cymis ſubverticillatis, dentibus calycis ovatis mucronatis patentibus tubum corollae ſubſuperantibus. *Europ.* (B. alba L. ſpec. ed. 2. fl. ſuec., foetida Lam. borealis Schweigg.)

vulgaris Link. 2. B. foliis ovatis acutis groſſe ſerratis baſi ſubattenuatis glabriuſculis, cymis ſubverticillatis, dentibus calycis linearibus cuſpidatis rectis tubo corollae brevioribus. *Europ.* (B. nigra L. ſpec. ed. 2., ruderalis Sv. bot.)

2100. BETONICA.

officinalis 1. B. caulibus aſcendentibus laxis, foliis cordato-oblongis crenatis, ſpica interrupta abbreviata, calycibus ciliatis glabriuſculis, lobo medio lab. inf. cor. ſubemarginato. *Anglia. Europ. auſtr.*

ſtricta Ait. 2. B. caule ſtricto ſimplici, foliis cordato-oblongis crenatis, ſpica oblonga baſi interrupta, calycibus hirſutis, lobo medio lab. inf. crenulato. *Europ.* (B. officinalis Crantz. Poll.)

incana Ait. 3. B. ſpica interrupta, tubo corollae incurvo tomentoſo, galea 2fida, lobo medio lab. inf. crenato, foliis cordato-oblongis groſſe crenatis caneſcentibus. *Italia. Ad Nannetum Armoric.*

orientalis 4. B. ſpica continua elongata, lobo medio lab. inf. cor. integerrimo, foliis cordato-lanceolatis elongatis crenatis. *Aſia minor.*

Alopecuros 5. B. ſpica interrupta baſi foliata, calycibus pungentibus, galea cor. 2fida, foliis caulinis cordato-ovatis crenatis petiolatis. *German. med. et auſtr. Italia. Gallia.* (Flores ochroleuci.)

heraclea 6. B. ſpica ſubcontinua lanata, dentibus calycis filiformibus inermibus, foliis lanceolatis glabriusculis. *Aſia minor.* (Flores lutei.)

hirſuta 7. B. ſpica ſubcontinua oblonga folioſa, bracteis lanceolatis calyces cuſpidatos aequantibus, galea cor. integra, foliis cordato-oblongis crenatis cauleque hirſutiusculis. *Italia. Pyren. Caucaſ.* (B. Monnerii Gouan.)

grandiflora W. 8. B. ſpica interrupta foliata, bracteis ovatis cuſpidatis calycibusque ſpinoſis villoſis, corollae declinatae galea obcordata, foliis cordato-ovatis ſerratis cauleque villoſis. *Sibir. Caucaſ.*

nivea Stev. 9. B. ſpica interrupta foliata, bracteis lanceolatis calycibusque inermibus villoſis, corollae erectae galea rotundata, foliis lineari-oblongis groſſe ſerratis villoſis ſubtus niveo-tomentoſis. *Caucaſus.*

2101. MARRUBIUM.

* *Calycibus 5dentatis.*

Alyſſon 1. M. caule albo lanato, foliis cuneatis ſubpraemorſis dentatis lanatis, verticillis foliatis, calycis dentibus rigidis patentibus. *Hiſpan. Sicil.*

aſtracanicum Jacq. 2. M. caule lanato, foliis obovatis ſubrotundo-oblongis rugoſis crenatis utrinque tomentoſis, bracteis ſubulatis, calycis denſe lanati dentibus reflexo-uncinatis. *Ad Volgam. Aſia minor. Caucaſ.* (M. affine Horn.)

candidiſſimum 3. M. caule baſi ramoſo villoſo-lanato, foliis ovatis obtuſe dentatis rugoſis utrinque ſericeo-tomentoſis, bracteis dentibusque calycis ſubulatis patentibus. *Hiſpan. Graecia. Aſia minor.* (M. uncinatum Horn.)

peregrinum 4. M. caule ramoſiſſimo, ramis divaricatis, foliis oblongo-lanceolatis dentatis rugoſo-venoſis incano-tomentoſis, bracteis dentibusque calycis ſubulatis rectis. *Europ. med. et auſtr. Aſia minor.* (M. creticum Mill. Roth., paniculatum et incanum Desrouſſ., remotum Kit.)

ſupinum 5. M. caule ramoſo lanato, foliis obovatis inaequaliter crenatis rugoſis lanato-villoſis, bracteis calycibusque ſpinoſis rectis villoſis. *Europ. auſtr.* (M. ſetaceum Desr.)

catariaefolium Desr. 6. M. caule ramoſo incano, foliis ovato-oblongis viridibus profunde crenatis, calycis villoſi dentibus bracteisque ſubulatis glabris patentibus. *Aſia minor. Caucaſ.* (M. leonuroides Desr.)

circinatum Desr. 7. M. caule tomentoſo, foliis orbiculatis crenatis rugoſiſſimis tomentoſis, bracteis dentibusque

calycis ſubulatis rectis villoſis. *Graecia.* (M. velutinum Sm.)

** *Calycibus* 10*dentatis.*

vulgare 8. M. foliis ſubrotundo-ovatis dentatis venoſo-rugoſis incanis, bracteis dentibusque calycis ſetaceo-uncinatis. *Europ. Aſia med. Amer. bor.* (M. apulum Tenor.)

hamatum Kunth. 9. M. foliis ſubrotundis crenatis rugoſis ſubtus cauleque lanatis, bracteis ſetaceis, dentibus calycis ſubulatis hamatis. *Nov. Hiſpan.*

africanum 10. M. caule ramoſo folioſo villoſo, foliis petiolatis cordato-ſubrotundis crenatis, verticillis paucifloris, calycis dentibus lanceolatis mucronatis patentibus. *Afric. auſtr.* (M. microphyllum Desr.)

criſpum 11. M. caule ſuffruticoſo lanato, foliis ſuperioribus amplexicaulibus cordato-ſubrotundis crenatis rugoſiſſimis utrinque piloſis ſubtus discoloribus, verticillis foliatis, calycibus patentibus muticis, corollae glabrae galea integra. *Ital. Hiſpan.*

cinereum Desr. 12. M. caule lanato, foliis cordato-ſubrotundis crenatis rugoſis ſupra piloſis ſubtus tomentoſis, calycis dentibus ovatis mucronatis patentibus, corollae piloſae galea 2fida. *Hiſpan. Luſitan. Aegypt. Palaeſtina.* (Ballota ſaxatilis Sieber.)

hiſpanicum 13. M. caule erecto foliisque cordatis ovatis crenatis rugoſis utrinque villoſis, bracteis linearibus, dentibus calycis ovatis mucronatis, galea corollae barbata inciſa. *Hiſpan. Ital. Sicil.* (M. hirſutum W., rupeſtre Bivon.)

orientale * 14. M. caule ramoſo villoſo, foliis cordato-ſubrotundis dentatis rugoſis ſubtus incano-tomentoſis, bracteis linearibus, calycis rigidi dentibus ſpinoſis, galea corollae fornicata crenulata. *Aſia minor.* (Ballota orientalis Presl.)

acetabuloſum 15. M. caule ſtricto villoſo-lanato folioſo, foliis cordato-ſubrotundis crenatis rugoſis, limbo calycis demum dilatato rotundato. *Creta. Inſ. maris aegei. Palaeſtina.* (Stachys palaeſtina Sieber.)

Pſeudo-Dictamnus 16. M. fruticoſum denſiſſime tomentoſum, foliis cordato-ſubrotundis concavis petiolatis, calycis limbo plano villoſo. *Creta. Graecia.*

2102. PHLOMIS.

* *Genuinae.*

† *Fruticoſae.*

fruticoſa 1. Phl. incano-tomentoſa, foliis oblongis obtuſis crenulatis rugoſis, inferioribus ſubcordatis, bracteis lanceolatis acuminatis calycem aequantibus, dentibus calycis ſubulatis recurvis. *Europ. auſtr.*

ferruginea Tenor. 2. Phl. ferrugineo-tomentoſo-floccoſa, foliis ſubcordato-ovato-oblongis crenatis rugoſis, brac-

teis linearibus ſubulatis calyce ſubbrevioribus, dentibus calycis ſubulatis recurvis. *Neapol.*

cretica Presl. 3. Phl. incano-tomentoſo-hirſuta, foliis omnibus cordatis petiolatis crenatis rugoſis, bracteis dentibusque calycis hirſutiſſimi ſubulatis, tubo corollae calycem ſubaequante, galea repanda. *Creta.* (Phl. fruticoſa Sieber.)

ſcarioſa Presl. 4. Phl. ſubtomentoſa, foliis ovato-oblongis acutis crenatis rugoſis ſupra viridibus, bracteis ſcarioſis calyce brevioribus, galea corollae crenata. *Calabria.*

virens Cand. 5. Phl. hirſutiuscula, foliis ovato-lanceolatis, bracteis lineari-ſubulatis, dentibus calycis inaequalibus. *Aſia minor?*

lanata W. 6. Phl. albido-lanata, foliis obovato-ellipticis obtuſis rugoſo-venoſis, bracteis obovatis obtuſis calyce breviſſime dentato brevioribus. *Calabria. Creta.* (Phl. microphylla Sieber., parvifolia Presl., anguſtifolia Cand.?)

purpurea Sm. 7. Phl. tomentoſo-lanata, foliis ſubcordato-ovato-lanceolatis acutis rugoſis ſubtus denſe lanatis, bracteis lanceolatis pungentibus, calycibus acuminatis. *Hiſpania. Luſitania.*

italica Sm. 8. Phl. tomentoſa, foliis cordatis oblongis utrinque lanatis, bracteis lanceolatis obtuſis calyce obtuſiſſimo inermi brevioribus. *Italia. Luſitan.* (Phl. purpurea L.)

Niſſolii 9. Phl. tomentoſo-villoſa, foliis radicalibus cordato-ſagittatis, caulinis oblongis, verticillis ebracteatis, dentibus calycis oblongis acutis. *Aſia minor.*

armeniaca W. 10. Phl. tomentoſa, foliis omnibus petiolatis lanceolatis obtuſis rugoſis ſubtus albo-tomentoſis, bracteis breviſſimis ſubulatis reflexis, dentibus calycis lanceolato-ſubulatis. *Armenia.*

Lychnitis 11. Phl. tomentoſa, foliis lanceolatis venoſo-rugoſis ſubtus albidis, floralibus ovatis involucrantibus, calycis villoſiſſimi dentibus ſetaceis bracteas lineari-ſubulatas aequantibus. *Gallia auſtr. Hiſpania.*

†† *Herbaceae.*

orientalis Cand. 12. Phl. denſe tomentoſa, foliis omnibus petiolatis crenulatis, inferioribus ſubcordatis ſuperioribus ovato-oblongis, verticillis laxis, bracteis ſubulatis calyce brevioribus. *Ad Smyrnam Aſiae minor.*

ſamia 13. Phl. hirſuta, foliis cordatis crenatis ſupra viridibus ſubtus incano-tomentoſis, bracteis 3partitis ſubulatis calycem 10 ſtriatum mucronatum aequantibus. *Inſ. Samos. Euboea. Afric. bor.*

lunarifolia Sm. 14. Phl. foliis cordatis crenatis ſubtus tomentoſis, bracteis latis indiviſis faſciculato-ciliatis mucronatis, calycibus ſpinoſis. *Graecia.*

crinita Cav. 15. Phl. candide tomentoſa, foliis integerrimis, inferioribus petiolatis ſubcordatis, floralibus ſeſſi-

libus oblongis, bracteis ſetaceis villoſis calycis dentes ſubulatos erectos ſubſuperantibus. *Hiſpan. auſtr.*

biloba Desf. 16. Phl. villoſo-lanata, foliis ovato-oblongis ſubintegerrimis, inferioribus petiolatis, floralibus ſeſſilibus verticillos paucifloros excedentibus, bracteis lineari-filiformibus hirſutis calycem aequantibus, galea cor. profunde 2partita. *Atlas.*

Herba venti 17. Phl. hirſuta, foliis venoſo-rugoſis ſerratis ſubtus hirſuto-tomentoſis, inferioribus cordato-oblongis petiolatis, floralibus ſubſeſſilibus lanceolatis, calycis dentibus patentibus bracteisque ſubulatis hirſutis. *Europ. auſtr.*

pungens W. 18. Phl. pubeſcens, foliis petiolatis ſupra ſcabris ſubtus tomentoſis, caulinis ovato-lanceolatis ſerratis, floralibus lineari-lanceolatis integerrimis, calycis dentibus patentibus bracteisque ſubulatis aſperis. *Armenia. Caucaſ. Perſia. Sibir.*

tuberoſa 19. Phl. radice tuberoſa, caule glabro, foliis cordato-oblongis ſerratis glabriusculis, calycis dentibus patentibus bracteisque ſubulatis hirſutis. *Tauria. Caucaſ. Sibir.*

alpina Pall. 20. Phl. pubeſcens, foliis radicalibus cordatis, floralibus lanceolatis elongatis, bracteis ſubulatis villoſis. *Imaus.*

laciniata 21. Phl. caule elato lanato, foliis alternatim pinnatis, foliolis pinnatifidis obtuſe dentatis, calycibus campanulatis denſe lanatis. *Armenia. Caucaſ.*

** *Deſciſcentes calyce.*

alba Forsk. 22. Phl. caule glabro, foliis ovatis obtuſis medio ſerratis piloſis, involucris 4fidis ſetaceis, calycibus obliquis, dentibus ſuperioribus majoribus. *Arabia.*

moluccoides Vahl. 23. Phl. arboreſcens, foliis omnibus petiolatis ovatis ſerratis, involucris multipartitis ſetaceis, calyce $\frac{1}{2}$, lobo medio lab. inf. rotundato membranaceo. *Arab.* (Clinopodium fruticoſum Forsk.)

2103. LEUCAS R. Br.

* *Fruticoſae.*

chinenſis R. Br. 1. L. ramis hiſpidis, foliis petiolatis ovatis ſerratis ſericeo-tomentoſis, calycibus infundibuliformibus, dentibus ariſtatis. *China.* (Phlomis Retz.)

montana * 2. L. ramis tomentoſis, foliis ſubcordato-ovatis groſſe dentatis ſubtus niveis, calycibus truncatis breviſſime dentatis bracteas lineares aequantibus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

** *Herbaceae.*

ceylanica R. Br. 3. L. caule diffuſo piloſo, foliis lanceolatis obtuſis remote ſerratis, calycibus obovatis truncatis pi-

losissimis brevissime dentatis bracteas setaceas ciliatas superantibus. *Ceylon. Ind. orient.* (Phlomis L.)

linifolia * 4. L. caule ramoso pubescente, foliis lineari-lanceolatis obtusis subserratis glabriusculis, calycibus ovatis obliquis sub-8dentatis glabris, dente supremo maximo. *Ind. or.* (Phlomis zeylanica Murr. linifolia Roth.)

Pluknetii * 5. L. caule ramoso laevi, foliis lineari-lanceolatis grosse serratis pubescentibus, calycibus obovato-oblongis obliquis 8dentatis apice pilosis, dentibus superioribus majoribus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

cephalotes * 6. L. caule ramoso hirto, foliis oblongo-lanceolatis grosse serratis pubescentibus, capitulis terminalibus multifloris, bracteis lanceolatis calyces oblongos pilosos dentibus 10 subulatis aequantibus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

nutans * 7. L. caule pubescente, foliis ovato-lanceolatis obtusis grosse serratis pilosis, verticillis subcontiguis, bracteis setaceis calyce cylindrico obliquo 10dentato brevioribus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

hirta * 8. L. caule foliisque lanceolatis obtusis subserratis rugosis hirtis, verticillis fastigiatis, calycis ovati truncati hirsuti dentibus 10 lanceolatis rigidis patulis. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

dimidiata * 9. L. caule hirto, foliis oblongo-lanceolatis subserratis hirsutis, verticillis dimidiatis, calycis oblongi superne pilosi dentibus 10 subulatis subpungentibus. *Ind. or.* (Phlomis Roth.)

aspera * 10. L. ramis horizontalibus hirsutis, foliis lanceolatis basi attenuatis medio serratis supra glabris subtus asperis, bracteis lanceolatis, calycibus inaequaliter 10dentatis oblique truncatis. *Persia austr.* (Phlomis W. en.)

indica R. Br. 11. L. caule tomentoso, foliis ovatis serratis villosis, bracteis linearibus villosis, calycibus tubulosis obliquis 8dentatis. *Ind. or.* (Phlomis L.)

urticaefolia R. Br. 12. L. foliis ovatis serratis cauleque canescentibus, bracteis subulatis, calycibus oblique truncatis membranaceis sub-9dentatis. *Arabia. Ind. or.* (Phlomis Vahl.)

stachyoides * 13. L. caule ascendente retrorsum piloso, foliis ovato-oblongis acutis serratis pubescentibus, verticillis laxiusculis ebracteatis, calycibus campanulatis glabriusculis, dentibus 10 alternis minoribus. *Ins. Societ. Cochinchina.* (Stachys decemdentata Forst., Phlomis W., Ballota pilosa Lour.)

flaccida R. Br. 14. L. foliis ovatis membranaceis calycibusque glabriusculis, dentibus 10 aequalibus, verticillis multifloris. *Nov. Holl.*

glabrata R. Br. 15. L. ramis retrorsum pilosis, foliis ovatis serratis, bracteis abbreviatis 4partitis setaceis, calycibus obliquis $\frac{7}{?}$, labio inf. producto. *Arabia.* (Phlomis Vahl.)

martinicensis R. Br. 16. L. ramis retrorſum piloſis, foliis oblongis utrinque attenuatis dentatis ſubtus pubeſcentibus, verticillis globoſis multifloris, calycibus incurvis oblique 8dentatis, dente ſupremo producto. *Martinica.* (Phlomis caribaea Jacq. martinicenſis Sw. W.)

biflora R. Br. 17. L. caule ſubramoſo ſcabro, foliis petiolatis ovatis crenato-ſerratis glabris, calycibus oppoſitis pedunculatis axillaribus aequaliter 10dentatis. *Ceylon.* (Phlomis Vahl. W.)

2104. LEONOTIS R. Br.

Leonurus R. Br. 1. L. fruticoſa, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſerratis venoſis ſcabris, bracteis ſubulatis verticillo brevioribus, calycibus prismaticis glabriusculis, dentibus recurvatis mucronatis abbreviatis. *C. B. S.* (Phlomis L.)

ovata * 2. L. fruticoſa, foliis petiolatis ovatis dentatis ſubtus incanis, verticillis capitatis, calycibus glabriusculis ore obliquo inaequaliter 7dentatis, dente ſupremo producto. *Afric. auſtr.* (Phlomis Leonotis Thunb. Leonitis L.)

intermedia Lindl. 3. L. caule ſuffruticoſo, foliis ſubcordato-ovatis acutis rugoſis ſerratis ſubtus tomentoſis, calycibus 10dentatis oblique truncatis muticis. *Afric. auſtr.*

nepetaefolia R. Br. 4. L. herbacea, foliis cordatis ſerratis ſubtomentoſis, verticillis globoſis, bracteis elongatis ſpinoſis reflexis, calycibus oblique 7dentatis ſpinuloſis, dente ſupremo producto rigido. *Ind. or. Afric. or.* (Phlomis L., Leonurus Marrubiaſtrum Lour.)

2105. MOLUCCELLA.

fruteſcens 1. M. caule fruticoſo ſubramoſo foliisque ovatis paucidentatis villoſiusculis, ſpinis axillaribus ternatis horizontalibus, calycibus ſubquaternis infundibuliformibus, ſpinis limbi 10, alternis brevioribus, galea cor. villoſiſſima. *Ital. Cyprus.*

perſica N. L. Burm. 2. M. caule fruticoſo glabro, foliis cuneiformibus dentato-ſpinuloſis tomentoſis, ſpinis axillaribus ſubpalmatis patentibus, calycibus verticillatis infundibuliformibus 5-mucronatis, galea cor. glabra. *Perſia.*

grandiflora Steph. 3. M. caule herbaceo glabro, foliis 3fidis cuneatis, laciniis inciſis apice ſpinuloſis, ſpinis axillaribus ſetaceis patentibus, calycibus ſubquaternis infundibuliformibus 5fidis, laciniis ſpina terminatis, galea cor. villoſa 2fida. *Imaus.*

tuberoſa Pall. 4. M. radice tuberoſa, caule herbaceo glabro, axillis petiolisque lanatis, foliis inferioribus oblongis inciſo-dentatis, ſuperioribus ſeſſilibus cuneiformibus ſerratis, calycibus infundibulifor-

mibus truncatis margine ſpinoſis, galea cor. piloſa. *Sibir. auſtr.*

Marrubiaſtrum Steph. 5. M. caule herbaceo humili lanato, foliis palmatis incano-villoſiuſculis, laciniis obtuſe 3dentatis, verticillis folioſis, calycibus denſiſſime lanatis 5ariſtatis. *Sibir. auſtr.*

laevis 6. M. caule herbaceo glabro, ſpinis axillarum ſuperiorum palmatis, foliis ſubrotundo-ovatis groſſe dentatis, calycibus campanulatis ampliſſimis membranaceis margine 5-ſpinuloſis. *Aſia minor. Syria.*

ſpinoſa 7. M. caule herbaceo glabro, foliis petiolatis ſubcordatis inciſo-dentatis, bracteis calycibusque 2labiatis 7dentatis ſpinoſis, dente calycis ſupremo porrecto rigido. *Calabria. Graecia.*

2106. RIZOA Cav.

ovatifolia Cav. *Inſ. Chiloe prope Chili.* Herba glabra ramoſa, foliis ovatis ſerratis, floribus paniculatis roſeis.

2107. COLQUHOUNIA Wall.

coccinea Wall. *Nepal.* Frutex volubilis, foliis oblongis crenulatis, floribus ſubverticillatis coccineis.

2108. SELAGO.

* *Fruticoſae.*

† *Floribus capitatis.*

capitata 1. S. foliis linearibus carnoſis glabris obtuſis faſciculatis, ramis pubeſcentibus, capitulo terminali, bracteis ſcarioſis. *Afric. auſtr.*

fruticoſa 2. S. foliis linearibus ſparſis obtuſis integerrimis, capitulis ſubrotundis terminalibus ſeſſilibus. *Afr. auſtr.*

articulata Thb. 3. S. foliis linearibus abbreviatis ſubimbricatis obtuſis glabris, ramis divaricatis articulatis glabris, capitulis ovatis glabriuſculis. *Afr. auſtr.*

ſtricta Berg. 4. S. foliis lineari-trigonis faſciculatis ſubtus ramisque hiſpidis, capitulis globoſis ſubtomentoſis. *C. B. S.*

glomerata Thb. 5. S. foliis lanceolatis glabris faſciculatis, ramis pubeſcentibus, capitulis terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque ciliatis. *C. B. S.*

paniculata Thb. 6. S. foliis lanceolatis glabris margine revolutis, ramis patentiſſimis ſubpubeſcentibus, capitulis lateralibus ſubſpicatis. *C. B. S.*

cinerea Thb. 7. S. foliis lanceolatis glabris margine revolutis faſciculatis, ramis pubeſcentibus, capitulis terminalibus paniculatis. *C. B. S.*

decumbens Thb. 8. S. foliis obovatis ſerratis hirſutis, caule decumbente, capitulis terminalibus aphyllis hiſpidis. *C. B. S.*

†† *Floribus ſpicatis.*

α. Spicis ſimplicibus.

caneſcens Thb. 9. S. foliis filiformibus faſciculatis glabris, ramulis villoſis, ſpicis terminalibus oblongis pubeſcentibus. *Afric. auſtr.*

geniculata Thb. 10. S. foliis linearibus faſciculatis glabris, ramis geniculato - inflexis glabris, ſpicis cylindricis laxis, calycibus pubeſcentibus. *Afr. auſtr.*

diffuſa Thb. 11. S foliis linearibus glabris ſubreflexis, ramis diffuſis, ſpicis terminalibus oblongis, calycibus ciliatis. *Afr. auſtr.* (S. ſpinea Link.)

ovata Thb. 12. S. foliis linearibus acutis glabris faſciculatis, ramis pubeſcentibus virgatis, ſpicis ovato-oblongis, bracteis denticulatis glabris. *Afr. auſtr.*

hiſpida Thb. 13. S. foliis linearibus reflexis hiſpidis, ſpicis oblongis terminalibus hirſutis. *Afr. auſtr.*

triquetra Thb. 14. S. foliis lineari-trigonis obtuſis apice reflexis imbricatis, ſpicis terminalibus oblongis. *C. B. S.*

ſpicata Link. 15. S. foliis lineari-lanceolatis acutis integerrimis glabris, ſpicis terminalibus, bracteis ovatis acutis calycem aequantibus. *C. B. S.*

ſcabrida Thb. 16. S. foliis lanceolatis margine revolutis hiſpidiusculis ſparſis, ſpicis terminalibus ovatis, bracteis calycibusque ciliato-hiſpidis. *C. B. S.*

ramuloſa Link. 17. S. foliis lanceolatis obtuſis argute ſerratis glabris, ſpicis ovatis terminalibus, calycibus pubeſcentibus. *C. B. S.*

ciliata Thb. 18. S. foliis ovatis acutis ciliatis imbricatis, ramis hirſutis, ſpicis ovatis, bracteis ciliatis. *C. B. S.*

bracteata Thb. 19. S. foliis obovatis obtuſis decurrentibus imbricatis glabris, ſpicis oblongis, bracteis ovatis acutis imbricatis. *C. B. S.* (S. lucida Vent.)

β. Spicis faſciculatis, corymboſis.

polyſtachya 20. S. foliis filiformibus aggregatis, ſpicis corymboſis, calycibus hiſpidis. *Afr. auſtr.*

dentata Poir. 21. S. foliis teretibus acutis utrinque ſulcatis glaberrimis ſubdentatis, ſpicis terminalibus aggregatis. *C. B. S.* (S. teretifolia Link.)

polygaloides Thb. 22. S. foliis linearibus margine revolutis acutis imbricatis, ſpicis faſciculatis, bracteis carinatis. *C. B. S.*

coccinea 23. S. foliis inferioribus linearibus integerrimis, ſuperioribus lanceolato-ſubulatis ſubdentatis, ſpicis corymboſis. *C. B. S.*

rapunculoides 24. S. foliis linearibus dentatis glabris, ſpicis cylindricis faſciculatis faſtigiatis, bracteis glabris acuminatis. *Afric. auſtr.* (S. fulvo-maculata Link.)

faſciculata 25. S. foliis obovato-ſpathulatis argute dentatis ſeſſilibus glabris ſparſis, ſpicis corymboſis, bracteis glabris. *Afr. auſtr.* (S. ſerrata Berg. Poir.)

verbenacea Thb. 26. S. foliis oppoſitis oblongis ſerratis glabris decurrentibus, ſpicis faſciculatis, bracteis ſubulatis glabris. *Afr. auſtr.*

rotundifolia Thb. 27. S. foliis ſubrotundis integerrimis obtuſis glabris, ſpicis faſciculatis, bracteis ovatis acutis glabris. *Afr. auſtr.*

††† *Floribus paniculatis.*

corymboſa 28. S. foliis filiformibus glabris patentibus faſciculato-confertiſſimis, panicula ramoſa corymboſa. *Afr. auſtr.*

** *Herbaceae.*

puſilla Thb. 29. S. caule filiformi ſimplici erecto, foliis oppoſitis ovatis ſerratis piloſis, flore terminali ſubſolitario. *Afr. auſtr.*

divaricata Thb. 30. S. caule aſcendente ramoſo, ramis divaricatis pubeſcentibus, foliis lineari-filiformibus faſciculatis glabris, capitulis terminalibus. *C. B. S.*

† *anguſtifolia* Thb. 31. S. caule erecto ramoſo glabro, foliis linearibus ſubverticillatis, ſpicis terminalibus diſtichis, bracteis ovatis, floribus diandris. *C. B. S.* (Eranthemum anguſtifolium et Selago dubia L.)

ſpuria 32. S. caule erecto ſimplici, foliis linearibus acutis confertis ſubintegerrimis glabris, ſpicis gracilibus faſciculatis. *C. B. S.*

heterophylla Thb. 33. S. caule erecto ramoſo glabro, foliis radicalibus ovatis obtuſis ſerratis, caulinis linearibus dentatis, capitulis terminalibus. *C. B. S.*

cephalophora Thb. 34. S. caule decumbente foliisque oblongis obtuſis dentatis villoſis, capitulis globoſis terminalibus. *C. B. S.*

cordata Thb. 35. S. caule erecto ſimplici foliisque petiolatis cordato-ovatis ſerratis hirtis, capitulo terminali. *C. B. S.*

ANGIOSPERMIA.

2109. VERBENA.

* *Foliis indiviſis.*

polycnemoides Lag. 1. V. ſuffruticoſa ramoſiſſima, foliis connatis ſubulatis ſubpungentibus, floribus axillaribus geminis ſeſſilibus. *Buenos Ayres.*

valerianoides Humb. 2. V. caule erecto ramoſo glabro, foliis linearibus margine revolutis integerrimis, ſpicis terminalibus ternis denſe imbricatis, bracteis ciliatis. *Nov. Granat.*

*montevidenſis** 3. V. caule erecto ramoſo glabro, foliis lanceolatis acutis ſubintegerrimis laevibus, ſpicis ſubternis terminalibus abbreviatis. *Monte Video.* Sello.

anguſtifolia Mx. 4. V. caule erecto glabro, foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis ſubſerratis venoſo-lineatis ſcabris, ſpicis axillaribus terminalibusque gracilibus elongatis. *Amer. bor.* (V. rugoſa Mühlb. W.)

paniculata Lam. 5. V. caule elato ſcabro, foliis petiolatis lanceolatis acutis groſſe ſerratis ſubtus venoſo-reticulatis, ſpicis filiformibus corymboſo-paniculatis. *Virgin. Carolin.*

bonarienſis 6. V. caule elato ramoſo hiſpidulo, foliis lanceolatis ſerratis amplexicaulibus venoſo-rugoſis ſcabris, ſpicis longe pedunculatis faſciculatis hirſutis, floribus imbricatis. *Ad fl. Plata.*

litoralis Humb. 7. V. caule elato ramoſo glabro, foliis lanceolatis petiolatis argute inciſo-ſerratis ſtrigoſis, ſpicis longe pedunculatis ternis, floribus diſtinctis hiſpidiuſculis. *Peru.*

recta Humb. 8. V. caule erecto foliisque lanceolato-oblongis acutis crenato-ſerratis reticulato-venoſis hiſpidiuſculis, ſpicis virgato-paniculatis. *Nov. Hiſpan.*

caroliniana 9. V. caule erecto hirſuto, foliis lanceolato-oblongis baſi attenuatis ſeſſilibus inaequaliter ſerratis ſubtus hirſutiuſculis, ſpicis filiformibus corymboſis. *Carolina. Mexico.* (V. 2ſerrata Kunth.)

urticaefolia 10. V. caule erecto aſpero, foliis petiolatis ovato-oblongis ſerratis ſcabris, ſpicis filiformibus aggregatis, floribus diſtinctis. *Amer. bor. Mexico. Ind. occ.* (V. polyſtachya Kunth.)

diffuſa Desf. 11. V. caule ſuffruticoſo glabriuſculo, foliis ovato-lanceolatis ſerratis pubeſcentibus, ſpicis longiſſimis paniculatis, floribus remotis. *Amer. bor.*

liguſtrina Lag. 12. V. caule fruticoſo, foliis ovato-oblongis ſcabris margine revolutis integerrimis, ſpicis cylindricis terminalibus. *Paraguay.*

thymifolia Lag. 13. V. caule ſuffruticoſo, foliis ovatis ſcabris ciliatis margine revolutis, ſpicis capitatis terminalibus. *Paraguay.*

platenſis * 14. V. caule fruticoſo ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis venoſo-lineatis inciſo-ſerratis utrinque hiſpidis, ſpica ſolitaria terminali laxa, bracteis calyce elongato brevioribus. *Ad fl. Plata.* Sello.

chamaedryfolia Juſſ. 15. V. caule aſcendente villoſo, foliis oblongis acutis ſubpetiolatis inciſo-ſerratis ſubtus piloſiuſculis, ſpica ſubſolitaria faſtigiata. *Ad fl. Plata.* Feuillée. Sello. (Erinus peruvianus L.)

veronicaefolia Humb. 16. V. caule procumbente hiſpido, foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus crenato-ſerratis ſtrigoſis, ſpicis filiformibus ſubternis. *Mexico.*

caracaſana Humb. 17. V. caule erecto ramoſo glabro, foliis oblongo-lanceolatis acutis triplinerviis ſerratis ſcabris, ſpicis filiformibus paniculatis. *Caracas.* (V. lanceolata W. herb.)

glabrata Humb. 18. V. caule procumbente ramoſo glabro, foliis oblongo-lanceolatis argute inciſo-ſerratis venoſo-reticulatis glabriuſculis, ſpicis ternis terminalibus filiformibus. *Nov. Granat.*

corymboſa R. et P. 19. V. caule erecto herbaceo, foliis cordato-triangularibus rugoſis inciſo-ſerratis ſcabris, ſpicis corymboſis. *Chili.*

ſtricta Vent. 20. V. caule ſtricto hirſutiſſimo, foliis ſubſeſſilibus obovato-oblongis acutis duplicato-dentatis hirſutis, ſpicis faſciculatis elongatis ſtrictis. *Carolina.* (V. rigens Mx.)

laſioſtachys Link. 21. V. caule diffuſo hirto, foliis oblongis baſi attenuatis inaequaliter dentatis hirſutis, ſpica terminali denſa ſolitaria, bracteis hirtis. *California.*

** *Foliis trifidis.*

tridactylites Lag. 22. V. caule fruticuloſo, foliis minutis connatis 3fidis linearibus, ſpicis capitatis ſolitariis. *Inſ. Falkland.*

tridens Lag. 23. V. caule fruticuloſo, foliis 3fidis ſubulatis, ſpicis cylindricis, bracteis 3dentatis. *Paraguay.*

juniperina Lag. 24. V. caule ſuffruticoſo, foliis verticillatis 3partitis pungentibus, ſpicis capitatis, bracteis ſubindiviſis. *Chili.*

trifida Humb. 25. V. caule erecto foliisque 3fidis hiſpidis, laciniis lanceolatis acutis integerrimis, ſpicis glomerato-capitatis. *Mexico.*

clavata R. et P. 26. V. caule fruticoſo ramoſo villoſo, foliis ſubverticillatis linearibus margine revolutis integerrimis indiviſis 3fidisque, ſpicis umbellatis, antheris dorſo clavato-appendiculatis. *Peru.*

hiſpida R. et P. 27. V. caule herbaceo hiſpido, foliis oppoſitis ſubternis ſemiamplexicaulibus oblongis venoſis ſerratis aſperis indiviſis 3fidisque, ſpicis ſubternis cylindricis. *Peru.*

microphylla Humb. 28. V. caule ſuffruticoſo repente ramoſiſſimo hirſuto, foliis 3partitis obtuſis ſtrigoſis, laciniis ſubdentatis, faſciculis florum pedunculatis axillaribus. *Quito.*

inflata Kunth. 29. V. caule fruticoſo ramoſo, foliis ſeſſilibus 3partitis albido-tomentoſis, laciniis linearibus ſub-3fidis, ſpicis axillaribus folioſis. *Quito.* (V. heterophylla W. herb.)

hirta * 30. V. caule herbaceo erecto villoſo-lanato, foliis ſubſeſſilibus ovatis 3fido-dentatis utrinque piloſis, ſpicis aggregatis longe pedunculatis faſtigiatis proliferis. *Monte Video.* Sello.

bracteoſa Mx. 31. V. caule proſtrato ramoſo hirto, foliis ſub-3partitis hirſutis, laciniis cuneatis inciſo-dentatis, ſpicis ſolitariis elongatis, floribus diſtinctis, bracteis elongatis patenti-reflexis. *Amer. bor.* (Zapania Poir.)

Aubletia Jacq. 32. V. caule aſcendente ſcabro, foliis 3fidis ovatis inciſo-ſerratis glabriuſculis, ſpicis ſolitariis laxis, bracteis calyces aequantibus patulis. *Carolina. Georgia.*

haſtata 33. V. caule erecto glabriuſculo, foliis lanceolatis acuminatis inaequaliter argute ſerrulatis ſcabris, inferioribus ſubhaſtato-3fidis, ſpicis aggregatis filiformibus. *Amer. bor.*

*** *Foliis laciniatis, multifidis.*

ſcabra Vahl. 34. V. caule erecto foliisque hiſpidis, inferioribus lanceolatis inciſo-ſerratis, ſuperioribus 3partito-pinnatifidis ſerratisque, laciniis acutis, ſpica terminali filiformi laxa, floribus remotis, bracteis linearibus elongatis. *Mexico.*

officinalis 35. V. caule erecto hiſpidiuſculo, foliis 3fido-laciniatis dentatis ſcabris, ſpicis filiformibus ſubracemoſis, floribus remotiuſculis. *In temperatis zonis orbis terrarum et in nov. Holl.*

ſpuria 36. V. caule aſcendente ramoſo glabro, foliis 3partito-laciniatis obtuſiuſculis ſcabris, ſpicis ſolitariis filiformibus hiſpidiuſculis, floribus remotis. *Amer. bor.*

erinoides W. 37. V. caule aſcendente ramoſo hirto, foliis 3partito-laciniatis hirſutis, laciniis lineari-lanceolatis ſubdentatis, ſpicis axillaribus ſolitariis laxis, bracteis calycem aequantibus patulis. *Peru.* (V. multifida R. et P. Erinus laciniatus L.)

cuneiformis R. et P. 38. V. caule erecto hiſpido, foliis cuneatis 3fido-laciniatis hirſutiuſculis, laciniis lanceolatis ſerratis, ſpicis ternis terminalibus oblongis. *Peru.*

Lamberti Ker. 39. V. caule procumbente radicante hirſuto, foliis oblongis baſi laciniatis apice inciſo-ſerratis, ſpicis laxis ſolitariis, bracteis calyce brevioribus patentibus. *Carolina. Ora occ. Amer. bor.?* (V. proſtrata R. Br.)

caneſcens Humb. 40. V. caule procumbente diffuſo incano, foliis oblongo-lanceolatis inciſo-ſubpinnatifidis incano-hirſutis, ſpicis ſolitariis axillaribus terminalibusque, floribus diſtinctis. *Mexico.*

elegans Humb. 41. V. caule repente hiſpido, foliis laciniato-pinnatifidis, laciniis lineari-oblongis obtuſiuſculis, ſpicis axillaribus ſolitariis laxis. *Mexico.* (V. moranenſis W. herb.)

tenera * 42. V. caule aſcendente ſuperne hirſutiuſculo, foliis 3partito-laciniatis glabris, laciniis linearibus acutis integerrimis, ſpica laxa ſolitaria terminali. *Monte Video.* Sello.

Selloi * 43. V. caule repente radicante hiſpido, foliis 3partito-laciniatis ciliatis, laciniis linearibus, faſciculis florum pedunculatis hirſutis. *Monte Video.* Sello.

diſſecta W. herb. 44. V. caule erecto herbaceo foliisque 3partito-pinnatifidis hirſutis, laciniis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis, corymbo terminali coarctato ſubcapitato, calycibus elongatis. *Chili.* Née.

ſupina 45. V. caule erecto foliis 3partito-2pinnatifidis hirſutis, laciniis obtuſiuſculis dentatis, ſpicis filiformibus ſolitariis, floribus remotis. *Europ. auſtr. Aſia minor. Aegypt.*

2110. AEOLLANTHUS Mart.

ſuaveolens Mart. *Braſil.* Herba annua glabra, foliis ſpathulatis integerrimis, floribus ſpicatis albis.

2111. LIPPIA.

* *Floribus capitatis.*

† *Capitulis pedunculatis axillaribus ſolitariis.*

α. Fruticoſae.

americana 1. L. capitulis 4gonis, bracteis reflexis, foliis petiolatis oblongis apice ſerratis ſcabris. *Nov. Hiſpan.*

hemiſphaerica 2. L. capitulis hemiſphaerico-conicis, foliis oblongis acuminatis integerrimis. *Amer. auſtr.*

purpurea Jacq. 3. L. capitulis hemiſphaericis longe pedunculatis ſubgeminis, foliis ovato-oblongis ſerratis hirſutiuſculis. *Patria?*

capenſis * 4. L. capitulis oblongis breviter pedunculatis hirſutis, foliis petiolatis ovato-oblongis crenatis ſupra ſcabris ſubtus tomentoſis. *C. B. S.* (Verbena Thunb.)

ferruginea Humb. 5. L. capitulis paucifloris breviter pedunculatis, foliis ovato-oblongis crenatis ſupra ſcabris ſubtus ramisque ferrugineo-pulverulentis. *Peru.*

ſtoechadifolia Kunth. 6. L. capitulis oblongis multifloris longe pedunculatis, foliis lanceolatis ſerrulatis plicatis ſupra aſperis ſubtus ramisque ſtrigoſo-caneſcentibus. *Ind. occ.* (Verbena L. Zapania Juſſ. Perſ.)

montevidenſis * 7. L. capitulis ſubrotundis longe pedunculatis, bracteis oblongis patentibus, foliis ovatis crenulatis plicato-rugoſis utrinque aſpero-hiſpidiuſculis. *Monte Video.* Sello.

linearis Humb. 8. L. capitulis ovatis folio brevioribus, foliis linearibus integerrimis glauceſcentibus appreſſo-ſtrigoſis. *Nov. Granat.*

caneſcens Humb. 9. L. capitulis oblongo-cylindricis folio longioribus, bracteis obovatis acutis, foliis obovatis apice argute ſerrulatis ſubeveniis utrinque ſericeo-ſtrigilloſis caneſcentibus, caule ſuffruticoſo proſtrato. *Peru.* (Verbena elliptica W. herb.)

reptans Humb. 10. L. capitulis oblongis folia ſuperantibus, foliis obovato-oblongis ſerrulatis venoſis utrinque ramisque caneſcentibus, caule ſuffruticoſo radicante. *Ind. occ.* (Zapania ſuberoſa *. Verbena globiflora Nocc.)

aſperifolia Rich. 11. L. capitulis oblongo-cylindricis, bracteis acutis, foliis ovato-lanceolatis crenatis ſupra ſcaberrimis ſubtus ſtrigilloſis, caule ſuffruticoſo. *Amer. auſtr.* (Verbena globulifera Herit. Zapania ſcaberrima et odorata Perſ., lantanoides Lam.)

β. Herbaceae.

nodiflora Rich. 12. L. capitulis ovato-conicis folio longioribus, bracteis acutis, foliis ſpathulatis apice dentatis utrinque ſcabris caneſcentibus, caule radicante. *Amer. bor. Ind. or. et occ. Inſ. maris pacifici et*

Nov. Holl. (Verbena L., Zapania Lam. Perf. R. Br., Verbena cuneata W. herb.)

repens * 13. L. capitulis ovato-conicis folio longioribus, bracteis obtufis, foliis obovato-oblongis apice argute dentatis utrinque ramisque glabris, caule radicante. *Italiae paludes maritimae.* (Verbena repens Sav. Tenor., V. nodiflora C. Bauh. Petagn., Zapania repens Bertolon.)

farmentofa * 14. L. capitulis cylindricis elongatis breviffime pedunculatis, foliis fpathulatis obtufis apice crenato-dentatis incanis, caule proftrato radicante. *Ind. or.* (Verbena farmentofa W. confufa tamen cum nodiflora.)

lanceolata Rich. 15. L. capitulis conicis folio longioribus, foliis lineari-lanceolatis argute ferratis. *Carolin. Georgia.* (Zapania Pursh.)

queretarenfis Kunth. 16. L. capitulis oblongo-cylindricis folia excedentibus, bracteis acutis, foliis oblongis acutis-ferratis venofis utrinque ftrigillofis, caule procumbente. *Nov. Hifpan. Carolina?* (Verbena fcabra Mühlenb. in W. herb.)

betulaefolia Kunth. 17. L. capitulis oblongo-cylindricis folio brevioribus, bracteis fubulatis flores fuperantibus, foliis ovato-deltoideis acutis argute ferratis ftrigofis, caule bafi radicante. *Ad Orinocum.*

†† *Capitulis fubverticillatis pedunculatis.*

javanica * 18. L. pedunculis inferioribus oppofitis fuperioribus verticillatis folia fuperantibus, capitulis cylindricis, bracteis acutis, foliis oblongis fubcrenulatis, caule erecto. *Java.* (Verbena N. L. Burm., Zapania Poir.)

origanoides Humb. 19. L. capitulis fubverticillatis ovatis folio multo brevioribus, bracteis acutis, foliis petiolatis ovatis obtufis crenulatis fupra rugofis afperis fubtus incano hirfutis, caule erecto fruticofo. *Cumana. Brafil.*

graveolens Humb. 20. L. capitulis verticillatis fubglobofis folio brevioribus, bracteis acutis, foliis ovato-oblongis acutis reticulato-venofis crenatis fupra pubefcentibus fubtus incano-villofis, caule erecto fruticofo. *Nov. Hifpan. Ad fl. Magdalen.* Bertero.

Berterii * 21. L. capitulis verticillatis numerofis cylindricis folio brevioribus, bracteis incano-tomentofis acutis patulis, foliis ovatis crenatis fubtus villofis, caule erecto fruticofo. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

††† *Capitulis paniculatis.*

hirfuta Mut. 22. L. capitulis hemifphaericis, bracteis obtufis, paniculis fimplicibus folia fubaequantibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis fupra rugofis fubtus incano-tomentofis, caule fruticofo. *Nov. Granat.*

23.

floribunda Kunth. 23. L. capitulis subglobosis longe pedunculatis, bracteis acutis, paniculis axillaribus, foliis oblongo-lanceolatis acutis serratis supra glabris subtus pilosiusculis. *Nov. Granat.*

umbellata Cav. 24. L. capitulis ovatis, bracteis late ovatis acutis patulis, pedunculis terminalibus paniculato-umbellatis, foliis oblongis utrinque attenuatis serratis rugosis subtus tomentosis. *Mexico.* (L. callicarpaefolia Kunth.)

** *Floribus spicatis.*

scorodonioides Bonpl. 25. L. floribus subverticillato-spicatis, spicis axillaribus solitariis oppositis pedunculatis, bracteis linearibus, foliis obovatis obtusis crenatis supra scabris subtus incano-tomentosis, caule suffruticoso. *Quito.*

citriodora Kunth. 26. L. floribus subternis remotis, spicis axillaribus terminalibusque subpaniculatis, bracteis abbreviatis, foliis ternis lanceolatis acutis integerrimis laevibus margine scabris. *Peru. Chili. Paraguay.* (Verbena 3phylla Herit. Aloysia citriodora Orteg. Zapania Lam.)

*** *Floribus cymoso-paniculatis.*

cymosa Sw. 27. L. panicula terminali cymosa, pedicellis 3partitis, foliis ovatis integerrimis glabriusculis, infimis subternis. *Jamaica.*

2112. PRIVA Adans.

lappulacea Pers. 1. Pr. calycibus fructiferis uncinato-hispidis, foliis petiolatis subcordato-ovatis appresso-pilosiusculis. *Ind. occid. Amer. austr.* (Verbena L. Zapania Lam. Blairia Houst. Priva echinata Juss.)

mexicana Pers. 2. Pr. calycibus fructiferis didymo-globosis densissime echinato-hispidis, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis hirsutis. *Mexico.* (Verbena L. Zapania Lam. Blairia Gärtn. Priva hispida Juss.)

aspera Kunth. 3. Pr. calycibus globosis hispidis, caule elato frutescente, foliis petiolatis ovatis acutis supra scaberrimis subtus hirtis. *Nov. Hispan.*

dentata Pers. 4. Pr. calycibus villosis, fructiferis rostratis reflexis, caule herbaceo glabro, foliis petiolatis ovatis acutis obtuse serratis substrigosis. *Arabia.* (Phryma Forsk. Verbena Forskolei Vahl. Zapania arabica Poir.)

virgata * 5. Pr. calycibus villosis rostratis, floribus subverticillato-spicatis, spicis gracilibus subpaniculatis, caule fruticoso elato, foliis petiolatis ovatis crenatis supra scabris subtus rugoso-venosis pubescentibus. *Peru.* (Verbena R. et P. Zapania Poir.)

laevis Juss. 6. Pr. calycibus ventricosis glabris, dentibus subulatis, floribus spicatis, caule herbaceo, foliis ovato-oblongis dentatis basi attenuatis glabris. *Chili. Buenos Ayres.* (Castelia cuneato-ovata Cav.)

2113. HEBENSTREITIA.

scabra Thunb. 1. H. foliis linearibus obtusis integerrimis ciliatis, spicis terminalibus, bracteis ovatis acutis glabris integerrimis. *C. B. S.*

dentata 2. H. foliis linearibus integerrimis subdentatisque glabris, caule suffruticoso superne pubescente, spicis terminalibus laxis, bracteis integerrimis glabris. *C. B. S.* (H. integrifolia L. var.)

ciliata 3. H. foliis linearibus dentatis hirsutiusculis, caule suffruticoso hirsutiusculo, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis ciliatis. *C. B. S.* (H. alba Jacq. albiflora Link.)

capitata Thb. 4. H. foliis linearibus apice dentatis glabris, caule herbaceo pubescente, spicis ovatis, bracteis ciliatis squarrosis glabris. *C. B. S.*

fruticosa Thb. 5. H. foliis lanceolatis dentato-serratis glabriusculis, caule suffruticoso, spicis ovatis, bracteis imbricatis glabris. *C. B. S.*

erinoides Thb. 6. H foliis oblongo-lanceolatis serratis cauleque suffruticoso villosis, spicis terminalibus, bracteis ciliatis. *C. B. S.* (H. chamaedryfolia Link.)

cordata 7. H. foliis cordatis subcarnosis subintegerrimis glabris, caule suffruticoso incano, spicis ovatis, bracteis glabris. *C. B. S.*

2114. TAMONEA Aubl.

verbenacea Sw. 1. T. fructibus 4spinosis, spicis axillaribus, foliis ovatis inciso-serratis pubescentibus. *Ins. Carib.* (Verbena curassavica L. Kämpfera Houst. Ghinia Sw. fl. ind. occ. Tamon. curassavica Pers.)

mutica Pers. 2. T. fructibus muticis, racemis axillaribus, foliis ovatis dentatis villoso-tomentosis. *Guiana.* (Ghinia Sw.)

2115. CONGEA Roxb.

tomentosa Roxb. *Ind. or.* Frutex foliis subcordato-ovatis villosiusculis, paniculis axillaribus.

2116. STREPTIUM Roxb.

asperum Roxb. *Ind. or.* Herba foliis subcordatis pilosis, spicis filiformibus, calycibus inflatis hispidis. (Tortula aspera W. Priva leptostachya Pers.)

2117. HOLMSKIOLDIA Retz.

ſanguinea Retz. *Bengal.* Frutex cortice cinereo, foliis cordato-ovatis acuminatis ſerratis pubeſcentibus, pedunculis ſubtrifloris corymboſis, calycibus purpureis, corolla coccinea. (Haſtingia coccinea Sm. Platunium rubrum Juſſ.)

2118. PREMNA.

* *Foliis integerrimis*

† *glabris.*

integrifolia 1. Pr. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis glabris, panicula corymboſa terminali. *Ind. or. Cayenn.?* (Citharexylon paniculatum Poir.?)

obtuſifolia R. Br. 2. Pr. foliis cordatis obovato-oblongis obtuſiſſimis integerrimis glaberrimis, panicula terminali. *Nov. Holl.*

attenuata R. Br. 3. Pr. foliis obovato-oblongis obtuſis baſi attenuatis integerrimis glaberrimis, panicula terminali. *Nov. Holl.*

media R. Br. 4. Pr. foliis late ovatis acutis integerrimis ſubtus coſtatis ramulisque glabriusculis. *Nov. Holl.*

† *parvifolia* Roth. 5. Pr. foliis ovato-ſubrotundis ſubintegerrimis glabris, ſpinis axillaribus oppoſitis horizontalibus, racemis terminalibus ſtrictis. *Ind. or.*

†† *pubeſcentibus.*

tomentoſa W. 6. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ſupra villoſiusculis ſubtus ramulisque fulvo-tomentoſis, paniculae terminalis ramis flexuoſis filiformibus. *Ind. or. Nov. Holl.* (Pr. acuminata R. Br., flaveſcens Juſſ.)

molliſſima Roth. 7. Pr. foliis ſubcordato-ovatis obtuſis integerrimis molliſſime villoſis, ramis ferrugineo-tomentoſis, panicula dichotoma. *Ind. or.*

arborea Roth. 8. Pr. foliis cordato-ſubrotundis acutis integerrimis 3nerviis venoſis ſubtus cinereo-tomentoſis, racemis terminalibus ſimpliciſſimis. *Ind. or.*

cordata R. Br. 9. Pr. foliis reniformi-cordatis acuminatis integerrimis utrinque tomentoſis, panicula terminali. *Nov. Holl.*

reticulata Juſſ. 10. Pr. foliis ovato-oblongis acuminatis ſubintegerrimis ſubtus venoſo-reticulatis ſubtomentoſis, paniculae ramis decuſſatis, calycibus 4dentatis incanis. *Jamaica.* (Citharexylon Melanocardium Sw.)

ovata R. Br. 11. Pr. foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis ſubtus ramulisque tenuiſſime tomentoſis, panicula ſupradecompoſita. *Nov. Holl.*

ſalvifolia * 12. Pr. foliis lanceolatis integerrimis rugoſis pube ſtellata furfuraceis, pedunculis axillaribus multifloris. *Nov. Holl.* (Pityrodia R. Br.)

*** Foliis ſerratis.*

ſerratifolia 13. Pr. foliis oblongis utrinque attenuatis acute ſubcartilagineo-ſerratis glaberrimis, cyma terminali. *Ind. or.*

2119. CHLOANTHES R. Br.

Stoechadis R. Br. 1. Chl. foliis linearibus ſubtus calycibusque niveo-tomentoſis, pedunculis axillaribus 1floris medio bracteatis. *Nov. Holl.*

glanduloſa R. Br. 2. Chl. foliis linearibus ſubtus glanduloſis, pedunculis axillaribus 1floris baſi bracteatis, calycibus ſubpubeſcentibus. *Nov. Holl.*

lavandulifolia Sieb. 3. Chl. foliis linearibus crenulatis ſupra rugoſiſſimis hiſpidis ſubtus calycibusque ſeſſilibus lanatis. *Nov. Holl.*

2120. VITEX.

** Foliis ſimplicibus.*

ovata Thb. 1. V. foliis ovalibus obtuſis ſubtus tomentoſis, panicula terminali trichotoma, caule decumbente repente. *Japon. China. Nov. Holl.* (V. rotundifolia L. ſuppl. falſa phraſi.)

† *macrophylla* R. Br. 2. V. foliis ovato-oblongis integerrimis glabris coſtatis baſi 2glanduloſis, caule arboreo. *Nov. Holl.*

*** Foliis ternatis.*

triflora Vahl. 3. V. foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, ramulis petiolisque ferrugineo-tomentoſis, pedunculis axillaribus terminalibusque ternatis 1floris. *Cayenn.*

divaricata Sw. 4. V. foliolis oblongis acuminatis utrinque glabris ſubtus pallidis, intermedio maximo, paniculae dichotomae ramis divaricatis. *Inſ. Carib.*

Balbiſii * 5. V. foliolis obovato-ellipticis obtuſis utrinque glaberrimis ſubcoriaceis ſubtus discoloribus, racemis axillaribus ſubcompoſitis. *Hiſpaniola.* Bertero.

latifolia Lam. 6. V. foliolis oblongo-ellipticis utrinque attenuatis glabriusculis ſubtus venoſis concoloribus, panicula terminali tomentoſa. *Ind. or.*

pubeſcens Vahl. 7. V. foliolis ovatis acutis ſubtus pubeſcentibus, panicula trichotoma, bracteis caneſcentibus calyces aequantibus. *Ceylon.*

altiſſima 8. V. foliolis ovato-oblongis acutis ſubtus pubeſcentibus, ſpicis verticillato-paniculatis, fructibus 3ſpermis. *Ceylon.*

alata Roth. 9. V. foliolis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus cinereo-tomentoſis, ramis articulatis ſubalatis, paniculae ramis brachiatis, floribus conferto-corymboſis. *Ind. or.*

mollis Humb. 10. V. foliolis oblongis obtuſis integerrimis ſupra nitidis ſubtus incano-pubeſcentibus, corymbis axillaribus dichotomis. *Mexico.*

*** *Foliis ternato-quinatis.*

gigantea Humb. 11. V. foliolis oblongis acutis integerrimis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 3-6floris. *Quito.*

bicolor W. 12. V. foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis ſubtus albo-tomentoſis, panicula terminali ſupradecompoſita, ramis ſubcorymboſis. *Ind. or.*

glabrata R. Br. 13. V. foliolis ovatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis, calycibus edentulis. *Nov. Holl.*

rufeſcens Juff. 14. V. foliolis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſubtus ramulisque ferrugineo-tomentoſis, pedunculis lateralibus paucifloris. *Braſil.*

parviflora Juff. 15. V. foliolis ovato-lanceolatis integerrimis ſubpubeſcentibus, paniculis axillaribus. *Inſ. Philippin.*

trifolia 16. V. foliolis ellipticis acutis ſubtus albo-tomentoſis, floralibus ſimplicibus, paniculis lateralibus terminalibusque dichotomis. *Ind. or.*

acuminata R. Br. 17. V. foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, paniculis ſtrictis dichotomis. *Nov. Holl.*

Negundo 18. V. foliolis oblongo-lanceolatis ſubſerratis ſubtus lanatis, paniculis terminalibus. *Ind. or.* (V. paniculata Lam.)

**** *Foliis quinatis.*

umbroſa Sw. 19. V. foliolis petiolatis elliptico-oblongis acutis utrinque glabris, paniculis axillaribus trichotomis folia aequantibus. *Ind. occ.*

capitata Vahl. 20. V. foliolis petiolatis lanceolatis acuminatis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus multifloris, floribus faſciculato-capitatis. *Inſ. Carib.*

Agnus 21. V. foliolis petiolatis lanceolatis ſubintegerrimis ſubtus ramisque incanis, verticillis ſpicato-paniculatis. *Europ. auſtr.*

inciſa Lam. 22. V. foliolis petiolatis lanceolatis inciſo-pinnatifidis ſubtus incanis, cymis oppoſitis abbreviatis. *China.*

cymoſa Berter. 23. V. foliolis ſubpedatis oblongis acutis integerrimis ſubtus ramisque tomentoſis, pedunculis lateralibus cymoſis. *Ad fl. Magdalen.*

flavens Kunth. 24. V. foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus ramisque flavo-villoſiusculis, pedunculis axillaribus dichotomis. *Peru.*

bignonioides Kunth. 25. V. foliolis oblongis acuminatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus capitato-corymboſis. *Caracas.*

orinocenſis Kunth. 26. V. foliolis obovato-oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, infimis ſubſeſſilibus, pedunculis axillaribus corymboſis. *Ad Orinocum.*

ſpicata Lour. 27. V. foliolis lanceolatis ſubcrenatis ſubtus tomentoſis, ſpicis terminalibus. *China. Cochinchina.*

[V. pinnata L. eſt Opilia odorata * tom. 1. p. 766.]

2121. CLERODENDRON.

* *Calyce 5dentato, demum immutato.*

liguſtrinum R. Br. 1. Cl. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, ramis incanis, pedunculis axillaribus 3fido-corymboſis, tubo corollae abbreviato. *Inſ. Mascaren.* (Volkamera Jacq.)

inerme R. Br. 2. Cl. foliis oblongis integerrimis glabris nitidis, pedunculis axillaribus 3fidis corymboſis, tubo corollae elongato. *China. Ind. or. Nov. Holland.* (Volkamera L.)

anguſtifolium * 3. Cl. foliis anguſte lanceolatis integerrimis opacis glabris, racemis axillaribus trichotomis, corolla infundibuliformi. *Jamaica.* (Volkamera Lam.)

Commerſonii * 4. Cl. foliis ovatis utrinque attenuatis integerrimis glabris, corymbis axillaribus trichotomis pubeſcentibus, tubo corollae elongato. *Inſ. Philippin.* (Volkamera Poir.)

coromandelinum * 5. Cl. foliis ovatis acutis integerrimis glaberrimis, panicula terminali corymboſa. *Ora Coromandel.* (Cl. ovatum Poir.)

volubile P. B. 6. Cl. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, caule volubili, paniculae corymboſae pedicellis 3floris. *Guinea.*

buxifolium * 7. Cl. foliis obovatis retuſis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus ſub-1floris. *Patria?* (Volkamera W.)

heterophyllum R. Br. 8. Cl. foliis ovato-oblongis lanceolatis ſublinearibusque integerrimis glaberrimis, pedunculis axillaribus corymboſis, tubo corollae abbreviato. *Inſ. Mascaren.* (Volkamera heterophylla Poir., anguſtifolia Andr.)

ſerratum * 9. Cl. foliis ſubſeſſilibus late lanceolatis ſerratis glabris, paniculae ramis brachiatis. *Ind. or.* (Volkamera L.)

** *Calyce 5fido, 5partito, demum ſubinde aucto.*

† *Foliis integerrimis*

α. glabris.

Siphonanthus R. Br. 10. Cl. foliis verticillatis elongato-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus corymboſis, tubo corollae longiſſimo. *Java. Ind. or.* (Siphonanthus indica et Ovieda mitis L., Siphon. anguſtifolia W.)

longicolla Meyer. 11. Cl. foliis oblongis breviſſime acuminatis glabris, pedunculis 3fidis, tubo corollae longiſſimo. *Surinam.*

ovatum R. Br. 12. Cl. foliis ovatis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, tubo corollae elongato. *Ora Coromandel. Nov. Holl.* (Ovieda ovalifolia Juſſ.)

ſcandens P. B. 13. Cl. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis lucidis ſubcoriaceis, corymbis terminalibus compoſitis. *Guinea.* (Cl. umbellatum Poir.)

trichotomum Thunb. 14. Cl. foliis late ovatis glabris, inferioribus 3lobis, panicula fupradecompofita glabra, tubo corollae elongato. *Japon.*

fortunatum 15. Cl. foliis lanceolatis glabriusculis venofis, pedunculis axillaribus paucifloris folio brevioribus, tubo corollae calycem aequante. *China.*

ternifolium Kunth. 16. Cl. foliis ternis oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis pubefcentibus, tubo corollae calycem fuperante. *Ad Orinocum.*

attenuatum R. Br. 17. Cl. foliis oblongis utrinque attenuatis fubundulatis glabris, corymbis axillaribus, calycibus pubefcentibus. *Nov. Holl.*

floribundum R. Br. 18. Cl. foliis elliptico-lanceolatis glabris, corymbis axillaribus, calycibus laevibus. *Nov. Holl.*

javanicum * 19. Cl. foliis ovato-oblongis acutis coriaceis glaberrimis, panicula terminali thyrfoidea. *Java.* (Cl. coriaceum Poir.)

β. *Foliis fubintegerrimis pubefcentibus.*

fquamatum Vahl. 20. Cl. foliis cordatis fubintegerrimis fupra villofis fubtus fquamofis, paniculae ramofiffimae ramis glabris coloratis, tubo corollae calycem duplo fuperante, genitalibus longiffimis. *China. Japon.* (Volkamera Kämpferi Jacq.)

tomentofum R. Br. 21. Cl. foliis oblongis acutis tomentofis, corymbis congeftis, calycibus demum incraffatis. *Nov. Holl.* (Volkamera Vent.)

infortunatum 22. Cl. foliis fubcordato-ovatis acutis tomentofis, pedunculis terminalibus corymbofis, tubo corollae elongato. *Ceylon.*

molle Bonpl. 23. Cl. foliis ternis oblongis obtufiusculis fubtus villofis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis pubefcentibus. *Quito.*

medium R. Br. 24. Cl. foliis ellipticis acutis fubtus tomentofis, corymbis axillaribus terminalibusque laxiusculis, calycibus glabris. *Nov. Holl.*

coriaceum R. Br. 25. Cl. foliis fubcordato-ovatis acutis fubtus reticulato-venofis petiolisque tomentofis, pedunculis axillaribus terminalibusque trichotomis. *Nov. Holl.*

coftatum R. Br. 26. Cl. foliis ovatis obtufiusculis rugofis fubtus tomentofis coftatis, corymbis axillaribus terminalibusque trichotomis. *Nov. Holl.*

pumilum * 27. Cl. foliis lanceolatis fubintegerrimis tomentofis, pedunculis axillaribus paucifloris, tubo corollae elongato. *China.* (Volkamera Lour.)

†† *Foliis dentatis, divifis.*

calamitofum 28. Cl. foliis ovalibus bafi attenuatis inaequaliter dentatis utrinque glabris, pedunculis axillaribus paucifloris laxis folia fuperantibus, tubo corollae calycem triplo fuperante. *Java.* (Volkamera alternifolia N. L. Burm.)

ſpinoſum * 29. Cl. foliis oblongis ſubſeſſilibus coriaceis ſpinoſo-dentatis ſubtus reticulato-venoſis, ramis aſperis, pedunculis corymboſis abbreviatis, tubo corollae longiſſimo. *Hiſpaniola.* (Ovieda ſpinoſa L.)

phlomoides L. ſuppl. 30. Cl. foliis ovatis angulato-dentatis incanis, pedunculis axillaribus ſubtrifloris tomentoſis, tubo corollae calycem triplo ſuperante. *Ind. orient.* (Volkamera multiflora N. L. Burm.)

fragrans Vent. W. 31. Cl. foliis latis ſubcordato-ovatis repando-dentatis baſi 2glandulofis ſubtus tomentoſis, corymbis terminalibus denſis hemiſphaericis, tubo corollae calycem duplo excedente. *Japon.* (Volkamera japonica Thunb. Volkmannia japonica Jacq.)

viſcoſum Vent. 32. Cl. foliis cordatis acutis repando-dentatis ſubtomentoſis, corymbis terminalibus paniculatis, calycibus viſcoſis, laciniis corollae aſcendentibus. *Ind. or.*

diverſifolium Vahl. 33. Cl. foliis ovatis angulato-trilobis glaberrimis trinerviis, paniculae dichotomae ramis villoſis racemoſis. *Ind. or.*

paniculatum 34. Cl. foliis cordatis 5lobis ſubdenticulatis glabris, paniculae ramoſiſſimae ramis corymboſis, tubo corollae elongato. *Java. Cochinchina.* (Cl. pyramidale Andr., Volkamera angulata Lour.)

2122. WALLROTHIA Roth.

articulata Roth. 1. W. foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus ſubtomentoſis, ramis articulatis ſubalatis, thyrſo terminali, bacca 4ſperma. *Ind. or.*

Leucoxylon Roth. 2. W. foliis quinatis, foliolis oblongis integerrimis utrinque glabris, panicula axillari dichotoma, bacca 1ſperma. *Ind. or.* (Vitex L.)

2123. PYROSTOMA Meyer.

ternatum Meyer. *Surinam.* Frutex ramis ferrugineo-villoſis, foliis ternatis oblongis glaberrimis, floribus corymboſis coccineis ſericeis.

2124. VOLKAMERA.

aculeata 1. V. foliis oblongis acutis integerrimis, aculeis ſtipularibus, corymbis axillaribus trichotomis. *Ind. occ.*

ſcandens 2. V. foliis cordato-ovatis obtuſis integerrimis glaberrimis, panicula corymboſa terminali, calycibus obtuſis tomentoſis. *Ceylon.*

† *capitata* W. 3. V. foliis ovato-oblongis integerrimis ſcabris, floribus capitatis, calycibus foliaceis trifidis. *Guinea.*

2125. PETREA.

volubilis 1. P. caule fruticoſo volubili, foliis elliptico-oblongis coriaceis utrinque ſcabris ſubtus venoſo-reticulatis, racemis laxis elongatis, laciniis calycis ext. ſpathulatis obtuſis reticulatis. *Ind. occid.*

arborea Humb. 2. P. caule arboreo, foliis ſubcordato-obovatis utrinque ſcabris, racemis laxis pendulis, laciniis calycis ext. ſpathulato-linearibus reticulatis. *Nov. Granat.*

rugoſa Humb. 3. P. caule arboreo (?), foliis ſubcordato-ellipticis rugoſis ſcabris ſubtus hirtis, racemis erectis laxis, laciniis calycis ext. obovato-oblongis reticulatis. *Caracas.*

oblonga * 4. P. caule volubili, foliis elliptico-oblongis utrinque glabris integerrimis, petiolis ſub-2glanduloſis, racemis abbreviatis, laciniis calycis ext. lineari-oblongis venoſis. *Braſil.* Sello.

dentata * 5. P. caule fruticoſo erecto, foliis lanceolatis utrinque glabris apice dilatatis ſubdentatis, racemis compoſitis corymboſis erectis, laciniis calycis ext. ſpathulato-linearibus elongatis reticulatis. *Braſil.* Sello.

2126. LANTANA.

(Flores capitato-ſpicati.)

* *Aculeatae.*

aculeata 1. L. foliis ſubcordatis ovatis acutis ſerratis ſupra ſcabris ſubtus villoſis, capitulis hemiſphaericis longe pedunculatis, bracteis oblongis acutis abbreviatis. *Jamaica. Mexico.* (L. horrida Kunth.)

purpurea Horn. 2. L. foliis ſubcordatis ovatis acutis ſerratis ſupra ſcaberrimis ſubtus piloſis, capitulis hemiſphaericis folia aequantibus, bracteis ovato-oblongis abbreviatis. *Amer. auſtr.*

ſcabrida Ait. 3. L. foliis ovato-oblongis acutis ſerratis ſupra calloſo-ſtrigoſis ſubtus villoſiuſculis, capitulis hemiſphaericis folia ſuperantibus, bracteis lanceolatis tubo brevioribus. *Ind. occ.*

mixta 4. L. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis ſcabris, capitulis hemiſphaericis folio ſubbrevioribus, bracteis lanceolatis flores ſubſuperantibus, caule ſetoſo-aculeato. *Ind. occ.*

meliſſaefolia Ait. 5. L. foliis ovatis baſi attenuatis crenatis utrinque villoſis, capitulis hemiſphaericis folia aequantibus, bracteis abbreviatis. *Braſil.*

nivea Vent. 6. L. foliis oblongis acuminatis crenulatis baſi attenuatis ſcabris, capitulis hemiſphaericis folia ſubaequantibus, bracteis linearibus abbreviatis. *Ind. or.*

** *Inermes.*

† *Pedunculis folia excedentibus vel aequantibus.*

viburnoides Vahl. 7. L. foliis ovato-lanceolatis ſerratis rugoſis ſcaberrimis ſubtus villoſis, capitulis oblongis, bracteis lanceolatis tubo corollae brevioribus. *Arabia.* (Charachera Forsk.)

ſtricta Sw. 8. L. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis ſupra rugoſis hiſpidiuſculis ſubtus albo-villoſis, capitulis ſubrotundis, bracteis ſquarroſis. *Jamaica.* (L. ſuaveolens Poir.)

Radula Sw. 9. L. foliis rhombeo-ovatis acuminatis ſerratis ſupra rugoſis aſperis ſubtus hirſutis, caule hiſpido aſperrimo, capitulis oblongis ſquarroſis, bracteis ovatis acuminatis. *Inſ. Carib. Mexico.* (L. hiſpida Kunth.)

ſalviaefolia Jacq. 10. L. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis crenato-ſerratis ſupra ſcabris ſubtus incano-villoſiuſculis, capitulis conicis, bracteis ovatis acutis nervoſis ſquarroſis. *C. B. S. Hiſpaniola. Cuba.* (L. piloſa Kunth.)

recta Ait. 11. L. foliis ſubellipticis rugoſis crenulatis incanis ſubtus pubeſcentibus, capitulis hemiſphaericis, bracteis oblongis elongatis. *Jamaica.* (L. parvifolia Salisb.)

rugoloſa Kunth. 12. L. foliis ovatis acuminatis crenatis ſupra bullatis ſcabris ſubtus incano-tomentoſis, capitulis hemiſphaericis, bracteis acuminatis abbreviatis. *Quito.*

ſcabioſaeflora Kunth. 13. L. foliis ovatis acutis ſerratis ſupra rugoſis aſperis ſubtus incano-villoſis, capitulis hemiſphaericis, bracteis lanceolatis flores ſubaequantibus, caule procumbente. *Peru.*

involucrata 14. L. foliis oppoſitis ternisque rhombeo-ovatis obtuſis crenatis rugoſiſſimis ſubtus tomentoſis, capitulis ſquarroſis, bracteis ſubfoliaceis ovatis. *Ind. occid.*

†† *Pedunculis folio brevioribus.*

odorata 15. L. foliis oppoſitis ternisque ellipticis rugoſis, capitulis ſquarroſis, bracteis lanceolatis. *Ind. occid.*

trifolia 16. L. foliis ſubternis ovato-oblongis acutis ſupra ſcabris ſubtus incano-villoſis, capitulis oblongis, bracteis ovatis acuminatis tubo corollae brevioribus. *Ind. occ.* (L. celtidifolia Kunth.)

Camara 17. L. foliis ovatis ſerratis ſubrugoſis ſubtus albido-villoſis, capitulis laxis umbellaribus, bracteis linearibus abbreviatis. *Amer. trop.*

fucata Ker. 18. L. foliis ovatis obtuſiuſculis crenatis rugoſis hirſutiuſculis, capitulis ſubhemiſphaericis, bracteis oblongis tubo corollae brevioribus. *Braſil.*

annua 19. L. foliis ſubcordato-oblongis ſerratis ſcabris, capitulis oblongis, bracteis lanceolatis, caule annuo hiſpido. *Amer. trop.*

canefcens Kunth. 20. L. foliis ovato-oblongis acuminatis crenato-ferratis fupra fcabris fubtus incano-hirfutis, capitulis hemifphaericis, bracteis ovato-oblongis acutis. *Nov. Granat.*

lavandulacea W. 21. L. foliis lanceolatis obtufis crenatis bafi attenuatis integerrimis fupra fcabris fubtus hirfutis, capitulis cylindricis, bracteis imbricatis ovatis villofis. *Patria?*

falicifolia Kunth. 22. L. foliis ternis lanceolatis utrinque attenuatis fubcrenatis rugofis fupra fcabris fubtus incano-pubefcentibus, capitulis fubglobofis, bracteis lanceolatis. *Nov. Granat.*

geminata * 23. L. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ferratis rugofis fubtus incano-pubefcentibus, capitulis oblongis, bracteis ovatis fubulatis. *Ad Orinoc.* (Lippia geminata Kunth., Verbena lantanoides W. herb.)

lippioides * 24. L. foliis parvis oblongis utrinque attenuatis fubdentatis venofis fubtus ramisque pilofis, capitulis hemifphaericis, bracteis fpathulatis tubum corollae aequantibus. *Brafil.* Sello.

*** *Omnino defcifcens.*

racemofa Lour. 25. L. foliis fubrotundis integerrimis fubtus albicantibus, petiolis bafi glandulofis, floribus racemofis, caule arboreo. *Cochinchina.*

2127. SPIELMANNIA Medic.

africana W. *Afric. auftr.* Frutex foliis ovato-oblongis acutis ferrulatis fubdecurrentibus hirfutiusculis, floribus axillaribus feffilibus. (Lantana africana, crifpa et capenfis Thunb.)

2128. CITHAREXYLON.

* *Calycibus truncatis obfolete dentatis.*

caudatum 1. C. ramis teretibus, foliis obovato-ellipticis obtufis, racemis erectis elongatis. *Jamaica.* (C. erectum Jacq.)

Berterii * 2. C. ramis teretiusculis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis glaberrimis, racemis erectis elongatis. *Jamaica.* Bertero.

villofum Jacq. 3. C. ramis 4gonis, foliis obovatis coriaceis apice fubdentatis fubtus villofiusculis, racemis axillaribus terminalibus elongatis pendulis. *Hifpaniola.*

quitenfe * 4. C. ramis 4gonis, foliis obovatis membranaceis apice integerrimis fubtus villofis, racemis terminalibus nutantibus. *Quito.* (C. molle Kunth.)

quadrangulare Jacq. 5. C. ramis 4gonis, foliis oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, racemis fpicatis aggregatis elongatis nutantibus. *Ind. occid.* (C. caudatum Sw.)

** *Calycibus 5fidis.*

cinereum 6. C. ramis teretibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, racemis ſpicatis aggregatis elongatis erectiuſculis. *Ind. occid. Braſil.* (C. teres Jacq.)

reticulatum Bonpl. 7. C. ramis 4gonis, foliis oblongis baſi attenuatis coriaceis integerrimis glaberrimis nitidis, racemis ſpicatis erectis. *Peru.*

ſubſerratum Sw. 8. C. ramis 4gonis, foliis obovato-oblongis apice ſubſerratis venoſis utrinque glabris ſupra lucidis, racemis terminalibus erectis ſubcompoſitis. *Hiſpaniola.*

molle Jacq. 9. C. ramis 4gonis, foliis ovatis acutis ſerratis utrinque villoſis, racemis erectis terminalibus. *Patria?*

tomentoſum Poir. 10. C. ramis teretibus, junioribus 4gonis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis coriaceis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus erectis pubeſcentibus. *Inſ. Carib. Amer. auſtr.*

pentandrum Vent. 11. C. ramis 4angulis villoſiuſculis, foliis oblongis apice paucidentatis baſi attenuatis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, racemis axillaribus ſimplicibus erectis. *Portorico.* (C. pulverulentum Perſ.)

ilicifolium Bonpl. 12. C. ramis 4angulis, foliis elliptico-oblongis integerrimis aut ſpinoſo-dentatis coriaceis glaberrimis nitidis, racemis ſpicatis terminalibus. *Quito.*

ſpinoſum Kunth. 13. C. ramis 4angulis ſpinoſis, foliis oblongis obtuſis integerrimis glabris ſubmembranaceis, racemis axillaribus paucifloris. *Peru.*

2129. DURANTA.

Plumerii 1. D. ſubſpinoſa, ramis 4angulis, foliis oblongis acutis ſerratis integerrimisque glabris ſubmembranaceis, racemis ſpicatis longiſſimis nutantibus. *Ind. occ.* (D. phytolaccaefolia Juſſ.)

Elliſia 2. D. ſubſpinoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis apice ſerratis, racemis axillaribus erectis. *Ind. occ.* (D. microphylla Desf.)

xalapenſis Kunth. 3. D. ſpinoſa, ramis 4angulis, foliis obovatis obtuſis coriaceis glaberrimis crenato-ſerratis, racemis paniculatis terminalibus, floribus nutantibus. *Mexico.*

triacantha Juſſ. 4. D. ſpinis ternis, ramis ſub-6gonis, foliis ternis ellipticis obtuſis integerrimis coriaceis glaberrimis, racemis terminalibus paucifloris. *Quito. Inſ. Carib.?* (D. buxifolia Poir.?)

macrocarpa Kunth. 5. D. ſubinermis, ramis angulatis, foliis ſubternis elliptico-oblongis obtuſiuſculis apice ſubſerratis glaberrimis, racemis ſpicatis terminalibus, floribus ſubſecundis. *Nov. Hiſpan.?* (D. dentata Perſ.?)

Mutisii 6. D. inermis, ramis sub-6gonis, foliis oblongis acutis coriaceis integerrimis glaberrimis, racemis axillaribus secundis, floribus nutantibus. *Nov. Granat.* (D. parietarifolia Juss.?)

obtusifolia Kunth. 7. D. inermis, foliis obovatis obtusis coriaceis integerrimis glaberrimis, racemis paniculatis, floribus pendulis. *Nov. Granat.*

2130. AMASONIA.

arborea Humb. 1. A. bracteis petiolatis flore brevioribus, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis remote dentatis glabris, caule arboreo. *Ad Orinoc.*

integerrima * 2. A. bracteis sessilibus minimis, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris, caule arborescente. *Ad fl. Magdalen.* Bertero.

punicea Vahl. 3. A. bracteis sessilibus flore longioribus, foliis ovato-lanceolatis serratis laevibus, caule arborescente. *Ins. Trinit.*

erecta 4. A. bracteis subsessilibus flores aequantibus, foliis oblongo-lanceolatis subserratis scabris, caule herbaceo. *Guiana.* (Taligalea campestris Aubl.)

2131. GMELINA.

arborea Roxb. 1. Gm. inermis, foliis cordatis pubescentibus, floribus paniculatis. *Ind. or.*

asiatica 2. Gm. spinosa, foliis ovatis 3dentatis subtus venosis subtomentosis, racemis terminalibus. *Ind. orient.*

parvifolia Roxb. 3. Gm. spinosa, foliis ovatis acuminatis basi attenuatis 3dentatis integerrimisque, floribus terminalibus subracemosis. *Ind. or.* (Gm. parviflora Pers.)

2132. MENDOZIA R. et P.

aspera R. et P. 1. M. foliis ovatis acuminatis utrinque asperis, pedunculis 1floris. *Peru.*

racemosa R. et P. 2. M. floribus racemosis. *Peru.* (Mendoncia Vand. foliis ovatis acutis villosis. *Brasil.?*)

2133. MYOPORUM Banks.

** Foliis oppositis.*

oppositifolium R. Br. 1. M. foliis sessilibus cordato-lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus geminis. *Nov. Holl.*

*** Foliis alternis*

† integerrimis.

ellipticum R. Br. 2. M. foliis subspathulato-lanceolatis mucronatis subtus punctatis supra lucidis ramulisque laevibus, pedunculis subaggregatis, laciniis calycis

acutiſſimis, limbo corollae imberbi. *Nov. Holl.* (Pogonia glabra Andr., Andreuſia glabra Vent.)

tenuifolium Forſt. 3. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis ramulisque laevibus, laciniis calycis lanceolatis acutis, limbo corollae imberbi. *Nov. Holl. Nov. Caledon.*

acuminatum R. Br. 4. M. foliis lanceolatis acuminato-cuſpidatis baſi attenuatis ramisque laevibus, laciniis calycis ovato-lanceolatis, limbo corollae barbato. *Nov. Holl.*

montanum R. Br. 5. M. foliis lineari-lanceolatis acutiſſimis baſi attenuatis ramisque laevibus, laciniis calycis linearibus acutis. *Nov. Holl.*

humile R. Br. 6. M. foliis ſpathulato-linearibus obtuſiusculis eveniis, caule procumbente. *Nov. Holl.*

†† *Foliis ſubdentatis ſ. ſerratis.*

parvifolium R. Br. 7. M. foliis ſpathulato-linearibus obtuſiusculis utrinque ſub-1dentatis ramisque glanduloſo-aſperis, pedunculis ſub-2partitis folia ſubaequantibus, caule diffuſo. *Nov. Holl.*

platycarpon R. Br. 8. M. foliis lineari-lanceolatis apice dentatis ramisque laevibus, fructibus compreſſis calycem 4plo ſuperantibus, caule erecto. *Nov. Holl.*

ſerratum R. Br. 9. M. foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſerrulatis baſi attenuatis ramisque laevibus, pedunculis umbellatis. *Nov. Holl.* (Pogonia tetrandra Labill.)

debile R. Br. 10. M. foliis lanceolatis apice dentatis baſi integerrimis, fructibus compreſſiusculis calyce brevioribus, pedunculis ſolitariis, caule proſtrato. *Nov. Holl.* (Pogonia debilis Andr.)

diffuſum R. Br. 11. M. foliis lanceolatis baſi recurvo-dentatis apice ſubintegerrimis, caule diffuſo ramisque glanduloſis, pedunculis ſolitariis, fructibus compreſſiusculis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

tuberculatum R. Br. 12. M. foliis lanceolatis acutis ſerratis ramisque glanduloſo-tuberculatis. *Nov. Holl.*

inſulare R. Br. 13. M. foliis oblongo-lanceolatis baſi attenuatis apice ſerratis ramisque laevibus, ramulis viſcidis, pedunculis geminis, caule erecto. *Nov. Holl.*

viſcoſum R. Br. 14. M. foliis oblongis acutis ſerratis reflexis ramisque viſcidis glanduloſis. *Nov. Holl.*

laetum Forſt. 15. M. foliis oblongis acutis apice obſolete ſerratis baſi attenuatis ramisque erectis glabris, pedunculis aggregatis, laciniis calycis cuſpidatis. *Nov. Zeeland.*

aſcendens R. Br. 16. M. foliis obovato-oblongis obtuſiusculis apice obtuſe ſerratis ramisque aſcendentibus laevibus, caule diffuſo. *Nov. Holl.*

† *craſſifolium* Forſt. 17. M. foliis oblongis ſubſerratis carnoſis. *Inſ. botan.*

† *pubeſcens* Forſt. 18. M. foliis oblongo-ellipticis ſerratis pubeſcentibus. *Nov. Zeeland.*

2134. PHOLIDIA R. Br.

ſcoparia R. Br. *Nov. Holl.* Frutex ramis virgatis, foliis oppoſitis ſubulatis, floribus pedunculatis axillaribus coeruleis.

2135. STENOCHILUS R. Br.

glaber R. Br. 1. St. foliis obovato-oblongis acutis ſubintegerrimis glabris, floribus ſolitariis folia ſubſuperantibus, ramulis tomentoſis, caule diffuſo. *Nov. Holl.*

maculatus Ker. 2. St. foliis ſpathulato-lanceolatis ſubcaneſcentibus, pedunculis flexuoſo-declinatis folia excedentibus, ramis ſericeis erectis. *Nov. Holl.*

longifolius R. Br. 3. St. foliis lanceolato-linearibus elongatis apice uncinatis integerrimis glabris, ramulis tomentoſis. *Nov. Holl.*

2136. BONTIA.

daphnoides *Ind. occ.* Frutex foliis lanceolatis ſubintegerrimis glabris, pedunculis axillaribus 1floris, floribus luteis, barba purpurea.

†2137. EREMOPHILA R. Br.

oppoſitifolia R. Br. 1. E. foliis oppoſitis ſemiteretibus, laciniis calycis unguiculatis eglanduloſis. *Nov. Holl.*

alternifolia R. Br. 2. E. foliis ſparſis ſemiteretibus calycibusque glanduloſis. *Nov. Holl.*

2138. XENOPOMA W.

obovatum W. *China?* Frutex aromaticus, ramis 4angulis aſperis, foliis obovato-oblongis glabriusculis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis albis.

2139. TOZZIA.

alpina *Alp. Europ. med.* Herba erecta ramoſa glabriuscula, radice ſquamata, foliis ſeſſilibus ovatis paucidentatis, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis flavis.

2140. HEMIPHRAGMA Wall.

heterophyllum Wall. *Nepal.* Herba proſtrata, foliis inferioribus cordato-ovatis ſuperioribus linearibus, floribus faſciculatis roſeis.

2141. JOSEPHINIA Vent.

Imperatricis Vent. 1. J. germinibus 4-5locularibus, foliis elliptico-lanceolatis acutis ſubtus cauleque pubeſcentibus, laciniis calycis aequalibus. *Nov. Holl. occid.*

grandiflora R. Br. 2. J. germinibus 8locularibus, foliis lanceolatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, caule glabro, lacinia calycis ſuprema abbreviata. *Nov. Holl.*

2142. PEDALIUM.

Murex *Ind. or. Ceylon.* Herba erecta caule tomentoſo, foliis ovatis ſinuato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis flavidis moſchum redolentibus.

2143. AVICENNIA.

tomentoſa 1. A foliis oblongo-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Intra tropicos totius mundi. Nov. Zeeland?* (A. reſinifera Forſt., Sceura (melius Schurah) marina Forsk. Bontia germinans L. ſpec. ed. 2.)

nitida Jacqu. 2. A. foliis lanceolatis utrinque nitidis. *Martinic.*

2144. LIMOSELLA.

aquatica *Europ. Amer. bor. Nov. Holl.* Herba humilis, foliis ſpathulato-linearibus longe petiolatis, ſcapis 1floris breviſſimis, floribus rubentibus. (L. auſtralis R. Br., tenuifolia Nuttall.)

2145. ERINUS.

* *Foliis integerrimis.*

aethiopicus Thunb. 1. E. annuus, caule erecto hirſuto, foliis linearibus villoſis, floribus ſpicatis. *Afr. auſtr.*

villoſus Thunb. 2. E. annuus, caule erecto hirto, foliis lanceolatis integerrimis tomentoſis, floribus ſpicatis. *Afr. auſtr.*

ſimplex Thunb. 3. E. annuus, caule ſimplici pubeſcente, foliis oblongis obtuſis integerrimis pubeſcentibus, ſpica faſtigiata. *Afric. auſtr.*

maritimus Thunb. 4. E. decumbens fruteſcens, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis glabris, ſpica denſa terminali. *Afric. auſtr.*

** *Foliis dentatis, ſerratis.*

Lychnidea Thunb. 5. E. erectus ſuffruteſcens, foliis linearibus apice ſubdentatis ciliatis, ſpica terminali, bracteis oblongis, tubo corollae pubeſcente. *Afr. auſtr.* (E. capenſis L.)

fragrans Ait. 6. E. ſuffruticoſus villoſus, foliis ſpathulato-linearibus dentatis ſubtus ſubtomentoſis, floribus ſpicatis,

catis, bracteis elongatis, laciniis limbi integris. *C. B. S.* (Selago Lychnidea L.)

africanus 7. E. caule debili flexuofo villofo, foliis lanceolatis obtufis dentatis pilofis, fpica elongata, tubo corollae glabriusculo. *C. B. S.*

patens Thunb. 8. E. herbaceus ramofiffimus glaber, foliis obovatis petiolatis ferratis, floribus axillaribus pedunculatis. *Afric. auftr.*

alpinus 9. E. herbaceus villofiusculus, foliis fpathulatis crenatis, floribus corymbofis. *Europ. med. alp.*

felaginoides Thunb. 10. E. herbaceus decumbens hirfutus, foliis obovatis dentatis villofis, capitulis foliofis. *Afric. auftr.*

tomentofus Thunb. 11. E. herbaceus erectus hirfutus, foliis oblongis ferratis tomentofis, floribus axillaribus pedunculatis. *Afr. auftr.*

incifus Thunb. 12. E. fruticofus ramofus, foliis ovatis obtufis incifo-ferratis tomentofis, floribus racemofis. *C. B. S.*

triftis Thunb. 13. E. herbaceus glaber, foliis ovato-oblongis incifo-dentatis, floribus folitariis pedunculatis. *C. B. S.*

2146. LINDERNIA.

Pyxidaria 1. L. caule procumbente, foliis oblongis integerrimis 3nerviis, pedunculis axillaribus 1floris demum elongatis. *Europ. med.* (L. Pyxidaria Perf. eft Gratiola dilatata Mühl. fyft. 1. p. 39. eadem ac Gr. anagalloidea Mx. Huc et Gratiola inundata Kit.)

*montevidenfis** 2. L. caule procumbente ramofo, foliis fpathulato-linearibus enerviis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus foliaceis. *Monte Video.* Sello.

2147. MANULEA.

* *Fruticofae.*

microphylla Thunb. 1. M. foliis fafciculatis confertis linearibus minutis, floribus racemofis terminalibus. *Afric. auftr.*

linifolia Thunb. 2. M. foliis fubfafciculatis linearibus fubintegerrimis fcabris, floribus axillaribus folitariis pedunculatis. *Afric. auftr.*

revoluta Thunb. 3. M. foliis linearibus obtufis oppofitis erectis margine revolutis villofiusculis, floribus fubracemofis. *Afric. auftr.*

vifcofa W. 4. M. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis glandulofo-pilofiusculis, floribus racemofis, ftaminibus exfertis. *Afric. auftr.*

coerulea Thunb. 5. M. foliis lineari-lanceolatis dentatis tomentofis, floribus fubracemofis, tubo corollae breviffimo. *Afric. auftr.*

integrifolia 6. M. foliis ovatis obtufis integerrimis glabris, floribus axillaribus racemofis. *C. B. S.*

tomentofa 7. M. foliis obovatis obtufis crenatis tomentofis, floribus thyrfoideis terminalibus. *C. B. S.*

virgata Thunb. 8. M. foliis obovatis acutis ſerratis villoſis, ramis virgatis, floribus alternis remotis. *C. B. S.*

incana Thunb. 9. M. foliis ſubſpathulatis inaequaliter dentatis piloſo-caneſcentibus, faſciculis thyrſoideis longe pedunculatis. *C. B. S.* (M. anguſtifolia Link.)

cuneifolia Thunb. 10. M. foliis obovatis acutiusculis ſerratis ſupra glabris ſubtus piloſis, ſpicis cylindricis. *C. B. S.*

argentea Thunb. 11. M. foliis petiolatis obovatis dentato-ſerratis ſubtus argenteo-punctatis, floribus axillaribus longe pedunculatis. *C. B. S.*

hiſpida Thunb. 12. M. foliis petiolatis ovatis ſerratis utrinque ramisque hiſpidis, floribus axillaribus ſubcorymboſis. *C. B. S.* (M. oppoſitifolia Vent.)

** *Herbaceae.*

capenſis Thunb. 13. M. erecta hirſuta, foliis linearibus dentatis calycibusque villoſo-viſcoſis, racemis terminalibus faſtigiatis. *C. B. S.* (Büchnera L. W.)

aethiopica Thunb. 14. M. erecta glabra, foliis lineari-lanceolatis paucidentatis, racemis faſtigiatis, calycibus pubeſcentibus. *Afric. auſtr.* (Büchnera L. W.)

rubra Thunb. 15. M. erecta villoſa, foliis lanceolatis dentatis, racemi ſecundi pedunculis remotis. *C. B. S.*

altiſſima Thunb. 16. M. caule elongato ſubaphyllo, foliis infimis lanceolatis remote dentatis pubeſcentibus, racemis ſpicatis. *C. B. S.*

corymboſa Thunb. 17. M. caule elongato glabro ſubaphyllo, foliis infimis obovatis crenatis glabriusculis, verticillis racemoſis ſubumbellatis. *C. B. S.*

thyrſiflora Thunb. 18. M. erecta pubeſcens, foliis obovatis crenatis tomentoſis, floribus paniculatis. *C. B. S.*

Cheiranthus 19. M. caule elongato pubeſcente oligophyllo, foliis infimis obovato-oblongis inciſo-ſerratis villoſo-tomentoſis, floribus remotis axillaribus pedunculatis. *Afric. auſtr.* (Lobelia L. ſpec. 1. Nemia Berg.)

hirta Thunb. 20. M. caule erecto foliisque obovatis duplicato-ſerratis hirſutis, floribus remotis axillaribus. *Afr. auſtr.*

capillaris Thunb. 21. M. caule erecto, ramis capillaribus, foliis caulinis obovatis paucidentatis glabris, rameis linearibus, ſpicis ovatis. *C. B. S.*

† *divaricata* Thunb. 22. M. ramis divaricato-decumbentibus foliisque ovato-ellipticis obtuſis dentatis piloſis, ſpica terminali faſtigiata, calyce bilabiato. *C. B. S.*

heterophylla Thunb. 23. M. caule ſimplici foliisque villoſis, inferioribus ovatis ſubdentatis ſuperioribus linearibus ſubintegerrimis, capitulis terminalibus globoſis. *C. B. S.*

plantaginea Thunb. 24. M. caule decumbente pubeſcente, foliis obovatis ſubdentatis glabris, capitulis terminalibus, calycibus ſublanatis. *Afric. auſtr.*

capitata Thunb. 25. M. caule erecto foliisque ovato-lanceolatis ſerratis hirſutis, capitulis globoſis. *Afric. auſtr.*

cephalotes Thunb. 26. M. caule erecto foliisque ſeſſilibus oblongis eroſo-ſerratis glabris, floribus ſubumbellatis. *C. B. S.*

cryſtallina Weinm. 27. M. caule erecto foliisque ovatis obtuſis duplicato-ſerratis papuloſis, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

indica Lour. 28. M. caule erecto foliisque ovato-oblongis integerrimis incano-villoſis, floribus terminalibus congeſtis ſubcapitatis. *Cochinchina.*

foetida W. 29. M. caule erecto foliisque ovato-oblongis inciſo-dentatis glabriusculis, pedunculis terminalibus ſubcorymboſis. *C. B. S.* (Büchnera Andr.)

† *antirrhinoides* Thunb. 30. M. caule erecto pubeſcente, foliis oblongis acutis inaequaliter ſerratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris. *C. B. S.*

rhynchantha Link. 31. M. caule erecto ſuperne foliisque obovatis ſerratis pubeſcentibus, ſpicis aggregatis, corollae laciniis lineari-filiformibus. *C. B. S.*

violacea Link. 32. M. caule erecto foliisque oblongis obtuſis denticulatis glabris, floribus racemoſis. *C. B. S.*

cordata Thunb. 33. M. caule decumbente radicante foliisque petiolatis cordatis ſerratis pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

pinnatifida Thunb. 34. M. ramis divaricatis foliisque oblongis inciſo-pinnatifidis pubeſcentibus, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.* (Sutera glanduloſa Roth.?)

2148. HORNEMANNIA W.

bicolor W. *Ind. or.* Herba annua, ramis divaricatis aſcendentibus, floribus racemoſis albo-flavis. (Gratiola goodenifolia Hornem.)

2149. CONOBEA Aubl.

aquatica Aubl. 1. C. caule procumbente foliisque reniformibus dentatis amplexicaulibus glabris, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Guiana.*

*viſcoſa** 2. C. caule erecto ſuperne viſcoſo, foliis lanceolatis argute ſerratis glaberrimis, pedunculis ſubgeminis folio brevioribus. *Braſil.*

*borealis** 3. C. caule erecto pubeſcente, foliis ſubconnatis lineari-lanceolatis apice denticulatis, pedunculis axillaribus folia aequantibus. *Amer. bor.* (Collinſia verna Nutt.? Gratiola acuminata Walt., neglecta Torr. Antirrhinum tenellum Purſh.?)

† *indica** 4. C. caule erecto glabro, foliis verticillatis, inferioribus linearibus pinnatifidis ſuperioribus lanceolatis 3nerviis apice ſerrulatis, verticillis ſpicatis terminalibus. *Ind. or.* (Stemodia aquatica W. Cyrilla Roxb.) Simillima Limnophilis, ſed capſ. 4valvis.

2150. RHINANTHUS M. B.

orientalis 1. Rh. calycis labio ſup. obtuſo emarginato, corollae labio ſup. incurvo. *Aſia minor. Caucaſ.*

Elephas 2. Rh. calycis labio ſup. acuto integro, corollae lab. ſup. ſubulato recto. *Calabria. Aſia minor.*

2151. ALECTOROLOPHUS M. B.

Crista galli *Europ. Asia. Amer. bor.* Herba erecta glabra superne ramosa, caule submaculato, foliis lanceolatis serratis, floralibus ovatis, calyce membranaceo glabro vel hirsuto. Hinc varietates: Rhinanthus Alectorolophus Poll. (Rh. hirsutus Lam., villosus Pers.), qui omnino semina marginata habet: Rhin. major Ehrh. (glaber Lam.): Rhin. minor Ehrh., alpinus Baumg., pulcher Schummel.)

Sub Rhinantho indico tres latent diversae plantae, mihi juxta ignotae. Pluknetii longe alia ac Burmanni et ab his iterum differt Willdenowii, quae, calyce foliaceo subdiphyllo insignis, ob fructus defectum determinari nequit.

2152. GYMNANDRA Pall.

* *Labio corollae inf. plerumque bifido.*

integrifolia W. 1. G. foliis radicalibus caulinisque oblongis utrinque attenuatis integerrimis, spica oblonga, antheris subsessilibus. *Davuria.* (Gymn. borealis Pall., Bartsia Gymnandra L. suppl.)

gracilis W. 2. G. foliis inaequaliter serratis, radicalibus oblongis longe petiolatis, caulinis sessilibus ovato-oblongis, spica laxa cylindrica, filamentis lanceolatis lab. sup. aequantibus. *Ins. Aleut.*

elongata W. 3. G. foliis crenatis, radicalibus oblongis elongatis, caulinis ovatis, spica elongata, filamentis lab. sup. brevioribus. *Sibir. or.*

ovata W. 4. G. foliis radicalibus oblongis subduplicato profunde dentatis, caulinis ovatis remote serratis, spica ovato-elliptica, filamentis lab. sup. brevioribus. *Sibir. or. Camtschatca. Ins. Aleut. Ora occid. Amer. bor.* (Bartsia Gymnandra Pursh.)

** *Labio cor. inf. plerumque 3fido.*

altaica W. 5. G. foliis obtuse serratis, radicalibus oblongis longe petiolatis, caulinis sessilibus ovatis, spica cylindrica, bracteis flore brevioribus, antheris subsessilibus. *Imaus. Camtschatca.* (Lagotis glauca Gärtn.)

minor W. 6. G. foliis oblongo-lanceolatis subserratis, radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, spica cylindrica, filamentis lab. sup. crenatum aequantibus. *Sibir. or.*

dentata W. 7. G. foliis profunde dentato-serratis oblongis, spica laxa cylindrica, filamentis lab. sup. integerrimum aequantibus. *Sibir. or.*

reniformis W. 8. G. foliis radicalibus reniformibus crenatis, caulinis subrotundo-ovatis serratis, spica densa cylindrica, filamentis lab. sup. emarginato brevioribus. *Ins. Aleut.*

Stelleri Ledeb. 9. G. foliis radicalibus oblongis crenatis petiolatis, caulinis amplexicaulibus ſubrotundis obtuſis integerrimis, ſpica ovata, filamentis lab. ſup. integerrimum aequantibus. *Camtſchatca.*

2153. BARTSIA.

Trixago 1. B. caule ſimplici, foliis lanceolatis, remote obtuſe profundeque ſerratis, floribus ſpicatis ſub-4fariam imbricatis, calycibus villoſis, labio cor. inf. dilatato ſuperius depreſſum excedente. *Italia. Gallia auſtr. Luſitania. Graecia. Syria. Caucaſ.* (Rhinanthus W., Alectorolophus M. B., Bellardia All. Trixago rhinanthina Link.) Rhinanthus maximus W. verſicolor Lam. ſunt varietates.

viſcoſa 2. B. caule ſimplici villoſo ſuperne glanduloſo-viſcoſo, foliis oblongo-lanceolatis profunde ſerratis ſuperioribus alternis, floribus axillaribus remotiusculis, labio cor. inf. dilatato labium ſup. aſcendens ſubaequante. *Anglia. Gallia auſtr. Italia. Graecia.* (Euphraſia pratenſis Sebaſt.)

alpina 3. B. caule ſimplici villoſo, foliis omnibus oppoſitis ſubcordato-ovatis ſerratis, floribus axillaribus oppoſitis, calycibus ſubviſcoſis. *Alp. Europ. med. et bor. Amer. bor.*

Fagonii Lapeyr. 4. B. caule ſimplici villoſo, foliis oppoſitis ſubcordato-ovatis remote obtuſeque ſerratis, floribus ſpicatis, calycibus pubeſcentibus. *Pyren.* (B. ſpicata Ram. Rhinanthus Poir.)

bicolor Cand. 5. B. caule ſimplici villoſo, foliis oppoſitis lineari-lanceolatis remote ſerratis, floralibus integerrimis, floribus ſpicatis glanduloſo-piloſis. *Inſ. pulcra ad Armoricam.*

latifolia Sm. 6. B. caule erecto hirſuto, foliis oppoſitis ovatis inciſo-ſerratis, floralibus ſubpalmatis, verticillis ſpicatis, labio cor. ſup. abbreviato. *Europ. auſtr.* (Euphraſia L.)

Odontites Hudſ. 7. B. caule erecto ramoſo foliisque oppoſitis lanceolatis ſerratis pubeſcentibus, racemis ſpicatis ſecundis, ſtaminibus exſertis. *Europ.* (Euphraſia L. E. verna Bellard. et ſerotina Lam. ſunt varr.)

*capenſis** 8. B. caule ſimplici foliisque lanceolatis dentatis villoſis, floribus verticillato-ſpicatis, calycibus viſcoſis. *C. B. S.* (Büchnera africana L., Rhinanthus capenſis Thunb.)

*ſcabra** 9. B. caule ſubramoſo hirſutiusculo, foliis ovatis dentatis ſcabris, floribus ſpicatis, bracteis foliaceis inciſo-dentatis. *C. B. S.* (Rhinanthus Thunb.)

*trifida** 10. B. caule ſimpliciſſimo ſubtomentoſo, foliis 3partitis linearibus pubeſcentibus, floribus axillaribus ſeſſilibus, laciniis calycis elongatis. *Aſia minor.* (Rhinanthus Vahl.)

2154. LAMOUROUXIA Kunth.

virgata Kunth. 1. L. fruticoſa ramoſa, ramis teretiusculis, foliis lineari-lanceolatis obſolete ſerrulatis glabris, laciniis calycis lanceolatis integerrimis. *Quito.*

ſerratifolia Kunth. 2. L. herbacea ramoſa, ramis 4gonis, foliis lineari-lanceolatis inciſo-ſerratis, laciniis calycis lato-lanceolatis integerrimis. *Nov. Granat.*

rhinanthifolia Kunth. 3. L. herbacea, ramis ſub-4gonis pubeſcentibus, foliis ſubcordato-ovatis argute ſerratis piloſis, laciniis calycis ovatis ſerratis. *Nov. Hiſpan.*

ſylvatica Kunth. 4. L. herbacea ſubvolubilis, ramis teretibus foliisque oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis inaequaliter ſerratis piloſis, laciniis calycis ſerrulatis. *Peru.*

viſcoſa Kunth. 5. L. herbacea glanduloſo-piloſa ſuperne viſcoſa, foliis lanceolatis acuminatis ſerrulatis incano-tomentoſis, laciniis calycis lanceolatis integerrimis. *Mexico.*

xalapenſis Kunth. 6. L. herbacea pubeſcens, ramis teretiusculis, foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis glabris, laciniis calycis integerrimis. *Mexico.*

multifida Kunth. 7. L. caule ſimpliciusculo foliisque pinnatifidis linearibus glabriusculis, calycis farinoſi laciniis lanceolatis integerrimis. *Nov. Hiſpan.*

2155. CASTILLEIA Mut. (Folia alterna.)

* *Fruticoſae.*

integrifolia L. ſuppl. 1. C. foliis linearibus integerrimis 3nerviis hiſpidis, floribus ſpicatis, corolla calycem ſuperante. *Nov. Hiſpan. Nov. Granat.*

tolucenſis Kunth. 2. C. caule procumbente, foliis lanceolatis obtuſis hiſpidis, ſuperioribus 3fidis, floribus axillaribus ſeſſilibus, corolla calycem aequante. *Mexico.*

moranenſis Kunth. 3. C. caule proſtrato, foliis lanceolatis acutis 3nerviis hiſpidis, ſuperioribus 3fidis, floribus axillaribus ſeſſilibus, corolla calycem ſuperante. *Mexico.*

coronopifolia Vent. 4. C. caule erecto, foliis linearibus hiſpidis integerrimis 3fidisque, floribus racemoſis ſecundis. *Nov. Granat.*

nubigena Kunth. 5. C. caule erecto, foliis linearibus 3fido-pinnatifidis hirſutiſſimis, floribus axillaribus breviter pedunculatis, calyce ventricoſo corollam ſubaequante. *In monte Pichincha.*

fiſſifolia L. ſuppl. 6. C. caule erecto, foliis linearibus 3fido-pinnatifidis hirſutiſſimis, floribus racemoſis, corolla calycem tubuloſum ſuperante. *Nov. Granat.*

** *Herbaceae.*

pallida * 7. C. caule ſimplici, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis ſubpubeſcentibus, floralibus ſubdentatis, dentibus calycis acutis. *Sibir. Amer. bor.* (Bartſia L. Semina membrana laxa reticulata obvoluta).

*acuminata** 8. C. foliis linearibus elongatis acuminatis 3nerviis, floralibus oblongis longiſſime acuminatis flores ſuperantibus, dentibus calycis acutis. *Ora occ. Amer. bor. Inſ. Aleut.* (Bartſia Purſh.)

lithoſpermoides Kunth. 9. C. foliis lineari-lanceolatis obtuſis integerrimis 3nerviis hiſpidis, floralibus apice dilatatis coloratis, dentibus calycis obtuſis. *Nov. Hiſpan.*

ſcorzoneraefolia Kunth. 10. C. foliis linearibus acuminatis baſi dilatatis amplexicaulibus hiſpidis, floralibus coloratis, dentibus calycis acutiusculis. *Nov. Hiſpan.*

*coccinea** 11. C. foliis linearibus inciſo-pinnatifidis, floralibus dilatatis coloratis ſub-3fidis flores ſuperantibus, dentibus calycis obtuſis. *Amer. bor.* (Bartſia L. Euchroma Nuttall.)

*grandiflora** 12. C. foliis linearibus ſub-3fidis hiſpidis, laciniis divaricatis, floralibus ſimilibus viridibus. *Louiſiana ſuper.* (Caſt. ſeſſiliflora Purſh. Euchroma grandiflora Nutt.)

2156. LAFUENTEA Lag.

rotundifolia Lag. *Hiſpan. auſtr.* Suffrutex glanduloſo-viſcoſus graveolens, foliis decuſſatis reniformibus crenatis, ſpicis axillaribus pedunculatis ſolitariis.

2157. EUPHRASIA.

**Foliis linearibus.*

tenuifolia Perſ. 1. E. caule virgato glabro, ramis filiformibus, foliis lineari-ſetaceis, floribus ſubſpicatis ſecundis, calycibus glabris, antheris barbatis. *Luſitania.* (E. linifolia Brot., filifolia Link., ſpiralis Pourr. in W. herb.?)

linifolia 2. E. caule virgato, ramis patentiſſimis pubeſcentibus, foliis ſubpetiolatis linearibus ſcabris, calycibus axillaribus alternis piloſiusculis. *Italia. Gallia auſtr.*

tricuſpidata 3. E. caule ramoſo pubeſcente, foliis linearibus apice dilatatis 3dentatis, floribus axillaribus oppoſitis pedunculatis. *Mons Baldus.* Zanon. *Italia ſuperior.*

† *coromandelina* Rottl. 4. E. caule ſimpliciusculo humili, foliis linearibus ſub-3fidis ſerrulatis, floribus axillaribus pedunculatis, fauce corollae inflata. *Coromandel.*

lutea 5. E. caule ſubramoſo glabriusculo, foliis linearibus ſerratis ſuperioribus integerrimis, floribus diſtiche racemoſis, genitalibus longe exſertis. *Europ. med. et auſtr.* (E. Coris Crantz.)

rigidifolia Bivon. 6. E. caule baſi 3fido ſtricto, foliis linearibus obtuſiusculis ſubtus convexis erectis calycibusque ſtrigilloſis, ſuperioribus remotis, floribus ſpicatis alternis, corollis calycem excedentibus. *Sicil.*

corſica Loiſ. 7. E. caule baſi procumbente foliisque linearibus integerrimis hiſpidiusculis, floribus ſubracemoſis, calycibus obtuſis corollam ſubaequantibus. *Corſica.*

glutinosa M. B. 8. E. glanduloso-pilosa viscosa, foliis linearibus carnosis integerrimis, floribus subracemosis, corolla calycem superante. *Tauria. Caucas.*

purpurea Desf. 9. E. caule ramoso colorato foliisque linearibus patentibus rigidulis glabris, floribus racemosis secundis, staminibus corollam aequantibus, capsula superne hirsuta. *Afric. bor.*

longiflora Lam. 10. E. viscido-pubescens, foliis oppositis linearibus obtusis integerrimis, rameis imbricatis, floribus secundis, tubo corollae filiformi calycem triplo superante. *Hispan.*

† *aspera* W. 11. E. foliis linearibus calloso-hispidis, floribus alternis sessilibus, tubo corollae superne inflato calycem triplo superante. *Guinea.* Isert.

paludosa R. Br. 12. E. foliis linearibus acutiusculis paucidentatis glabris, rameis distantibus, floribus spicatis inferioribus distinctis. *Nov. Holl.*

melampyroides Humb. 13. E. caule ramoso, ramis retrorsum hispidis, foliis linearibus apice obtuse dentatis hispidiusculis, floribus racemosis, calycibus glanduloso-pilosis, staminibus exsertis, capsula pilosa. *Quito.* (E. hispida W. herb.)

santolinaefolia Humb. 14. E. glanduloso-pilosa viscida, foliis linearibus obtusis margine revolutis crenatis, floribus axillaribus pedunculatis, corolla calycem superante. *Nov. Granat.*

** *Foliis sublanceolatis.*

Bocconi Gusson. 15. E. suffruticosa elata, foliis lanceolato-linearibus integerrimis glabris, inferioribus margine scabris, racemis confertis secundis, bracteis calycibusque ciliatis, staminibus exsertis. *Sicil.*

viscosa 16. E. herbacea viscoso-pubescens, foliis lineari-lanceolatis 3nerviis integerrimis, racemis secundis, corolla calycem glutinosum triplo superante. *Europ. austr. Afric. bor.*

alpina Lam. 17. E. herbacea ramoso-glabriuscula, foliis oblongo-lanceolatis setaceo-serratis subincisis, floribus axillaribus subsessilibus, calycibus aristatis. *Alp. Europ. med.* (E. salisburgensis Funk. Hopp., pectinata Tenor.)

kaliformis Pourr. 18. E. herbacea stricta hispida, foliis lineari-lanceolatis integerrimis subcarnosis abbreviatis, racemis terminalibus elongatis. *Hispan.*

stricta Humb. 19. E. herbacea stricta hispidiuscula, foliis lineari-lanceolatis obtusiusculis crenatis, floribus racemoso-spicatis terminalibus, staminibus subinclusis, capsula pilosa. *Quito.*

mutica Humb. 20. E. herbacea scandens hispida, foliis lineari-lanceolatis obtusis crenato-serratis, floribus racemosis subsecundis, antheris muticis, capsula hirsuta. *Peru.*

cuneata Forst. 21. E. ramosa glabriuscula, foliis cuneatis apice 3dentatis, floribus racemosis. *Nov. Zeeland. Terra Diemen.* (E. collina R. Br.)

ſcabra R. Br. 22. E. glanduloſo-pubeſcens ſcabra, foliis lanceolatis inciſo-dentatis, corollae pubeſcentis laciniis integris. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

arguta R. Br. 23. E. pubeſcens, foliis lanceolatis inciſo-pinnatifidis ſcabris, calycibus bracteisque cuſpidatis, corollae laciniis integris. *Nov. Holl.*

**** Foliis ſubovatis.*

officinalis 24. E. glabriuscula, foliis ſubſeſſilibus ovatis ſerratis, floribus axillaribus oppoſitis, calycibus eglanduloſis, laciniis corollae emarginatis. *Europ. Amer. bor.* (E. minima Jacqu., imbricata Perſ.)

Roſtcoviana Hayn. 25. E. pubeſcens, foliis ſeſſilibus ovatis obtuſe inciſo-ſerratis, calycibus glanduloſo-piloſis, corollae amplae laciniis emarginatis. *Europ. Camtſchatca.* (E. mollis Ledeb. var.)

tatarica Fiſch. 26. E. caule ſtricto villoſo, foliis ovatis ſetaceo-ſerratis, floribus axillaribus ſeſſilibus, corolla calycem ſubaequante. *Sibiria.*

aſperrima Link. 27. E. foliis ovatis obtuſe ſerratis lineato-rugoſis aſperis, floribus ſpicatis, caule tereti laevi. *Luſitania.* (E. aſpera Brot.)

*diemenica** 28. E. foliis cuneatis 3-5crenatis glabris, ramorum fertilium diſtantibus, ſterilium decuſſatis, laciniis corollae emarginatis. *Terra Diemen.* (E. alpina R. Br.)

tetragona R. Br. 29. E. foliis ſubovalibus 3-5dentatis obtuſis glabris, caule 4gono, calycibus ſubſeſſilibus obtuſis glabris, laciniis corollae inferioribus emarginatis. *Terra Diemen.*

ſtriata R. Br. 30. E. foliis bracteisque ſubpalmato-5lobis glabris, caule aſcendente, floribus denſe ſpicatis, calycibus acutiusculis glabris, laciniis corollae retuſis ſtriatis. *Terra Diemen.*

ſpecioſa R. Br. 31. E. foliis ovatis inciſo-crenatis decuſſatis cauleque erecto ſcabris, calycibus acutiusculis pubeſcentibus, laciniis corollae retuſis. *Nov. Holl.*

2158. PEDICULARIS.

** Galea corollae roſtrata.*

longiflora Rudolph. 1. P. tubo corollae longiſſimo filiformi, galea falciformi hiante, calyce 2fido foliaceo, foliis pinnatifidis linearibus, laciniis obtuſis abbreviatis crenato-criſtatis, caule humili. *Sibir. orient.*

grönlandica Retz. 2. P. galea acuminata declinata corollam claudente, calyce glabro 10dentato, dentibus alternis minoribus, floribus laxe ſpicatis, foliis lanceolatis pinnatifidis, laciniis linearibus ſerrulatis. *Grönland. Ad fl. Columbiam Amer. bor.* (Flores roſei.)

incarnata Jacqu. 3. P. galea porrecta acuminata truncata hiante, calyce 5fido villoſo, floribus ſubſpicatis alternis, foliis ſub-2pinnatifidis, laciniis dentatis. *Alp. Europ. med.* (P. roſtrato-ſpicata Crantz.)

roſtrata 4. P. galea porrecta truncata hiante, calyce 5fido ſubfoliaceo colorato glabro, floribus racemoſo-congeſtis bracteatis, foliis 2pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis diſtantibus, caule aſcendente. *Alp. Europ. med.* (P. roſtrato-capitata Crantz., caeſpitoſa Sieber.)

tuberoſa 5. P. galea porrecta emarginata hiante declinata labium inferius excedente, calycibus 5fidis foliaceis hirſutis, floribus ſpicatis bracteatis, foliis 2pinnatifidis dentatis hirſutiusculis, caule aſcendente. *Alp. Europ. med.* (P. aſcendens Schleich. Sternb., ſummana *Pollin. var.) (Flores flavi.)

vireſcens Hartm. 6. P. galea porrecta acuta, calycibus 5fidis, ſpica folioſa, foliis pinnatifidis. *Scandinavia.* (P. folioſa Gunner.)

gyroflexa Vill. 7. P. galea porrecta emarginata labium inferius aequante, calycibus 5fidis foliaceis, floribus ſpiratim ſpicatis bracteatis, caule aſcendente. *Alp. Europ. med.* (Flores purpurei.)

aſplenifolia Flörk. 8. P. galea porrecta cernua truncata hiante labium inferius aequante, calycis 5fidi ſublanati laciniis recurvis, floribus ſubracemoſis, foliis pinnatifidis dentatis, caule aſcendente. *Alp. noric. dinar.* (P. atrorubens Cand.) (Flores purpurei.)

uncinata Steph. W. 9. P. galea falcata porrecta acuta emarginata, calyce 5dentato glabro, ſpica aphylla elongata, foliis pinnatifidis argute ſerratis. *Sibir. bor.* (P. incarnata L.)

tanacetifolia Adam. 10. P. galea ſubporrecta truncata corollam claudente, calycibus 5dentatis hirſutis, foliis pinnatifidis dentatis, caule aſcendente hirſuto. *Sibir. bor.*

compacta W. 11. P. galea porrecta emarginato-crenulata, calyce 5fido glabro obtuſo, ſpica capitata aphylla, foliis 2pinnatifidis, laciniis lanceolatis dentatis. *Sibir.*

Romanzovii Chamiſſ. 12. P. galea acuta horizontali abbreviata, calyce 5dentato glabro, ſpica pauciflora bracteata, foliis pinnatifidis lanceolatis ſerrulatis, caule erecto. *Camtſchatca.* (Flores purpurei.)

lapponica 13. P. galea porrecta truncata hiante, racemis ſpicatis laxis, calyce 2fido 5dentato, foliis lanceolatis inciſo-pinnatifidis denticulatis, caule erecto. *Lappon. Norveg. Sibir. Labrador.* (Flores flavi.)

reſupinata 14. P. galea acutiuscula, labio inferiori oblique flexo, calycibus 2fidis truncatis lanatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis lanceolatis profunde ſerratis, ſerraturis crenatis, caule elato ſimplici. *Sibir.*

*** Galea redunca.*

grandiflora Chamiſſ. 15. P. galea elongata hiante apice breviter redunca, calyce 5fido foliaceo, caule humili paucifloro, foliis 2pinnatis abbreviatis. *Ora occ. Amer. bor. ſub circulo arctico.*

*** *Galea obtuſiuscula ſub apice 2dentata.*

† *Calyce bifido ſ. bilabiato.*

paluſtris 16. P. galea apice obtuſe 2dentata, calyce foliaceo, floribus ſubſolitariis pedunculatis, foliis 2pinnatifidis, caule erecto ramoſo. *Europ.*

euphraſioides Steph. 17. P. galea apice acute 2dentata, calycibus obtuſis 2fidis, floribus laxe racemoſis, bracteis integerrimis, foliis lanceolatis ſinuato-pinnatifidis denticulatis, caule ramoſiſſimo. *Sibir. bor. Terra Labrador.*

aequinoctialis Kunth. 18. P. galea truncata cuſpidato-2dentata, calycibus hinc fiſſis undulatis, floribus ſpicatis, foliis lanceolatis pinnatifidis ſerrulatis pubeſcentibus, caule proſtrato radicante. *Mexico.*

ſtriata Pall. 19. P. galea obtuſa ſub apice 2dentata, calyce glabro 2labiato $\frac{3}{2}$, floribus ſpicatis, bracteis integerrimis, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus ſerrulatis. *Davuria.*

canadenſis 20. P. galea obtuſa dentibus ſub apice 2 ſetaceis, calyce oblique fiſſo integerrimo incano-pubeſcente, ſpica abbreviata foliata, foliis pinnatifidis inciſo-crenatis laevibus. *Amer. bor.* (Flores albi.)

ramoſa Wormsk. 21. P. galea obtuſa ſub apice 2ſetoſa, calyce 2labiato $\frac{3}{2}$ 5nervio, floribus racemoſis bracteatis, foliis pinnatifidis ſerrulatis ſubtus cauleque ramoſo pubeſcentibus. *Grönland.* (Flores lutei.)

†† *Calyce 5fido.*

ſylvatica 22. P. galea truncata acute 2dentata, calyce inaequaliter 5fido crenulato, floribus ſubſolitariis pedunculatis, foliis 2pinnatifidis, caule erecto ſubramoſo. *Europ.*

myriophylla Pall. 23. P. galea falcata acuta ſub apice 2dentata, calyce inaequaliter 5fido hirſuto, foliis 2pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis ſerratis, caule erecto ramoſo. *Imaus.*

altaica Steph. 24. P. galea obtuſa emarginata 2dentata, calyce 5dentato glabro, floribus ſpicatis, foliis lanceolatis 2pinnatifidis hirſutiuſculis, laciniis linearibus axi proximis decuſſatis. *Imaus.*

rubens Steph. 25. P. galea emarginata crenulata, dentibus ſub apice 2ſetaceis, calyce inaequaliter 5dentato glabro colorato, ſpica folioſa, foliis 2pinnatifidis linearibus acutis. *Sibir. media.*

ſudetica W. 26. P. galea emarginata ſub apice 2dentata, lobis labii inferioris lateralibus ſerrulatis, calycibus 5fidis hirſutis, foliis pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis inaequaliter dentatis. *Sudetes. Sibiria. Amer. bor.*

arctica R. Br. 27. P. galea truncata 2dentata, filamentis longioribus hirſutis, calycibus 5fidis lanatis, foliis pinnatifidis, laciniis ſubovatis inciſo-dentatis. *Inſ. Melvill. Amer. bor.* (75° lat. bor.)

achillaeifolia Steph. 28. P. galeae falcatae declinatae collo anguſtato, dentibus ſub apice 2 ſubulatis, calyce inaequaliter 5fido pubeſcente, racemo ſpicato elongato denſifloro, foliis 2pinnatifidis linearibus dentatis. *Sibir.*

villoſa Ledeb. 29. P. galea emarginata, dentibus breviſſimis 2 ſub apice, calyce 5fido villoſo, ſpica compacta aphylla, foliis pinnatis, laciniis linearibus ſerratis, caule ſimplici villoſo. *Sibir.*

erioſtachys Ledeb. 30. P. galea depreſſa obtuſa, dentibus ſub apice 2 ſetaceis, calyce 5dentato lanato, ſpica compacta abbreviata, foliis pinnatis, laciniis linearibus ſerratis, caule ſimplici. *Sibir.*

alopecuroides Stev. 31. P. galea elongata obtuſa ſub apice 2dentata, calycibus 5dentatis denſe lanatis, ſpica elongata bracteata, foliis pinnatifidis ſubtus incanis, laciniis linearibus ſerratis. *Sibir.*

comoſa 32. P. galea oblique truncata 2dentata, calyce 5fido, ſpica denſa, foliis ſub-2pinnatis, laciniis lineari-lanceolatis argute ſerratis. *Gallia auſtr. Italia. Hungar. Transſylvan. Ucrania. Podolia. Sibiria.*

**** *Galea 3dentata.*

faſciculata Bellard. 33. P. galea adunca 3dentata, calyce 5fido foliaceo, floribus ſpicatis, foliis 2pinnatifidis hirſutis, laciniis obtuſe denticulatis. *Italia ſuperior. Gallia auſtr.*

***** *Galea obtuſa integerrima.*

† *Calyce bifido ſ. bilabiato.*

pallida Pursh. 34. P. galea depreſſa obtuſa, calyce 2fido rotundato, ſpica aphylla glabra, foliis lanceolatis crenatis dentatis. *Amer. bor.* (P. virginica Lam., lanceolata Mx., ſerotina Mühlenb., auriculata Sm. in Rees.)

ſpicata Pall. 35. P. galea abbreviata obtuſa, calyce 2fido rotundato, bracteis ſubintegerrimis, ſpica terminali elongata denſa, floribus inferioribus verticillatis, foliis quaternis lanceolatis ſinuato-pinnatifidis crenatis. *Davuria.*

†† *Calyce 5fido.*

α. ſubfoliaceo.

Sceptrum 36. P. galea obtuſiſſima corollam claudente, calyce foliaceo obtuſo, floribus remote ſpicatis bracteatis, foliis pinnatifidis, laciniis obtuſis denticulatis. *Scandinavia. German. bor. Boruſſia. Hungar. Volhynia.*

flava Pall. 37. P. galea obtuſa depreſſa hiante, calyce foliaceo ſerrulato acuto, ſpica folioſa, foliis pinnatifidis, laciniis remotis lineari-lanceolatis acutis ſerratis. *Sibir. Olymp. Aſiae minoris.* Sibthorp.

caucaſica M.B. 38. P. galea erecta obtuſa patente, lab. inf. dilatato, calycibus ſubfoliaceis ſubulatis ſerrulatis hirſutis, ſpica folioſa, foliis 2pinnatifidis linearibus ſerrulatis. *Caucaſ.*

purpurascens Chamiss. 39. P. galea subdeclinata obtusa, calycibus foliaceis hirsutis, spica foliosa, foliis pinnatifidis linearibus crenulatis. *Ins. Aleut.*

parviflora Sm. 40. P. galea obtusa labium inferius superante, calyce foliaceo, foliis sub-2pinnatifidis. *Ora occ. Amer. bor.* Menzies.

capitata Adam. 41. P. galea obtusa crenulata, calycibus foliaceis, floribus capitatis bracteatis, caule nudo, foliis radicalibus 2pinnatifidis, laciniis inciso-serratis obtusiusculis. *Insul. ostii Lenae.* (75° lat. bor.)

acaulis Scop. 42. P. galea erecta elongata obtusiuscula, calycibus foliaceis, pedunculis 1floris radicalibus aggregatis, foliis pinnatis hirsutis, foliolis ovatis inciso-serratis sessilibus. *Carniolia. Carinthia. Italia super.* (Flores albi s. rubentes.)

β. Calyce 5fido s. 5dentato membranaceo.

recutita 43. P. galea obtusissima labium inferius multo superante, calycibus 5dentatis glabris, spica compacta foliosa, foliis pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis acutis inciso-serratis. *Alp. Europ. med. Ora occ. Amer. bor.* (Flores purpurei.)

foliosa 44. P. galea villosa obtusissima labium inferius aequante, calycibus inaequaliter 5dentatis, spica foliosa, foliis 2pinnatifidis hirsutis, laciniis linearibus inciso-serratis. *Alp. Europ. med.* (Flores ochroleuci.)

verticillata 45. P. galea suberecta obtusa, labio inferiori dilatato, calycibus 5dentatis hirsutis, spica subinterrupta basi foliosa, fructuum rostris elongatis ensiformibus, foliis pinnatifidis, laciniis obtusiusculis crenulatis. *Alp. Europ. med. Sibir. Amer. bor.* (P. gladiata Mx.) (Flores purpurei.)

interrupta Steph. 46. P. galea sub-falcata obtusa, calycibus inaequaliter 5dentatis villosis, verticillis spicatis, bracteis ovatis integerrimis margine lanatis, foliis verticillatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis inaequaliter dentatis. *Sibir.*

elata W. 47. P. galea erecta truncata labium inferius multo superante, calycibus 5dentatis glabris, spica laxa foliosa elongata, bracteis sub-3fidis, foliis pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis crenatis, caule elato. *Sibir. Louisiana.* (Flores purpurei.)

Wilhelmsiana M. B. 48. P. galea erecta obtusissima labium inferius multo superante, calycis lanati dentibus subulatis, spica compacta foliosa, caule lanato subaphyllo, foliis radicalibus 2pinnatifidis villosis. *Caucas.* (Flores purpurei.)

condensata M. B. 49. P. galea obtusa, calycis lanati dentibus inaequalibus, spica compacta foliosa, foliis 2pinnatifidis lineari-lanceolatis dentatis. *Caucas.* (Flores purpurei.)

tristis 50. P. galea obtusa margine villosa, calycibus 5fidis, spica compacta, foliis dentato-pinnatifidis, dentibus argute denticulatis. *Sibir.* (Flores flavi.)

aſparagoides Lapeyr. 51. P. galea recurva obtuſa, labio inf. erecto ipſam amplexante, calycibus glabris coloratis 5dentatis, ſpica oblonga bracteata, foliis 2pinnatis inaequaliter dentatis, radice tuberoſa. *Pyren. orient.* (Fl. purpurei.)

flammea 52. P. galea erecta obtuſa, laciniis lab. inf. anguſtis acutis, calycibus 5dentatis glabris, ſpica pauciflora, foliis pinnatis, foliolis reflexis oblongis obtuſis crenulato - denticulatis, radice tuberoſa. *Lappon. Island. Grönland. Labrador. Sibir. bor.* (Corolla fulva, galea coccinea.)

verſicolor Wahlenb. 53. P. galea erecta truncata, laciniis lab. inf. rotundatis, calycibus 5dentatis piloſis, floribus ſpicatis, foliis pinnatis, foliolis reflexis oblongis obtuſis inciſo - dentatis, radice tuberoſa. *Alp. Europ. med.* (P. flammea Suter. Cand. Baumgart.) (Corolla lutea, galea ferruginea.)

Oederi Vahl. 54. P. galea obtuſa erecta, labio inf. dilatato rotundato, calycibus 5dentatis coloratis piloſis, floribus racemoſo - ſpicatis remotiuſculis foliatis, foliis pinnatis, foliolis ovatis inciſo - ſerratis. *Norvegia.* (P. flammea Oeder. Gunner.) (Flores flavi 1 - colores.)

hirſuta 55. P. galea arcuata obtuſa, lobo medio labii inf. maximo emarginato, calycibus tubuloſis 5dentatis hirſutis, floribus ſpicatis, foliis pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis obtuſe dentatis. *Lappon.* (Flores roſei.)

abrotanifolia Stev. 56. P. galea truncata recta patente, calycibus 5dentatis hirſutis, ſpica compacta bracteata, foliis 2pinnatifidis glabris, laciniis anguſtiſſimis diſtantibus ſerrulatis. *Sibir.*

roſea Jacqu. 57. P. galea erecta obtuſa, lobo medio lab. inf. breviori, calycibus ventricoſis 5dentatis villoſo - lanatis, floribus ſpicatis, foliis 2pinnatifidis linearibus acutis. *Alp. Europ. med.* (P. hirſuta All.) (Flores roſei.)

2159. MELAMPYRUM.

criſtatum 1. M. ſpicis 4angularibus, bracteis cordatis coloratis denſe imbricatis denticulatis, foliis lineari - lanceolatis integerrimis. *Europ. nemora.*

arvenſe 2. M. ſpicis conicis laxis, bracteis coloratis pinnatifido - dentato - ſetaceis ſubtus punctatis, calycibus ſcabris, corollis clauſis. *Europ. ſegetes.* (M. argyrocomum Fiſch. var. bracteis albis.)

barbatum Kit. 3. M. ſpicis conicis laxis, bracteis vireſcentibus dentato - ſetaceis epunctatis ciliatis, calycibus villoſiſſimis, corollis hiantibus. *Hungar. ſeget.*

nemoroſum 4. M. floribus ſecundis lateralibus, bracteis cordato - lanceolatis dentatis, ſummis coloratis ſterilibus, calycibus lanatis. *Europ. nemora.*

pratenſe 5. M. floribus ſecundis lateralibus remotis, bracteis viridibus haſtato - dentatis, calycibus abbreviatis,

foliis lanceolatis integerrimis. *Europ.* (M. ſylvaticum Hudſ., vulgatum Perſ.)

ſylvaticum 6. M. floribus ſecundis lateralibus remotis, foliis bracteisque conformibus lineari-lanceolatis integerrimis, calycis dentibus elongatis. *Europ. alp.* (M. alpeſtre Perſ. ſaxoſum Baumg.)

lineare Lam. 7. M. floribus ſecundis lateralibus remotis, bracteis ſuperioribus latioribus baſi dentatis, calycis dentibus ſubelongatis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis. *Amer. bor.*

2160. ORTHOCARPUS Nutt.

luteus Nutt. *Ad fl. Miſſuri.* Herba annua ſimplex, foliis lineari-lanceolatis integerrimis *alternis*, floribus axillaribus ſeſſilibus, bracteis cuneatis divaricato-3fidis calycibusque viſcido-pubeſcentibus, corollae flavae tubo calycem ſubaequante.

2161. GOMARIA R. et P.

racemoſa R. et P. *Peru.* Arbor foliis oblongo-lanceolatis apice denticulatis, floribus racemoſis.

2162. SCROFULARIA.

* *Foliis ſimplicibus, indiviſis,*

† *ovatis, oblongis, lanceolatis.*

cretacea Fiſch. 1. Scr. foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis petiolatis ſerratis glabris, floribus racemoſis. *Sibir.*

Schellii * 2. Scr. foliis lanceolatis acutis utrinque glabris aequaliter ſerrulatis breviter petiolatis, petiolis dilatatis, caule 4angulo laevi, paniculae terminalis ramis trichotomis. *Patria?*

lanceolata Pursh. 3. Scr. foliis lanceolatis acuminatis inaequaliter ſerratis, petiolis nudis, paniculae faſciculis corymboſis. *Penſylvan.*

meliſſaefolia Urv. 4. Scr. foliis ovato-lanceolatis argute ſerratis petiolatis, caule 4angulo laevi, paniculae elongatae ramis pubeſcentibus multifloris, bracteis lanceolatis ſerratis. *Aſia minor.*

orientalis 5. Scr. foliis lanceolatis elongatis acuminato-cuſpidatis argute ſerratis utrinque glabris petiolatis, inferioribus ternis ſuperioribus oppoſitis, paniculae pubeſcentis ramis corymboſis. *Aſia minor. Sibir.*

rupeſtris MB. 6. Scr. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis inaequaliter dentatis ſubtriplinerviis glabris, caule teretiusculo incano-pubeſcente, paniculae ramis ſubdichotomis racemoſis. *Tauria.*

fruteſcens 7. Scr. foliis ſubcarnoſis nitidis glabris dentatis, inferioribus petiolatis obovatis, ſuperioribus ob-

longis apice recurvis, paniculae ramis remotis 2fidis multifloris. *Lufitan. Afric. bor.*

ramofiffima Loif. 8. Scr. foliis oblongis utrinque attenuatis incifo-ferratis utrinque glabris, caule humili ramofiffimo, pedunculis 1floris. *Corfica. Gallia provinc.* (Scr. frutefcens Cand.)

afcendens W. 9. Scr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis profunde inaequaliter duplicato-dentatis glabris, racemo terminali. *Patria?*

coccinea 10. Scr. foliis quaternis ovatis amplexicaulibus ferratis, floribus verticillatis fpicatis. *Nov. Hifpan.*

minima MB. 11. Scr. foliis ovatis fublobatis denticulatis petiolatis cauleque fimpliciffimo humili fubvifcidis, capitulo terminali. *Caucaf.*

†† *Foliis cordatis.*

marilandica 12. Scr. foliis cordato-lanceolatis acuminatis profunde ferratis utrinque cauleque obtusangulo laevibus, paniculae ramis remotis alternis corymbofis. *Amer. bor.*

peregrina 13. Scr. foliis cordato-ovatis acutis inaequaliter dentatis utrinque cauleque obtusangulo glabris, pedunculis axillaribus paucifloris. *Italia.*

nodofa 14. Scr. foliis cordato-oblongis acutis ferratis fubtrinerviis cauleque acutangulo glabris. *Europ.*

aquatica 15. Scr. foliis fubcordato-oblongis ferratis utrinque glabris in petiolos decurrentibus, caule alato, pedunculis axillaribus corymbofis. *Europ.*

glabrata Ait. 16. Scr. foliis fubcordato-oblongis obtufiusculis inaequaliter dentatis utrinque glabris, paniculae ramis trichotomis glandulofo-pubefcentibus. *Inf. Canar. Hifpan. auftr.* (Scr. Smithii Hornem., nepetaefolia Presl.)

biferrata W. 17. Scr. foliis profunde cordatis oblongo-lanceolatis argute duplicato-ferratis glabris, paniculae ramis trichotomis. *Patria?*

arguta Ait. 18. Scr. foliis cordatis duplicato-ferratis glabris, paniculis axillaribus dichotomis. *Inf. Canar.*

vernalis 19. Scr. foliis cordato-ovatis duplicato-dentatis pubefcentibus, caule villofo, pedunculis axillaribus corymbofis paucifloris. *Europ.* (Scr. cordata Perf.)

glandulofa Kit. 20. Scr. foliis cordato-oblongis inaequaliter crenatis pubefcentibus, petiolis ciliatis, pedunculis bracteisque glandulofo-pilofis. *Carniolia. Hungar.* (Scr. auriculata Scop., rugofa W., nepetaefolia Sm., Scopolii Hopp. Perf.)

Scorodonia 21. Scr. foliis cordato-oblongis profunde rectangulo-duplicato-ferratis fubtus cauleque obtusangulo villofis, paniculae ramis foliatis. *Inf. Caefarea ad oram Armoricae.* (Jerfey.) *Cornubia. Italia.* (Scr. grandidentata Tenor.)

altaica Murr. 22. Scr. foliis cordatis duplicato-dentatis fubtus pubefcentibus, racemis terminalibus villofis, laciniis calycis patentibus lanceolatis acutis. *Imaus.*

23.

betonicaefolia 23. Scr. foliis cordato-oblongis ſimpliciter argute dentatis rugoſis ſubtus pubeſcentibus, dentibus baſeos profundioribus, panicula terminali foliata. *Luſitan. Ital.* (Scr. hirſuta Hornem.)

** *Foliis baſi appendiculatis ternatisque.*

appendiculata Jacq. 24. Scr. foliis cordato-ovatis duplicato crenato-ſerratis glabris baſi appendiculatis, petiolis dilatatis, paniculae ramis abbreviatis paucifloris. *Ager tunetanus.*

Balbiſii Hornem. 25. Scr. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis crenatis utrinque glabris, inferioribus appendiculatis, petiolis dilatatis, panicula terminali aphylla. *Italia.* (Scr. auriculata All.)

auriculata 26. Scr. foliis cordato-oblongis obtuſis duplicato-dentatis ſubtus hirſutis baſi appendiculatis, petiolis aequalibus, racemis terminalibus. *Hiſpan.*

micrantha Urv. 27. Scr. foliis oblongis obtuſis groſſe dentatis baſi appendiculatis, racemo terminali compoſito, floribus minimis, caule glabro aſcendente. *Inſ. Thera maris aegei.*

heterophylla W. 28. Scr. foliis ſubcarnoſis ternatis trilobis ſimplicibusque inciſo-dentatis glabris longe petiolatis, racemis longiſſimis paniculatis, caule fruteſcente. *Creta. Inſ. maris aegei.*

trifoliata 29. Scr. foliis ſubcarnoſis ſubrotundis obtuſis inaequaliter dentatis glabris, inferioribus ternatis ſuperioribus ſimplicibus, pedunculis axillaribus abbreviatis ſubtrifloris. *Corſica.*

*** *Foliis inciſis, laciniatis.*

laciniata Kit. 30. Scr. foliis cordato-oblongis ſublyrato-lobatis dentato-ſerratis integrisque utrinque glabris, petiolis aequalibus, paniculae terminalis ramis glanduloſo-pubeſcentibus. *Croatia.* (Scr. verbenaefolia Poir.)

deſerti Delil. 31. Scr. foliis lyrato-pinnatifidis glabris margine cartilagineis dentatis, lobis obtuſis, paniculae terminalis ramis glabris paucifloris, caule fruteſcente. *Aegypti deſert.*

pinnatifida Brot. 32. Scr. foliis lanceolatis utrinque attenuatis pinnatifidis glabris, laciniis acutis inaequaliter ſerratis, racemo compoſito terminali, caule fruteſcente. *Luſitan.*

caeſia Sm. 33. Scr. foliis lyrato-pinnatifidis inciſis glauceſcentibus, panicula terminali pauciflora, caulibus caeſpitoſis herbaceis. *Graecia.*

variegata MB. 34. Scr. foliis ovatis pinnatifido-laciniatis dentatis ſubpubeſcentibus, pedunculis axillaribus ſubtrifloris glanduloſo-hiſpidis, caule fruticoſo. *Caucaſ.*

ebulifolia MB. 35. Scr. foliis ternis glabris palmato-pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis inaequaliter ſerratis baſi ſubinciſis, racemis terminalibus paniculatis. *Caucaſ.*

grandiflora Cand. 36. Scr. foliis oppofitis lyratis villofis, fummis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus 3fidis 5floris folio brevioribus. *Amer. auftr.?*

**** *Foliis pinnatis.*

lyrata W. 37. Scr. foliis interrupte pinnatis fubcordato-oblongis bafi inaequalibus, paniculae terminalis pedunculis dichotomis. *Patria?*

mellifera Ait. 38. Scr. foliis pinnatis ternatisque glabris, foliolis ovatis crenato-ferratis, pedunculis axillaribus abbreviatis fubcymofis. *Corfica. Afr. bor.* (Scr. viridiflora Poir.)

fambucifolia 39. Scr. foliis pinnatis ternatisque cauleque herbaceo villofis, pedunculis axillaribus abbreviatis 3floris, corollis amplis. *Patria?*

Sibthorpiana * 40. Scr. foliis pinnatis lobatisque incifis glaucefcentibus, floralibus elliptico-lanceolatis integerrimis, panicula cylindrica, caule fruticofo. *Graecia.* (Scr. frutefcens Sm.)

hifpida Desf. 41. Scr. foliis pinnatis duplicato-crenatis villofis, terminali maximo cordato, racemo compofito terminali aphyllo, caule herbaceo hifpido. *Atlas.*

tanacetifolia W. 42. Scr. foliis pinnatis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis fubpinnatifidis incifo-dentatis, paniculae terminalis ramis remotis corymbofis. *Amer. boreal.*

canina 43. Scr. foliis pinnatis glabris, foliolis oblongo-lanceolatis bafi attenuatis incifo-dentatis, paniculae terminalis ramis dichotomis, lobis lab. inf. lateralibus integerrimis, caule tereti. *Europ. auftr.*

chrysanthemifolia W. 44. Scr. foliis glabris, radicalibus 2pinnatifidis, caulinis pinnatis, foliolis lanceolatis incifo-dentatis, floralibus integerrimis, panicula diffufa foliofa, laciniis lab. inf. lateralibus emarginatis. *Tauria. Afia minor.* (Scr. bicolor Sibth. Sm.)

lucida 45. Scr. foliis fubcarnofis glabris nitidis, inferioribus 2pinnatifidis, fuperioribus cuneiformibus incifis, paniculae terminalis foliofae ramis dichotomis. *Italia. Graecia. Tauria. Afia minor.*

filicifolia Mill. 46. Scr. foliis interrupte 2pinnatifidis glabris, foliolis laciniisque divaricatis lanceolatis incifis mucronato-dentatis, caule fimplici quadrangulo, paniculae terminalis ramis abbreviatis foliatis. *Creta.*

multifida W. 47. Scr. foliis 2pinnatis glabris, foliolis lineari-lanceolatis acute incifo-dentatis, paniculae terminalis ramis remotis alternis paucifloris. *Sicil. Afia minor.* (Scr. filaifolia Clark.)

livida Sm. 48. Scr. foliis 2pinnatis angulato-incifis dilatatis, paniculae ftrictae ramis virgatis fub-5floris, caule herbaceo. *Afia minor.*

2163. DIGITALIS.

** Corollae ventricofae labio fuperiori transverfo.*

purpurea 1. D. foliis oblongis crenatis rugofis pubefcentibus, pnduculis rectis calyces aequantibus, laciniis calycis ovato-oblongis. *Europ. montofa fylvatica.*

Thapfi 2. D. foliis oblongis crenatis rugofis undulatis decurrentibus nudiusculis, caule fuperne villofo, pedunculis arcuatis calyces multo fuperantibus, laciniis calycis lanceolatis. *Hifpan.*

tomentofa Link. 3. D. foliis oblongis inaequaliter crenato-dentatis fubtus villofo-tomentofis fubdecurrentibus, caule fuperne villofiffimo, pedunculis patulis calyces aequantibus, laciniis ovato-oblongis. *Lufitan.* (D. Thapfi Brot.)

fufcefcens Kit. 4. D. foliis oblongis ferrulatis venofis fubtus ad venas pilofis, pedunculis calyce brevioribus laciniisque lanceolatis glandulofo-villofis, corollae reticulatae labio fup. obtufiffimo, inferioris lacinia media ovata fubreflexa. *Croatia.*

grandiflora Lam. 5. D. foliis lanceolatis ferrulatis nervofo-venofis pubefcentibus, pedunculis calyces aequantibus laciniisque linearibus villofis, corollae reticulatae pubefcentis lab. fup. praemorfo, inferioris laciniis ovatis. *Europ. med.* (D. ambigua Murr. Lindl.)

ochroleuca Jacq. 6. D. foliis ovato-ellipticis venofis denticulatis cauleque vifcido-villofiusculis, pedunculis calyce fubbrevioribus, laciniis lanceolatis, corollae lobis breviffimis obtufis. *German.* (D. ambigua Schk.)

fulva Lindl. 7. D. foliis lanceolatis remote ferrulatis venofis ciliatis, pedunculis alternis calyce brevioribus, laciniis lanceolatis, corollae pubefcentis fubreticulatae lobo medio lab. inf. triangulari fubporrecto. *Patria?*

chinenfis Lour. 8. D. foliis ovatis acutis ferratis pilofis petiolatis, floribus axillaribus folitariis, laciniis calycis fubulatis, corollae lobis obtufis. *China.*

cochinchinenfis Lour. 9. D. foliis oppofitis lanceolatis integerrimis afperis, floribus axillaribus folitariis feffilibus, laciniis calycis acutis, corollae lobis obtufis. *Cochinchina.*

*** Corollae fubventricofae lobo medio lab. inf. porrecto tubum fubaequante.*

laevigata Kit. 10. D. caule ftricto foliisque lanceolatis elongatis denticulatis laevibus, floralibus linearibus, racemi elongati pedunculis remotis abbreviatis, laciniis calycis lanceolatis acutis, corollae labio inferiori ovato porrecto fupra pilofo. *Croatia.*

ferruginea 11. D. caule ftricto foliisque lanceolatis elongatis fubintegerrimis laevibus, racemi elongati pedunculis confertis, laciniis calycis obtufis margine

ſcarioſis, corollae labio inferiori porrecto obtuſo villoſo. *Italia. Caucaſ.*

ſibirica Lindl. 12. D. caule ramoſo villoſo, foliis lanceolatis dentatis, corollae villoſae laciniis ovatis acutis. *Sibiria.*

aurea Lindl. 13. D. foliis lanceolatis nervoſis ſubdentatis, racemi pedunculis confertis breviſſimis, laciniis calycis ſubrotundis obtuſis marginatis, corollae venoſo-reticulatae labio inf. porrecto tridentato. *Graecia. Aſia minor.* (D. ferruginea Sm.)

leucophaea Sm. 14. D. ſpica cylindrica denſiſſima, bracteis flore longioribus, calycibus ciliatis, corollae labio inferiori ſpathulato obtuſo pubeſcente. *Mons Athos Macedoniae.*

lanata Ehrh. 15. D. ſpica pyramidata denſa lanata, bracteis calyce longioribus laciniisque lanceolatis, corollae labio inf. porrecto oblongo obtuſo. *Hungaria. Tranſſylvan. Sicil.* (D. nova Winterl. ind. peſt., Winterli Roth.)

orientalis Lam. 16. D. caule ſuperne ramoſo pubeſcente, inferne foliisque linearibus integerrimis nervoſis laevibus, floribus ſparſis ſubſeſſilibus, laciniis calycis oblongis tubum corollae aequantibus, corollae labio inf. porrecto oblongo integerrimo. *Aſia minor.*

purpuraſcens Roth. 17. D. caule ſimplici foliisque lanceolatis venoſis ſerrulatis glabriuſculis, floribus racemoſis ſecundis, laciniis calycis lanceolatis acutis tubo corollae multo brevioribus, lobis omnibus corollae obtuſis integerrimis erectis, infimo porrecto. *German. occ.* (D. erubeſcens Ait.)

*** *Corollae labio ſuperiori bifido.*

minor 18. D. caule laevi, foliis radicalibus lanceolatis ſubintegerrimis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, ramis paucifloris, pedunculis elongatis villoſis, corollae glaberrimae lobis obtuſis. *Hiſpania.*

parviflora Jacq. 19. D. caule ſimplici ſtricto villoſo, foliis ſpathulato-lanceolatis nervoſo-venoſis integerrimis laevibus margine lanatis, racemo denſe ſpicato elongato, floribus horizontalibus tubuloſis, laciniis calycis ovatis obtuſis, corollae lobis abbreviatis obtuſis ſubaequalibus. *Patria?*

micrantha Roth. 20. D. caule ſtricto foliisque lanceolatis remote ſerratis nitidis glabris, ſuperioribus integerrimis, racemo ſubconferto aequali, floribus nutantibus glabris, lobis corollae ſuberectis obtuſis. *Helvetia.*

obſcura 21. D. caule ſuffruticoſo, foliis lineari-lanceolatis integerrimis baſi adnatis, racemo paucifloro ſecundo, laciniis calycis ovatis, corollae reticulatae lobis obtuſis recurvis. *Hiſpania.*

media Roth. 22. D. foliis lanceolatis remote ſerrulatis venoſis glabriuſculis ciliatis, racemo ſecundo, corollae ventricoſae lobis acutis, labio inf. ovato barbato

reflexo, capſula 4ſulca. *German. occid.* (D. intermedia Perſ.)

ſlutea 23. D. foliis lanceolatis remote ſerratis venoſis glabris, racemo ſecundo, corollae tubuloſae lobis acutis, labio reflexo, capſula biſulca. *Gallia. Italia.* (D. parviflora All., tubiflora Lindl. var.)

luteſcens Lindl. 24. D. foliis cordato-oblongis crenatis glabris, racemo ſecundo, bracteis flore brevioribus, lobis corollae obtuſis. *Patria?*

rigida Lindl. 25. D. glanduloſo-piloſa, foliis oblongis inaequaliter ſerratis, racemo ſecundo, laciniis calycis lanceolatis, corollae ovatis ſubaequalibus. *Patria?*

viridiflora Lindl. 26. D. glanduloſo-piloſa, foliis oblongis dentatis, bracteis flore longioribus, laciniis calycis linearibus, corollae (viridis) ſubaequalibus. *Mons Athos Macedoniae.*

Roxburghii Roth. 27. D. papilloſo-muricata, foliis ovato-oblongis obtuſis integerrimis, floribus terminalibus ſubſolitariis, calycibus ſtrigoſis ſubovatis conniventibus. *Ind. or.*

canarienſis 28. D. fruteſcens glabra, foliis lanceolatis mucronato-ſerratis reticulato-venoſis, racemo terminali, laciniis calycis lanceolatis elongatis, labio corollae ſuper. longiori bilobo, reliquis acutis aequalibus. *Inſ. Canar.*

Sceptrum 29. D. fruticoſa, ramis foliisque oblongis acuminatis ſerratis ſubtus hirſutis, ſpica comoſa, laciniis calycis linearibus, corollae obtuſae labio ſup. bifido, inf. lobo medio ſubrotundo lateralibus ovatis duplo latiori. *Madera.*

2164. LINARIA Tourn.

* *Fruticoſae.*

fruticoſa Desf. 1. L. caule fruticoſo erecto villoſo, foliis ſparſis ovato-oblongis baſi utrinque 1dentatis, floribus axillaribus pedicellatis, calcare corollam excedente ſubarcuato. *Montes Afric. bor.*

ſpineſcens * 2. L. caule ſuffruticoſo ramoſo pubeſcente, ramis ſpineſcentibus, foliis ſparſis ſubſeſſilibus ovatis dentatis hiſpidulis, floribus axillaribus pedicellatis, calcare arcuato corollam aequante. *Montes Cyren.* Cella. (Antirrhinum Viv.)

fruticans * 3. L. caule fruticoſo decumbente ramoſo, foliis oppoſitis ſubſeſſilibus ovatis integerrimis margine revolutis aſperis, floribus pedunculatis axillaribus. *C. B. S.* (Antirrhinum Thunb.)

dalmatica Buxb. 4. L. caule ſuffruticoſo ramoſo glabro, foliis ſemiamplexicaulibus cordato-oblongis acutis glaberrimis integerrimis, floribus racemoſis amplis, calcare recto corollam aequante. *Dalmatia. Transſylvan. Armenia.* (Antirrhinum L.)

ſcoparia Brouſſonet. 5. L. caule fruticoſo ramoſo, ramis virgatis glaberrimis inferne aphyllis, foliis linearibus an-

gustissimis, pedunculis axillaribus capillaribus subracemosis, calcare ascendente. *Teneriffa.*

** *Herbaceae.*

† *Caule prostrato.*

a. Foliis lobatis, angulatis, dentatis.

Cymbalaria W. 6. L. foliis alternis cordatis 5lobis glabris, floribus pedunculatis axillaribus subsolitariis, calcare brevi. *Europ.* (Antirrhinum L., A. hederaefolium Poir., acutangulum Tenor.)

pubescens Presl. 7. L. foliis alternis cordato-reniformibus 5lobis pubescentibus, floribus pedunculatis axillaribus subsolitariis, laciniis calycis linearibus, caule filiformi longissimo repente. *Neapol. Sicil.* (Antirrhinum pubescens et pallidum Tenor.)

pilosa Cand. 8. L. foliis alternis reniformi-orbiculatis obtuse 5lobis crenatisque pilosissimis, caule procumbente sublanato, floribus axillaribus longe pedunculatis. *Italia.* (Antirrhinum L.)

hepaticaefolia * 9. L. foliis suboppositis carnosis glaberrimis 3lobis, lobo medio maximo, lateralibus mucronatis, pedunculis axillaribus subgeminis elongatis, laciniis calycis obtusis, calcare abbreviato. *Corsica.* (Antirrhinum Poir.)

aequitriloba * 10. L. pilosa, foliis omnibus 3lobis, lobis aequalibus rotundatis, caule repente filiformi, pedunculis axillaribus elongatis, calcare brevi. *Corsica.* (Antirrhinum Viv.)

scariosa Desf. 11. L. foliis oppositis sparsisque ovato-oblongis villosis, inferioribus basi angulato-dentatis, superioribus integerrimis, floribus axillaribus breviter pedunculatis, calycibus hirsutis scariosis, calcare arcuato abbreviato, caule prostrato lanato. *Afric. bor.* (Antirrhinum scariosum Lam., dentatum Vahl.)

caucasica Mussin. 12. L. foliis sparsis oblongis mucronato-dentatis pilosis, pedunculis axillaribus elongatis filiformibus, calyce herbaceo acuto, caule procumbente pilosissimo. *Caucas.*

Elatine Desf. 13. L. foliis sparsis ovatis hastatis cauleque procumbente pilosiusculis, pedunculis axillaribus 1floris elongatis. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (Antirrhinum L.)

elatinoides Desf. 14. L. foliis subsessilibus oblongis obtusis cauleque procumbente glabriusculis, inferioribus crenato-dentatis, floribus breviter pedunculatis, calcare corollam aequante. *Afric. bor.*

heterophylla * 15. L. foliis sparsis supra glabris subtus pubescentibus, inferioribus hastatis lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis basi integerrimis, pedunculis elongatis capillaribus, corolla inflata. *Marocco.* (Antirrhinum heterophyllum Schousb. W., sagittatum Poir.)

cirrhoſa W. 16. L. foliis ſparſis haſtatis lineari-lanceolatis cauleque procumbente diffuſo glabris, ramis petiolisque flexuoſis, pedunculis capillaribus elongatis, calcare recto. *Aegypt.* (Antirrhinum L.)

β. *Foliis ſubintegerrimis.*

ſpuria W. 17. L. foliis ſparſis ſubrotundo-ovatis mucronatis ſubintegerrimis ſuperioribus ſubſeſſilibus cauleque procumbente villoſis, pedunculis oppoſitifoliis ſolitariis, laciniis calycis oblongis. *Europa.* (Antirrhinum L.)

lanigera Desf. 18. L. foliis ſparſis breviter petiolatis ſubcordato-ovatis acutis integerrimis cauleque proſtrato ramoſiſſimo lanatis, pedunculis axillaribus ſolitariis, calcare arcuato. *Afric. bor. Luſitan.* (Antirrhinum ſpurium Brot.)

dealbata Link. 19. L. foliis ſparſis petiolatis ſubcordato-ovatis villoſiſſimis, inferioribus dentatis, pedunculis axillaribus abbreviatis, calcare arcuato, caule procumbente ramoſiſſimo lanato. *Luſitan.* (Antirrhinum lanigerum Brot.)

polygonifolia * 20. L. foliis ſubverticillatis oppoſitisque ſeſſilibus ovatis cauleque proſtrato ramoſiſſimo glabris, floribus ſubſpicatis, calyce hiſpido. *Ad Gibraltar.* (Antirrhinum Poir.)

†† *Caule erecto.*

α. *Foliis inferioribus oppoſitis ſ. verticillatis.*

αα. *Foliis latioribus, ovatis ſ. oblongis.*

latifolia Desf. 21. L. foliis ternis oppoſitisque oblongo-lanceolatis ſubtrinerviis ramisque glaberrimis, floribus racemoſo-ſpicatis, calycibus elongatis, calcare recto corollam aequante. *Afric. bor.*

triphylla W. 22. L. foliis ternis ovato-oblongis obtuſis 3nerviis margine ſcabris glaueſcentibus, floribus racemoſo-ſpicatis, laciniis calycis lanceolatis, calcare rectiuſculo corollam ſubſuperante. *Europ. auſtr. Aſia minor.* (Antirrhinum 3phyllum L., neglectum Clark.)

reflexa Desf. 23. L. foliis ternis alternisque obovatis mucronatis ſubtrinerviis cauleque aſcendente glaberrimis, pedunculis ſubcorymboſis demum reflexis, galea bifida erecta, calcare recto corollam ſuperante. *Italia. Afric. bor.* (Antirrhinum L.)

origanifolia Cand. 24. L. foliis oppoſitis obovato-oblongis ſubrotundisque glabriuſculis, ramis erectis ſuperne glanduloſo-pubeſcentibus, floribus racemoſis, fauce corollae aperta, calcare abbreviato. *Gallia auſtr. Hiſpan. Luſitan.* (Antirrhinum origanifolium L., craſſifolium Cav., Anarrhinum W.)

cretacea Fiſch. 25. L. foliis verticillatis oppoſitisque ſeſſilibus ovatis acutis craſſiuſculis glaucis cauleque glaberrimis, floribus terminalibus aggregatis, fauce corollae aperta, calcare abbreviato. *Sibir.*

rhegina * 26. L. foliis glabris, inferioribus oppofitis fpathulatis fuperioribus alternis fubrotundis, caule ramofo caefpitofo, pedunculis racemofis elongatis laevibus, fauce corollae claufa, calcare recto elongato. *Rhegium in Calabria.* (Antirrhinum proftratum Cyrill.)

virgata Desf. 27. L. foliis glabris glaucis, inferioribus ternis ovato-oblongis fuperioribus alternis lanceolatis, floribus fubfpicatis, bracteis patenti-reflexis, calcare corollam excedente. *Afric. bor.* (Antirrhinum Poir. Vent.)

thymifolia Cand. 28. L. foliis ternis oppofitisque feffilibus ovali-oblongis glaucefcentibus, floribus terminalibus fafciculatis, calcare incurvo abbreviato. *Ad oftium Aturi prope Baionnam.* (Antirrhinum Vahl.)

flava Desf. 29. L. foliis ternis oppofitis alternisque obovato-oblongis glaucis, floribus terminalibus fubcapitatis, galea bifida, calcare corollam aequante. *Afric. bor.* (Antirrhinum Poir. Vent.)

flexuofa Desf. 30. L. foliis oppofitis fparfisque fpathulatis obtufis glaberrimis in petiolum decurrentibus, ramis pedunculisque elongatis fubracemofis flexuofis, calcare brevi recurvo. *Afric. bor.*

transtagana * 31. L. foliis verticillatis confertisque obovatis fubcarnofis cauleque ftricto fimplici glaucis glaberrimis, floribus terminalibus pedunculatis, calcare incurvo. *Hifpan. Lufitan.* (Antirrhinum lufitanicum Link., pedunculatum Poir.)

tenella * 32. L. foliis oppofitis cordato-ovatis acutis petiolatis cauleque tenero afcendente villofis, pedunculis axillaribus folitariis elongatis, fauce corollae pervia. *Valentia Hifpaniae auftr.* (Anarrhinum W.)

alfinaefolia * 33. L. foliis verticillatis oppofitisque ovatis acutis in petiolos attenuatis ramisque hirfutis, floribus axillaribus, laciniis calycis lineari-fetaceis, calcare recto fubulato breviffimo. *Infulae cunicularíae in freto Sardiniam a Corfica fejungente.* (Antirrhinum Viv.)

oppofitiflora * 34. L. foliis oppofitis ovalibus petiolatis fubtus ramisque villofis, pedunculis axillaribus oppofitis hifpidis, calcare inflato obtufo abbreviato. *Marocco.* (Antirrhinum Poir.)

villofa * 35. L. foliis oppofitis ovatis fubfeffilibus trinerviis ramisque villofis, pedunculis axillaribus folia fuperantibus, calcare incurvo elongato. *Hifpania.* (Antirrhinum L.)

fcabra * 36. L. foliis oppofitis fubcordato-ovatis acutis ferratis 5nerviis breviter petiolatis glabris, pedunculis axillaribus folitariis folio brevioribus. *Afr. auftr.* (Antirrhinum Thunb.)

rubrifolia Cand. 37. L. foliis infimis oppofitis ovalibus in petiolum attenuatis fubcarnofis rubentibus, fuperioribus fparfis oblongis ramisque villofis, calycibus 5fepalis patentiffimis linearibus, fauce corollae

aperta, calcare ſubulato, capſula ſubevalvi. *Gall. auſtr.* (Antirrhinum origanifolium Gouan.)

ocimifolia * 38. L. foliis infimis quaternis ovato-oblongis ſuperioribus lineari-lanceolatis, caule tenero humili ſimplici villoſo paucifloro, calcare breviſſimo. *Hiſpan.* (Antirrhinum Pourr.)

ββ. *Foliis lanceolatis.*

ſaxatilis Cand. 39. L. viſcido-pubeſcens, foliis verticillatis oppoſitisque lanceolatis, floribus ſpicatis, calcare abbreviato recto. *Armoric. Hiſpan. Luſitan.* (Antirrhinum ſaxatile L. Tournefortii Poir. pubeſcens Perſ. L. glutinoſa Link. var. ?)

hirta W. 40. L. villoſa, foliis infimis oppoſitis reliquis alternis ſeſſilibus lanceolatis, floribus ſubſpicatis, bracteis reflexis, calycibus obtuſis, calcare elongato rectiuſculo. *Hiſpania. Luſitania.* (Antirrhinum L.)

triornithophora W. 41. L. glaberrima, foliis verticillatis oppoſitisque ſemiamplexicaulibus lanceolatis ſubtrinerviis, floribus verticillato-racemoſis, galea revoluta, calcare longiſſimo. *Aſturia. Luſitania.* (Antirrhinum L.)

marginata Desf. 42. L. glabra, foliis verticillatis oppoſitisque lanceolatis glaucis, floribus terminalibus faſciculatis, galea reflexa, calcare corollam aequante. *Ad Atlantem.*

parviflora Desf. 43. L. glabra, foliis verticillatis ſparſisque lanceolatis ſeſſilibus glaucis, floribus racemoſo-ſpicatis minimis, calcare breviſſimo. *Afric. bor.*

albifrons * 44. L. glabra, foliis verticillatis ſparſisque lanceolatis glaucis, calcare breviſſimo, ſeminibus alveolatis. *Rhodus.* (Antirrhinum Sibth.)

bipartita W. 45. L. foliis inferioribus ternis lanceolatis, ſuperioribus oppoſitis ſparſisque anguſtioribus, floribus ſpicato-racemoſis, galea 2partita, calcare corollam excedente. *Marocco.* (Antirrhinum Vent. L. ſpecioſa Jacq. fil.)

† *patens* * 46. L. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus lanceolatis acutis ſubintegerrimis glabris, floribus terminalibus ſolitariis. *C. B. S.* (Antirrhinum Thunb.)

γγ. *Foliis lineari-lanceolatis.*

minor Cand. 47. L. foliis oppoſitis ſparſisque lineari-lanceolatis obtuſiuſculis, caule ramoſo diffuſo glanduloſo-piloſo, pedunculis axillaribus calyce multo longioribus. *Europa.* (Antirrhinum L.)

litoralis W. 48. L. foliis oppoſitis ſparſisque lineari-lanceolatis obtuſis, caule ſtricto villoſo, pedunculis axillaribus calycem aequantibus. *Auſtria litoralis.* (Antirrhinum Bernh.)

chalepenſis Mill. 49. L. foliis lineari-lanceolatis acutis glabris, infimis verticillatis, ſuperioribus ſparſis, floribus racemoſis, calycibus ſub-5ſepalis corolla longioribus, calcare incurvo longiſſimo. *Italia. Gallia*

auſtr. (Antirrhinum chalepenſe L., album Lam., Oſyris Cyrill.)

triſtis Mill. 50. L. foliis lineari-lanceolatis glaucis, inferioribus verticillatis ſuperioribus ſparſis, floribus racemoſis, calcare elongato diſcolore. *Hiſpania.* (Antirrhinum triſte L., aerugineum Gouan.)

verſicolor Mönch. 51. L. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus ternis, caule ſtricto ſuperne villoſo-viſcidulo, floribus racemoſo-ſpicatis, calcare elongato diſcolore, capſula ſubevalvi. *Gallia auſtr.* (Antirrhinum verſicolor Jacq.)

hians * 52. L. foliis lineari-lanceolatis ternis ſparſisque, caule ſtricto ſuperne glabro, floribus racemoſis, fauce corollae hiante, calcare breviusculo. *Europ. auſtr.* (Antirrhinum linarioides L.)

micrantha * 53. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-lanceolatis obtuſiusculis patentibus, floribus faſciculatis, calcare breviſſimo. *Hiſpan.* (Antirrhinum micranthum Cav.)

viſcoſa * 54. L. foliis verticillatis oppoſitisque lineari-lanceolatis cauleque ſuperne viſcido-villoſis, floribus ſparſis, calycibus foliaceis, calcare abbreviato. *Hiſpan.* (Antirrhinum viſcoſum L.)

purpurea Mill. 55. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-lanceolatis ſubtus trinerviis cauleque ramoſo laevibus, floribus racemoſo-ſpicatis, fauce corollae aperta, calcare incurvo corollam aequante. *Neapol.* (Antirrhinum purpureum L., L. purpuraſcens Hornem.)

arenaria Cand. 56. L. foliis verticillatis ſparſisque ſubſpathulato-linearibus ſeſſilibus, caule ſimplici ſuperne viſcidulo-pubeſcente, floribus racemoſo-ſpicatis, bracteis erectis calycem aequantibus, calcare abbreviato ſubulato. *Armorica.* (Antirrhinum ſaxatile Bonam.)

alpina Cand. 57. L. foliis verticillatis ſparſisque ſpathulatis ſubcarnoſis glaucis, caule diffuſo glabro, floribus racemoſis, calcare rectiuſculo corollam aequante. *Alp. Europ. med.* (Antirrhinum alpinum L., ſubalpinum Brot.)

luſitanica Tourn. 58. L. foliis ternis ſparſisque lineari-lanceolatis glaucis, ramis ſterilibus proſtratis floriferis aſcendentibus, floribus laxe racemoſis, calcare rectiuſculo corollam aequante. *Luſitania.* (Antirrhinum luſitanicum Vent. Brot. polygalaefolium W. herb.)

pyrenaica Cand. 59. L. foliis verticillatis ſparſisque lineari-lanceolatis glaucis, caule aſcendente ſuperne villoſiusculo, floribus ſubſpicatis, lacinia calycis ſuprema longiore, calcare recto ſtriato corollam aequante. *Pyren. Gallia. Aegypt.* (Antirrhinum pyrenaicum Ramond., Haelava Forsk., Thuillerii Merat.)

laxiflora Desf. 60. L. foliis linearibus obtuſis glaucis, infimis quaternis ſuperioribus ſparſis, caule ſubaſcendente ſuperne glabro, floribus laxe racemoſis, galea

acute 2fida, calcare corollam duplo ſuperante. *Afric. bor.*

Peliſſeriana Cand. 61. L. foliis inferioribus quaternis lanceolato-linearibus, ſuperioribus ſparſis linearibus, floribus corymboſis, calcare recto corollam excedente. *Gallia. Italia.* (Antirrhinum Peliſſerianum L., gracile et elegans Perſ. varr.?)

δδ. Foliis exacte linearibus.

†*procera* Cand. 62. L. foliis infimis verticillatis ſuperioribus ſparſis glabris, caule ſimpliciuſculo, floribus denſe racemoſis, calcare calycem ſuperante. *Patria?*

ſtriata Cand. 63. L. foliis verticillatis ſparſisque glaucis glabris, racemis paniculatis, corolla ſtriata, calcare calycem aequante. *Anglia. Gallia. Italia.* (Antirrhinum repens et monspeſſulanum L., ſtriatum et galioides Vent.)

amethyſtina * 64. L. foliis verticillatis ſparſisque glaucis glabris, caule ſimplici, racemo ſub-4floro villoſo, calcare corollam duplo excedente discolore. *Hiſpania. Luſitania. Armorica.* (Antirrhinum amethyſtinum Vent., bipunctatum Cav., tricolor Pourr., ſapphirinum Brot. Linaria maritima Cand.)

ſupina Desf. 65. L. foliis quaternis ſparſisque abbreviatis heteromallis glabris, caule diffuſo, floribus racemoſis, calcare reflexo corollam ſuperante. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (Antirrhinum ſupinum L.)

bipunctata * 66. L. foliis quaternis ſparſisque, caule erecto paniculato, floribus ſubſeſſilibus, fauce corollae hiante, calcare recto corollam aequante. *Italia. Hiſpania.* (Antirrhinum bipunctatum L.)

ſpartea * 67. L. foliis ternis ſparſisque lineari-canaliculatis carnoſis, racemis paniculatis, fauce corollae clauſa. *Hiſpania. Afric. bor.* (Antirrhinum ſparteum L.)

ſimplex Cand. 68. L. foliis verticillatis ſparſisque glaucis glabris, floribus racemoſo-congeſtis, calycibus viſciduloputeſcentibus, corollae exiguae calcare recto. *Gallia. Caucaſ.* (Antirrhinum parviflorum Jacq., ſimplex W.)

arvenſis Desf. 69. L. foliis verticillatis ſparſisque, floribus racemoſis, calycibus viſcido-villoſiuſculis, calcare recurvo. *Europ.* (Antirrhinum arvenſe L.)

diffuſa Link. 70. L. foliis quaternis ſparſisque abbreviatis cauleque diffuſo pubeſcentibus, floribus ſparſis, calcare ſubulato aſcendente corollam ſuperante. *Luſitania.*

multicaulis * 71. L. foliis verticillatis linearibus carnoſis, ramis diffuſis laxis, floribus congeſtis, calcare elongato. *Sicilia. Luſitania. Afric. bor.* (Antirrhinum multicaule L., capitellatum Vent., multipunctatum Brot. Brouſſoneti Poir.)

tenuis * 72. L. foliis ternis ſparſisque linearibus ſubpubeſcentibus, caule tenero ſimplici paucifloro, calycibus hiſpidis, labio corollae inferiore bilobo,

calcare elongato. *Ad magnam Syrtim Afric. bor.* (Antirrhinum tenue Viv.)

incarnata * 73. L. foliis verticillatis sparsisque linearibus abbreviatis subhomomallis, caule erecto flexuoso superne piloso, racemo laxo terminali, laciniis calycis subulatis, fauce corollae hiante, calcare elongato discolore. *Hispan. Lusitan.* (Antirrhinum incarnatum Vent., L. lineogrysea Link.)

virgatula * 74. L. foliis ternis sparsisque lineari-canaliculatis glaberrimis, caule ramoso paniculato, floribus pedunculatis remotis, calcare abbreviato. *Lusitania.* (Antirrhinum virgatulum Brot.)

reticulata Desf. 75. L. foliis verticillatis sparsisque lineari-canaliculatis, floribus racemoso-spicatis, bracteis pedicellos superantibus calycibusque hirsutis, corolla reticulata. *Afric. bor.* (Antirrhinum pinifolium Poir.)

glauca W. 76. L. foliis quaternis subulatis carnosis, caule erecto, floribus subspicatis, calcare striato. *Asia minor.* (Antirrhinum glaucum L.)

aparinoides * 77. L. foliis verticillatis confertisque linearibus glabris, caule simplici, racemo denso spicato, calycibus villosis, calcare recto elongato. *Atlas.* (L. heterophylla Desf., Antirrhinum aparinoides W.)

† *filifolia* Lag. 78. L. foliis verticillatis confertisque lineari-filiformibus carnosis, floribus spicatis, calcare rectiusculo subulato elongato. *Ager matritensis.*

† *capensis* * 79. L. foliis oppositis linearibus glabris, ramis elongatis, racemis terminalibus. *C. B. S.* (Antirrhinum capense Thunb.)

β. Foliis omnibus sparsis,

aa. latioribus.

glabrata Kunth. 80. L. foliis oblongis acutiusculis carnosis glabris, floribus spicatis bracteatis, calycibus obtusis, calcare ascendente tubum aequante. *Quito.*

aegyptiaca Desf. 81. L. foliis alternis ovato-lanceolatis basi 1-2dentatis petiolatis, caule erecto ramoso, ramis strictis pubescentibus, pedunculis solitariis persistentibus spinescentibus, calcare incurvo. *Aegypt.*

pyramidata Tourn. 82. L. foliis subcordato-oblongis acutis nervosis amplexicaulibus, racemis glaberrimis, calcare elongato. *Armenia.* (L. silenifolia Link.)

genistaefolia Mill. 83. L. foliis lanceolatis acuminatis enerviis sessilibus glaberrimis, racemis paniculatis, calcare elongato. *German. med. Helvetia. Sibir.* (Antirrhinum L.)

linifolia W. 84. L. foliis lanceolato-linearibus acutis 3nerviis, floribus racemoso-spicatis, bracteis pedicellos superantibus. *Italia. Tauria. Podolia.* (Antirrhinum Linaria MB., polygalaefolium Poir., Lin. Bieberfteinii Bess.)

vulgaris Bauh. 85. L. foliis lanceolato-linearibus acutis, caule folioso, floribus racemoso-spicatis. *Europ. Amer. bor.* (Antirrhinum Linaria L.)

lagopodioides * 86. L. foliis lanceolato-linearibus apice recurvis subtomentosis, floribus spicatis dense villosis. *Sibir.* (Antirrhinum L.)

ββ. Foliis angustis, linearibus.

Löselii Schweigg. 87. L. foliis linearibus utrinque glabris sessilibus acutis, ramis virgatis, floribus racemosis, calcare corollam aequante. *Borussiae litora. Ad Borysthenem et in Tauria.* (Antirrhinum odorum MB.)

stricta Horn. 88. L. foliis linearibus confertis glaucis, caule simplici, floribus racemoso-spicatis, calycibus villosis, calcare recto corollam excedente. *Asia minor. Ad Volgam et in Tauria.* (Antirrhinum strictum Sm., macrourum MB.)

juncea Cand. 89. L. foliis linearibus angustissimis subtus convexis, ramis virgatis, floribus racemosis, calycibus glabris abbreviatis, calcare elongato. *Hispania.* (Antirrhinum L.)

canadensis * 90. L. foliis linearibus remotis glabris, caule simplicissimo filiformi basi stolonifero, racemis subcorymbosis, fauce corollae hiante. *Amer. bor.* (Antirrhinum L.)

pedunculata * 91. L. foliis linearibus subcarnosis laevibus remotis, pedunculis subracemosis folio longioribus, corolla striata. *Hispan.* (Antirrhinum L.)

monomotapensis Desf. 92. L. foliis linearibus obtusis subcarnosis obsolete dentatis, racemo laxo pubescente, calcare obtuso, caule simpliciusculo. *Afric. austr. mediterr.* (Antirrhinum dentatum Poir.)

---

aphylla * 93. L. scapo 1floro capillari. *Afric. austr.* (Antirrhinum aphyllum Thunb.)

2165. NEMESIA Vent.

chamaedryfolia Vent. 1. N. foliis ovatis serratis petiolatis, pedunculis axillaribus 1floris. *C. B. S.* (Antirrhinum macrocarpon Ait.)

bicornis Pers. 2. N. foliis lineari-lanceolatis serratis verticillatis oppositisque sessilibus, racemo terminali laxo glanduloso-pilosiusculo, capsulis 2cornibus. *C. B. S.* (Antirrhinum 2corne L.)

foetens Vent. 3. N. foliis lineari-lanceolatis subtrinerviis glabris, floribus racemosis terminalibus bracteatis. *C. B. S.*

linearis Vent. 4. N. foliis linearibus integerrimis sessilibus, floribus corymboso-racemosis. *C. B. S.*

2166. ANTIRRHINUM.

majus 1. A. foliis oppositis oblongo-lanceolatis glabris, floribus racemoso-spicatis, laciniis calycis glanduloso-pubescentibus obtusis. *Europ. med. et*

auſtr. (A. meonanthon Link. var. parviflora, A. tortuoſum Boſc. et Vent. in vicis Romae vulgare, A. anguſtifolium Urv., in inſula Melita, et A. capitatum Presl. in Sicilia bor. ſiſtunt varietatem eandem anguſtifoliam.)

ſempervirens Lapeyr. 2. A. foliis oppoſitis ovalibus ſubpubeſcentibus, pedunculis axillaribus ſolitariis folio brevioribus, laciniis calycis oblongis, caule fruticoſo, ramis divaricatis villoſis. *Pyren.*

molle 3. A. foliis oppoſitis ovatis tomentoſis, pedunculis axillaribus, caule procumbente. *Hiſpan. Luſitan. Cochinchina.*

Aſarina 4. A. foliis oppoſitis cordatis crenatis piloſis, pedunculis axillaribus oppoſitis folio brevioribus, caule procumbente radicante. *Italia.*

filiforme Poir. 5. A. foliis oppoſitis ovatis integerrimis glabriusculis, ramis alternis 1floris, calycibus ſetaceis, caule filiformi pubeſcente. *Gallia provinc.*

papilionaceum N. L. Burm. 6. A. foliis alternis obovatis trinerviis carnoſis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris, lacinia calycis ſuprema latiſſima, corolla papilionacea. *Perſia.*

porcinum Lour. 7. A. foliis oppoſitis lanceolatis ſubſerratis viſcoſis, floribus axillaribus verticillatis, laciniis calycis ſubulatis, caule erecto. *Cochinchina.*

aquaticum Lour. 8. A. foliis verticillatis lanceolatis integerrimis glabris, floribus ſolitariis axillaribus, caule erecto. *Cochinchina.*

ſiculum Ucr. 9. A. foliis ternis lineari-lanceolatis glabris, floribus racemoſis, laciniis calycis lanceolatis acutis glanduloſo-piloſis. *Sicil.*

Orontium 10. A. foliis alternis oppoſitisque lanceolato-linearibus ſubpetiolatis, floribus ſparſis ſubſeſſilibus, calycibus digitatis longiſſimis. *Europ.* (A. calycinum Vent. Brot.)

2167. ANARRHINUM Desf.

fruticoſum Desf. 1. A. foliis inferioribus cuneiformibus apice 3dentatis, ſuperioribus linearibus, ramis virgatis, caule fruticoſo. *Ad Atlantem et in rupibus Palaeſtinae.*

bellidifolium W. 2. A. foliis radicalibus oblongis inciſo-dentatis triplinerviis, caulinis 3-5partitis lineari-filiformibus, caule glabro herbaceo erecto. *Helvetia. Europ. auſtr.*

pedatum Desf. 3. A. foliis radicalibus obovato-lanceolatis ſerratis trinerviis, caulinis 3-5partitis ſubpedatis, lacinia media lato-lanceolata, caule foliisque hirſutis. *Numidia. Prov. interamnis Luſitaniae.* (Antirrhinum duriminium Brot.)

2168. MIMULUS.

* *Caule erecto.*

glutinosus Wendl. 1. M. caule fruticoso foliisque oblongis subserratis glutinosis, pedunculis flore brevioribus. *Patria?* (M. aurantiacus Curt.)

ringens 2. M. caule herbaceo foliisque oblongo-lanceolatis serratis glabris, pedunculis flore longioribus. *Amer. bor.*

alatus Ait. 3. M. caule herbaceo 4alato foliisque petiolatis ovato-oblongis crenatis glabris, pedunculis flore brevioribus. *Amer. bor.*

Lewisii Pursh. 4. M. caule humili foliisque lanceolatis nervosis sessilibus denticulatis pubescentibus, pedunculis paucis terminalibus elongatis. *Ad fl. Missuri.*

perfoliatus Mut. 5. M. caule 4alato foliisque connatis lanceolatis acuminatis argute serratis glabris, corymbis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Granat.*

gracilis R. Br. 6. M. caule gracili foliisque lineari-oblongis integerrimis obtusis glaberrimis, pedunculis elongatis. *Nov. Holl.*

** *Caule basi repente.*

luteus 7. M. caule basi radicante tereti foliisque subsessilibus ovatis acutis nervosis serratis glabris, pedunculis axillaribus elongatis ebracteatis. *Chili.*

guttatus Cand. 8. M. caule basi radicante foliisque inferioribus longe petiolatis ovato-oblongis obtusis nervosis inaequaliter denticulatis basi subauriculatis glabris, pedunculis flore brevioribus bracteatis. *Ins. Aleut. Ora occ. Amer. bor. Mexico.* (M. luteus Pursh. Curt., glabratus Kunth.)

† *repens* R. Br. 9. M. caule repente glabro, ramis ascendentibus, foliis ovalibus obtusis, pedunculis calyce brevioribus. *Nov. Holl. Terra Diemen.*

andicola Kunth. 10. M. caule repente glabro, foliis subcordato-ovatis obtusis petiolatis nervosis irregulariter dentatis, pedunculis folio longioribus. *Peru.*

pilosiusculus Kunth. 11. M. caule repente 4angulo foliisque subcordato-ovatis obtusis petiolatis nervosis irregulariter dentatis pubescentibus, pedunculis folio brevioribus. *Peru.*

2169. TORENIA.

hirsuta Lam. 1. T. caule erecto foliisque oppositis subsessilibus ovatis acuminatis serratis hispidis, pedunculis terminalibus folio brevioribus. *Ind. or.*

lepidota Roth. 2. T. caule erecto, foliis oppositis alternisque linearibus integerrimis lepidotis, floribus axillaribus sessilibus. *Ind. or.*

flaccida R. Br. 3. T. caule diffuso foliisque late ovatis obtusis crenatis glabris, pedunculis flore triplo longioribus. *Nov. Holl.*

asiatica 4. T. caule proſtrato radicante foliisque ovatis acutis crenatis glabris, pedunculis terminalibus elongatis. *Ind. or.*

cordifolia Roxb. 5. T. caule proſtrato pubeſcente, foliis cordato-ovatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus oppoſitis unifloris. *Ind. or.* [In Micrantho Rothii collocando haereo.]

2170. VANDELLIA P. Br.

pratenſis Vahl. 1. V. caule erecto 4gono, foliis lanceolatis acutis crenatis, pedunculis axillaribus ſubverticillatis folia ſuperantibus. *Amer. auſtr.* (Matourea Aubl.)

diffuſa 2. V. caule diffuſo 4gono foliisque ovatis crenatis villoſis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus. *Inſ. Carib. Braſil.*

2171. DIASCIA Link.

Bergiana Link. 1. D. caule diffuſo foliisque alternis petiolatis lanceolatis pinnatifidis glabris, pedunculis elongatis erectis ſubſolitariis. *C. B. S.* (Hemimeris diffuſa L. ſuppl., peduncularis Lam., Paederota bonae ſpei L., Hem. ſabuloſa Thunb. var.)

Thunbergiana * 2. D. caule diffuſo foliisque oppoſitis petiolatis obovatis inciſo-ſerratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris elongatis ſubſolitariis. *C. B. S.* (Antirrhinum longicorne Thunb.)

macrophylla * 3. D. caule diffuſo, foliis oppoſitis cordato-ovatis dentatis glabris, pedunculis capillaribus piloſis bracteatis. *C. B. S.* (Hemimeris macrophylla Thunb.)

montana * 4. D. caule diffuſo pubeſcente, foliis oppoſitis ovatis obtuſiusculis crenatis glabris, pedunculis 1floris compreſſis folia aequantibus. *C. B. S.* (Hemimeris montana Thunb., alſinoides Lam.)

2172. TITTMANNIA Reichenb.

ovata Reichenb. 1. T. caule diffuſo ramoſo foliisque ovatis ſerratis petiolatis piloſiusculis, pedunculis axillaribus oppoſitis elongatis erectis. *Inſ. Philippin. et Societ.* (Hornemannia ovata Link., Antirrhinum hexandrum Forſt.)

alſinoides * 2. T. caule erecto, foliis oppoſitis ovatis ſubintegerrimis, pedunculis fructiferis deflexis. *Nov. Holl.* (Lindernia alſinoides R. Br.)

ſcabra * 3. T. caule erecto pubeſcente, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris, pedunculis fructiferis erectis. *Nov. Holl.* (Torenia ſcabra R. Br.)

monticola * 4. T. caule erecto dichotomo, foliis radicalibus ſpathulatis caulinis linearibus remotis, pedunculis elongatis fructiferis deflexis. *Carolina bor.* (Lindernia monticola Nuttall.)

ſcapigera * 5. T. caule erecto, foliis late ovatis ſubintegerrimis, infimis confertis, ſuperioribus minutis, pedun-

dunculis longiſſimis fructiferis deflexis. *Nov. Holl.* (Lindernia ſcapigera R. Br.)

viſcoſa Reichenb. 6. T. caule proſtrato radicante foliisque ovato-oblongis venoſis crenato-ſerratis glanduloſo-piloſis viſcoſis, pedunculis racemoſis fructiferis deflexis. *Ind. or.* (Hornemannia viſcoſa W., Gratiola viſcoſa Horn.)

grandiflora * 7. T. caule proſtrato repente, foliis ſubamplexicaulibus craſſiuſculis ſubrotundis ſubintegerrimis glaberrimis, pedunculis axillaribus elongatis. *Georgia.* (Lindernia grandiflora Nuttall.)

† *ſubulata* * 8. T. foliis lineari-ſubulatis integerrimis, pedunculis fructiferis deflexis. *Nov. Holl.* (Lindernia ſubulata R. Br.)

2173. HERPESTES Gärtn.

* *Calycibus bracteatis.*

domingenſis * 1. H. caule erecto glabro ramoſo, foliis petiolatis oblongis baſi attenuatis crenatis, pedunculis verticillatis, calycibus fructiferis reticulatis. *Hiſpaniola.* Bertero.

floribunda R. Br. 2. H. caule erecto glabro, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis axillaribus ſub-5floris, calycibus fructiferis reticulatis. *Nov. Holl. Ind. or.*

ſtricta Link. 3. H. caule erecto glabro ſubramoſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis in petiolum decurrentibus inaequaliter ſerratis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis abbreviatis, calycibus crenulatis. *Braſil.?*

erecta * 4. H. caule erecto foliisque ovato-oblongis ſubcrenulatis villoſis, pedunculis axillaribus oppoſitis abbreviatis erectis. *Braſil.* Sello.

cuneifolia Pursh. 5. H. glaberrima, caule repente, ramis erectis, foliis ſpathulatis ſubintegerrimis, pedunculis ſolitariis folia ſuperantibus. *Carolina. Nov. Hiſpan. Ind. occ. et or.* (Gratiola Monneria L., Monneria Brownei Perſ., cuneifolia Mx., Herpeſtes Monneria et moranenſis Kunth., Monneria pedunculoſa et africana Perſ. varr.)

rotundifolia Pursh. 6. H. ſubpubeſcens, foliis orbiculato-ovalibus multinerviis, pedunculis ſuboppoſitis folia aequantibus. *Ditio illinoënſis, Amer. bor.* (Monneria Mx.)

amplexicaulis Pursh. 7. H. caule lanato, foliis cordatis obtuſis integerrimis amplexicaulibus, pedunculis folio brevioribus. *Carolina.* (Monneria Mx.)

micrantha Pursh. 8. H. caule repente glabro, foliis ſeſſilibus ſubrotundis obtuſis ſtriato-nervoſis, pedunculis folio brevioribus. *Jamaica. Amer. bor.* (Gratiola repens Sw.)

rugoſa Roth. 9. H. caule repente, foliis ovatis obtuſe ſerratis rugoſis ſubtus favuloſo-punctatis, capitulis axillaribus pedunculatis geminis. *Ind. or.*

** *Calycibus ebracteatis.*

vandellioides Kunth. 10. H. caule procumbente glaberrimo, foliis obovatis acutiusculis ſerratis, pedunculis axillaribus ſolitariis folia ſuperantibus. *Mexico.*

caprarioides Kunth. 11. H. caule repente glaberrimo, foliis obovatis obtuſis crenato-ſerratis, pedunculis axillaribus ſolitariis folia ſubaequantibus. *Nov. Granat.*

colubrina Kunth. 12. H. caule aſcendente glaberrimo, foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis, pedunculis axillaribus folia duplo ſuperantibus. *Peru.*

procumbens * 13. H. caule proſtrato radicante glaberrimo, foliis obovato-ſpathulatis ſeſſilibus integerrimis, pedunculis axillaribus ſolitariis folio brevioribus. *Cuba. Braſil.*

cubenſis Pöppig. 14. H. caule aſcendente glabro, ramis virgatis, foliis petiolatis ſubrotundo-ovatis crenulatis, pedunculis axillaribus filiformibus oppoſitis folia ſuperantibus. *Cuba.*

linearis * 15. H. caule humili ramoſo, foliis linearibus integerrimis glabris, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Coromandel.* (Lindernia ſeſamoides * N. E.)

montevidenſis * 16. H. ramis erectis flexuoſis foliisque lineari-oblongis obtuſiusculis ſubintegerrimis, pedunculis axillaribus nutantibus folia ſuperantibus. *Monte Video.* Sello.

2174. LIMNOPHILA R. Br.

gratioloides R. Br. 1. L. foliis verticillatis linearibus pinnatifidis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris calycibusque piloſis. *Ind. or. Nov. Holl.* (Hottonia indica L. ſub qua et Hydropityon Gärtn. latet: p. 330.)

trifida * 2. L. foliis oppoſitis verticillatisque lanceolatis apice ſerratis trifidisque, pedunculis axillaribus ſubdiviſis folio longioribus. *Ind. or.* (Gratiola chamaedryfolia Lam., trifida W., Limn. gratioloides Roth.)

hyſſopifolia Roth. 3. L. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis remote denticulatis, pedunculis axillaribus racemoſis glaberrimis. *Ind. or.*

2175. UVEDALIA R. Br.

linearis R. Br. *Nov. Holl.* Herba foliis oppoſitis linearibus, pedunculis axillaribus terminalibusque folia ſuperantibus, floribus coeruleis.

2176. MORGANIA R. Br.

lucida * 1. M. caule diffuſo radicante, foliis cordato-ovatis dentatis glabris, pedunculis axillaribus unifloris folia ſuperantibus. *Ind. or. China.* (Gratiola lucida Vahl. Capraria cruſtacea L.)

rotundifolia * 2. M. caule erectiusculo glabro, foliis ſubrotundo-ovatis ſubintegerrimis 5nerviis, pedunculis axillaribus alternis patentibus folia ſuperantibus. *Ind. or.* (Gratiola rotundifolia L.)

aſpera * 3. M. caule aſcendente filiformi foliisque ſubcordato-ovatis obtuſis groſſe ſerratis ſubſeſſilibus hiſpidiusculis, pedunculis axillaribus folia excedentibus. *Ind. or.* (Gratiola aſpera Roth.)

ſtrigoſa * 4. M. caule erecto dichotomo, ramis divaricatis ſtrigoſis, foliis petiolatis ovatis acutiusculis ſerrulatis glabris, floribus racemoſis terminalibus. *Ind. or.* (Gratiola ſtrigoſa Roth.)

hyſſopioides * 5. M. caule erecto ſimplici, foliis lanceolatis ſeſſilibus ſubintegerrimis, pedunculis axillaribus folio longioribus. *Ind. orient.* (Gratiola hyſſopioides L.)

juncea * 6. M. caule erecto ſimplici, foliis ovalibus obtuſis integerrimis ſeſſilibus, floribus alternis axillaribus inferioribus ſubſeſſilibus. *Ind. or.* (Gratiola juncea Roxb.)

callitrichoides * 7. M. caule proſtrato foliisque oblongis utrinque attenuatis dentatis glabris, pedunculis axillaribus folio brevioribus. *Ad Orinoc.* (Herpeſtes callitrichoides Kunth.)

glabra R. Br. 8. M. caule erecto foliisque linearibus ſubintegerrimis glabris, pedunculis axillaribus calyces ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

pubeſcens R. Br. 9. M. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis dentatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

2177. MAZUS Lour.

rugoſus Lour. 1. M. foliis radicalibus ovatis ſerratis rugoſis, racemo laxo terminali caulem oligophyllum ſuperante, calycibus pubeſcentibus. *Cochinchina. China. Japon.* (Lindernia japonica Thunb.)

pumilio R. Br. 2. M. foliis radicalibus calycibusque glabris, ſcapo paucifloro. *Terra Diemen.*

2178. OURISIA Commerſ.

magellanica Perſ. 1. Ou. foliis radicalibus oblongis ſerratis longe petiolatis, caulinis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus elongatis, calycis laciniis inaequalibus ciliatis. *Ad fretum Magellan. Chili.* (Chelone ruellioides Forſt.)

integrifolia R. Br. 2. Ou. foliis radicalibus ſubovatis integerrimis, pedunculo terminali ſubſolitario, calycis laciniis aequalibus. *Terra Diemen.*

2179. DICHROMA Cav.

coccineum Cav. *Inſ. Chiloe.* Herba villoſa, foliis radicalibus longe petiolatis cordatis crenatis ſubtus violaceis, caule

ſubpaniculato oligophyllo, floribus coccineis. (Ouriſia coccinea Perſ. Poir.)

2180. LOXONIA Jack.

diſcolor Jack. 1. L. foliis biformibus ſupra glabris ſubtus diſcoloribus ſcabris, reniformibus minutis et ſemicordatis ſubſerratis, floribus racemoſis. *Sumatra.*

hirſuta Jack. 2. L. foliis ſubbiformibus hirſutis, ſemicordatis ſemiovatisque ſubſerratis, pedunculis ſubracemoſis nutantibus ſecundis. *Sumatra.*

2181. CENTRANTHERA R. Br.

hiſpida R. Br. *Nov. Holl.* Herba erecta hiſpida, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus ſpicatis bracteatis purpuraſcentibus.

2182. BÜCHNERA.

* *Corollae limbo ſubaequali.*

cernua 1. B. fruticoſa, foliis ſubternis oppoſitisque obovatis 5dentatis glabris, racemis ſpicatis terminalibus cernuis. *C. B. S.*

cuneifolia Thb. 2. B. fruticoſa, foliis cuneatis glabris apice dentatis, racemis axillaribus ſimplicibus. *C. B. S.* (Phryma dehiſcens L. ſuppl.)

americana 3. B. caule ſimplici, foliis lanceolatis ſubdentatis 3nerviis aſperis, floribus remote ſpicatis. *Amer. boreal.*

urticaefolia R. Br. 4. B. ſcabra, foliis infimis confertis oblongis obtuſis, reliquis lanceolatis dentatis, bracteis ciliatis calyce dimidio brevioribus. *Nov. Holl.*

tetragona R. Br. 5. B. caule glabro 4gono, foliis oblongo-lanceolatis paucidentatis, ſpicis 4gonis, bracteis late ovatis ciliatis calyce longioribus. *Nov. Holl.*

gracilis R. Br. 6. B. glabriuſcula, foliis oblongis obtuſis integerrimis, caule ſimplici, floribus remote ſpicatis, bracteis ciliatis calyce dimidio brevioribus, capſulis exſertis. *Nov. Holl.*

aſperata R. Br. 7. B. ſcaberrima, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis paucidentatis, ſuperioribus lineari-lanceolatis integerrimis, bracteis ovato-lanceolatis calyce duplo brevioribus, capſulis incluſis. *Nov. Holl.*

† *cordifolia* 8. B. caule 4gono, foliis cordatis 3nerviis ſerratis, racemis terminalibus ſubſpicatis. *Ind. or.*

grandiflora 9. B. caule glabro ſimpliciſſimo, foliis oblongis integerrimis 5nerviis ſcabris, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis lineari-ſubulatis, calyce infundibuliformi. *Amer. auſtr.*

roſea Humb. 10. B. caule ſimplici hiſpido, foliis lanceolatis obtuſiuſculis ſubdentatis ſcabris, ſpicis agggregatis, bracteis linearibus calyce triplo brevioribus. *Caracas.*

macrocarpa Humb. 11. B. caule ſimplici teretiuſculo hiſpido, foliis lanceolatis utrinque attenuatis 3nerviis ſubdentatis, ſpica ſimplici, bracteis linearibus calyce triplo brevioribus, capſula exſerta. *Nov. Granat.*

elongata Sw. 12. B. caule ſimplici ſcabro, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis integerrimis 3nerviis, ſuperioribus oppoſitis linearibus, floribus remote ſpicatis, bracteis minutis. *Ind. occ.*

paluſtris * 13. B. caule ſimpliciſſimo, foliis omnibus alternis linearibus ſerrulatis, floribus paucis remote ſpicatis, bracteis minutis. *Guiana.* (Peripea paluſtris Aubl.)

diſticha Humb. 14. B. caule ramoſo 4gono hiſpidiuſculo, foliis ſuboppoſitis linearibus integerrimis, floribus diſtiche ſpicatis, bracteis calyce brevioribus. *Nov. Granat.*

longifolia Humb. 15. B. caule ramoſo tereti ſcabriuſculo, foliis linearibus elongatis integerrimis trinerviis calloſo-aſperis, inferioribus oppoſitis ſuperioribus ſparſis, ſpica terminali, bracteis calyce brevioribus. *Nov. Granat.*

lithoſpermifolia Humb. 16. B. caule ſimplici teretiuſculo hiſpidulo, foliis linearibus ſubintegerrimis 3nerviis, ſpica ſolitaria, bracteis calyce brevioribus. *Amer. auſtr.*

ternifolia Humb. 17. B. caule ſimplici 3gono hiſpido, foliis inferioribus ternis lanceolato-linearibus apice ſubſerratis 3nerviis, ſpica ſolitaria, bracteis calyce brevioribus. *Amer. auſtr.*

virgata Humb. 18. B. caule ramoſo hiſpidiuſculo, ramis virgatis 4gonis, foliis oppoſitis lanceolato-linearibus integerrimis 3nerviis, ſpicis paniculatis, bracteis minutis. *Nov. Granat.*

linearis R. Br. 19. B. caule ſcabro, foliis linearibus obtuſis integerrimis, floribus paucis remote ſpicatis, bracteis linearibus calyce piloſo brevioribus. *Nov. Holl.*

tenella R. Br. 20. B. caule ſcabro, foliis lineari-lanceolatis acutis integerrimis, floribus paucis remote ſpicatis, bracteis lanceolatis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

ramoſiſſima R. Br. 21. B. caule ſcabro ramoſiſſimo, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, bracteis lanceolatis calyce brevioribus. *Nov. Holl.*

pinnatifida Thunb. 22. B. caule ſuffruticoſo ramoſo, ramis pubeſcentibus, foliis pinnatifido-palmatis petiolatis glabris, racemo laxo terminali. *C. B. S.*

** *Corolla ſubbilabiata.*

pedunculata Andr. 23. B. caule ſuffruticoſo, foliis obovatis inciſo-dentatis, pedunculis 1floris ſolitariis elongatis, laciniis limbi truncatis. *C. B. S.*

geſnerioides W. 24. B. caule ramoſo tetragono, foliis minutiſſimis ſquamaeformibus oblongis appreſſis ciliatis, floribus ſpicatis bracteatis. *Ind. or.*

humifuſa Vahl. 25. B. caule proſtrato ramoſo hiſpidulo, foliis minutis obovatis ſquamoſo-aſperis, pedunculis

axillaribus 1floris abbreviatis. *Arabia.* (Browallia humifuſa Forsk.)

hermonthica Delil. 26. B. caule erecto herbaceo ſub-4gono aſpero, foliis lanceolato-linearibus calloſo-hiſpidis, ſpicis terminalibus aggregatis, bracteis calyces ſubaequantibus. *Aegypt. ſuper. Nubia.*

curviflora R. Br. 27. B. ſcaberrima, foliis elongato-linearibus integerrimis patentibus, calyce 5ſtriato. *Nov. Holl.*

aſiatica 28. B. ſcaberrima, foliis linearibus integerrimis ſquamoſis, calycibus axillaribus ſolitariis 15ſtriatis. *Ceylon. China.*

euphraſioides Vahl. 29. B. caule 4quetro ramoſo, foliis linearibus abbreviatis integerrimis hiſpidiuſculis, calycibus axillaribus ſeſſilibus folia aequantibus, corollae piloſae laciniis linearibus. *Ind. or.*

parviflora R. Br. 30. B. ſcaberrima, foliis linearibus ſtrictis integerrimis, calycibus 5ſtriatis, lab. cor. ſup. integro. *Nov. Holl.*

bilabiata Thb. 31. B. caule ſimplici villoſo, foliis lineari-lanceolatis papilloſo-aſperis, floribus ſpicatis cernuis, calycibus hiſpidiuſculis. *C. B. S.*

puſilla Humb. 32. B. caule ſimplici teretiuſculo foliisque integerrimis hiſpidis, inferioribus obovato-oblongis, ſuperioribus linearibus, ſpica ſolitaria, calycibus 10ſtriatis. *Nov. Granat.*

2183. GERARDIA.

* *Floribus rubris.*

† *Foliis latioribus.*

braſilienſis * 1. G. fruticoſa ramoſa, foliis alternis oblongis petiolatis integerrimis ſubcoriaceis ſupra nitidis ſubtus ramisque fulvo-tomentoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis folio brevioribus. *Braſil.* Sello.

fruticoſa Pursh. 2. G. fruticoſa ramoſa, foliis lanceolatis ſubpetiolatis ſerratis utrinque glabris, floribus racemoſis terminalibus. *Ad montes ſcopuloſos Amer. bor.*

cuneifolia Pursh. 3. G. ſuffruticoſa ramoſa, foliis ſpathulatis inaequaliter ſerratis ſuperioribus alternis, pedunculis axillaribus folio longioribus. *Georgia.*

ſeſſiliflora Vahl. 4. G. caule ſimplici hiſpidiuſculo, foliis oppoſitis ſeſſilibus cordatis obtuſis baſi dentatis 5nerviis, floribus axillaribus ſeſſilibus oppoſitis. *C. B. S.*

glutinoſa 5. G. caule teretiuſculo foliisque oppoſitis petiolatis ovatis profunde ſerratis villoſo-viſcoſis, floribus axillaribus breviſſime pedunculatis oppoſitis, calycibus bracteatis piloſo-glutinoſis. *China.*

japonica Thb. 6. G. caule ſimplici foliisque petiolatis ovatis inciſo-pinnatifidis villoſis, floribus axillaribus breviter pedunculatis oppoſitis. *Japon.*

tubuloſa Thb. 7. G. caule herbaceo ramoſo, foliis ellipticis integerrimis glabris, floribus axillaribus pedunculatis, tubo corollae calycem ſuperante. *C. B. S.*

Nigrina Thb. 8. G. caule herbaceo 4gono aſpero, foliis oppoſitis ſeſſilibus lanceolatis profunde ſerratis calloſo-aſperis, floribus axillaribus pedunculatis, tubo corollae calycem ſubaequante. *C. B. S.* (Melaſma ſcabrum Berg.)

†† *Foliis anguſtis.*

ſcabra Thb. 9. G. caule herbaceo foliisque pinnatifidis hiſpidiusculis, floribus racemoſis ſubſecundis. *C. B. S.*

delphinifolia 10. G. caule herbaceo ramoſo glabro, foliis lineari-filiformibus 3partito-pinnatifidis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus 5fidis. *Ind. or.*

domingenſis * 11. G. caule herbaceo tereti ramoſo, foliis linearibus confertis ſubfaſciculatis glabris, floribus racemoſis, calycibus abbreviatis 5dentatis. *Hiſpaniola.* Bertero.

purpurea 12. G. caule herbaceo 4gono ramoſo glabro, foliis linearibus remotis ſcabris, calycibus axillaribus breviſſime pedunculatis 5fidis. *Amer. bor.*

tenuifolia Vahl. 13. G. caule ſimpliciſſimo 4gono, foliis linearibus margine ſcabris, pedunculis oppoſitis folia ſuperantibus, calycibus 5dentatis capſula globoſa brevioribus. *Amer. bor.*

maritima Rafin. 14. G. caule 4gono ramoſo, foliis linearibus carnoſis obtuſiusculis nitidis, ramis aphyllis paucifloris, calycibus breviter pedunculatis crenulatis. *Ad oram maritimam. Nov. Caeſar.* (G. crinita Eddy.)

linifolia Nutt. 15. G. caule tereti ramoſo, ramis virgatis paucifloris, foliis linearibus ſubcarnoſis acutis, calycibus truncatis, limbo corollae ciliato. *Carolina.*

filifolia Nutt. 16. G. caule tereti ramoſo, foliis filiformibus ſubfaſciculatis, pedunculis alternis folia ſuperantibus, calycibus acute dentatis. *Florida.*

ſetacea Nutt. 17. G. caule tereti ramoſo glaberrimo, ramis capillari-filiformibus elongatis 1floris, foliis ſetaceis, calycibus obſolete dentatis capſula ovata brevioribus. *Carolina.* (G. erecta Walt.)

aphylla Nutt. 18. G. caule erecto aphyllo, ramis virgatis 4angulis, ſquamis minutis ovatis deciduis, floribus oppoſitis pedunculatis. *Carolina.*

** *Floribus flavis.*

flava 19. G. caule ſubſimplici pubeſcente, foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus ſubintegerrimis, inferioribus baſi inciſo-pinnatifidis, ſpicis axillaribus oppoſitis abbreviatis. *Amer. bor.*

glauca Eddy. 20. G. caule ſimplici glaberrimo glauco-pruinoſo, foliis lanceolatis inciſo-pinnatifidis dentatis, pedunculis oppoſitis ſubracemoſis, laciniis calycis capſulaque roſtrata elongatis. *Amer. bor.*

quercifolia Pursh. 21. G. caule ramoſo glabro glauco, foliis inferioribus profunde pinnatifidis, laciniis oblongis ſubdentatis ſinuatis, ſuperioribus lanceolatis ſerra-

tis, floribus axillaribus oppoſitis breviter pedunculatis, laciniis calycis acutis. *Amer. bor.* (Rhinanthus virginicus L.)

Pedicularia 22. G. caule ramoſo, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis, pedunculis axillaribus oppoſitis folia ſubaequantibus glanduloſo-piloſis, laciniis calycis foliaceis crenatis. *Amer. boreal.*

virgata Humb. 23. G. caule ramoſo, foliis pinnatifidis ſcabris, laciniis ſpathulato-linearibus acutiusculis, inferioribus inciſo-ſerratis, pedunculis axillaribus ſpicatis calycibusque hirſutis. *Mexico.*

proſtrata Humb. 24. G. caule proſtrato foliisque pinnatifidis glabriusculis, laciniis linearibus, inferioribus inciſo-ſerratis, floribus axillaribus ſeſſilibus, laciniis calycis inciſo-pinnatifidis. *Nov. Hiſpan.*

digitata * 25. G. caule erecto, ramis virgatis villoſis, foliis digitatis linearibus acutis glabris, pedunculis ſolitariis axillaribus unifloris, calycibus glabris. *Braſil.* Sello.

ſerpyllifolia Humb. 26. G. caule procumbente, foliis ovatis obtuſis petiolatis integerrimis glabris, floribus axillaribus ſeſſilibus, calycibus glabris. *Nov. Hiſpan.*

2184. SCHWALBEA.

americana *Amer. bor.* Herba erecta ſimplex pubeſcens, foliis ovato-oblongis acutis integerrimis, floribus racemoſis terminalibus atropurpureis.

2185. ESCOBEDIA R. et P.

ſcabrifolia R. et P. *Nov. Granat. Peru.* Herba erecta, foliis ſeſſilibus cordato-oblongis nervoſis remote denticulatis ſcabris, pedunculis axillaribus 1floris, floribus amplis albis (?).

2186. BROWALLIA.

elongata Kunth. 1. Br. caule erecto ramoſo, foliis ovato-oblongis acutis, pedunculis axillaribus 1floris, ramulis calycibusque villoſis. *Amer. auſtr.* (Br. elata et lactea Hortul.)

Linnaeana * 2. Br. caule erecto ramoſo, foliis oblongis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus ſub-1floris ramulisque pubeſcentibus, calycibus glabris. *Amer. auſtr.* (Br. elata et demiſſa L.)

viſcoſa Humb. 3. Br. caule diffuſo ramoſo, foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis, pedunculis axillaribus unifloris ramulis calycibusque villoſo-viſcoſis. *Nov. Granat.*

2187. HEMIMERIS.

urticaefolia W. 1. H. caule fruticoſo ramoſo, foliis ovatis petiolatis inciſo-ſerratis, inferioribus oppoſitis ſuperioribus alternis, pedunculis elongatis ſubracemoſis. *Amer. auſtr.* (Celſia urticaefolia Curt. Alonſoa inciſifolia R. et P.)

parviflora Kunth. 2. H. caule herbaceo ſub-4alato, foliis oppoſitis petiolatis ovatis acutis ſerratis glaberrimis, pedunculis ſolitariis axillaribus 1floris. *Caracas. Peru.* (Alonſoa caulialata R. et P.)

Mutiſii Bonpl. 3. H. caule herbaceo ſub-4alato, foliis oppoſitis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris. *Nov. Granat. Peru.* (Alonſoa acutifolia R. et P. Scrofularia meridionalis Mut. L.)

hirſuta * 4. H. caule herbaceo 4alato, foliis ovatis dentatis in petiolum decurrentibus piloſis (pilis articulatis), pedunculis unifloris axillaribus ſolitariis calycibusque ſubinaequalibus hirſutis. *Braſil.* Sello.

procumbens Perſ. 5. H. caule procumbente, foliis ovatis ſerratis. *Peru.* (Alonſoa procumbens R. et P.)

linarifolia Humb. 6. H. caule fruticoſo ramoſiſſimo, foliis linearibus acutis ſubintegerrimis craſſiusculis, pedunculis racemoſis bracteatis. *Peru.*

coccinea W. 7. H. caule ſuffruticoſo, foliis faſciculatis linearibus remote denticulatis membranaceis, pedunculis racemoſis bracteatis. *Amer. auſtr.* (Celſia linearis Jacq.)

2188. CELSIA.

orientalis 1. C. foliis 2pinnatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis. *Graecia. Aſia minor.*

Arcturus 2. C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, ſuperioribus oblongis, pedunculis bracteas longe excedentibus, laciniis calycis integerrimis. *Creta. Aſia minor. Ind. orient.* (C. coromandelina Vahl. heterophylla Perſ.)

cretica 3. C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, ſuperioribus oblongis, pedunculis bracteas ſubaequantibus, laciniis calycis ovatis ſerratis. *Creta. Afr. boreal.*

viſcoſa Roth. 4. C. viſcoſo-pubeſcens, foliis radicalibus petiolatis oblongis baſi auriculatis, ſuperioribus cordatis amplexicaulibus, pedunculis bracteas ſubaequantibus, laciniis calycis oblongis ſubintegerrimis. *Patria?*

laciniata Poir. 5. C. foliis inferioribus laciniato-pinnatifidis, ſuperioribus ſeſſilibus lanceolatis, pedunculis bracteas ſubaequantibus, laciniis calycis oblongis acutis integerrimis. *Afric. bor.*

betonicaefolia Desf. 6. C. foliis ovato-oblongis crenatis, pedunculis bracteas lanceolatas ſuperantibus, laciniis calycis ovatis ſubſerratis. *Afric. bor.*

lanata Jacq. 7. C. ſuffruticoſa lanato-tomentoſa, foliis oblongis obtuſis crenatis, pedunculis bracteas ſuperantibus, laciniis calycis ovatis integerrimis. *Patria?*

lanceolata Vent. 8. C. ſubtomentoſa, foliis lanceolatis ſinuato-dentatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, laciniis calycis lanceolatis integerrimis. *Ad Euphraten.*

2189. SEYMERIA Pursh.

macrophylla Nutt. 1. S. caule elato ramoſo, foliis inferioribus ſubpinnatifidis, ſuperioribus lanceolatis integerrimis, floribus ſubſeſſilibus intus lanatis. *Ad fl. Ohio.*

auriculata * 2. S. caule ſimplici aſpero, foliis ovato-lanceolatis integerrimis baſi auriculatis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Virginia.* (Gerardia auriculata Mx.)

pectinata Pursh. 3. S. viſcido-pubeſcens ramoſiſſima, foliis pectinato-pinnatifidis, laciniis linearibus acutis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *Amer. bor.*

tenuifolia Purh. 4. S. glabriuscula ramoſa, ramis virgatis, foliis pinnatifido-ſetaceis, laciniis diviſis. *Amer. bor.* (Afzelia caſſioides J. F. Gmel., Gerardia Afzelia Mx.)

2190. ANGELONIA Humb.

ſalicarifolia Humb. *Caracas. Hiſpaniola.* Bertero. Herba foliis confertis lanceolatis apice ſubſerratis, pedunculis racemoſis demum incurvis bracteas ſuperantibus, floribus violaceis maculatis.

2191. STEMODIA.

ſuffruticoſa Bonpl. 1. St. caule erecto ſuffruticoſo, foliis ternis ovato-oblongis in petiolum decurrentibus inaequaliter crenatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus erectis ſubternis 1floris folia ſubſuperantibus. *Nov. Granat. Braſil.* (St. 3foliata Reichenb., Columnea 3foliata Link., Col. violacea Jacq. fil.)

ruderalis Retz. 2. St. caule erecto herbaceo, foliis oppoſitis petiolatis oblongis obtuſe dentatis, pedunculis axillaribus oppoſitis 1floris. *Ind. or.*

camforata Vahl. 3. St. caule erecto, foliis oppoſitis petiolatis ovatis inaequaliter ſerratis, floribus racemoſis terminalibus. *Ceylon.*

viſcoſa Roxb. 4. St. caule erecto villoſo-viſcoſo, foliis ſubhaſtato-oblongis denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. or.*

verticillaris Link. 5. St. caule erecto glanduloſo-piloſo, foliis verticillatis amplexicaulibus lanceolatis ſerratis, pedunculis axillaribus ſubgeminis folio brevioribus. *Braſil.* (Conobea verticillaris * nov. prov.)

xorullenſis Kunth. 6. St. caule erecto piloſo, foliis ternis petiolatis ovatis acutis duplicato-ſerratis, pedunculis axillaribus ſolitariis elongatis. *Mexico.*

maritima 7. St. caule erecto hirſuto, foliis oppoſitis ſemiamplexicaulibus lanceolatis ſerratis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubſolitariis. *Jamaica. Hiſpaniola.*

durantifolia Sw. 8. St. caule erecto ſub-6gono hirſuto, foliis ternis oppoſitisque amplexicaulibus lanceolatis ſerrulatis, floribus ſubaggregatis axillaribus ſubſeſſilibus. *Jamaica. Hiſpaniola.* (Capraria durantifolia L.)

glabra * 9. St. caule aſcendente angulato glabro, foliis oppoſitis amplexicaulibus lanceolatis remote dentatis ſcabris, floribus axillaribus oppoſitis ſeſſilibus. *Monte Video.* Sello.

paluſtris Hilar. 10. St. foliis ſeſſilibus oblongo-linearibus acutis obſolete dentatis, ſuperioribus anguſtiſſimis, floribus racemoſis, calycibus pubeſcentibus. *Braſil.*

gratiolaefolia Hilar. 11. St. foliis ſeſſilibus linearibus acutis ſubintegerrimis glabris, paniculis axillaribus, floribus ſubſeſſilibus, calycibus glabriusculis. *Braſil.*

arenaria Humb. 12. St. caule diffuſe ramoſo villoſo, foliis oppoſitis petiolatis ovatis ſubduplicato-ſerrulatis, pedunculis ſubaggregatis axillaribus petiolo brevioribus. *Ad fl. Magdalen. Hiſpaniola. Braſil.* (St. parviflora R. Br., Conobea pumila * nov. prov.)

multifida * 13. S. caule diffuſe ramoſo piloſiusculo, foliis 3partito-pinnatifidis, laciniis linearibus obtuſiusculis ſubdentatis, pedunculis axillaribus oppoſitis laciniisque calycis capillaribus. *Ad fl. Miſſuri.* (Capraria multifida Mx.)

2192. RUSSELIA.

ſarmentoſa Jacq. 1. R. caule ſcandente ramisque 4angulis glabris, foliis oppoſitis breviſſime petiolatis ovatis acutis ſerratis ſupra piloſiusculis, pedunculis axillaribus 3-5floris. *Cuba. Panama.*

floribunda Humb. 2. R. caule ramisque 4angulis glabris, foliis breviſſime petiolatis ſubcordato-ovatis crenato-ſerratis glabriusculis, corymbis axillaribus ſeſſilibus multifloris. *Mexico.*

rotundifolia Cav. 3. R. caule fruticoſo, ramis ſub-4gonis foliisque ſeſſilibus cordato-ſubrotundis crenatis tomentoſis, racemis axillaribus 2fidis ſecundis. *Nov. Hiſpan.*

multiflora Sims. 4. R. caule ſubſcandente, ramis 4angularis, foliis petiolatis ovato-oblongis crenatis, racemo terminali verticillato, pedunculis cymoſis. *Mexico.*

ternifolia Kunth. 5. R. ramis hexagonis foliisque ternis petiolatis obovatis crenatis incano-hirſutis, corymbis axillaribus pedunculatis multifloris. *Mexico.*

verticillata Kunth. 6. R. caule lignoſo, ramis verticillatis decagonis glaberrimis, foliis verticillatis obovatis crenatis pubeſcentibus, corymbis verticillatis. *Nov. Hiſpan.*

2193. ACHIMENES Vahl.

ſeſamoides Vahl. 1. A. foliis oppoſitis ſeſſilibus elongatis ſubſerratis laevibus, floribus racemoſis terminalibus, pedicellis oppoſitis. *Ind. or.* (Seſamum javanicum Burm. Columnea longifolia L., Diceros longifolius Perſ.)

*cochinchinenſis** 2. A. caule villoſo, foliis ternis ovato-lanceolatis ſerratis carnoſis glabris, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis. *Cochinchina.* (Diceros Lour. Columnea Poir.)

2194. RAZUMOVIA *.

*tranquebarica** *Coromandel.* Herba puſilla pubeſcens, foliis ſpathulato-linearibus, floribus axillaribus ſeſſilibus rubris.

2195. TREVIRANIA W.

coccinea W. *Jamaica.* Herba villoſa, radice ſquamoſo-tuberoſa, foliis ternis petiolatis oblongis ſerratis, pedunculis axillaribus ternis, floribus coccineis. (Büchnera coccinea Scop., Columnea erecta Lam., Gesneria pulchella Sw., Cyrilla pulchella Herit., Achimenes coccinea Perſ.)

2196. CHELONE.

* *Filamento quinto glabro.*

glabra 1. Ch. foliis oblongo-lanceolatis ſerrulatis utrinque glabris, floribus terminalibus denſe ſpicatis. *Amer. bor.* (Ch. obliqua L. var. fl. purpur.)

Lyoni Pursh. 2. Ch. foliis cordato-acuminatis ſerratis ſubtus tomentoſis, ſpicis axillaribus terminalibusque aggregatis. *Carolina.* (Ch. major Ker.)

gentianoides Humb. 3. Ch. foliis lanceolatis longe acuminatis ſeſſilibus integerrimis, pedunculis axillaribus paucifloris, calycibus acutis, corollis imberbibus. *Mexico.*

imberbis Humb. 4. Ch. caule ſimplici pubeſcente, foliis linearibus obtuſiuſculis integerrimis glabris, paniculae terminalis ramis 2floris, calycibus acutis, corollis imberbibus. *Nov. Hiſpan.*

barbata Cav. 5. Ch. caule tereti glabro ramoſo, foliis glaucis glaberrimis, inferioribus ſpathulato-ſuperioribus lineari-lanceolatis, paniculae terminalis ramis nutantibus, calycibus acutis, corollis barbatis. *Mexico.* (Ch. formoſa Wendl., ruellioides Andr.)

** *Filamento quinto piloſo.* (Pentſtemon Mitch. Ait.)

*fruteſcens** 6. Ch. caule fruticoſo ramoſo, foliis oblongis ſeſſilibus ſubdenticulatis, floribus ſubracemoſis terminalibus, calycibus acuminatis. *Camtſchatca. Inſ. Aleut.* (Pentſtemon fruteſcens Lamb.)

elegans Humb. 7. Ch. caule fruticoſo ramoſo, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulibus argute ſerrulatis, pedunculis axillaribus 2floris, calycibus corollisque pubeſcentibus. *Cuba. Nov. Hiſpan.*

campanulata Cav. 8. Ch. caule herbaceo foliisque lineari-lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſeſſilibus, pedunculis 2floris racemoſis, calycibus corollisque glabris. *Mexico.* (Chelone campanuloides Andr. Pentſtemon campanulata W. — Ch. anguſtifolia Kunth. var.)

*laevigata** 9. Ch. foliis glaberrimis, inferioribus petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis ſuperioribus amplexicaulibus lanceolatis tenuiſſime denticulatis, pedunculis terminalibus corymboſis pubeſcentibus. *Amer. bor.* (Pentſtemon laevigata Ait.)

*erianthera** 10. Ch. foliis amplexicaulibus ovato-oblongis integerrimis ſubundulatis glaberrimis, pedunculis trifloris ſubracemoſis, antheris hirſutis. *Louiſiana ſuper.* (Pentſtemon glabra Pursh. Sims., erianthera Fraſ. Nutt.)

hirſuta 11. Ch. foliis lanceolatis denticulatis cauleque hirſutiusculis, panicula terminali, calycibus glanduloſo-piloſiusculis. *Amer. bor.* (Pentſtemon hirſuta W. — Ch. Pentſtemon L., Pentſt. pubeſcens Ait. var.)

*criſtata** 12. Ch. caule humili pubeſcente, foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis axillaribus terminalibusque paucifloris abbreviatis, calycibus hirſutis, fauce corollae filamentoque ſterili criſtato-barbatis. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon criſtatum Fraſ., erianthera Pursh.)

*coerulea** 13. Ch. foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus integerrimis ciliatis cauleque glabris glaucis, pedunculis multifloris. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon anguſtifolia Fraſ. Pursh., coeruleum Nutt.)

*grandiflora** 14. Ch. caule elato foliisque amplexicaulibus oblongo-ſubrotundis integerrimis glaucis glaberrimis, floribus axillaribus amplis. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon grandiflorum Fraſ. Nutt., Bradburii Pursh.)

*albida** 15. Ch. caule humili, foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſerrulatis glabris, floribus axillaribus faſciculatis, calycibus pubeſcentibus. *Ad fl. Miſſuri.* (Pentſtemon teretiflorum Fraſ., albidum Nutt.)

*gracilis** 16. Ch. foliis ſeſſilibus linearibus argute ſerrulatis cauleque glabris, panicula pauciflora. *Amer. bor.* (Pentſtemon gracile Nutt.)

2197. CAPRARIA.

**Fruticoſae.*

undulata L. ſuppl. 1. C. foliis oppoſitis ovato-oblongis integerrimis undulatis, ſummis ſubcordatis verticillatis, racemis ſpicaeformibus ſecundis. *C. B. S.*

cuneata R. Br. 2. C. foliis alternis rhombeo-cuneiformibus inciſo-ſerratis piloſis, floribus geminis, laciniis calycis linearibus. *Amer. auſtr.* (C. hirſuta Kunth.)

biflora 3. C. ramis pilosis, foliis alternis argute serratis basi integerrimis attenuatis sessilibus glabriusculis, pedunculis geminis axillaribus, laciniis calycis subulatis. *Ind. occ. Amer. austr.* (Xuaresia biflora R. et P. syst. I. 622. solo staminum numero differt.)

lanceolata L. suppl. 4. C. ramis 4gonis, foliis oppositis lineari-lanceolatis rigidiusculis glabris, racemis terminalibus compositis, floribus subcapitatis. *C. B. S.*

** *Herbaceae.*

semiserrata Vahl. 5. C. caule piloso, foliis alternis lanceolatis cuspidatis basi attenuatis subintegerrimis ciliatis, pedunculis axillaribus capillaribus sub-1floris. *Ad fl. Magdalen.*

dissecta Delil. 6. C. caule ramoso viscido-villosiusculo, foliis pinnatifidis basi attenuatis, laciniis obtusiusculis dentatis, pedunculis axillaribus superne racemosis. *Ad Nilum Aegypt.*

2198. LEUCOPHYLLUM Humb.

ambiguum Humb. *Mexico.* Frutex ramosissimus, foliis alternis petiolatis obovato-oblongis integerrimis ramulisque densissime tomentosis, floribus axillaribus violaceis.

2199. MAURANDIA Jacqu.

semperflorens Jacqu. 1. M. foliis deltoideo-hastatis, lobis corollae emarginatis. *Mexico.* (Usteria scandens Cav. Andr.)

antirrhiniflora Humb. 2. M. foliis deltoideo-sagittatis, lobis corollae integerrimis. *Mexico.*

2200. SESAMUM.

orientale 1. S. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis longe petiolatis cauleque pilosiusculis, floribus axillaribus solitariis. *Ind. or.*

luteum Retz. 2. S. foliis lanceolatis integerrimis longe petiolatis cauleque pilosiusculis, floribus axillaribus solitariis hispidis. *Ind. or.*

prostratum Retz. 3. S. foliis orbiculatis crenatis supra hispidis subtus niveo-tomentosis, floribus solitariis pedunculatis, caule diffuso. *Ind. or.*

indicum 4. S. foliis inferioribus 3lobis dentatisque superioribus oblongis, floribus axillaribus alternis. *Ind. or.*

laciniatum W. 5. S. foliis omnibus 3partitis laciniatis scabris, caule prostrato hispido, floribus axillaribus solitariis. *Ind. or.*

2201. Dodartia.

orientalis 1. D. caule fruticoſo ramoſo, foliis linearibus ſeſſilibus ſubdentatis glabris, floribus racemoſo-ſpicatis. *Aſia minor. Caucaſ. Sibir. auſtr.*

indica 2. D. caule ſubſimplici foliisque ovatis ſerratis villoſis, floribus racemoſis. *Ind. or.*

2202. Cymbaria.

daurica 1. C. foliis lanceolatis, calycibus 10dentatis, labio cor. ſup. 2partito reflexo. *Dauria.*

boryſthenica Pall. 2. C. foliis linearibus, calycibus 5fidis, labio cor. ſup. integerrimo recto. *Inter Boryſthenem et Hypanim. Provinc. Cherſon.*

2203. Calytriplex R. et P.

†*obovata* R. et P. *Peru.*

2204. Sibthorpia.

europaea 1. S. foliis cordato-reniformibus lobato-crenatis peltatis, floribus didynamis. *Anglia. Luſitania.*

retuſa Kunth. 2. S. foliis cordato-reniformibus lobatis, lobis retuſis, floribus 5andris. *Nov. Hiſpan.*

pichinchenſis Kunth. 3. S. foliis cordatis ſub-7lobis, floribus 5andris. *In monte Pichincha.* [Genus olim cum Disandra n. 1393. jungendum.]

2205. Orobanche.

* *Labio cor. ſuper. integro.*

† *Labio infer. bipartito.*

americana 1. O. floribus imbricato-ſpicatis, bracteis tubum corollae aequantibus, calycibus 1phyllis integris, corollae incurvae labio inf. erecto. *Carolina.*

†† *Labio infer. trifido: calycibus 4partitis ſub-2ſepalis.*

major 2. O. floribus laxe ſpicatis inflato-ventricoſis, bracteis ſimplicibus calyces ſubſuperantibus, lobis lab. infer. ſubaequalibus acutiuſculis, ſtaminibus glabriuſculis. *Anglia. Europ. auſtr.* (O. barbata Brot.)

pruinoſa Lapeyr. 3. O. glanduloſo-villoſa, floribus laxe ſpicatis, bracteis ſetaceis tubo corollae brevioribus, lobis lab. inf. ſubaequalibus rotundatis denticulatis, ſtaminibus glabris. *Ager ruſcinonenſis Galliae auſtr.*

cruenta Bertol. 4. O. pubeſcens, floribus laxe ſpicatis, bracteis flore brevioribus, labio cor. ſuper. emarginato, lobis inf. obtuſiſſimis crenulato-criſpis, ſtaminibus ger-

mine ſtyloque undique piloſis, ſtigmate luteo. *Italia.* (O. caryophyllacea Viv.)

caryophyllacea Sm. 5. O. pubeſcens, floribus laxe ſpicatis, bracteis flore brevioribus, labio cor. ſup. emarginato, lobis inf. obtuſis fimbriato-criſpis, ſtaminibus baſi piloſis, germine glabro, ſtigmate fuſco. *Europ. med.* (O. major Poll., vulgaris Lam. Cand., rubens Wallr.)

rigens Loiſ. 6. O. glaberrima, floribus laxe ſpicatis, bracteis pubeſcentibus rigidis calyces aequantibus, lobis lab. inf. ſubaequalibus acutiuſculis, ſtylis ſtaminibusque glaberrimis. *Corſica.*

elatior Sutt. 7. O. pubeſcens, floribus confertim ſpicatis numeroſis, bracteis corollam ſubaequantibus flaccidis reflexis, limbo corollae undique crenulato, labio ſuper. emarginato, inferioris lobis ſubaequalibus, ſtaminibus baſi pubeſcentibus, ſtylo glabro, ſtigmate luteo. *Europ. med.*

crinita Viv. 8. O. pubeſcens, ſpica compacta cylindrica elongata apice bracteis comoſa, bracteis florem ſuperantibus, corolla cylindrica incurva, ſtaminibus germineque glaberrimis. *Corſica.*

coeruleſcens Steph. 9. O. pubeſcens, floribus denſe ſpicatis, bracteis flores aequantibus calycibusque albo-villoſis, ſtaminibus ſtyloque glabris. *Sibir. Caucaſ. Podolia.*

ſparſiflora Wallr. 10. O. pubeſcens, floribus remote ſpicatis, bracteis flores ſubaequantibus, corollae hirſutae lab. ſup. ſubemarginato, lobo medio lab. inf. obovato majori, ſtaminibus ciliatis. *German. med.*

minor Sm. 11. O. pubeſcens, ſquamis remotis, ſpica pauciflora, floribus tubuloſis, labio cor. ſup. integerrimo, infer. obtuſe lobato undulato, lobo medio majori 3lobo, ſtaminibus baſi ciliatis, ſtylo glabro. *Europ. med.* (O. barbata Lam.)

nudiflora Wallr. 12. O. pubeſcens, ſquamis paucis anguſtis, ſpica pauciflora laxa, bracteis flores tubuloſos ſuperantibus, lobis corollae integerrimis, medio labii inf. majori obovato, ſtaminibus baſi pubeſcentibus, ſtylo glabro. *Dania. Germania.* (O. minor Vahl. Epithymum Cand.?)

gracilis Sm. 13. O. corolla inflata, labio inferiori breviſſimo, laciniis obcordatis inaequalibus fimbriato-criſpis, ſtaminibus ſtyloque piloſis exſertis. *Liguria.*

***Labio cor. ſuper. bilobo.*

† *Calyce ſimpliciter 2partito aut 2ſepalo.*

rubra Sm. 14. O. ſcapo ſuperne glanduloſo-pubeſcente viſcido, floribus laxe ſpicatis tubuloſis, bracteis ſolitariis flore brevioribus, lobis cor. integerrimis, lab. inf. minori, ſtaminibus baſi ſtyloque apice ciliatis. *Hibernia bor.*

ſpecioſa Cand. 15. O. ſcapo ſuperne glanduloſo-piloſo, floribus denſe ſpicatis, bracteis ſolitariis, corollae tubuloſae lobis rotundatis crenulatis, medio labii inf. majori, ſtaminibus ſtyloque glabris. *Ad Telonem Galliae provinc.*

16.

alba Steph. W. 16. O. fulvo-villoſa, floribus laxe ſpicatis, bracteis ſolitariis calycem aequantibus, lobis corollae ſubaequalibus denticulatis, ſtaminibus baſi ſtyloque apice glanduloſo-piloſis. *Caucaſ.*

acaulis Roxb. 17. O. acaulis, floribus glomeratis, corollis campanulatis laciniato-ſerratis, antheris internis baſi glanduliferis. *Ad Sacchari culmos in horto Calcutt.*

†† *Calyce 4partito, ſ. 2ſepalo, ſepalis 2fidis.*

coerulea Vill. 18. O. glabriuscula, floribus laxe ſpicatis tubuloſis cernuis, bracteis acuminatis ternis calycem ſubaequantibus, labio cor. ſup. 2fido ſub-2dentato, lobis labii inf. aequalibus planis integerrimis, ſtaminibus glabris. *Europ. med.* (O. laevis Lam., purpurea Jacqu.)

longiflora Trevir. 19. O. pubeſcens, floribus laxe ſpicatis, bracteis ternis, media ovata obtuſa, corolla calycem triplo ſuperante, labio infer. elongato, ſtaminibus pubeſcentibus. *Ad Volgam.*

cernua Löfl. 20. O. glabra, bracteis corolla brevioribus, tubo baſi ventricoſo, lobo medio labii inf. crenulato, lateralibus acutis. *Hiſpania.*

foetida Poir. 21. O. hirſuta, floribus arcte ſpicatis campanulatis, bracteis ſolitariis cuſpidatis corollas aequantibus, lobis corollae aequalibus obtuſiſſimis denticulato-fimbriatis, ſtaminibus pubeſcentibus. *Afric. bor. Sicilia. Gallia auſtr. Inſ. maris aegei.* (O. caneſcens Presl.? pubeſcens Urv.)

ſanguinea Presl. 22. O. pubeſcens ſquamata, floribus denſiſſime ſpicatis, bracteis ſolitariis flores ſubaequantibus, lobis corollae aequalibus obtuſis denticulatis, ſtaminibus glaberrimis. *Sicil.*

compacta Viv. 23. O. ſcapo breviſſimo ſquamoſo, ſpica oblonga compacta, bracteis ſolitariis tubo corollae multo brevioribus, lobis corollae rotundatis undulatis, ſtaminibus glabris. *Ad Syrtim magnam Afric. bor.*

media Desf. 24. O. hirſuta, floribus denſe ſpicatis, bracteis ſolitariis ovatis calycem aequantibus, lobis corollae ſubaequalibus rotundatis planis integerrimis. *Afric. bor.*

arenaria M.B. 25. O. glabriuscula, ſpica pauciflora, bracteis ſolitariis corolla minoribus calycibusque laevibus, lobis corollae acutiusculis, ſtaminibus glabris. *Podolia. Beſſarabia. Tauria. Caucaſ.*

ramoſa 26. O. ſcapo ramoſo, floribus remote ſpicatis alternis, bracteis ſolitariis calyces ſubaequaliter 4fidos aequantibus, corollae tubo baſi conſtricto, limbo aequaliter 5lobo, ſtaminibus glabris incluſis. *Europ.*

purpurea Thunb. 27. O. ſcapo ramoſo villoſo, floribus racemoſis, pedunculis oppoſitis, corollis campanulatis. *C. B. S.*

*indica** 28. O. ſcapo ramoſo, floribus terminalibus faſciculatis, bracteis ternis, corollae lobis ſubaequalibus obtuſis. *Ind. or.* (Büchnera hydrabadenſis Roth.)

††† *Calyce 5fido.*

comofa Wallr. 29. O. fquamis bracteisque furfuraceo-hirfutis, fpica comofa compacta, bracteis ternis, tubo corollae medio conftricto, labio cor. fuper. 2lobo revoluto, lobis inf. oblongis fubcrenulatis. *Thuringia.*

ludoviciana Nutt. 30. O. pulverulento-pubefcens, floribus denfe fpicatis, bracteis binis corolla brevioribus, limbo recurvo fub-5lobo, ftaminibus glabris. *Louifiana.*

fquamofa Thunb. 31. O. glabra fubramofa, floribus fpicatis, bracteis ternis calycibusque obtufis, corolla incurvo-tubulofa. *Afric. auftr.*

2206. Phelipaea Tourn.

Tournefortii Desf. 1. Ph. fcapo nudo fimpliciffimo 1floro bafi vaginato, lobis corollae aequalibus orbiculatis patentibus. *Armenia.*

foliata Lamb. 2. Ph. fcapo fimpliciffimo 1floro remote fquamato, corollae cernuae lobis ovalibus. *Tauria. Caucaf.* (Orobanche coccinea M. B. W.)

biflora * 3. Ph. fcapo abbreviato bafi vaginato fubfquamato 2floro, corollae tubo recurvo, limbi lobis fubaequalibus venofis marginatis. *Amer. bor.* (Orobanche 1flora L., 2flora Nutt.)

fafciculata * 4. Ph. fcapo abbreviato pulverulento pubefcente, floribus corymbofis terminalibus, corollae tubulofae incurvae lobis rotundis. *Louifiana.* (Orobanche fafciculata Nutt.)

violacea Desf. 5. Ph. fcapo carnofo fquamofo multifloro, fpica denfa, bracteis ternis, calycibus obtufis, corolla tubulofa. *Afric. bor.* (Orobanche Phelypaea W.)

lutea Desf. 6. Ph. fcapo carnofo fquamofo multifloro, fpica denfa, bracteis ternis, calycibus obtufis, corolla infundibuliformi arcuata. *Lufitan. Afric. bor. Arabia.* (Lathraea Phelypaea L., Orobanche tinctoria Forsk. W., Ph. tinctoria Brot.)

2207. Hyobanche.

fanguinea *C. B. S.* Scapus craffus fquamofus fanguineo-villofus, floribus rubentibus bracteas fubfuperantibus.

2208. Lathraea.

Clandeftina 1. L. fcapo fubterreftri ramofo, pedunculis aggregatis terminalibus, floribus erectis. *Gallia. Italia.* (Clandeftina rectiflora Lam.)

Squamaria 2. L. fcapo fimplici fquamofo, floribus bracteatis pendulis. *Europ.* (Clandeftina penduliflora Lam.)

† *Anblatum* 3. L. corollae labiis indivifis. *Afia minor.* (Anblatum orientale Tourn. a nemine poft Tourn. vifum.)

2209. EPIPHEGUS Nutt.

americanus Nutt. *Amer. bor.* Scapus ramoſus ſquamatus, floribus alternis remotis pedunculatis albidis purpureo-ſtriatis. (Orobanche virginiana L.)

2210. ALECTRA Thunb.

capenſis Thunb. *Afric. auſtr.* Caulis ſimplex foliis ſquamaceis ſparſis ovato-oblongis villoſis, floribus ſpicatis luteis purpureo-ſtriatis. (Gerardia orobanchoides Lam.)

2211. AEGINETIA Roxb.

indica Roxb. *Ind. or.* Planta acaulis aphylla, ſcapi plures ex eadem radice nudi 1flori, corolla purpurea e ſpatha flava. (Orobanche Aeginetia L.)

2212. ACANTHUS.

ebracteatus Vahl. 1. A. caule fruticoſo inermi, foliis oblongo-lanceolatis elongatis dentato-ſpinoſis, ſpica pedunculata terminali pedunculata, bracteis minutis ſolitariis. *Ind. or. Cochinchina. Nov. Holl.* (Ac. ilicifolius Lour. Dilivaria Juſſ. Perſ.)

ilicifolius 2. A. caule fruticoſo ſubinermi, foliis oblongis ſinuato-dentatis ſpinoſis undulatis, ſpica foliata, bracteis ternis. *Ind. or. Nov. Holl.* (Dilivaria Juſſ. Perſ.)

*Delilii** 3. A. caule ſuffruticoſo humili, foliis ovatis acutis ſubſeſſilibus dentato-ſpinoſis, ſpicis 4fariam imbricatis rigidis, bracteis ternis, media foliacea flores ſuperante, lateralibus ſetaceis, ſeminibus villoſis. *Aegypt.* (Acanthodium ſpicatum Delil.)

ſpinoſus 4. A. caule herbaceo, foliis 2pinnatifidis undique ſpinoſis, ſpica elongata, bracteis foliaceis 3partitis. *Italia.*

carduifolius Thunb. 5. A. acaulis, foliis radicalibus oblongis ſinuatis ſpinoſis villoſiuſculis, ſcapo ſpicigero, floribus imbricatis, bracteis ternis ſpinoſis. *C. B. S.*

mollis 6. A. caule herbaceo, foliis ſinuato-pinnatifidis inermibus nitidis, ſpica elata, bracteis latis foliaceis ſpinoſo-dentatis. *Italia. Graecia.* (Ac. niger Mill. foliorum dentibus ſubſpinuloſis differt.)

2213. BLEPHARIS Juſſ.

*arborea** 1. Bl. caule arboreſcente, foliis ſinuato-dentatis ſupra glaberrimis margine ſpinoſis, ſpica ſeſſili denſa, bracteis villoſis. *Arabia.* (Acanthus arboreus Forsk.)

furcata Perſ. 2. Bl. caule fruticoſo ramoſo, foliis oblongis dentato-ſpinoſis, floribus ſpicatis ſecundis, bracteis ſpina trifida terminatis. *Afric. auſtr.* (Acanthus furcatus Thunb.)

capensis Perf. 3. Bl. caule fruticofo ramofo, foliis fubfafciculatis obovato-oblongis dentato-fpinofis, fpica capitata, bracteis fpinofis. *C. B. S.* (Acanthus capenfis Thunb.)

procumbens Perf. 4. Bl. caule fruticofo procumbente, ramis umbellatis, foliis obovatis dentato-fpinofis, floribus lateralibus capitatis, bracteis ciliato-fpinofis. *Afric. auftr.* (Acanthus procumbens Thunb., glomeratus Lam.)

† *calaminthaefolia* Perf. 5. Bl. caule fruticofo, foliis ovatis integerrimis fpinofis, floribus axillaribus. *Patria?*

edulis Perf. 6. Bl. caule fuffruticofo, foliis quaternis lineari-lanceolatis dentato-fpinofis, fpicis pedunculatis axillaribus, bracteis foliaceis flores longe fuperantibus. *Perfia. Arabia.* (Ruellia perfica N. L. Burm., ciliaris L., Acanthus edulis Forsk. W.)

boerhaavifolia Perf. 7. Bl. caule herbaceo dichotomo, foliis quaternis inaequalibus oblongis bafi attenuatis inermibus, capitulis paucifloris axillaribus. *Ind. or.* (Acanthus ciliaris N. L. Burm., maderafpatenfis L.)

molluginifolia Perf. 8. Bl. caule herbaceo repente hifpido, foliis quaternis linearibus ciliatis, floribus axillaribus folitariis. *Ind. or.* (Acanthus repens Vahl.)

fatureiaefolia Perf. 9. Bl. caule herbaceo ramofo, foliis fubquaternis obovatis inermibus, floribus axillaribus folitariis. *Afric. auftr.* (Acanthus integrifolius Thunb.)

linariaefolia Perf. 10. Bl. caule herbaceo dichotomo, foliis linearibus elongatis fubdentatis, floribus axillaribus folitariis. *Senegambia.*

2214. Ruellia.

1. *Floribus axillaribus folitariis vel oppofitis* † *feffilibus.*

coccinea Vahl. 1. R. caule ramofo, foliis ovatis dentatis petiolatis. *Ind. occid.* (Barleria coccinea L.)

pallida Vahl. 2. R. caule ramofo, foliis ovato-oblongis obtufiusculis undulato-crenatis margine fcabris, floribus bracteatis. *Arabia.* (R. ftrepens Forsk.)

ocimoides Cav. 3. R. caule humili ramofo, foliis ovato-ellipticis obtufis integerrimis fubtus glaucis petiolatis, floribus bracteatis. *Mexico.*

ciliata Hornem. 4. R. caule fuffruticofo erecto foliisque longe petiolatis ovatis acutis repando-fubdentatis pilofis, bracteis petiolatis foliaceis. *Ind. or.*

auftralis Cav. 5. R. caule erectiusculo, foliis oblongo-lanceolatis petiolatis, floribus ebracteatis. *Nov. Holl.*

foetida Humb. 6. R. caule fuffruticofo, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris. *Mexico.*

tubiflora Bonpl. 7. R. caule herbaceo erecto, foliis petiolatis oblongis acuminatis glabris, corolla infundibuliformi elongata. *Ad fl. Magdalen.*

quitenfis Kunth. 8. R. caule fuffruticofo proftrato foliisque obovato-oblongis obtufiusculis pubefcentibus, corolla infundibuliformi, antheris bafi 3dentatis. *Quito.*

geminiflora Kunth. 9. R. caule herbaceo foliisque oblongis acutis integerrimis subſtrigoſis. *Nov. Granat.*

biflora 10. R. caule herbaceo aſcendente foliisque ſubſeſſilibus obovato-oblongis villoſis, floribus bracteatis, calycibus tubum corollae aequantibus. *Carolina.* (R. oblongifolia Mx.)

aciculata Roth. 11. R. caule erecto villoſo, foliis parvis ovalibus rigidiusculis mucronatis ciliatis, bracteis faſciculatis aceroſis 4gonis rigidiſſimis apice 2-3ſpinoſis ramos ſquarroſos obſidentibus, corolla campanulata. *Ind. or.*

microphylla Cav. 12. R. caule proſtrato, foliis parvis oblongis integerrimis petiolatis, floribus ebracteatis, calycibus tubum corollae aequantibus. *Nov. Hiſpan.*

repens N. L. Burm. 13. R. caule repente, foliis lanceolatis acutiusculis ſeſſilibus, floribus bracteatis. *Java.*

humiſtrata Mx. 14. R. caule proſtrato radicante glabriusculo, foliis obovatis in petiolum attenuatis, capſulis linearibus. *Georgia. Florida.*

depreſſa Thunb. 15. R. caule ſuffruticoſo proſtrato, foliis confertis obovatis mucronatis petiolatis glabris. *Afric. bor.*

ſpineſcens Thunb. 16. R. caule ſuffruticoſo depreſſo, foliis faſciculatis confertis lanceolatis rigidis ſpineſcentibus ſquarroſis, floribus ſparſis. *Afric. auſtr.*

pumilio R. Br. 17. R. caule diffuſo procumbente, foliis oblongo-linearibus obtuſis, bracteis minutis. *Nov. Holl.*

†† *Floribus pedunculatis.*

violacea Aubl. 18. R. caule erecto herbaceo villoſo, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubrepandis tomentoſis, pedunculis axillaribus alternis 1floris apice bracteatis, corolla infundibuliformi, genitalibus exſertis. *Guiana.*

longiflora Vahl. 19. R. caule erecto fruticoſo villoſo, foliis petiolatis ovatis obtuſis ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis abbreviatis bracteatis, corollae tubo gracillimo longiſſimo. *Arabia.*

piloſa 20. R. caule ſuffruticoſo erecto, foliis ovatis obtuſis integerrimis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, pedunculis ſubterminalibus abbreviatis ſolitariis. *Afric. auſtr.* (R. ovata Thunb., pubeſcens Perſ.)

barlerioides Roth. 21. R. caule fruticoſo glaberrimo, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis petiolatis, pedunculis axillaribus oppoſitis abbreviatis, bracteis coloratis reticulato-venoſis, calycibus villoſis. *Ind. or.*

bracteata R. Br. 22. R. caule erecto, foliis oblongo-ellipticis, pedunculis abbreviatis, bracteis foliaceis deciduis. *Nov. Holl.*

† *litoralis* 23. R. caule fruticoſo incano, foliis cuneiformibus retuſis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ind. or.* Heyne. Roth.

acaulis R. Br. 24. R. caule pumilo, foliis obovato-oblongis obtuſis, pedunculis axillaribus ebracteatis. *Nov. Holl.*

proſtrata Poir. 25. R. caule herbaceo proſtrato pubeſcente, foliis petiolatis ovatis crenatis villoſis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ind. or.*

2. *Floribus verticillatis.*

ſalicifolia Vahl. 26. R. caule erecto ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis, bracteis lineari-lanceolatis, calycibus ariſtatis. *Ind. or.*

*braſilienſis** 27. R. caule erecto herbaceo foliisque oblongo-lanceolatis venoſis integerrimis glabris, verticillis ſubebracteatis dimidiatis, calycibus ariſtatis. *Braſil.* Sello.

*verticillata** 28. R. caule erecto herbaceo retrorſum piloſo, foliis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus hiſpidiuſculis, verticillis ebracteatis, calycibus elongatis hiſpidis. *Monte Video.* Sello.

barbata Vahl. 29. R. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis integerrimis ſcabris ſeſſilibus, verticillis paucifloris, bracteis oblongis, calycibus pubeſcentibus acutis. *Ind. or.*

ſetigera Perſ. 30. R. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis obovatis obtuſiſſimis glabris, verticillis bracteatis, calycibus ſubulato-ariſtatis ſcabris. *Afric. auſtr.* (R. ariſtata Thunb.)

rubricaulis Cav. 31. R. caule erecto herbaceo, foliis oblongis crenatis petiolatis glabris, verticillis paucifloris, bracteis linearibus ſubintegerrimis, calycibus ſubulatis. *Mexico.*

albicaulis Bert. 32. R. caule erecto herbaceo, foliis longe petiolatis ovatis acuminatis integerrimis piloſis, verticillis paucifloris, bracteis ovato-ſubrotundis, laciniis calycis linearibus pectinato-ciliatis. *Ad fl. Magdalen.*

ciliosa Pursh. 33. R. caule erecto ramoſo, foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis longe ciliatis, bracteis lanceolatis abbreviatis, calycibus ſubulatis. *Georgia.*

hybrida Pursh. 34. R. caule erecto ramoſiſſimo, foliis ſubſeſſilibus oblongis utrinque attenuatis hirſutis, bracteis abbreviatis, laciniis calycis linearibus. *Georgia.*

ovata Cav. 35. R. caule aſcendente herbaceo, foliis oblongis obtuſiuſculis baſi attenuatis ſubſeſſilibus villoſis, verticillis paucifloris, laciniis calycis linearibus hirſutis. *Mexico.*

patula Jacqu. 36. R. caule fruticoſo erecto ramoſo foliisque petiolatis ovato-oblongis obtuſiſſimis integerrimis pubeſcentibus, verticillis paucifloris, capſulis obovatis calyce majoribus. *Ind. or.*

difformis 37. R. caule diffuſo hirſuto, foliis linearibus ſinuato-dentatis integerrimisque. *Ind. or.*

3. *Pedunculis axillaribus paucifloris.*

formoſa Andr. 38. R. caule erecto herbaceo foliisque ovato-oblongis integerrimis petiolatis piloſis, pedunculis elongatis hirſutis, laciniis calycis linearibus, corolla

ſubringente, genitalibus exſertis. *Braſil.* (R. elegans Poir.)

ventricoſa Humb. 39. R. caule herbaceo erecto foliisque oblongis integerrimis petiolatis pubeſcentibus, pedunculis dichotomis elongatis, calycibus bracteatis ſubulatis, corolla ventricoſa. *Nov. Granat.*

*cayennenſis** 40. R. ramis teretibus foliisque lanceolatis acuminatis integerrimis petiolatis glabris, pedunculis elongatis, calycibus villoſis, corollae tubo apice inflato. *Cayenn.* (R. ventricoſa Poir., longiflora Perſ.)

grandiflora Poir. 41. R. ramis 4gonis foliisque petiolatis ovatis obtuſis repandis glabris, pedunculis folia ſuperantibus dichotomis, calycibus elongatis ſubulatis. *Guadalupa.*

macrophylla Vahl. 42. R. ramis 4gonis foliisque oblongis utrinque attenuatis integerrimis petiolatis pubeſcentibus, pedunculis elongatis 2fidis bracteatis, calycibus glabris. *Amer. auſtr.*

dichotoma Berter. 43. R. caule herbaceo erecto ramisque teretibus, foliis oblongis utrinque attenuatis longe petiolatis caneſcenti-pubeſcentibus, pedunculis axillaribus dichotomis foliatis folio brevioribus, calycibus ſubulatis elongatis hirſutis. *Ad fl. Magdalen.*

tuberoſa 44. R. radice faſciculata, caule herbaceo aſcendente hirſuto, foliis obovato-oblongis crenatis glabriusculis, pedunculis trifidis folio ſubbrevioribus ebracteatis, calycibus elongatis ſubulatis, capſulis linearibus. *Jamaica.*

ſtrepens 45. R. caule herbaceo erecto foliisque oblongis repandis petiolatis hirſutis, pedunculis breviſſimis foliatis 3floris, calycibus hirſutis lineari-ſubulatis. *Virginia. Carolina. Ind. occid.* (Flores ſubverticillati.)

lactea Cav. 46. R. caule herbaceo tomentoſo-lanato, foliis oblongis obtuſis repandis in petiolum attenuatis pubeſcentibus, pedunculis breviſſimis 3floris bracteatis, capſulis linearibus. *Mexico.*

clandeſtina 47. R. caule herbaceo, ramis 4gonis, foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis crenulatis pubeſcentibus, pedunculis 3floris folio brevioribus. *Ind. occid.*

erecta Roth. 48. R. caule erecto villoſo, foliis ſubrotundis obtuſis mucronatis petiolatis ſubcrenulatis ſupra ſcabris ſubtus tomentoſis, pedunculis breviſſimis bracteatis. *Ind. or.*

dulcis Cav. 49. R. caule ſimplici humili herbaceo, foliis longe petiolatis oblongis integerrimis, pedunculis bracteatis folio brevioribus. *Chili.*

4. *Racemis axillaribus multifloris.*

paniculata 50. R. caule fruticoſo ramoſo, foliis oblongis acutis venoſis hirſutiusculis integerrimis petiolatis, racemis axillaribus dichotomis bracteatis, floribus ſubſeſſilibus, lobis corollae emarginatis. *Jamaica. Nov. Granat.*

rubra Aubl. 51. R. caule herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis repandis glabris, pedunculis corymbofis multifloris bracteatis, corollae limbo fimbriato, capfula utrinque finuata. *Guiana.*

fecunda Vahl. 52. R. foliis fubcordato-ovatis obtufis integerrimis villofis petiolatis, racemis axillaribus fecundis, calycibus hirtis corolla glabra brevioribus. *Ind. or.*

glandulofa Roth. 53. R. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis ferrulatis pubefcentibus, racemis axillaribus fubfecundis, calycibus pubefcentibus corollas fubaequantibus. *Ind. or.*

vifcofa Humb. 54. R. herbacea glandulofo-pilofa vifcofa, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus feffilibus. *Ad Orinocum.*

inundata Humb. 55. R. herbacea procumbens pilofo-vifcofa, foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus feffilibus. *Ad fl. Magdalenae.*

5. *Floribus fafciculatis, capitatis.*

fulgida Andr. 56. R. caule erecto fruticofo, foliis ovato-acuminatis undulato-crenatis pilofis, fafciculis longe pedunculatis axillaribus bracteatis. *Ind. occid.*

undulata Vahl. 57. R. caule erecto herbaceo, foliis petiolatis oblongis obtufis undulatis glabris, capitulis axillaribus feffilibus. *Ind. or.*

molliffima Vahl. 58. R. villofa, foliis petiolatis lato-lanceolatis acuminatis integerrimis, fafciculis pedunculatis. *Madagascar.*

involucrata Vahl. 59. R. foliis fubfeffilibus lanceolatis obtufiusculis glabris, capitulis terminalibus breviter pedunculatis, bracteis quaternis pilofis. *Ind. or.*

ariftata Vahl. 60. R. foliis petiolatis ovatis obtufis integerrimis fubtus canefcentibus, capitulo terminali involucrato, bracteis calycibusque nervofis ariftatis. *Arabia.*

crifpa 61. R. caule fuffruticofo diffufo, foliis petiolatis oblongis obtufis undulato-crenatis, capitulis terminalibus foliofis hifpidis, bracteis lanceolatis. *China. Ind. or.* (R. urens Roth.)

fumatrenfis Roth. 62. R. caule repente hifpido, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis fubintegerrimis, floralibus retufis, fafciculis terminalibus feffilibus, bracteis lanceolatis ferrulatis. *Sumatra.*

6. *Floribus fpicatis.*

cordifolia Vahl. 63. R. caule fruticofo, foliis feffilibus cordato-ovatis integerrimis fubtus incano-tomentofis, fpica terminali pauciflora, bracteis linearibus calycem aequantibus. *Ind. or.*

guttata Forsk. 64. R. caule fuffruticofo, foliis petiolatis oblongis obtufiusculis undulatis margine fcabris, fpica ter-

minali pedunculata, bracteis ternis calyces ſubſuperantibus. *Arabia.*

japonica Thunb. 65. R. caule herbaceo erecto, foliis ſubpetiolatis ellipticis integerrimis glabris, ſpicis terminalibus alternis, bracteis oblongis obtuſis. *Japon.*

hirta Vahl. 66. R. caule herbaceo aſcendente foliisque petiolatis oblongis ſerratis albido-hirſutis, ſpicis terminalibus imbricatis, bracteis oblongis calycem aequantibus. *Ind. or.*

tetragona Link. 67. R. caule herbaceo 4gono erecto foliisque ovatis acuminatis repando-dentatis hirſutis, verticillis ſpicatis ebracteatis. *Braſil.*

latebroſa Roth. 68. R. caule herbaceo 4gono foliisque oblongis acutis medio groſſe ſerratis longe petiolatis hiſpidiusculis, ſpicis terminalibus imbricatis paucifloris, bracteis lanceolatis. *Ind. or.*

† *rufeſcens* Roth. 69. R. caule erecto foliisque petiolatis oblongis acuminatis groſſe ſerratis rufo-ſetoſis, oppoſito minori, ſpicis imbricatis, bracteis lanceolatis, calyce 3partito inaequali. *Ind. or.*

myſorenſis Roth. 70. R. caule erecto foliisque ovatis acuminatis crenatis ſcabris, ſpicis terminalibus ovatis imbricatis, bracteis lanceolatis margine piloſiſſimis. *Ind. oe.*

ſpicata Roth. 71. R. caule erecto hiſpido, foliis ovatis acuminatis ſerratis petiolatis ſupra ſcabris, ſpicis paniculatis oblongis paucifloris, bracteis lanceolatis 3nerviis. *Ind. or.*

longifolia Roth. 72. R. caule erecto glabro, foliis oblongo-lanceolatis ſubintegerrimis pubeſcentibus, ſpicis axillaribus ſeſſilibus ſubgeminis, bracteis lineari-lanceolatis calycibusque ſetoſo-ciliatis. *Ind. or.*

elongata P. B. 73. R. caule erecto foliisque oblongis acuminatis integerrimis glabris, floribus ſpicato-racemoſis terminalibus bracteatis, corollae tubo longiſſimo. *Guinea.*

digitalis Kön. 74. R. caule erecto herbaceo foliisque ovatis acuminatis integerrimis longe petiolatis glabris, ſpica terminali laxa, floribus alternis remotis ebracteatis, corolla ventricoſa. *Ind. or.*

repanda 75. R. caule repente, ramis erectis, foliis lanceolatis dentatis petiolatis, ſpicis terminalibus pedunculatis, calycibus ariſtatis. *Java. Amboina.*

reptans Forſt. 76. R. caule repente, foliis ovatis obtuſis ſerratis petiolatis, ſpicis pedunculatis terminalibus. *Nov. Hebrid.*

rupeſtris Sw. 77. R. acaulis, foliis longe petiolatis ellipticis repando-crenatis hirſutis ſubtus incanis, ſcapo ſpicigero bracteato folia ſubaequante, corolla hypocrateriformi. *Inſ. Antill. Carib.* (Gerardia tuberoſa L.)

ſcabroſa Sw. 78. R. acaulis, foliis breviſſime petiolatis ovatis acutis coriaceis ſubrepandis glabris ſubtus ſcabris, ſcapo ſpicigero bracteato, corolla hypocrateriformi. *Hiſpaniola.*

7. *Dubiae.*

intrusa Forsk. 79. R. caule herbaceo, foliis ovatis integerrimis pilosis petiolatis, spica terminali secunda, bracteis setaceis, lacinia corollae quinta fornicata in faucem intrusa. *Arabia.*

gigantea Humb. 80. R. arborea, ramis 4gonis, foliis ovatis acuminatis glabris, panicula terminali, bracteis calycibusque obtusis pubescentibus. *Amer. austr.*

2215. BLECHUM Juss.

Brownei Juss. 1. Bl. caule herbaceo ramoso, foliis ovato-oblongis repando-dentatis pubescentibus, spicis pedunculatis axillaribus terminalibusque 4gonis, bracteis serratis hirsuto-ciliatis 3floris. *Ind. occ.* (Ruellia Blechum L., Barleria pyramidata Lam.)

laxiflorum Juss. 2. Bl. caule herbaceo ramoso, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis glabris, spicis terminalibus ovatis, bracteis cordato-ovatis integerrimis glabris sub-1floris. *Jamaica.* (Ruellia blechioides Sw.)

angustifolium R. Br. 3. Bl. caule herbaceo, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis glabris, spicis terminalibus oblongis, bracteis ovatis integerrimis hirsutis. *Ins. Carib.*

2216. APHELANDRA R. Br.

cristata R. Br. *Ind. occid.* Frutex foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis subtus ad venas pilosis, spicis pedunculatis elongatis, bracteis coloratis, corollis coccineis. (Justicia pulcherrima L. fil., 4gona Vahl., Ruellia cristata Andr.)

2217. HARRACHIA Jacqu.

speciosa Jacqu. *Ind. or.* Frutex foliis oblongis undulatis glabris, spicis pedunculatis, bracteis ternis cuspidatis pubescentibus, floribus miniatis. (Justicia infundibuliformis L., Ruellia infundibuliformis Andr., Crossandra undulaefolia Salisb.)

2218. AETHEILEMA R. Br.

alopecuroides R. Br. 1. Ae. caule herbaceo foliisque ovatis subrepandis nervosis glabris, spicis pedunculatis terminalibus pilosis bracteatis, calycibus membranaceis subulatis. *Ins. Carib.* (Ruellia Vahl.)

imbricatum R. Br. 2 Ae. caule suffruticoso, foliis petiolatis ovatis undulato-crenatis, opposito minori, spica secunda foliosa, bracteis cordatis pilosis. *Arabia. Ins. Mascaren. Ind. or.* (Ruellia imbricata Forsk., dorsiflora Retz.)

*parviflorum** 3. Ae. caule herbaceo foliisque ovatis acutis venosis hirsutis, pedunculis 3floris axillaribus, calycibus

glandulofis. *Ind. or.* (Micranthus oppofitifolius Wendl. Phaylopfis parviflora W.)

2219. LEPIDAGATHIS W.

criftata W. 1. L. caule fruticofo diffufo, foliis feffilibus lanceolatis integerrimis rigidis glabris, capitulis radicalibus majoribus rameisque minoribus. *Coromandel.*

*repens** 2. L. caule herbaceo repente, foliis feffilibus ovato-oblongis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris. *Cochinchina.* (Septas repens Lour.)

2220. BARLERIA.

** Spinofae.*

buxifolia 1. B. fpinis axillaribus oppofitis fimplicibus, foliis fubrotundis coriaceis integerrimis, floribus folitariis axillaribus. *Ind. or.*

Hyftrix 2. B. fpinis axillaribus oppofitis fimplicibus, foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, floribus axillaribus folitariis. *Ind. or. Inf. Molucc.*

acanthoides Vahl. 3. B. fpinis geminis foliaceis, foliis oblongis cufpidatis pilofis, fpicis axillaribus fecundis. *Arabia.*

folanifolia 4. B. fpinis axillaribus fubquaternis fimplicibus, foliis lanceolatis finuato-dentatis glabris, floribus axillaribus oppofitis. *Hifpaniola.*

Prionitis 5. B. fpinis axillaribus fubquaternis divaricatis fimplicibus, foliis ovato-oblongis fubtus pubefcentibus, floribus axillaribus oppofitis. *Ind. or. Arabia.* (Jufticia appreffa Forsk.)

bifpinofa Vahl. 6. B. fpinis axillaribus oppofitis 2fidis divaricatis, foliis ovatis mucronatis integerrimis fubtus villofis, pedunculis e fpinarum angulo 1floris. *Arabia.* (Jufticia Forsk.)

trifpinofa Vahl. 7. B. fpinis axillaribus 3fidis, foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, fpica terminali imbricata, calycibus villofis. *Arabia.* (Jufticia Forsk.)

longifolia 8. B. caule foliisque lineari-lanceolatis longiffimis integerrimis hifpidis, floribus verticillatis, fpinis verticillorum fenis erectis craffis. *Ind. or.*

noctiflora 9. B. fpinis axillaribus ramofis, foliis lanceolatis cufpidatis integerrimis, floribus folitariis feffilibus alternis, bracteis fcariofis ftrigofis, tubo corollae elongato. *Ind. or. Arabia.* (Jufticia lanceata Forsk. Barl. myforenfis Roth.)

*** Inermes.*

criftata 10. B. foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus fubfolitariis, fepalis duobus majoribus nervofis ciliatis, duobus linearibus. *Ind. or.*

tomentofa Roth. 11. B. foliis oblongis integerrimis fubtus tomentofis, floribus racemofis bracteatis, fepalis fcariofis coloratis integerrimis, duobus majoribus ovato-lanceolatis, duobus linearibus. *Ind. or.*

ſtrigoſa W. 12. B. foliis oblongis ſubtus ſtrigoſis, ſpicis terminalibus ovatis, bracteis obtuſis reticulatis ciliatis. *Ind. or.*

longiflora 13. B. foliis ovatis integerrimis ſericeis, floribus terminalibus, bracteis cordatis ſcarioſis, tubo corollae gracili elongato. *Malabar.*

flava Jacq. 14. B. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſtrigilloſis, ſpica imbricata, bracteis ciliatis reticulatis, ſepalo quarto bifido. *Arabia.* (Dianthera americana Forsk. Dianthera flava et Juſticia flava Vahl. W., Eranthemum flavum W. ſuppl., Barleria mitis Ker.)

procumbens Lour. 15. B. foliis lato-lanceolatis crenatis piloſis, capitulis terminalibus, bracteis acuminatis ciliatis. *China.*

pungens Thb. 16. B. foliis ſubſeſſilibus ovatis integerrimis glabris mucronatis, floribus axillaribus, bracteis ſpinuloſo-ciliatis. *Afric. auſtr.*

anomala * 17. B. foliis petiolatis oblongis integerrimis glabris, paniculis axillaribus, bracteis binis minutis, calycibus 5partitis obtuſis. *Ad fl. Magdalen.* (Bignonia bibracteata Bertero.)

2221. HYGROPHILA R. Br.

formoſa * 1. H. fruticoſa, ramis teretibus, foliis oblongis ſubcoriaceis dentato-ſpinoſis, petiolis baſi verticillato-ſpinoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus, bracteis calycibusque ſpinuloſis. *Peru.* (Ruellia formoſa Humb.)

ringens R. Br. 2. H. procumbens, foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis, bracteis calyce brevioribus. *Ind. or.* (Ruellia ringens L.)

anguſtifolia R. Br. 3. H. procumbens, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus axillaribus confertis, bracteis ciliatis. *Nov. Holl.*

2222. THUNBERGIA.

grandiflora Roxb. 1. Th. ſcandens, foliis cordatis angulatis acuminatis hiſpidiusculis, pedunculis 1floris, calyce inter. 0, antheris barbatis calcaratis. *Bengal.*

fragrans Roxb. 2. Th. ſcandens, foliis ſubcordato-angulatis pubeſcentibus, pedunculis unifloris, calyce inter. 12fido. *Ind. or. Guadalupa.* Bertero.

capenſis Retz. 3. Th. caule diffuſo flexuoſo, foliis ovatis obtuſis ſubdentatis 5nerviis ſcabris, pedunculis 1floris calycibus ext. hirto, int. 12fido. *Afric. auſtr.*

2223. ADENOSMA R. Br.

uliginoſa * 1. A. caule diffuſo hirſuto, foliis ſubſeſſilibus ovatis ſerrulatis pubeſcentibus, ſpicis 4gonis. *Coromandel.* (Ruellia uliginoſa L. ſuppl.)

polyſperma * 2. A. caule diffuſo gracili, foliis oblongis obtuſis ſubintegerrimis ſtrigoſis, ſpicis ovatis. *Ind. or.* (Ruellia polyſperma Roth.)

fragrans * 3. A. caule diffuſo, foliis ſubrotundis ſeſſilibus crenatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Inſ. Societ.* (Ruellia fragrans Forſt.)

chenopodifolia * 4. A. caule erecto, foliis petiolatis ovatis integerrimis pubeſcentibus, floribus verticillatis. *Ind. or. Guadalupa?* (Ruellia chenopodifolia Poir.)

balſamea * 5. A. caule erecto glabro, foliis petiolatis lanceolatis ſerratis glutinoſis, floribus verticillatis bracteatis. *Ind. or.* (Ruellia balſamea L. ſuppl.)

coerulea R. Br. 6. A. caule erectiusculo foliisque ovatis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſubſpicatis, bracteis calycibusque hirſutis. *Nov. Holl.*

2224. BIGNONIA.

1. *Foliis ſimplicibus.*

tenuiſiliqua Vahl. 1. B. ſcandens, foliis lanceolatis acutis utrinque glabris integerrimis, panicula terminali. *Ad fl. Magdalenae.*

viminalis Bonpl. 2. B. arborea, foliis longe petiolatis linearibus integerrimis glabris, panicula terminali ſeſſili. *Mexico.*

obtuſifolia Lam. 3. B. foliis alternis obovato-oblongis integerrimis glabris, floribus corymboſis terminalibus. *Braſil. Cayenn.* (B. latiſiliqua Poir.?)

undulata Sm. 4. B. arborea, foliis lanceolatis undulatis glabris, floribus terminalibus umbellatis, involucro polyphyllo. *Ind. or.*

† *ilicifolia* Perſ. 5. B. foliis ovatis mucronatis coriaceis integerrimis margine revolutis. *Madagascar.*

2. *Foliis binatis.*

* *Scandentes cirrhiferae.*

† *Pedunculis uni-paucifloris.*

Unguis 6. B. foliolis ovato-oblongis glaberrimis ſupra lucidis, pedunculis oppoſitis 1floris. *Ind. occ.*

ſtaminea Lam. 7. B. foliolis ovato-oblongis glaberrimis, pedunculis oppoſitis 1floris, genitalibus longe exſertis. *Hiſpaniola.*

capreolata 8. B. foliolis cordato-oblongis glabris opacis, pedunculis 1floris aggregatis. *Virginia. Carolina.*

pubeſcens 9. B. foliolis cordato-ovatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 1floris. *Nov. Hiſpan.*

aequinoctialis 10. B. foliolis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis paucifloris, fructibus longiſſimis. *Ind. occid. Braſil.* (B. Chamberlainii Bot. mag.)

ſalicifolia Kunth. 11. B. foliolis lanceolatis glaberrimis nitidis, pedunculis 3-6floris pubeſcentibus. *Ad Orinoc.*

chryfoleuca Bonpl. 12. B. foliolis ovato-oblongis acuminatis glaberrimis, pedunculis 3-5floris glabris. *Ad fl. Magdalen.*

obovata * 13. B. foliolis obovatis acutis membranaceis glabris, pedunculis pubefcentibus axillaribus uniterminalibus 3floris. *Nov. Granat.* (Spathodea Kunth.)

alliacea Lam. 14. B. foliolis ellipticis coriaceis integerrimis glabris, pedunculis fub-5floris. *Guiana.*

†† *Floribus racemofis.*

fpectabilis Vahl. 15. B. foliolis ovato-oblongis obtufiusculis fubcoriaceis nitidis, racemis terminalibus. *Portorico. Inf. Carib. Amer. auftr.* (B. picta Kunth.)

rigefcens Jacq. 16. B. foliolis ovatis retufis fubcoriaceis venofo-reticulatis glabris, racemi pedunculis 3floris. *Hifpaniola. Amer. auftr.* (B. obliqua et glabrata Kunth.)

lactiflora Vahl. 17. B. foliolis cordato-ovatis acutis venofo-reticulatis glabris, racemo terminali inferne foliato. *Inf. Carib. Amer. auftr.* (B. hondenfis Kunth.)

laurifolia Vahl. 18. B. foliolis oblongis glabris, racemi terminalis ramis dichotomis, corollis extus tomentofis. *Cayenn.*

grandiflora Jacq. 19. B. foliolis oblongis utrinque attenuatis undulatis fubcoriaceis glabris, racemi terminalis pedunculis afperis fquamatis, corollis glabris. *Amer. auftr.*

tiliaefolia Kunth. 20. B. foliolis cordato-fubrotundis acuminatis membranaceis fupra glabris fubtus pubefcentibus, racemis terminalibus, corollis extus tomentofis. *Amer. auftr.*

longifiliqua Bert. 21. B. foliolis profunde cordatis acuminatis membranaceis utrinque glaberrimis, racemis terminalibus fimplicibus, calycibus 5dentatis corollisque glabris. *Ad fl. Magdalen.*

villofa Vahl. 22. B. foliolis ellipticis obtufis coriaceis fubtus ramisque albido-villofis, racemis axillaribus laxis. *Ad fl. Magdalen.*

latifolia Rich. 23. B. foliolis ovatis nervofis membranaceis, racemis lateralibus, calycibus inflatis. *Cayenn.*

††† *Floribus paniculatis.*

elongata Vahl. 24. B. foliolis ovalibus obtufis membranaceis fubtus tomentofis, paniculae terminalis longiffimae ramis dichotomis, calycibus corollisque villofis. *Amer. auftr.*

molliffima Kunth. 25. B. foliolis cordato-ovatis acutis fupra villofis fubtus fufco-tomentofis, paniculis axillaribus dichotomis calycibusque 5dentatis pubefcentibus. *Caracas.*

diverfifolia Kunth. 26. B. foliis conjugatis fimplicibusque glabris nitidis, foliolis fubcordato-ovatis acuminatis nervofis venofo-reticulatis, paniculis terminalibus, calycibus 5dentatis glabris. *Mexico.*

floribunda Kunth. 27. B. foliolis oblongis utrinque attenuatis glabris nitidis, paniculis axillaribus pulverulentis, corollis extus pubescentibus. *Mexico.*

Selloi * 28. B. foliolis subcordato-oblongis acutis glabris nitidis, paniculis oppositis horizontalibus multifloris, calycibus corollisque glabris. *Brasil.* Sello.

magnolifolia Kunth. 29. B. foliolis ovato-ellipticis acutis coriaceis glabris nitidis, panicula terminali, corollis glabris. *Ad Orinoc.* (B. pyramidata Rich.?)

† *candicans* Rich. 30. B. foliolis subrotundo-ovatis subtus albido-tomentosis, panicula laxissima parviflora. *Cayenn.*

** *Anelix s. absque cirrhis.*

corymbifera Vahl. 31. B. foliolis subcordato-ovatis acuminatis utrinque glabris, corymbis axillaribus terminalibus trichotomis, corollis pubescentibus. *Amer. austr.*

3. *Foliis ternatis.*

* *Scandentes cirrhiferae.*

crucigera 32. B. foliis ternatis binatisque glabris, foliolis subcordato-ovatis acuminatis, racemis axillaribus, tubo corollae longissimo, ramis verrucoso-asperis. *Virginia. Ind. occ.*

heterophylla W. 33. B. foliis ternatis binatisque glabris, foliolis subcordato-oblongis acutis, pedunculis axillaribus cymosis paucifloris, ramis angulatis. *Guiana.* (B. Cherere Aubl.)

venusta Ker. 34. B. foliis ternatis binatisque glabris punctatis, foliolis oblique ovatis acuminatis, petiolis villosiusculis, pedunculis axillaribus corymbosis multifloris. *Brasil.*

colorata Poir. 35. B. foliolis ovato-oblongis acuminatis coriaceis supra nitidis subtus pubescentibus, panicula terminali, calycibus coloratis. *Cayenn.*

microcalyx Meyer. 36. B. foliis ternatis binatisque glabris, foliolis ovalibus obtusis, racemis axillaribus, calycibus 5dentatis brevissimis. *Surinam.*

mollis Vahl. 37. B. foliolis amplis subcordato-oblongis utrinque pubescentibus, panicula terminali multiflora, floribus parvis villosiusculis. *Cayenn.*

incarnata Aubl. 38. B. foliis ternatis binatisque glaberrimis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus cymosis paucifloris, fructibus longissimis. *Guiana.*

litoralis Kunth. 39. B. foliolis subrotundo-ovatis acuminatis supra nitidis villosis subtus villosissimis, paniculis axillaribus dichotomis, corolla pubescente. *Mexico.*

riparia Kunth. 40. B. foliolis cordatis obovato-subrotundis acutis subtus ad venas pubescentibus, paniculis axillaribus tomentosis, corolla pubescente. *Nov. Granat.*

umbrosa Kunth. 41. B. foliolis cordato-oblongis acuminatis membranaceis glaberrimis nitidis, ramulis petiolisque

villofis, paniculis lateralibus, corolla pubefcente. *Nov. Granat.*

apurenfis Kunth. 42. B. foliolis elliptico-oblongis utrinque attenuatis fubtus ad venas pubefcentibus, racemis terminalibus fimplicibus glabris. *Ad Orinoc.*

** *Erectae anelices.*

verrucofa Kunth. 43. B. foliolis oblongis obtufiusculis bafi attenuatis glaberrimis reticulato-venofis, panicula terminali feffili, corolla glabra, ramis verrucofis. *Ad Orinocum.*

carichanenfis Kunth. 44. B. foliolis oblongis obtufis glabris fupra nitidis fubtus albidis, panicula terminali feffili, floribus 5andris glabris. *Ad Orinocum.*

haemantha Bert. 45. B. foliolis ellipticis retufis coriaceis glaberrimis, pedunculis axillaribus paucifloris abbreviatis. *Portorico.*

triphylla 46. B. foliolis ovatis acuminatis glabris, racemis axillaribus. *Mexico.*

4. *Foliis digitatis.*

fluviatilis Aubl. 47. B. arborea, foliis quinatis coriaceis glabris, foliolis petiolatis oblongis acuminatis, corymbis confertis breviter pedunculatis, calycibus 5fidis. *Amer. auftr.*

Leucoxylon 48. B. arborea, foliis quinatis glabris, foliolis lanceolatis acuminatis nitidis, pedunculis 1floris terminalibus. *Jamaica.*

chrysantha Jacq. 49. B. arborea, foliis quinatis tomentofis, foliolis longe petiolatis ovatis acuminatis, floribus terminalibus congeftis. *Caracas.*

hirfuta Lam. 50. B. foliis quinatis fubtus pubefcentibus, foliolis petiolatis obovato-oblongis emarginatis, floribus terminalibus fafciculato-corymbofis hirfutis. *Ind. or.*

lepidota Kunth. 51. B. arborea, foliis quinatis coriaceis glabris fubtus fublepidotis, foliolis petiolatis oblongo-lanceolatis obtufis margine revolutis, pedunculis axillaribus fub-3floris. *Cuba.*

aefculifolia Kunth. 52. B. arborea procerifsima, foliis feptenatis fubtus tomentofis, foliolis obovato-oblongis, panicula terminali corymbofa. *Mexico.*

ferratifolia Vahl. 53. B. arborea, foliis fubquinatis glaberrimis coriaceis, foliolis petiolatis ovatis acutis ferratis, pedunculis terminalibus confertis fubunifloris. *Inf. Carib.*

radiata 54. B. herbacea humilis, foliis longe petiolatis fubfeptenatis, foliolis feffilibus oblongis fubbipinnatifidis crenatis glabris, pedunculis nudis paucifloris. *Peru.*

5. *Foliis fimpliciter pinnatis.*

bijuga Vahl. 55. B. foliis abrupte pinnatis bijugis fubcoriaceis glabris, foliolis petiolatis ellipticis integerrimis, racemis terminalibus. *Madagascar.*

56.

Clematis Kunth. 56. B. ſcandens cirrhifera, foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis cordato-ovatis acutiusculis glabris, floribus paniculatis. *Caracas.*

africana Lam. 57. B. arborea, foliis impari-pinnatis bijugis, foliolis obovatis dentatis rugoſis, floribus racemoſis. *Senegambia.*

racemoſa Lam. 58. B. foliis impari-pinnatis 2-3jugis, foliolis ovatis acutis integerrimis glabris, petiolo communi alato, floribus racemoſis. *Madagascar.*

compreſſa Lam. 59. B. foliis impari-pinnatis 2-3jugis, foliolis ovato-oblongis obtuſis integerrimis coriaceis, petiolo communi marginato, ramulis compreſſis, floribus terminalibus congeſtis. *Ind. or.*

fraxinifolia * 60. B. ſcandens, foliis impari-pinnatis 3jugis glabris, foliolis ovato-ellipticis integerrimis, panicula terminali. *Caracas.* (Spathodea Kunth.)

chelonoides 61. B. arborea, foliis impari-pinnatis ſub-5jugis pubeſcentibus, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, panicula terminali. *Ind. or.*

fulva Cav. 62. B. fruticoſa, foliis impari-pinnatis ſub-9jugis glabriusculis, foliolis obovatis truncatis denticulatis, petiolo communi alato, floribus racemoſis ſubterminalibus. *Peru.*

6. *Foliis decompoſitis ſ. bipinnatis.*

variabilis Jacq. 63. B. ſcandens cirrhifera, foliis inferioribus biternatis ſuperioribus conjugato-ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, racemis terminalibus multifloris. *Caracas.*

peruviana 64. B. foliis decompoſitis, foliolis pinnatis ternatisque inciſo-ſerratis, geniculis cirrhiferis. *Peru.*

ſuberoſa Roxb. 65. B. arborea, cortice ſuberoſo, foliis decompoſitis glabris, foliolis ovato-acuminatis ſubintegerrimis, paniculis ramoſiſſimis. *Ind. or.* (Millingtonia hortenſis L. ſuppl. Mallingtonia W.)

longifolia W. 66. B. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis ampliſſimis ſubcordato-oblongis integerrimis, floribus racemoſis, calycibus ſubgloboſis mucoſis. *Ind. or.*

Chica Humb. 67. B. ſcandens cirrhifera, foliis abrupte bipinnatis, foliolis bijugis, ovato-oblongis acuminatis integerrimis glabris, paniculis axillaribus pendulis. *Ad Orinocum.*

jasminifolia Kunth. 68. B. ſcandens, foliis conjugato-bipinnatis glabris, foliolis ovato-obtuſis integerrimis, terminalibus duplo longioribus ovato-lanceolatis. *Ad Orinocum.*

7. *Dubia.*

linearis Cav. 69. B. fruticoſa, foliis ſubternis linearibus acuminatis glaberrimis, floribus terminalibus ſubcorymboſis, corollae limbo undulato-crenato. *Patria?*

2225. TECOMA Juss.

splendida * 1. T. fruticosa, foliis confertis linearibus acutis carnosis glabris, floribus subracemosis terminalibus, antheris exsertis lanatis. *Brasil.* (Esterhazia splendida Mikan.)

pentaphylla Juss. 2. T. arborea, foliis digitatis glabris, foliolis obovatis integerrimis nitidis, floribus racemosis. *Ind. occ. Brasil.* (T. digitata Bonpl.)

australis R. Br. 3. T. scandens, foliis pinnatis glabris, foliolis lanceolatis subintegerrimis, floribus racemosis. *Nov. Holl.* (Bignonia pandorana Andr. Vent.)

mollis Humb. 4. T. foliis pinnatis villosis, foliolis oblongis acuminatis subintegerrimis, floribus racemosis terminalibus. *Mexico.*

radicans Juss. 5. T. scandens, ramis radicantibus, foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis utrinque attenuatis inciso-dentatis, corymbis terminalibus. *Amer. boreal.* (Bignonia L.)

stans Juss. 6. T. arborea, foliis pinnatis glabris, foliolis lanceolatis acuminatis profunde serratis, racemis terminalibus. *Ind. occ.*

sambucifolia Kunth. 7. T. arborea, foliis pinnatis glabris, foliolis oblongis acuminatis serratis, panicula terminali. *Peru.*

rosaefolia Kunth. 8. T. arborea, foliis pinnatis glabris, foliolis oblongis obtusis serratis, racemis terminalibus. *Peru. Quito.* (T. azaleaeflora Kunth.)

sorbifolia Kunth. 9. T. arborea, foliis pinnatis subtus tomentosis, foliolis oblongis acuminatis serratis, racemis terminalibus. *Quito.*

2226. JACARANDA Juss.

echinata * 1. J. scandens, foliis ternatis glabris, foliolis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis, pedunculis axillaribus racemosis, fructibus echinatis. *Amer. austr.* (Bignonia Jacq. Aubl.)

orbiculata * 2. J. scandens, foliis digitatis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, racemis axillaribus. *Amer. austr.* (Bignonia Jacq.)

alba * 3. J. scandens, foliis decomposito-pinnatis glabris, foliolis ovato-oblongis integerrimis, petiolis nodosis, pedunculis racemosis. *Guiana.* (Bignonia Aubl.)

procera * 4. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis oblongis obtusis mucronatis, paniculae terminalis pedunculis bracteatis. *Guiana.* (Bignonia Copaia Aubl., procera W.)

caroliniana Pers. 5. J. arborea, foliis bipinnatis villosiusculis, foliolis lanceolatis acutis, paniculae terminalis pedunculis nudis. *Ins. Baham. Brasil.?* (Bignonia coerulea L. Jac. mimosae folia Don. Ker.)

brasiliana Pers. 6. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis oblongis acutis, paniculis axillaribus, fructibus

utrinque ſinuato - cornutis. *Braſil.* (Bignonia Lam.)

obtuſifolia Humb. 7. J. arborea, foliis bipinnatis pubeſcentibus, foliolis oblongis obtuſis margine revolutis integerrimis, paniculis axillaribus. *Ad Orinocum.*

acutifolia Humb. 8. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Peru.*

rhombifolia Meyer. 9. J. arborea, foliis bipinnatis glabris, foliolis rhombeo - linearibus acuminatis integerrimis, panicula terminali ramoſiſſima. *Surinam.*

2227. SPATHODEA P. B.

uncata * 1. Sp. ſcandens, foliis binatis glaberrimis, cirrhis petiolo longioribus 3fidis uncatis, floribus racemoſis. *Ind. occ.* (Bignonia Sims.)

uncinata * 2. Sp. ſcandens, foliis binatis glabris, cirrhis trifidis uncinatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Surinam.* (Bignonia uncinata Meyer.)

corymboſa Vent. 3. Sp. fruticoſa, foliis binatis glabris, foliolis ſubcordatis acutis integerrimis, petiolis baſi glanduloſis, floribus corymboſis. *Inſ. Trinit.*

laurifolia Kunth. 4. Sp. ſcandens, foliis binatis glabris coriaceis, foliolis ovatis obtuſis integerrimis, petiolis baſi glanduloſis, pedunculis terminalibus paucifloris. *Nov. Granat.*

heterophylla R. Br. 5. Sp. arboreſcens, foliis pinnatis ternatis ſimplicibusque glabris, foliolis lanceolato - linearibus integerrimis, floribus racemoſis. *Nov. Holl.*

atrovirens * 6. Sp. foliis impari - pinnatis bijugis molliſſime tomentoſis, foliolis ovato - lanceolatis integerrimis, racemis terminalibus paucifloris. *Ind. or.* (Bignonia Roth.)

Rheedii * 7. Sp. arborea, foliis impari - pinnatis 3jugis hirſutis, foliolis ſubcordato - ovatis integerrimis, pedunculis racemoſis. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (Bignonia ſpathacea Retz.)

Roxburghii * 8. Sp. foliis pinnatis 4jugis glabris, foliolis ovato - oblongis ſerratis, paniculis villoſis, limbo corollae criſpo. *Ind. or.* (Bignonia 4locularis Roxb.)

laevis P. B. 9. Sp. arborea, foliis impari - pinnatis glabris, foliolis oblongis acuminatis apice dentatis, floribus racemoſo - ſpicatis. *Guinea.*

campanulata P. B. 10. Sp. arborea, foliis impari - pinnatis glabris, foliolis lanceolatis integerrimis, floribus racemoſo - ſpicatis. *Guinea.*

Dubiae.

longiflora Vent. 11. Sp. foliis impari - pinnatis, foliolis ovatis, floribus axillaribus pedunculatis longiſſimis. *Patria?*

orinocenſis Kunth. 12. Sp. ſcandens, foliis binatis glabris, foliolis oblongis acutis coriaceis. *Ad Orinocum.*

alternifolia R. Br. 13. Sp. arboreſcens, foliis ſimplicibus alternis ſubovatis integerrimis glabris coriaceis. *Nov. Holl.*

2228. AMPHILOPHIUM Kunth.

paniculatum Kunth. 1. A. ſcandens cirrhiferum, foliis binatis, foliolis ſubcordato-ovatis acuminatis ſubtus albo-punctulatis, venis ramulis angulatis petiolisque fulvo-tomentoſis, racemis erectis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (A. macrophyllum Kunth.)

Mutiſii Kunth. 2. A. ſcandens, foliis binatis cordato-ſubrotundis acuminatis utrinque tenuiſſime lepidotis, petiolis ramulisque angulatis pulverulentis, floribus racemoſis. *Nov. Granat.*

pubeſcens * 3. A. ſcandens, foliis ternato-bipinnatis pubeſcentibus, foliolis oblongis obtuſis ſeſſilibus ſubintegerrimis, floribus axillaribus oppoſitis pedunculatis. *Braſil.* Sello.

2229. ECCREMOCARPUS R. et P.

ſcaber R. et P. 1. E. ſcandens cirrhifer, foliis pinnatis bijugis, foliolis oblique cordatis ſerratis. *Chili.*

viridis R. et P. 2. E. ſcandens cirrhifer, foliis bipinnatis, foliolis ovatis integerrimis. *Peru.*

longiflorus Humb. 3. E. ſcandens, foliis 3pinnatis, foliolis ovalibus inciſis integrisque, pedunculis oppoſitifoliis 3-4floris pendulis. *Peru.*

2230. SALPIGLOSSIS R. et P.

ſinuata R. et P. *Chili.* Herba cubitalis, foliis alternis ſinuato-pinnatifidis, ſummis ſtipulisque linearibus integerrimis, floribus terminalibus pedunculatis ſanguineis.

2231. INCARVILLEA Juſſ.

grandiflora * 1. I. fruticoſa, foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis dentatis, panicula terminali. *China. Japon.* (Bignonia grandiflora Thunb., chinenſis Lam.)

tomentoſa * 2. I. arborea, foliis ſimplicibus cordatis acutis 5nerviis integerrimis tomentoſis, paniculis axillaribus. *Japon.* (Bignonia Thunb.)

paraſitica Roxb. 3. I. fruticoſa, foliis lanceolatis carnoſis, umbellis terminalibus. *Ind. or.*

chinenſis Lam. 4. I. fruticoſa ſcandens, foliis 2pinnatifidis glabris, floribus corymboſis. *China auſtr.* (Campſis adrepens Lour.)

2232. GELSEMIUM Juſſ.

nitidum Mx. *Virginia. Carolina.* Frutex ſcandens glaberrimus, foliis lanceolatis, floribus axillaribus faſciculatis luteis. (Bignonia ſempervirens L.)

2233. TOURRETTIA Domb.

lappacea W. *Peru.* Herba ſcandens cirrhifera, foliis ternatis ſ. ternato-decompoſitis ſerratis, floribus racemoſis fuſco-violaceis. (Dombeya lappacea Herit.)

2234. MARTYNIA.

diandra Glox. 1. M. caule ramoſo, foliis oppoſitis cordatis dentatis, floribus diandris. *Mexico.* (M. anguloſa Lam.)

Craniolaria Sw. 2. M. caule ramoſo, foliis oppoſitis 5lobis dentatis, calyce bibracteato. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (M. ſpathacea Lam., Craniolaria annua L.)

proboſcidea Glox. 3. M. caule ramoſo, foliis alternis cordatis integerrimis, calyce bibracteato. *Amer. bor.* (M. annua L., alternifolia Lam.)

longiflora 4. M. caule ſimplici, foliis ſubrotundis repandis, calyce ebracteato abbreviato, tubo corollae elongato. *C. B. S.* (M. capenſis Glox.)

zanguebarica Lour. 5. M. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis pinnatifidis piloſis, calyce ebracteato 5partito. *Ora orient. Afric. med.*

2235. DIDYMOCARPUS Jack.

barbatus Jack. 1. D. fruticoſus erectus, foliis oppoſitis ovatis acuminatis integerrimis hirſutis, pedunculis axillaribus paucifloris, ſtaminibus apice barbatis, duobus abortientibus. *Sumatra.*

fruteſcens Jack. 2. D. ſuffruticoſus erectus, foliis oppoſitis longe petiolatis ovato-lanceolatis ſupra glabris ſubtus caneſcenti-tomentoſis, pedunculis axillaribus aggregatis paucifloris. *Inſ. in freto Malacc.*

corniculatus Jack. 3. D. ſuffruticoſus erectiuſculus, foliis alternis obovatis acutis ſerratis villoſis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus faſciculatis ſecundis. *Sumatra.*

crinitus Jack. 4. D. herbaceus erectus, foliis alternis ſpathulatis acutis ſerratis piloſis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris petiolo adnatis. *Inſ. in freto Malacc.*

racemoſus Jack. 5. D. herbaceus erectus, foliis oppoſitis lanceolatis duplicato-ſerratis ſupra glabris, pedunculis axillaribus bifidis racemoſis. *Sumatra.*

elongatus Jack. 6. D. herbaceus erectiuſculus, foliis oppoſitis ovatis utrinque attenuatis ſerratis papilloſo-piloſis, racemis axillaribus ſecundis, pedicellis binatis remotis, corolla elongata. *Inſ. ad oram Sumatrae.*

reptans Jack. 7. D. herbaceus reptans, foliis ellipticis crenulatis villoſis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis unifloris, ſtaminibus duobus abortientibus. *Inſ. in freto Malacc.*

2236. AESCHYNANTHUS Jack.

volubilis Jack. 1. A. caule volubili, calycibus glabris. *Sumatra.*
radicans Jack. 2. A. caule radicante, calycibus villofis. *Sumatra.*

2237. GESNERA.

* *Fruticofae*

† *pubefcentes.*

tomentofa 1. G. hirfuta, foliis lanceolatis elongatis acuminatis inaequaliter ferratis, pedunculis lateralibus longiffimis corymbiferis. *Ind. occ.*

fcabra Sw. 2. G. foliis lanceolatis elongatis acuminatis crenulatis rugofis afperis, pedunculis axillaribus longiffimis hirfutis corymbiferis, corolla villofiffima tubulofa. *Jamaica. Hifpaniola.*

grandis Sw. 3. G. arborefcens, foliis amplis oblongo-lanceolatis crenatis fupra afpero-hifpidiusculis fubtus villofis, pedunculis axillaribus longiffimis hirfutis corymbiferis, corolla fubcampanulata. *Jamaica. Hifpaniola.*

elongata Humb. 4. G. foliis ovato-oblongis acutis ferrulatis fupra ftrigofis fubtus lanato-tomentofis, pedunculis elongatis 4floris, corollae tubulofae fauce conftricta. *Quito?*

corymbofa Sw. 5. G. foliis ovato-oblongis acutis ferratis fupra afperis fubtus incano-pilofis, pedunculis elongatis trichotomo-corymbofis, corollae tubo incurvo, limbo inaequali. *Jamaica.*

longiflora Humb. 6. G. foliis oblique ovatis crenatis fupra hirfutis fubtus pubefcentibus, pedunculis axillaribus bifloris, corolla tubulofa. *Nov. Granat.*

mollis Humb. 7. G. foliis oblique fubcordatis oblongis acutis ferratis fupra villofis fubtus fericeis, pedunculis axillaribus 3floris, corolla tubulofo-ventricofa. *Nov. Granat.*

hirfuta Humb. 8. G. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ferratis fupra tomentofis fubtus lanatis, pedunculis axillaribus geminis 1floris, corolla tubulofo-ventricofa. *Cumana.*

ulmifolia Humb. 9. G. foliis oblique fubcordato-ovatis acutis crenatis rugofis fupra afperis fubtus pilofis, pedunculis 1floris fubaggregatis, corolla tubulofo-inflata. *Quito.*

Craniolaria Sw. 10. G. foliis oblongis dentatis villofis, pedunculis terminalibus corymbiferis, corollae campanulatae limbo fimbriato. *Hifpaniola.* (G. fimbriata Lam., Craniolaria fruticofa L.)

prafinata Ker. 11. G. foliis oblongis utrinque attenuatis ferratis fubtus fericeo-tomentofis, pedunculis axillaribus folio brevioribus fubbifloris, corollae extus villofae fauce ampliata, laciniis revolutis. *Brafil.*

fpicata Humb. 12. G. foliis ternis oblongis utrinque attenuatis crenatis fupra ftrigofis fubtus lanatis, pedunculis

axillaribus verticillatis abbreviatis, corolla tubulosa villosa. *Nov. Granat.*

†† *Glabrae.*

ventricosa Sw. 13. G. foliis oblongis utrinque attenuatis crenulatis, pedunculis axillaribus 3floris folio brevioribus, corolla tubuloso-campanulata incurva. *Jamaica. Ins. Carib.*

macrantha * 14. G. foliis oblongis utrinque attenuatis obsolete denticulatis ciliatis, pedunculis unifloris axillaribus, corolla amplissima campanulata. *Brasil.* Sello.

calycina Sw. 15. G. foliis oblongis utrinque attenuatis serrato-crenatis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, calycibus campanulatis, capsulis cylindricis. *Jamaica.*

exserta Sw. 16. G. foliis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis axillaribus 3floris, calycibus profunde partitis, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis. *Jamaica.*

humilis 17. G. foliis lanceolatis apice dilatatis inciso-serratis subtus pallidis, pedunculis axillaribus corymbosis. *Cuba.*

** *Herbaceae.*

chelonioides Humb. 18. G. foliis oblongis grosse crenatis pilosis subtus canescentibus, pedunculis axillaribus bifloris. *Nov. Granat.*

elatior Humb. 19. G. foliis ternis subsessilibus lanceolatis obtusis crenatis utrinque hirsutis, pedunculis verticillatis 3floris, corolla tubulosa superne inflata. *Nov. Granat.*

verticillata Cav. 20. G. foliis oppositis sessilibus ovatis crenatis hirsutis, pedunculis axillaribus verticillatis 1floris. *Peru.*

sylvatica Humb. 21. G. foliis ternis quaternisque subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis pilosis, pedunculis axillaribus verticillatis 3-4floris. *Ad fl. Amazonum.*

tubiflora Cav. 22. G. foliis oppositis ovatis crenatis tomentosis, pedunculis axillaribus quaternis 1floris, corollae tubulosae tomentosae limbo suberecto. *In isthmo Panam.*

aggregata Ker. 23. G. foliis oppositis ovatis crenatis subtus tomentosis, pedunculis verticillatis 1floris, corollae villosae tubulosae basi bigibba limbo erectiusculo. *Brasil.*

bulbosa Ker. 24. G. foliis cordato-ellipticis crenatis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus corymbosis, corollae limbo oblique truncato. *Brasil.*

acaulis 25. G. caule brevissimo, foliis lanceolatis elongatis serratis rugosis, pedunculis 3floris folio brevioribus. *Jamaica.*

pumila Sw. 26. G. acaulis, foliis obovato-oblongis crenatis supra hirsutis subtus pallidis, pedunculis sub-

unifloris, calycibus profunde partitis patenti-reflexis, corollae tubo infundibuliformi. *Jamaica.*

2238. BESLERIA.

* *Calycibus ſerratis ſ. denticulatis.*

criſtata 1. B. fruticoſa ſcandens, foliis ovatis ſerratis hirſutis, pedunculis elongatis 1floris, calycibus latis rubris ſerrato-criſtatis, fructibus capſularibus. *Ind. occ. Amer. auſtr.*

hiſpida Kunth. 2. B. fruticoſa erecta, foliis elliptico-oblongis crenato-ſerratis hiſpidis, pedunculis ſolitariis 1floris, calycibus hiſpidis argute ſerratis, fructibus baccatis. *Quito. Nov. Granat.*

coccinea Aubl. 3. B. fruticoſa ſcandens, foliis oblongis acutis ſubdentato-repandis glabris carnoſis, pedunculis axillaribus paucifloris diphyllis, calycibus ampliſſimis coccineis ſerrulatis, limbo corollae crenulato. *Guiana.*

craſſifolia Schott. 4. B. foliis carnoſis oblongo-lanceolatis integerrimis ſupra glabris, pedunculis axillaribus 1floris nutantibus, calycibus lanceolatis ſerratis, corollae limbo revoluto. *Braſil.*

bicolor Humb. 5. B. fruticoſa erecta, foliis ovato-oblongis acutis denticulatis hirſutis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus verticillatis 1floris, calycibus purpureis piloſis denticulatis. *Nov. Granat.*

dichrus * 6. B. foliis ovato-lanceolatis integerrimis pubeſcentibus, floribus axillaribus confertis ſubſeſſilibus, calycibus rubris denticulatis rotundatis, corollae clavatae limbo erectiuſculo. *Braſil.* (B. bicolor Schott.)

ſanguinea Perſ. 7. B. foliis obovato-oblongis acutis dentatis pubeſcentibus ſubtus rubro-maculatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, calycibus inciſo-ſerratis hirſutiſſimis. *Hiſpaniola. Nov. Granat.* (Dalbergia phoenicea Tuſſ.)

pulchella Don. 8. B. ſuffruticoſa erecta, foliis oblongis rugoſis ſerratis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus multifloris umbelliferis, calycibus coccineis ſerratis, corollae limbo ſubaequali ciliato. *Inſ. Trinit.*

melittaefolia 9. B. ſuffruticoſa erecta, foliis oblongis crenatis hirſutiuſculis, pedunculis axillaribus cymoſis, calycibus viridibus lanceolatis ſubſerratis. *Ind. occid.*

ſerrulata Jacq. 10. B. fruticoſa ſcandens, foliis oblongis dentatis hirſutis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus oppoſitis 1floris, calycibus viridibus ſerratis. *Ind. occid.*

ſpectabilis Humb. 11. B. fruticoſa erecta, foliis oblongis obſolete dentatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus viridibus obſolete dentatis. *Nov. Granat.*

calcarata Humb. 12. B. fruticosa erecta, foliis oblongis crenato-serratis pilosis, pedunculis axillaribus subtrifloris, calycibus coloratis (?) denticulatis, corollae basi saccato-calcarata. *Nov. Granat.*

** *Calycis laciniis integerrimis.*

lutea 13. B. foliis oblongo-lanceolatis obsolete denticulatis glabris, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus 5fidis coloratis. *Ind. occ. Amer. austr.* (B. solanoides Kunth.)

elegans Humb. 14. B. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus subgeminis 3floris, calycibus 5partitis integerrimis. *Nov. Granat.*

violacea Aubl. 15. B. scandens, foliis oblongis integerrimis glabris, pedunculis racemosis terminalibus, calycibus coloratis 5fidis. *Guiana.* (B. coerulea Aubl.)

grandiflora Bonpl. 16. B. fruticosa erecta, foliis oblongis acutis crenatis villosissimis, pedunculis axillaribus subcorymbosis, calycibus coloratis pilosis. *Nov. Granat.*

grandifolia Schott. 17. B. foliis late ovatis integerrimis subtus hirsutis, pedunculis axillaribus racemoso-paniculatis, calycibus coloratis, laciniis corollae inferioribus revolutis. *Brasil.*

hirtella Schott. 18. B. foliis ovatis integerrimis hirsutiusculis, floribus axillaribus confertis subsessilibus, calycibus obtusis coloratis, corolla clavata. *Brasil.*

incarnata Aubl. 19. B. herbacea tomentosa, foliis oblongis crenatis, pedunculis axillaribus solitariis 1floris, calycibus 5fidis. *Guiana.*

2239. PARENTUCELLIA Viv.

floribunda Viv. *Ora Afr. bor.* (regio Pentapolit.) Herba glanduloso-pilosa, foliis sessilibus ovatis inciso-serratis, floribus axillaribus oppositis purpureis.

2240. ANTHOCERCIS Labill.

litorea Labill. 1. A. foliis obovatis ramisque laevissimis, corollae laciniis tubo longioribus, capsula oblonga calycem bis superante. *Ora austr. Nov. Holl.*

viscosa R. Br. 2. A. foliis obovatis glanduloso-punctatis margine scabriusculis, ramulis pubescentibus, capsula ovata calycem subaequante. *Ora austr. Nov. Holl.*

2241. BRUNFELSIA.

americana 1. B. foliis subspathulato-lanceolatis petiolatis, pedunculis calycem patentem excedentibus, limbo corollae plano. *Ind. occ. Amer. bor.*

undulata Sw. 2. B. foliis lanceolatis sessilibus, pedunculis calycem conniventem aequantibus, limbo corollae undulato. *Jamaica.*

2242. CRESCENTIA.

Cujete 1. Cr. arborea, foliis oblongo-lanceolatis undulatis confertis, fructibus ſubellipticis. *Ind. occid. Amer. auſtr.*

acuminata Bonpl. 2. Cr. arborea, foliis anguſte lanceolatis confertis, fructibus ſubgloboſis. *Cuba.*

cucurbitina 3. Cr. arborea, foliis ovato-oblongis ſparſis, fructibus ovatis acuminatis. *Ind. occ. Amer. auſtr.* (Cr. latifolia Mill. Lam.)

jasminoides Lam. 4. Cr. fruticoſa, foliis ſpathulatis emarginatis coriaceis, fructibus ovalibus. *Inſ. baham.*

edulis Desv. 5. Cr. arboreſcens, foliis lanceolatis confertis, fructibus angulatis tuberculatis. *Nov. Hiſpan.*

aculeata Kunth. 6. Cr. arboreſcens, ramis aculeatis, foliis ternatis ſimplicibus, petiolo alato, fructibus teretibus (?). *Nov. Hiſpan.*

alata Bonpl. 7. Cr. arborea, ramis inermibus, foliis ternis ternatis, petiolo communi alato, fructibus globoſis, *Nov. Hiſpan.*

2243. TANAËCIUM Sw.

paraſiticum Sw. 1. T. altiſſime ſcandens, foliis ovatis coriaceis, pedunculis 4floris. *Jamaica.*

Jaroba Sw. 2. T. altiſſime ſcandens, foliis inferioribus ternatis ſuperioribus geminis, foliolis amplis ovatis ſubmembranaceis. *Jamaica.*

2244. TRIPINNARIA Perſ.

aſiatica * 1. Tr. foliis tripinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, floribus corymboſis. *Cochinchina.* (Tripinna tripinnata Lour.)

africana * 2. Tr. foliis pinnatis, foliolis ellipticis ſerratis coriaceis, floribus ſubſolitariis. *Ora or. Afr. med. Inſ. Mascaren.* (Creſcentia pinnata Jacq. Tanaëcium W.)

2245. COLUMNEA.

ſcandens 1. C. villoſa, foliis ovatis integerrimis ſubtus incanis, laciniis calycis integerrimis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (C. villoſa W. ſuppl.)

hirſuta Sw. 2. C. hirſuta, foliis oblongis acuminatis ſubſerratis, laciniis calycis dentatis. *Jamaica.*

rutilans Sw. 3. C. foliis ovato-oblongis denticulatis ſubtus hirſutis coloratis, laciniis calycis obtuſis laciniatis. *Jamaica.*

hiſpida Sw. 4. C. hiſpida, foliis ovatis obtuſis denticulatis, laciniis calycis integerrimis hirſutiſſimis coloratis. *Jamaica.*

† *ovata* Cav. 5. C. pubeſcens, foliis oblongis crenatis, laciniis calycis utrinque 1dentatis. *Inſ. Chiloe.* [Corollae forma aliena ſubregularis.]

† *ftellata* Lour. 6. C. pilofa herbacea repens, foliis ternis ovatis ferratis, laciniis calycis fubulatis. *Cochinchina.* [Corollae facies aliena ½.]

2246. DUBOISIA R. Br.

myoporoides R. Br. *Nov. Holl.* Frutex foliis alternis integerrimis, floribus paniculatis albis.

2247. MITRARIA Cav.

coccinea Cav. *Inf. Chiloe.* Frutex fcandens, foliis oppofitis ovato-oblongis ferratis, floribus axillaribus pedunculatis coccineis.

2248. TEEDIA Rudolph.

lucida Rud. 1. T. foliis oppofitis ellipticis ferratis lucidis, pedunculis 3floris axillaribus. *C. B. S.* (Capraria Ait. Borkhaufenia Roth.)

pubefcens Burch. 2. T. foliis oppofitis ellipticis ferratis opacis ramisque pubefcentibus, pedunculis 3floris axillaribus. *Afric. auftr.*

2249. HALLERIA.

lucida 1. H. foliis ovatis acuminatis ferratis, corollis 2labiatis, ftaminibus exfertis. *Afric. auftr.*

elliptica Thb. 2. H. foliis oblongis utrinque attenuatis dentatis, corollis aequalibus, ftaminibus inclufis. *Afr. auftr.*

2250. DIPLANTHERA R. Br.

tetraphylla R. Br. *Nov. Holl.* Arbor ramofa foliis quaternis integerrimis bafi 2glandulofis, floribus thyrfoideis flavis.

2251. LINNAEA.

borealis *Europ. et Amer. bor.* Planta fuffruticofa, caule proftrato, foliis fubrotundis crenatis, ramis floriferis erectis 2floris, floribus pendulis albo-rubentibus. [Nomen primus impofuit J. F. Gronovius.]

2252. PICRIA Lour.

Fel terrae Lour. 1. P. herbacea erecta, foliis ovatis ferratis fcabris, pedunculis congeftis. *In hortis Chinae colitur.*

† *furinamenfis** 2. P. herbacea repens, foliis oblongis pilofis, pedunculis axillaribus oppofitis. *Surinam.* (Besleria bivalvis L. fuppl.)

2253. GLOXINIA Herit.

maculata Herit. 1. Gl. foliis cordatis inaequaliter dentatis fupra hifpidiusculis fubtus glabris discoloribus, calycibus obtufis. *Amer. auftr.* (Martynia perennis L.)

ſpecioſa Ker. 2. Gl. foliis elliptico-oblongis crenatis utrinque villoſis ſubtus discoloribus, calycibus acutis. *Braſil.*

2254. MELIANTHUS.

major 1. M. ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis, foliis utrinque glabris. *C. B. S.*

minor 2. M. ſtipulis geminis diſtinctis, foliis ſubtus tomentoſis. *Afric. auſtr.*

comoſus Vahl. 3. M. ſtipulis diſtinctis, foliis villoſis, bracteis cordatis elongatis. *Afric. auſtr.*

2255. KRAMERIA.

Ixina 1. Kr. foliis oblongo-lanceolatis cuſpidatis triplinerviis, ramis racemiferis incano-pubeſcentibus. *Amer. auſtr.*

argentea Mart. 2. Kr. foliis ovato-oblongis craſſiusculis cuſpide decidua acutis ſuperioribus racemisque ſpicatis villoſis. *Braſil.*

triandra R. et P. 3. Kr. foliis oblongis acutiusculis villoſo-ſericeis, racemi abbreviati pedicellis folio longioribus. *Peru.*

pauciflora Seſſ. 4. Kr. foliis oblongo-linearibus villoſis, pedicellis paucis folio longioribus, calycis labio inf. gibbo. *Mexico.*

ſecundiflora Seſſ. 5. Kr. foliis linearibus acutis villoſis, pedicellis folio longioribus ſecundis. *Mexico.*

linearis R. et P. 6. Kr. proſtrata, foliis lineari-ſubulatis villoſis, pedicellis tomentoſis. *Peru.*

cytiſoides Cav. 7. Kr. foliis ternatis, foliolis ovalibus villoſis, pedunculis ſolitariis. *Nov. Hiſpan.* [Kramera glabra * N. E. eſt Acidandra Mart.]

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

CRUCIFERAE.

I.

Synclistae: Fructus non dehiscentes

1. *monospermi.*

2256. *Neslia* Desv. Cal. patens. Fructus globosus intus membrana interstinctus.
2257. *Calepina* Adans. Cal. erectus. Fructus subglobosus rugoso-muriculatus, stylo brevissimo coronatus.
2258. *Sobolewskia* MB. Cal. patens. Fructus pyriformis. Sem. pendulum.
2259. *Myagrum*. Cal. erectus. Fructus coriaceo-suberosus apice compressus, in lacunas 2 steriles dilatatus. Sem. pendulum.
2260. *Pugionium* Gärtn. Fructus membranaceus transverse ovalis reticulato-echinatus utrinque in mucronem pugioniformem longum productus. Sem. arillatum.

2. *Fructus biarticulati oligospermi.*

2261. *Crambe*. Cal. patens. Filamenta majora subfurcata. Fructus 2articulatus 2spermus, articulo sup. globoso 1spermo, inf. pedicelliformi abortiente.
2262. *Cakile* Tourn. Cal. patens. Fructus 2articulatus 2spermus, articulo sup. producto s. stylifero, semine sup. suberecto, inf. pendulo.
2263. *Goldbachia* Cand. Cal. erectus. Fructus siliquaeformis oblongus 2articulatus 2spermus, seminibus pendulis, stylo subnullo.
2264. *Anchonium* Cand. Cal. basi saccatus. Fructus siliquaeformis ovato-oblongus, stylo rostriformi coronatus, 2articulatus: articuli 2loculares, loculis sub-4spermis.

3. *Fructus 2loculares.*

2265. *Ochthodium* Cand. Cal. patens. Fructus coriaceus verrucosus, loculis 1spermis, seminibus ad latera insertis.

2266. *Coronopus* Sm. Cal. patens. Fructus didymus, ſtigmate ſeſſili, loculis 1ſpermis, ſeminibus pendulis.
2267. *Succovia* Medic. Cal. erectus. Fructus globoſus echinatus, ſtylo ſubulato coronatus, loculis 1ſpermis.
2268. *Zilla* Forsk. Cal. erectus. Fructus globoſus ſuberoſus, ſtylo coronatus, loculis 1ſpermis.
2269. *Bunias*. Cal. erecto-patens. Nux ſub-4gona 2-4locularis, loculis 1ſpermis.

4. *Fructus ſiliquaeformes articulati polyſpermi.*

2270. *Cordylocarpus* Desf. Cal. clauſus. Fructus teres ſubarticulatus, articulo ſupremo globoſo echinato cuſpidato.
2271. *Sterigma* Cand. Cal. erectus. Stam. longiora baſi connata. Fructus teres villoſo-tomentoſus, ſtigmate bilobo coronatus, articulatus, intus celluloſo-durus: ſem. 2ſerialia.
2272. *Choriſpora* Cand. Cal. clauſus. Fructus teres, ſtylo longo coronatus, articulatus, ſeminibus pendulis. Cotyledones accumbentes (radiculam rima recipientes).
2273. *Enarthrocarpus* Labill. Cal. erectus. Fructus ſubcompreſſus 2articulatus, articulo inf. obconico 1-3ſpermo, ſuperiori elongato, iſthmis 9-10 1ſpermis ſtrangulato. Cotyledones conduplicatae.
2274. *Raphanus*. Cal. erectus baſi ſubſaccatus. Fructus teres roſtratus nodoſus multiarticulatus, ſeminibus pendulis. Cotyledones conduplicatae.

5. *Fructus valvati ſ. haud ſ. vix dehiſcentes.*

2275. *Clypeola*. Cal. baſi aequalis. Fructus ſiliculoſus compreſſus orbicularis 1locularis 1ſpermus.
2276. *Tauſcheria* Fiſch. Cal. erectus. Fructus oblongus hinc convexus illinc planus 1locularis 1ſpermus. Sem. pendulum.
2277. *Iſatis*. Cal. patens. Fructus ellipticus planus 1locularis 1ſpermus, valvis navicularibus vix dehiſcentibus. Sem. pendulum.
2278. *Biſcutella*. Cal. baſi ſaccatus vel aequalis. Fructus didymus planus, loculis orbiculatis 1ſpermis axi ſtylifero annexis, baſi dehiſcentibus.
2279. *Peltaria*. Silicula foliaceo-compreſſa reticulata 1locularis oligoſperma, ſuturis valvarum non dehiſcentium manifeſtis.
2280. *Euclidium* R. Br. Silicula ventricoſa, ſuturis valvarum non dehiſcentium manifeſtis, 2locularis, loculis 1ſpermis, ſeminibus pendulis.

II.

Siliculoſae, valvis dehiſcentibus.

1. *Siliculae oligoſpermae.*

α. Cotyledones accumbentes. (v. n. 2272.)

2281. *Lunaria*. Silicula pedicellata elliptica plana, funiculis longis ſepto adnatis. Sem. marginato-alata.
2282. *Ricotia*. Silicula ſeſſilis oblonga plana, demum 1locularis, funiculis liberis. Sem. aptera ſubſolitaria.

2283. *Alyſſum.* Filamenta ſubappendiculata. Silicula ſubrotunda compreſſa ſtylo coronata. Sem. ſubſolitaria ſubalata.
2284. *Petrocallis* R. Br. Filamenta edentula. Silicula ovalis plana, funiculis ſepto adnatis. Sem. 2 haud marginata in quovis loculo.
2285. *Hutchinſia* R. Br. Petala aequalia. Silicula elliptica, valvis navicularibus, loculis 2-4ſpermis, ſtylo coronata.
2286. *Iberis.* Petala exteriora ampliora. Silicula emarginata, valvis navicularibus alatis, loculis 1ſpermis.
2287. *Teesdalia* R. Br. Filamenta baſi appendiculata. Silicula emarginata, valvis navicularibus, loculis 2ſpermis.
2288. *Menonvillea* Cand. Cal. baſi ſaccatus. Silicula ſubſtipitata didyma margine alata, loculis 1ſpermis diſcos parallelos efficientibus.
2289. *Anaſtatica.* Silicula ventricoſa ſtylo terminata, valvis ad apicem auriculatis, loculis 2ſpermis.

β. Cotyledones incumbentes (radicula dorſum cotyledonum ſpectante).

2290. *Lepidium.* Silicula ſubovata, valvis carinato-ventricoſis, loculis 1ſpermis. Sem. haud marginata.
2291. *Bivonaea* Cand. Silicula emarginata ſtylo coronata, valvis carinatis dorſo alatis, loculis ſub-4ſpermis, funiculis ſepto adnatis.
2292. *Aethionema* R. Br. Filamenta longiora vel coalita vel dentata. Silicula ovalis ſubemarginata, valvis navicularibus dorſo alatis, loculis 1-2ſpermis.

γ. Cotyledones conduplicatae.

2293. *Vella.* Silicula ovata compreſſa, ſtylo dilatato foliaceo coronata, loculis 1-2ſpermis.

δ. Cotyledones bicrures biplicatae.

2294. *Subularia.* Silicula ovalis ſtigmate coronata, valvis ventricoſis, loculis 4ſpermis.

2. *Siliculae polyſpermae.*

α. Cotyledones accumbentes.

2295. *Farſetia* Turr. Cand. Silicula elliptica ſtylo brevi coronata, valvis planis. Semina compreſſa alata.
2296. *Aubrietia* Adanſ. Filamenta minora dentata. Silicula oblonga, valvis convexis. Semina haud marginata.
2297. *Veſicaria* Lam. Silicula inflato-globoſa, valvis ſubhemiſphaericis.
2298. *Draba.* Silicula ovali-oblonga, valvis plano-convexis.
2299. *Cochlearia.* Silicula ſubgloboſa ſ. ovato-oblonga, valvis ventricoſis craſſiuſculis.
2300. *Thlaſpi.* Silicula compreſſa emarginata, valvis naviculari-bus ſubalatis.

β. Cotyledones incumbentes.

2301. *Camelina* Crantz. Silicula obovata ſ. ſubgloboſa, valvis ventricoſis cum ſtyli parte dehiſcentibus.

2302. *Stenopetalum* R. Br. Silicula elliptica, valvis planiusculis. Stylus 0. Semina 2feriata.

2303. *Eutrema* R. Br. Silicula ovato-oblonga, ftylo coronata, valvis concavis. Septum apice feneftratum.

γ. Cotyledones conduplicatae.

2304. *Pfychine* Desf. Silicula ftylo longo fuperata, valvis navicularibus dorfo alatis, fepto anguftiffimo.

III.

* *Siliquofae.*

1. Siliquae abbreviatae, fubfiliculofae. Cotyledones accumbentes.

2305. *Stevenia* Adam. Cal. bafi faccatus. Siliqua oblonga ftylo perfiftente coronata, oligofperma, valvis planis.

2306. *Braya* Sternb. Cal. bafi aequalis. Siliqua teretiuscula ftylo abbreviato coronata, valvis convexis. Sem. fub-2ferialia. Cotyled. oblique accumbentes.

2307. *Nafturtium* R. Br. Cal. patens. Siliqua teretiuscula ftylo brevi coronata, valvis convexis. Sem. 2ferialia. Cotyled. recte accumbentes.

2308. *Morettia* Cand. Cal. erectus. Siliqua oblonga ftylo brevi coronata, valvis concavis intus in feptula feminum productis.

2. Siliquae genuinae.

α. Cotyledones accumbentes.

2309. *Dentaria.* Cal. erectus. Siliqua compreffa lanceolata ftylo coronata, valvis planis enerviis elaftice refilientibus, funiculis dilatatis. Sem. 1ferialia.

2310. *Pteronevron* Cand. Cal. patens. Siliqua compreffa ftylo coronata, valvis planis enerviis elaftice refilientibus, placentis extus funiculisque alatis.

2311. *Cardamine.* Siliqua linearis, valvis planis enerviis, fepto margine incraffato anguftioribus, faepe elaftice refilientibus. Sem. 1ferialia.

2312. *Nevroloma* Andrz. Siliqua lanceolata compreffa, valvis planis, funiculis fepto adnatis. Sem. late marginata.

2313. *Arabis.* Siliqua linearis, valvis planis medio 1nerviis. Sem. 1ferialia.

2314. *Turritis.* Siliqua linearis elongata, valvis planis nervofis. Sem. 2ferialia.

2315. *Barbarea* R. Br. Cal. erectus. Siliqua 4gono-anceps, ftylo coronata. Sem. 1ferialia.

2316. *Notoceras* R. Br. Cal. erectiusculus. Siliqua 4gono-anceps, valvis apice in cornua productis. Sem. compreffa.

2317. *Cheiranthus.* Cal. claufus bafi faccatus. Siliqua ftigmate bilobo f. capitato coronata. Sem. 1ferialia compreffo-marginata.

2318. *Matthiola* R. Br. Cal. claufus. Filamenta longiora dilatata. Siliqua ftigmatibus conniventibus dorfo incraffatis f. cornigeris coronata. Sem. 1ferialia compreffa.

β. Co-

β. Cotyledones incumbentes.

2319. *Malcolmia* R. Br. Cal. fubclaufus. Siliqua teretiuscula ftigmate acuminato coronata.
2320. *Hefperis.* Cal. bafi faccatus. Siliqua teretiuscula f. fub-4gona, ftigmatibus conniventibus coronata. Sem. 1ferialia.
2321. *Sifymbrium.* Cal. patens bafi aequalis. Siliqua teretiuscula f. angulata. Sem. 1ferialia.
2322. *Eryfimum.* Cal. erectus f. claufus. Siliqua 4gona. Sem. 1ferialia.
2323. *Stanleia* Nutt. Cal. patentiffimus coloratus. Siliqua pedicellata teretiuscula.

γ. Cotyledones conduplicatae.

2324. *Braffica.* Cal. erectus. Siliqua teretiuscula vel ftylo coronata vel roftrata. Sem. 1ferialia.
2325. *Sinapis.* Cal. patentiffimus. Siliqua teretiuscula vel ftylo coronata vel roftrata. Sem. 1ferialia.
2326. *Moricandia* Cand. Cal. bafi faccatus. Siliqua 4gona fubanceps. Sem. 2ferialia fubalata.
2327. *Diplotaxis* Cand. Cal. patens bafi aequalis. Siliqua compreffa. Sem. 2ferialia ovata.

δ. Cotyledones fpiratim convolutae.

2328. *Erucaria* Gärtn. Cal. erectus. Siliqua teres 2articulata, artic. infer. 2valvi pleiofpermo, fuper. 2valvi oligofpermo.
2329. *Schizopetalon* Sims. Cal. claufus. Petala pinnatifida. Siliqua linearis ftigmate dilatato coronata. Cotyledones bicrures.

ε. Cotyledones bis transverfe plicatae.

2330. *Chamira* Thunb. Cal. bafi bicalcaratus. Siliqua compreffa fubulata.
2331. *Heliophila.* Cal. bafi fubaequalis. Filamenta faepe appendiculata. Siliqua compreffa linearis f. moniliformis. Semina 1ferialia fubalata.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

I.

SYNCLISTAE.

Fructus non dehiscentes.

2256. Neslia Desv.

paniculata Desv. *Europ. Afric. bor. Asia med.* Herba annua erecta, foliis alternis sagittatis integerrimis, floribus racemosis flavis. (Myagrum L., Rapistrum Gärtn., Alyssum W. enum., Vogelia Horn.)

2257. Calepina Adans.

Corvini Desv. 1. C. caule erecto, foliis radicalibus lyratis, caulinis sagittatis, fructibus rugosis. *Europ. austr.* (Bunias cochlearioides Murr. W., Crambe Corvini All., Cochlearia auriculata Lam., Laelia cochlearioides Pers.)

prostrata * 2. C. caule procumbente, foliis bipinnatifidis denticulatis pubescentibus, fructibus muriculatis. *Afric. bor.* (Bunias prostrata Desf., Laelia Pers., Myagrum Poir., Muricaria Desv. Cand.)

2258. Sobolewskia MB.

lithophila MB. *Tauria. Asia med.* Herba elata ramosa glabra, foliis cordato-reniformibus crenatis longe petiolatis, floribus racemosis albis. (Cochlearia sibirica W., Crambe macrocarpa MB.)

2259. Myagrum.

perfoliatum *Europ. med. et austr.* Herba annua erecta, foliis caulinis sagittatis, floribus racemosis flavis. (Cakile Cand. fl. gall. Baumg.)

2260. PUGIONIUM Gärtn.

cornutum Gärtn. *Asia minor et med.* Herba glabra, foliis linearibus glaucis, floribus racemosis albis. (Bunias cornuta L., Myagrum Lam.)

2261. CRAMBE.

* *Fruticosae, fructibus stylo mucronatis.*

strigosa Herit. 1. Cr. foliis ovatis basi auriculatis dentatis hispidis, racemis laxis paniculatis, filamentis simplicibus. *Ins. Canar.* (Myagrum arborescens Jacqu.)

fruticosa L. suppl. 2. Cr. foliis lyrato-pinnatifidis serratis incanis, racemis paniculatis, filamentis majoribus furcatis. *Madera.*

** *Herbaceae: fructibus muticis.*

† *perennes.*

maritima 3. Cr. glaberrima, foliis subrotundis sinuatis dentatis undulatis glaucis. *Ad litora marium Europ.*

pinnatifida R. Br. 4. Cr. glabra, foliis pinnatifidis, lobis oblongis dentatis. *Hungar. Tauria. Caucas.* (Cr. orientalis Jacqu.)

† *grandiflora* Stev. 5. Cr. glabra, foliis interrupte pinnatifidis, lobis oblongis inciso-dentatis. *Ad ostia Hypanis Maeotic. paludis.*

orientalis 6. Cr. caule glabro, foliis sinuato-pinnatifidis dentatis scabris. *Asia minor.*

Tataria Jacqu. 7. Cr. caule glabriusculo, foliis decompositis subtus pilosiusculis, foliolis pinnatifidis dentato-incisis. *Moravia. Hungar. Transsylvan. Tauria.* (Cr. laciniata Lam.)

aspera M. B. 8. Cr. caule aspero, foliis 2pinnatifidis hispidissimis, laciniis distantibus inciso-dentatis. *Tauria. Ad Volgam.*

juncea M. B. 9. Cr. foliis lyratis subtus cauleque retrorsum hispidis, lobis dentatis, terminali laciniato. *Ad fl. Cyrum* in *Caucas. regione.*

cordifolia Stev. 10. Cr. caule glabriusculo ramosissimo, foliis petiolatis dentatis, inferioribus cordatis superioribus ovatis. *Caucas.*

†† *annuae.*

hispanica 11. Cr. caule retrorsum hispido, foliis pinnato-lyratis scabris, lobo extremo maximo cordato-orbiculato denticulato. *Hispan. Lusitan.* (Myagrum sphaerocarpon Jacqu., Cr. cordifolia Dufour. var.)

reniformis Desf. 12. Cr. caule hispidiusculo, ramis virgatis, foliis cordato-reniformibus grosse dentatis asperis, petiolis auriculatis. *Atlas.*

filiformis Jacqu. 13. Cr. foliis lyrato-pinnatis hispidis, lobo extremo ovato dentato, ramis filiformibus, filamentis subsimplicibus. *Patagonia.*

2262. CAKILE Tourn.

**Maritimae.*

maritima Scop. 1. C. articulis fructus ancipitibus, superiori sagittato, foliis pinnatifidis subdentatis carnosis. *Orae maritim. totius Europae.* (Bunias Cakile L. C. aegyptiaca W., latifolia Poir. var.)

americana Nutt. 2. C. articulo fructus superiori ovato acuto, foliis oblongis obtusis subdentatis carnosis. *Orae maritim. Amer. bor. et Ind. occ.* (C. aegyptiaca Tuss., Bunias edentula Bigel.)

aequalis Cand. 3. C. articulo fructus superiori basi sub-4gono apice longe rostrato, foliis oblongis apice dentatis. *Ins. Carib.* (Sinapis integrifolia West. Raphanus lanceolatus W.)

striata Herit. 4. C. articulis fructus 4gonis striatis, superiori pyramidato-rostrato, foliis pinnatifidis glabris. *Ins. maris aegei.* (Bunias tenuifolia Sm., Didesmus Cand.)

*aegyptia** 5. C. articulis fructus sub-4gonis, superiori in stylum pyramidatum abeunte, foliis inferioribus lyratis, superioribus oblongis subdentatis. *Aegypt. Cyprus. Ins. maris aegei.* (Myagrum aegyptium L. Bunias virgata Sibth. Didesmus aegyptius Desv. Cand.)

*cyrenaica** 6. C. articulis fructus sub-4gonis striatis, superiori obtuse pyramidato, foliis ovalibus carnosis subintegerrimis. *Regio Cyrenaica.* (Bunias ovalis Viv.)

***Mediterraneae.*

perennis Cand. 7. C. articulo fructus glabri superiori ovato stylum superante, foliis pinnatifidis hispidiusculis, ramis divaricatis. *Europ. med. et austr.* (Myagrum L., Rapistrum Crantz., Bunias Sm.)

rugosa Cand. 8. C. articulo fructus pubescentis superiori globoso rugoso abbreviato, foliis obtusis dentatis, radicalibus sublyratis. *Europ. med. et austr.* (Myagrum L. Rapistrum All. M. venosum Pers. var.)

† *clavata** 9. C. articulo fructus rugosi superiori acuminato stylifero, inferiori contracto, foliis hastatis. *Syria.* Labillard. (Myagrum clavatum Poir., Rapistrum Cand.)

*bipinnata** 10. C. articulo fructus glabri superiori ovato in stylum longum producto, inferiori obconico, foliis 2pinnatis glabris. *Mauritania.* (Sinapis Desf., Didesmus Cand.)

2263. GOLDBACHIA Cand.

laevigata Cand. 1. G. fructibus 4gono-compressis rostratis rugosis pendulis, foliis superioribus sagittatis. *Ad Volgam.* (Raphanus laevigatus M. B.)

torulosa Cand. 2. G. fructibus teretiusculis brevissime rostratis torosis ascendentibus, foliis superioribus oblongis. *Persia.*

2264. ANCHONIUM Cand.

Billarderii Cand. *Libanus.* Fruticulus glanduloſo-villoſus, foliis oblongis, floribus racemoſis purpureis.

2265. OCHTHODIUM Cand.

aegyptiacum Cand. *Aegypt. Syria. Peloponneſ.* Herba annua ramoſa glabriuscula, foliis inferioribus ſublyrato-pinnatifidis, ſuperioribus oblongis, floribus racemoſis flavis.

2266. CORONOPUS Sm.

Ruellii Dalech. 1. C. fructibus compreſſis reticulato-criſtatis, racemis axillaribus ſeſſilibus, foliis pinnatifidis, caule proſtrato. *Europ. omnis. Amer. bor.* (Cochlearia Coronopus L. Senebiera Poir. Perſ. Cand.)

ſerratus Desv. 2. C. fructibus compreſſis reticulato-rugoſis, racemis ſeſſilibus, foliis oblongo-lanceolatis inciſo-ſerratis, caule procumbente. *Monte Video.* (Senebiera Poir. Perſ. Cand.)

*integrifolius** 3. C. fructibus ſubgloboſis fungoſis rimoſo-areolatis, racemis oppoſitifoliis, foliis linearibus integerrimis, caule ramoſo. *Madagascar.* Senebiera Cand.)

*linoides** 4. C. fructibus ſubcompreſſis areolato-punctatis, racemis oppoſitifoliis, foliis linearibus integerrimis, caule erecto ramoſo. *Afric. auſtr.* (Lepidium Thunb. Senebiera Cand.)

*Helenae** 5. C. fructibus ſubgloboſis ſubareolato-reticulatis, racemis oppoſitifoliis, foliis pinnatifido-3fidis linearibus, caule decumbente ramoſo. *Inſ. Helenae.* Burchell. (Senebiera Cand.)

didymus Sm. 6. C. fructibus compreſſis ruguloſis, racemis oppoſitifoliis, foliis pinnatifidis, caule proſtrato. *Anglia. Europ. auſtr. Amer. bor. et auſtr. Nov. Holl.* (Lepidium didymum L., Senebiera inciſa W., pinnatifida, pectinata Cand.)

*niloticus** 7. C. fructibus compreſſis ſubcymbaeformibus glabris, racemis oppoſitifoliis, foliis pinnatifidis, caule erecto. *Aegypt. infer.* (Cochlearia nilotica Delil., Cotyliſcus Desv., Senebiera Cand. Lepidium niloticum Sieb.)

†*anomalus** 8. C. fructibus glabris compreſſis, racemis elongatis, foliis oblongo-linearibus integerrimis, caule fruticoſo. *C. B. S.* (Heliophila flava L. fil., Brachycarpaea varians Cand.)

2267. SUCCOVIA Medic.

balearica Med. *Inſ. balear. Teneriffa. Sicilia.* Herba annua ramoſa glabra, foliis pinnatifidis, floribus racemoſis flavis. (Bunias L., Myagrum Lam.)

2268. Zilla Forsk.

myagroides Forsk. *Aegypt.* Herba suffruticosa, ramis spinescentibus, foliis oblongis glaucis caducis, floribus racemosis lilacinis. (Bunias spinosa L. Myagrum spinosum Lam.)

2269. Bunias.

Erucago 1. B. angulis fructus 4locularis cristatis, petalis emarginatis, foliis radicalibus runcinatis. *Europ. austr.* (B. aspera Retz. var.)

raphanifolia Sm. 2. B. angulis fructus 4locularis verrucoso-glandulosis subsinuatis, stylo persistente elongato, foliis infimis pinnatifido-runcinatis, superioribus lanceolatis serratis. *Creta. Graecia.* (Myagrum orientale L. Rapistrum Cand.)

orientalis 3. B. fructibus ovatis sub-4gonis 2locularibus verrucosis, foliis inferioribus runcinatis, superioribus lanceolatis dentatis. *Europ. orient.*

2270. Cordylocarpus Desf.

muricatus Desf. *Numidia.* Herba annua foliis sublyratis oblongis, floribus racemosis ochroleucis.

2271. Sterigma Cand.

tomentosum Cand. 1. St. foliis runcinato-pinnatifidis tomentosis, fructibus incanis laevibus. *Caucas. Sibir.* (Cheiranthus an litoreus Pall., tomentosus W. Sterigmostemum M. B.)

sulfureum Cand. 2. St. foliis tomentosis, inferioribus runcinatis, summis oblongo-linearibus integerrimis, fructibus stellato-pubescentibus. *Syria.* (Cheiranthus sulfureus Russel.)

torulosum Cand. 3. St. foliis subtomentosis oblongis, radicalibus sinuato-dentatis, superioribus integerrimis, fructibus incanis hispidis. *Caucas.* (Cheiranthus torulosus M. B. Sterigmostemum incanum M. B. suppl.)

elichrysifolium Cand. 4. St. foliis omnibus oblongo-linearibus integerrimis fructibusque tomentosis. *Armenia. Persia bor.* (Cheiranthus aureus W. herb.)

2272. Chorispora Cand.

tenella Cand. 1. Ch. foliis infimis sinuato-pinnatifidis superioribus lanceolatis dentatis fructibusque glabris. *Podolia. Tauria. Sibiria.* (Raphanus tenellus Pall., arcuatus W., Chorispermum tenellum R. Br. Hesperis laxa Lam.)

stricta Cand. 2. Ch. foliis linearibus dentatis fructibusque hispidis, seminibus alatis. *Regio Kirgisorum.* (Raphanus strictus Fisch.)

sibirica Cand. 3. Ch. foliis omnibus sinuato-pinnatifidis fructibusque glabris. *Sibir.* (Raphanus sibiricus L.)

iberica Cand. 4. Ch. foliis linearibus runcinato-dentatis, fructibus hirtis stylum ensiformem aequantibus. *Caucas. orient.* (Raphanus ibericus MB.)

2273. ENARTHROCARPUS Labill.

arcuatus Labill. 1. E. fructibus teretibus torulosis scabris, racemis terminalibus elongatis. *Libanus.*

lyratus Cand. 2. E. fructibus compressis striatis subsessilibus basi foliatis remote racemosis. *Aegypt.* (Raphanus lyratus Forsk., recurvatus Pers. Delil.)

pterocarpus Cand. 3. E. fructibus compressis marginato-alatis longe acuminatis breviter pedunculatis basi foliatis subracemosis. *Aegypt.* (Raphanus pterocarpus Pers. Delil.)

2274. RAPHANUS.

sativus 1. R. siliquis teretibus acuminatis plurilocularibus fungosis septatis pedicellos aequantibus. *China.*

biarticulatus W. 2. R. siliquis teretibus acuminatis 1locularibus fungosis pedicellos superantibus. *China.*

caudatus 3. R. siliquis depressis acuminatis fungosis 1locularibus tota planta longioribus. *Java.*

*odessanus** 4. R. siliquis 1locularibus 8angulis sulcatis stylum compressum aequantibus, foliis sublyratis alterne runcinatis. *Ad Odessam.* (Raphanistrum odessanum Andrz. Bess.)

rostratus Cand. 5. R. siliquis 1locularibus stylo conico subulato brevioribus. *Persia bor.*

Raphanistrum 6. R. siliquis 1locularibus stylo longioribus, calyce colorato, foliis simpliciter lyratis, radice annua. *Europ. omnis.* (Raphanistrum Lampsaka Gärtn. Rapistrum arvense All.)

maritimus Sm. 7. R. siliquis 1locularibus stylo longioribus, calyce virescente, foliis interrupte lyratis, radice perenni. *Anglia. Italia superior.* (R. Landra Morett. Cand.)

2275. CLYPEOLA.

Ionthlaspi 1. Cl. siliculis glabriusculis ciliatis, caule diffuso. *Europ. austr. Asia med.* (Alyssum repens Baumg.?)

eriophora Cand. 2. Cl. siliculis emarginatis dentatis floccoso-lanatis, caule erecto. *Hispania.* (Alyssum eriophorum Pourr. W., Vesicaria lanuginosa Poir. Orium Desv.)

echinata Cand. 3. Cl. siliculis dentatis setoso-echinatis, caule erecto, calycibus deciduis. *Asia minor. Ad Tigrim.* (Cl. lasiocarpa Pers., Bergeretia Desv.)

2276. TAUSCHERIA Fisch.

lasiocarpa Fisch. 1. T. siliculis hinc villosis, foliis sagittatis. *Regio Kirgisorum.*

gymnocarpa Fisch. 2. T. siliculis glabris, foliis cordato-sagittatis. *Regio Kirgisorum.*

2277. ISATIS.

* *Siliculis marginato-alatis haud dehiscentibus.*

Garcini Cand. 1. I. siliculis obovatis obtusissimis apice 2tuberculatis, foliis oblongis utrinque attenuatis. *Persia.* (Peltaria Garcini N. L. Burm. W.)

armena 2. I. siliculis cordato-orbiculatis stylo coronatis, foliis cordato-sagittatis subdenticulatis. *Armenia. Caucas.* (Sameraria Desv.)

latisiliqua Stev. 3. I. siliculis ellipticis obtusis sessilibus, stigmate sessili, foliis cordato-sagittatis. *Asia minor. Caucas.* (I. cappadocica Desv.)

leiocarpa Cand. 4. I. siliculis ovali-oblongis stigmate sessili subtruncatis sessilibus, foliis sagittatis. *Libanus.* Labillard.

lusitanica Brot. 5. I. siliculis obovatis obtusissimis emarginatis, foliis cordato-sagittatis. *Lusitan.* (I. glauca W. herb.)

** *Siliculis margine suberosis subdehiscentibus.*

alpina All. 6. I. siliculis ovali-oblongis utrinque obtusis margine subfoliaceo-alatis, foliis acute sagittatis. *Alp. cott. Apennin.*

praecox Kit. 7. I. siliculis ellipticis utrinque obtusis margine coriaceo-alatis glaberrimis. *Hungar. Ad Volgam.*

litoralis Cand. 8. I. siliculis oblongo-cuneatis truncato-emarginatis glaberrimis, loculis utrinque exsertis sulco ab ala distinctis. *Tauria.*

hebecarpa Cand. 9. I. siliculis oblongo-cuneatis apice rotundato-obtusissimis villosis, loculis esulcis. *Tauria.*

tinctoria 10. I. siliculis spathulatis obtusis glabris, calyce corollam subaequante. *Europ. austr.* (I. alpina Vill. var. fol. hirsutis. I. campestris Stev., taurica M. B., heterocarpa Andrz. et maeotica Cand. pariter varr.)

canescens Cand. 11. I. siliculis spathulato-linearibus obtusis margine basique incano-villosis, corolla calycem excedente. *Gallia austr. Ad litora Ponti.* (I. iberica Stev.)

oblongata Cand. 12. I. siliculis elliptico-oblongis utrinque attenuatis glabris, loculo centrali complanato subtrinervio. *Sibir.*

orientalis W. 13. I. siliculis oblongo-linearibus stigmate sessili apiculatis acutiusculis pubescentibus. *Asia minor.*

aleppica Scop. 14. I. siliculis linearibus obtusis retrorsum villosis. *Graecia. Asia minor. Syria.* (I. aegyptiaca et lusitanica L.?)

2278. BISCUTELLA.

** Calycibus basi bicalcaratis.*

cichoriifolia Loiſ. 1. B. ſiliculis utrinque emarginatis punctato-aſperiusculis, foliis ſuperioribus oblongis ſinuato-dentatis cauleque villoſis. *Pyrenaei.* (B. picridifolia var. Lapeyr.)

hiſpida Cand. 2. B. ſiliculis utrinque ſubrectilineis ſcabris, foliis oblongis ſinuatis hiſpidis, caule hirto. *Gallia auſtr. Italia.*

auriculata 3. B. ſiliculis glabris apice confluentibus, foliis oblongo-lanceolatis dentatis glabriusculis, caule hiſpido. *Europ. med. et auſtr. Afric. bor.* (B. erigerifolia Cand. var.)

*** Calycibus basi aequalibus.*

† Fruticoſae: ſiliculis axin ſtyliferum tantum tangentibus.

peruviana Lam. 4. B. ſtylo breviſſimo, foliis oblongis ſubcoriaceis ſerratis venoſo-lineatis glaberrimis. *Peru. Chili.* (Cremolobus Cand.)

ſuffruticoſa Cand. 5. B. ſtylo elongato, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis glabris. *Peru.* (Cremolobus Cand. ſyſt.)

†† Perennes: ſiliculis cum axi ſtylifero coalitis.

megalocarpa Fiſch. Cand. 6. B. ſiliculis glabris apice emarginatis baſi ſubdecurrentibus, foliis 2pinnatifidis hiſpidis. *Sibir. auſtr.* (B. laciniata W. herb.)

montana Cav. 7. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis inferioribus obovatis groſſe dentatis tomentoſis. *Hiſpan. auſtr.* (B. obovata Cand. var.)

laevigata 8. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis cauleque inferne pubeſcentibus. *Europ. auſtr.* (B. alpeſtris Kit.)

coronopifolia 9. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis hiſpidis, inferioribus ſinuato-dentatis oblongis, ſuperioribus ſemiamplexicaulibus. *Europ. auſtr.* (B. ambigua Cand. Siſymbrium valentinum L.?)

lucida Cand. 10. B. ſiliculis utrinque emarginatis laevibus, foliis ſpathulatis nitidis glaberrimis dentatis integerrimisque. *Neapol.* (B. ſubſpathulata Lam.)

ſaxatilis Cand. 11. B. ſiliculis utrinque emarginatis ſcabris, foliis ſpathulato-linearibus hiſpidis dentatis integerrimisque. *Europ. auſtr.* (B. didyma et intermedia Gouan., longifolia Vill., mollis Loiſ., ſubſpathulata Suter.)

ſempervirens 12. B. ſiliculis utrinque emarginatis ſcabris, foliis ſubradicalibus linearibus ſubintegerrimis incano-tomentoſis, ſcapo nudo. *Hiſpan. Luſitan.*

tomentoſa Lag. 13. B. ſiliculis pubeſcentibus punctato-ſcabris, foliis radicalibus ſpathulatis repando-dentatis, caulinis cordato-ovatis cauleque molliſſimo tomentoſis. *Hiſpan.*

††† *Annuae.*

α. *Siliculis apice confluentibus.*

chilensis Cand. 14. B. siliculis glabris pendulis, foliis lanceolatis remote serratis laevibus. *Chili.* (B. cuneata Lag. Cremolobus chilensis Cand. syst.)

β. *Siliculis utrinque emarginatis.*

raphanifolia Poir. 15. B. siliculis glaberrimis, foliis radicalibus lyratis scabris, caulinis obovatis dentatis, caule superne glabro. *Sicil. Mauritan.* (B. leiocarpa Cand.)

lyrata 16. B. siliculis pubescentibus, foliis radicalibus lyratis elongatis, caulinis lanceolatis acuminatis, caule superne hispido. *Europ. austr. Afric. bor.*

maritima Tenor. 17. B. siliculis disco glabris margine pubescentibus ciliatis, foliis radicalibus obovatis dentatis hispidis, caule nudiusculo. *Neapol. Aegypt.* (B. depressa W. Delil. var.?)

ciliata Cand. 18. B. siliculis disco glabris margine ciliatis, foliis oblongis remote dentatis cauleque folioso hispidis. *Europ. austr.* (B. didyma et coronopifolia W.)

apula 19. B. siliculis pubescentibus, foliis lanceolatis serratis cauleque folioso ramoso hirsuto. *Italia. Sicilia. Graecia.*

Columnae Tenor. 20. B. siliculis subpubescentibus scabris, foliis radicalibus obovatis dentatis cauleque nudiusculo basi hispido. *Neapol. Hispania.* (B. didyma β. L., microcarpa Cand.)

eriocarpa Cand. 21. B. siliculis disco hispidis, foliis obovatis subdentatis cauleque superne nudo basi hirsutiusculis. *Mauritania.* Broussonet.

2279. PELTARIA.

alliacea 1. P. foliis caulinis sagittato-amplexicaulibus, fructibus laevibus. *Austria. Transsylvan. Ital. super.*

glastifolia Cand. 2. P. foliis caulinis sagittato-amplexicaulibus, fructibus rugulosis coriaceis. *Syria. Mesopotamia.*

angustifolia Cand. 3. P. foliis inferioribus petiolatis oblongis superioribus linearibus, fructibus laevibus. *Syria.*

2280. EUCLIDIUM R. Br.

syriacum R. Br. 1. E. fructibus hispidis, stylo subulato persistente, foliis caulinis petiolatis oblongo-lanceolatis dentatis scabris. *Austria. Hungar. Transsylvan. Podolia. Asia minor et media.* (Anastatica L., Bunias Gärtn. Myagrum syriacum Lam., rostratum Scop., rigidum Pall.)

tataricum Cand. 2. E. fructibus glabris, stylo demum deciduo, foliis caulinis linearibus sessilibus ciliatis. *Ad Volgam et in Tataria.* (Vella tenuissima Pall., Bunias tatarica W.)

II.

SILICULOSAE.

2281. Lunaria.

rediviva. 1. L. siliculis lanceolatis utrinque attenuatis. *Europ. austr.*

biennis Mönch. 2. L. siliculis ellipticis (utrinque rotundatis). *Europ.* (L. annua L.)

2282. Ricotia.

Lunaria Cand. 1. R. foliis sub-2pinnatis, foliolis oblongis inciso-dentatis. *Syria.* (Cardamine Lunaria et Ricotia aegyptiaca L.)

tenuifolia Sibth. 2. R. foliis sub-2pinnatifidis, laciniis linearibus. *Asia minor.*

2283. Alyssum.

* *Floribus flavis.*

† *Filamentis appendiculatis.*

a. Suffruticosa.

saxatile 1. A. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ramisque subtomentoso-canescentibus, racemis paniculato-corymbosis. *Podolia.*

gemonense 2. A. foliis oblongis obtusis repando-dentatis ramisque subtomentoso-canescentibus, racemis subsimplicibus, siliculis glabris ovali-orbiculatis. *Saxonia. Austria. Transsylvania.*

orientale Ard. 3. A. foliis oblongo-lanceolatis repando-undulatis incano-tomentosis, racemis compositis, siliculis transverse ovalibus glabris. *Creta. Ins. maris aegei. Asia minor.* (Clypeola tomentosa L.)

spathulatum Steph. 4. A. foliis minutis orbiculato-spathulatis integerrimis candido-tomentosis, racemo simplici, siliculis orbiculatis glabris. *Sibir. bor.* (A. cretaceum Adam.)

argenteum W. 5. A. foliis obovato-spathulatis supra stellato-pubescentibus incanis subtus lepidoto-argenteis, siliculis suborbiculatis villosis, seminibus submarginatis. *Alp. grai. cott. Tauria. Sibir.* (Lunaria argentea All. Al. murale M. B., spathulatum Adam., obtusifolium Stev. Cand.)

murale Kit. 6. A. foliis oblongis acutiusculis supra siliculisque stellato-pubescentibus subtus ramisque virgatis dense albido-tomentosis, seminibus haud marginatis. *Italia. Hungar. Transsylvan.* (A. argenteum Bertol., Bertolonii Desv. Cand.)

savranicum Andrz. 7. A. foliis spathulato-linearibus stellato-pubescentibus incanis subtus dense tomentosis, ramis ascendentibus diffusis, floribus minutis, siliculis incano-pubescentibus. *Podolia.*

atlanticum Desf. 8. A. foliis lanceolatis stellato-pubescentibus incanis ciliatis, siliculis pubescentibus convexis stylum aequantibus. *Creta. Atlas.*

serpyllifolium Desf. 9. A. foliis incanis, inferioribus obovatis superioribus lanceolatis, siliculis obovatis planissimis pubescentibus. *Afric. bor. Hispan.*

alpestre. 10. A. foliis obovato-spathulatis stellato-pubescentibus sublepidotis incanis, siliculis ovato-oblongis planis canescentibus. *Europ. med. et austr.*

tortuosum Kit. 11. A. foliis spathulatis stellato-pubescentibus incanis, ramis flexuosis, siliculis ellipticis planis incano-tomentosis, seminibus haud marginatis. *Hungar. Transsylv. Podolia. Tauria.* (A. serpyllifolium M. B. A novum Winterl. ind. pest.)

nebrodense Tin. 12. A. foliis rosaceo-congestis obovatis utrinque candido-tomentosis, caule humili, siliculis ellipticis stellato-pubescentibus planis stylo longioribus, seminibus haud marginatis. *Sicil.*

Marschallianum Andr. 13. A. foliis incanis, inferioribus obovatis superioribus oblongo-linearibus, siliculis ellipticis canescentibus convexis stylo longioribus, seminibus haud marginatis. *Tauria. Caucas.* (A. alpestre M. B.)

lenense Adam. 14. A. foliis imbricatis lanceolatis stellato-tomentosis, racemis abbreviatis, siliculis emarginatis incanis stylum aequantibus. *Sibir.*

lanigerum Cand. 15. A. foliis obovatis tomentoso-lanatis, racemis corymbosis, siliculis ellipticis villoso-tomentosis stylum subaequantibus. *Persia.*

montanum 16. A. foliis spathulatis candido-tomentosis, ramis diffusis ascendentibus, racemis simplicibus, siliculis suborbiculatis canescentibus stylum subaequantibus. *Europ. med.* (A. arenarium Lois., diffusum et cuneifolium Tenor. varr.)

Wulfenianum Bernh. 17. A. foliis lineari-lanceolatis remotis incanis, racemis simplicibus, filamentis omnibus appendiculatis, siliculis ellipticis stellato-pubescentibus stylum aequantibus. *Carinthia.*

gnaphalodes Cand. 18. A. foliis ellipticis villoso-tomentosis, rameis linearibus, racemis simplicibus, calycibus clausis pedicello longioribus, siliculis ellipticis villosis stylo duplo longioribus. *Persia.*

petalodes Cand. 19. A. foliis obovato-oblongis subdentato-sinuatis hirsutis, racemis simplicibus, calycibus densis pedicello longioribus, siliculis ovatis margine villosis. *Syria.* Labillard.

β. Herbacea.

sibiricum W. 20. A. foliis obovato-oblongis stellato-pubescentibus incanis, siliculis orbiculatis demum glabris, stylo elongato, seminibus haud marginatis. *Sibir.* (A. Fischerianum Cand. var.)

umbellatum Desv. 21. A. foliis lineari-lanceolatis stellato-pubescentibus, racemis conferto-corymbosis, filamentis longioribus edentulis, siliculis ellipticis stellato-

pubefcentibus incanis. *Tauria.* (A. brachyftachyon M. B.)

roftratum Stev. 22. A. foliis oblongo-lanceolatis ftellato-pubefcentibus fcabris, ramis erectis racemofo-paniculatis, filiculis ellipticis incano-pilofis ftylo longo roftratis. *Beffarabia. Tauria.*

parviflorum M. B. 23. A. foliis lanceolatis ftellato-pubefcentibus villofis, calycibus corollam fubaequantibus, filiculis convexis hirfutis ftylo breviusculo roftratis. *Caucaf.*

hirfutum M.B. 24. A. foliis oblongo-lanceolatis hirfutis, caule fimpliciusculo erecto, filiculis orbiculatis tuberculato-hirfutis convexiusculis ftylo breviusculo coronatis, feminibus marginatis. *Tauria. Caucaf.* (A. Draba W.)

campeftre 25. A. foliis oblongo-linearibus ftellato-pubefcentibus hirfutiusculis, calycibus deciduis corolla minoribus, filamentis omnibus appendiculatis, filiculis orbiculatis tuberculato-hirfutis ftylo breviusculo coronatis, feminibus fubalatis. *Gallia. Hifpan. Italia. Graecia.*

calycinum 26. A. foliis lineari-lanceolatis bafi attenuatis ftellata pube canefcentibus, calycibus perfiftentibus ungues petalorum marcidorum aequantibus, filamentis longioribus edentulis, filiculis orbiculatis pubefcentibus f. glabriusculis convexis ftylo brevi coronatis, feminibus marginatis. *Europ. med.* (A. campeftre Hofm. Schk.)

minimum W. 27. A. foliis linearibus incano-hirfutis, calycibus deciduis, filiculis orbiculatis medio convexis glaberrimis ftylo brevi deciduo coronatis. *Auftria. Podolia. Tauria.*

minutum Schlechtend. 28. A. pygmaeum, foliis ftellata pube villofis, radicalibus ovalibus petiolatis, caulinis oblongo-linearibus, calycibus demum deciduis, filiculis orbiculatis glabris. *Sibir.*

glomeratum Burch. 29. A. foliis obovato-oblongis villofis, racemis confertis foliofis, calycibus perfiftentibus, filamentis omnibus appendiculatis, filiculis orbiculatis glabris. *Afric. auftr.*

fulvefcens Sm. 30. A. foliis ftellata pube canefcentibus, infimis obovatis petiolatis, fummis oblongis, calycibus perfiftentibus, filamentis longioribus edentulis, filiculis ovato-globofis glabris. *Peloponnef. Inf. maris aegei.*

†† *Filamentis omnibus edentulis.*

edentulum Kit. 31. A. foliis fubtus incano-villofiusculis, inferioribus obovato-oblongis repando-finuatis, fuperioribus lanceolatis, racemis paniculatis, calycibus patulis, petalis 2fidis, filiculis glabris fubinflatis. *Hungar. Transfylvan.* (Veficaria Poir.)

dafycarpon Steph. 32. A. foliis oblongis ftellata pube canefcentibus, pedicellis breviffimis, petalis emarginatis calycem fubaequantibus, filiculis convexis ftellato-pubefcentibus hirfutis. *Ad Volgam.* (A. fibiricum Trevir.)

** *Floribus albis.*

† *Suffruticosa: filamentis edentulis.*

maritimum Lam. 33. A. foliis lineari-lanceolatis acutis canescentibus, ramis diffusis ascendentibus, racemis elongatis, siliculis orbiculatis glabris. *Ad oras maris mediterr.* (Clypeola maritima, Alyssum halimifolium et minimum L. Lepidium fragrans W. in Usteri mag.)

rupestre Tenor. 34. A. foliis argenteis, inferioribus oblongo-lanceolatis superioribus linearibus, siliculis obovatis flocculoso-lepidotis stylo brevi mucronatis. *Neapol.*

halimifolium W. 35. A. foliis obovato-spathulatis candido-tomentosis, floribus corymbosis, siliculis orbiculatis planis glabris stylo coronatis. *Italia super.* (Lunaria All.)

spinosum 36. A. foliis minutis oppositis stellato-tomentosis argenteis, ramis demum spinescentibus, siliculis subrotundis stellato-pubescentibus. *Hispan. Gallia austr.* (Draba spinosa Lam.)

macrocarpon Cand. 37. A. foliis spathulatis subtus argenteo-lepidotis, racemis paucifloris, siliculis oblongis subinflatis glaberrimis stylo coronatis, seminibus alatis. *Montes Gebenn. Galliae austr.*

pyrenaicum Lapeyr. 38. A. foliis obovatis subtus incano-villosis, ramis crassis lignosis, siliculis oblongis utrinque attenuatis stellato-pubescentibus stylo longo coronatis. *Pyrenaei montes.*

canescens Cand. 39. A. foliis oblongo-linearibus incano-tomentosis, floribus corymbosis, siliculis ellipticis stellato-villosis stylo longo terminatis. *Sibir. Camtschatca.*

tenuifolium Steph. 40. A. foliis linearibus acutis stellato-villosis, siliculis ovalibus incano-hirsutis stylo terminatis. *Sibir.*

†† *Herbacea.*

densiflorum Desf. 41. A. foliis lineari-lanceolatis stellata pube incanis, floribus dense confertis racemosis, siliculis orbiculatis pubescentibus. *Armenia.* (A. strictum W.)

hyperboreum 42. A. foliis oblongis grosse dentatis hirsutiusculis glaucescentibus, floribus corymbosis, filamentis majoribus denticulatis, siliculis ellipticis planis. *Ora occid. Amer. bor.* (Draba hyperborea Desv.)

2284. Petrocallis R. Br.

pyrenaica R. Br. *Alp. Europ. austr.* Herba caespitosa ramosissima, foliis 3-5fidis cuneatis linearibus glabris ciliatis, floribus subcorymbosis roseis. (Draba L.)

2285. HUTCHINSIA R. Br.

**Foliis indivisis.*

rotundifolia R. Br. 1. H. foliis subcarnosis integerrimis glaberrimis, inferioribus subrotundis petiolatis, superioribus oblongis amplexicaulibus, petalis stamina, siliculis subemarginatis stylum superantibus. *Alp. Europ. med. et austr.* (Iberis rotundifolia L., Lepidium rotundifolium All.)

cepeaefolia Cand. 2. H. foliis subcarnosis, inferioribus obovato-oblongis dentatis in petiolum decurrentibus, superioribus oblongis sessilibus, petalis stamina, siliculis subemarginatis stylum superantibus. *Carinthia. Apennin.* (Iberis cepeaefolia Wulff.)

pumila Cand. 3. H. foliis subcarnosis, inferioribus ovalibus integerrimis longe petiolatis, caulinis oblongis sagittatis, siliculis utrinque attenuatis stylum superantibus. *Caucas.* (Iberis pumila Stev. M. B.)

stylosa Cand. 4. H. foliis subcarnosis, inferioribus obovato-oblongis petiolatis subintegerrimis, superioribus oblongis subamplexicaulibus, staminibus petala styloque siliculam oblongam obtusam subaequantibus. *Neapol.* (Iberis stylosa Tenor.)

brevistyla Cand. 5. H. foliis subcarnosis confertis obovatis petiolatis subdentatis, silicula emarginata, stylo brevissimo. *Syria.* Labillard.

trinervia Cand. 6. H. foliis cordato-oblongis amplexicaulibus 3nerviis integerrimis, staminibus petala subaequantibus. *Persia.*

hastulata Cand. 7. H. foliis subhastato-oblongis amplexicaulibus subdentatis, siliculis elongatis truncatis. *Persia.*

***Foliis pinnatis s. pinnatifidis.*

calycina Desv. 8. H. foliis decursive pinnatis villosis, foliolis lineari-lanceolatis obtusis integerrimis, calycibus persistentibus, siliculis oblongis utrinque attenuatis stylo coronatis. *Sibir.* (Lepidium calycinum Steph. W.)

alpina R. Br. 9. H. foliis decursive pinnatis glabris, foliolis obovato-linearibus, petalis calyce deciduo multo majoribus, siliculis oblongis utrinque attenuatis stylo abbreviato coronatis. *Alp. Europ. med.* (Lepidium alpinum L., Halleri Crantz., Draba alpina Baumg., Nasturtiolum Scop.)

*brevicaulis** 10. H. foliis lyrato-pinnatis, foliolis obovatis, petalis calyce deciduo majoribus, siliculis obovato-oblongis obtusis stylo destitutis. *Summae alpes Carinth.* (Lepidium brevicaule Hopp.)

petraea R. Br. 11. H. foliis decursive pinnatis glabris, foliolis oblongo-linearibus, petalis calycem aequantibus, siliculis ovalibus (utrinque rotundatis) 4spermis, stigmate sessili. *Europ.* (Lepidium petraeum L., Linnaei Crantz.)

procumbens Cand. 12. H. foliis sinuato-pinnatifidis integrisque glabris, petalis calycem aequantibus, siliculis ovalibus sub 10 spermis, stigmate sessili. *Thuringia. Hispan. Cyprus. Tauria. Ad Volgam.* (Lepidium procumbens L. Thlaspi Lapeyr.)

2286. IBERIS.

* *Frutescentes.*

semperflorens 1. I. foliis spathulatis integerrimis subcoriaceis glabris, floribus corymbosis, siliculis transverse ovalibus (apice haud emarginatis), seminibus marginatis. *Sicilia.*

sempervirens 2. I. foliis oblongo-linearibus obtusis integerrimis, floribus racemoso-corymbosis, siliculis acute emarginatis. *Italia. Creta.* (I. Garrexiana All. var.)

gibraltarica 3. I. foliis subspathulatis apice dentatis integrisque glabris, floribus corymbosis, siliculis acute emarginatis. *Hispania.*

Tenorii Cand. 4. I. suffrutescens procumbens, ramis pubescentibus, foliis ovato-oblongis subcarnosis denticulato-ciliatis, floribus corymbosis, siliculis oblongis utrinque attenuatis (vix emarginatis). *Neapol.* (I. cepeaefolia Tenor.)

Pruiti Tin. 5. I. suffrutescens glabra, foliis spathulato-linearibus integerrimis subcarnosis, floribus corymbosis, siliculis subrotundis acute emarginatis. *Sicil.*

contracta Pers. 6. I. fruticosa ramosissima, foliis spathulato-linearibus subdentatis carnosis, corymbis umbellatis contractis. *Hispania.*

conferta Lag. 7. I. suffruticosa humillima, foliis subradicalibus confertissimis lineari-lanceolatis acutis glabris subcarnosis, scapo racemifero, siliculis ovatis (vix emarginatis). *Hispania.*

saxatilis 8. I. foliis linearibus acutiusculis integerrimis subciliatis, floribus corymbosis, siliculis emarginatis. *Europ. austr.* (I. vermiculata W.)

pubescens W. 9. I. suffruticosa procumbens, foliis spathulatis obtuse dentatis subsinuatis ciliatis, floribus corymbosis, siliculis subrotundis acute emarginatis, stylo elongato. *Hispania.* (I. Lagascana Cand.)

subvelutina Cand. 10. I. frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis villosis, floribus racemosis, siliculis acute emarginatis. *Hispania.* (I. sempervirens Lag.)

cappadocica W. 11. I. frutescens humilis, foliis strigosis, inferioribus spathulatis superioribus linearibus acutis, floribus corymbosis. *Asia minor.*

** *Herbaceae: floribus racemoso-corymbosis, siliculis emarginatis.*

carnosa W. 12. I. foliis spathulatis integerrimis subcarnosis glabris basi ciliatis. *Pyren.* (I. cepeaefolia Pourr., spathulata Cand., rotundifolia Lam.)

13.

pyrenaica Lapeyr. 13. I. foliis ellipticis integerrimis glabris subcarnosis, inferioribus oppositis superioribus alternis. *Pyren.*

nana All. 14. I. humilis, foliis subrotundo-spathulatis integerrimis subcarnosis glabris. *Gallia austr. Pedemont.* (I. aurosica Vill.)

violacea R.Br. 15. I. ramosa, foliis spathulatis petiolatis obtusis dentatis integerrimisque ciliatis, calycibus dorso pilosiusculis. *Patria?*

ciliata W. 16. I. subramosa, foliis spathulato-linearibus integerrimis ciliatis. *Gallia. Italia. Tauria.* (I. taurica Cand.)

linifolia 17. I. foliis linearibus sparsis integerrimis glabris. *Europ. austr.*

umbellata 18. I. foliis lineari-lanceolatis acuminatis inferioribus serratis superioribus integerrimis. *Italia. Hispania. Graecia.*

amara 19. I. foliis lanceolatis apice dilatatis dentatis acutis glabris, floribus racemosis. *Europ.* (I. intermedia Guers. var. ♂.)

odorata 20. I. foliis linearibus apice dilatatis serratis glabris basi ciliatis, floribus corymbosis. *Creta.*

pinnata 21. I. foliis linearibus pinnatifidis ramisque pilosis, floribus corymbosis. *Europ. austr.* (I. crenata Lam.)

2287. TEESDALIA R. Br.

Iberis Cand. 1. T. petalis inaequalibus, exterioribus majoribus. *Europae arenosa.* (Iberis nudicaulis L. Guepinia Bât. Cand.)

Lepidium Cand. 2. T. petalis aequalibus. *Europ. austr. Afric. bor.* (Lepidium nudicaule L., Thlaspi nudicaule Desf. Guepinia Lepidium Desv., Teesdalia regularis Sm.)

2288. MENONVILLEA Cand.

linearis Cand. *Peru. Chili.* Herba suffruticosa, foliis linearibus, inferioribus serratis superioribus integerrimis, floribus racemosis.

2289. ANASTATICA.

hierochuntica *Aegypt. Palaestina.* Herba humilis ramosa pubescens, foliis oblongis, floribus racemosis albis parvis.

2290. LEPIDIUM.

**Fruticosa.*

oppositifolium Labill. 1. L. foliis oppositis amplexicaulibus orbiculatis integerrimis glaucis subcarnosis, racemis elongatis, siliculis emarginatis. *Libanus.* (Iberis Pers., Thlaspi Poir., Lepia Desv., Eunomia Cand.)

*chloraefolium** 2. L. foliis oppositis subrotundis crenulato-scabris amplexicaulibus, floribus corymbosis, siliculis

emarginatis. *Olymp. Asiae minoris.* (Iberis chloraefolia Sibth. Sm. Eunomia Cand.)

*Tournefortii**. 3. L. foliis alternis cordato-ovatis amplexicaulibus glaucis, siliculis margine subdentatis. *Armenia. Syria.* (Thlaspi cordatum Desf., Myagrum chloraefolium W., Eunomia Cand.)

subdentatum Burch. 4. L. foliis alternis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis apice dentatis, summis linearibus integerrimis, racemis oppositifoliis, floribus minimis diandris, siliculis ellipticis obtuse emarginatis. *Afric. austr.*

† *fruticulosum* Desv. 5. L. foliis obovato-oblongis apice dentatis subcarnosis, ramis divaricatis, siliculis ovatis obtusis astylis. *Nov. Holl.* (L. Novae Hollandiae Desv.)

suffruticosum 6. L. foliis inferioribus cuneato-linearibus apice dentatis, caulinis linearibus integerrimis, floribus racemosis, siliculis ovatis apice attenuatis astylis. *Hispania.* (L. graminifolium Cav.)

subulatum 7. L. foliis lineari-subulatis integerrimis confertis, racemis subpaniculatis, floribus parvis, siliculis ovatis subemarginatis. *Hispania.*

divaricatum Ait. 8. L. foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis divaricatis acutis, superioribus linearibus subincisis, caule ramosissimo, floribus minimis, siliculis ovalibus subemarginatis. *C. B. S.*

africanum Cand. 9. L. foliis lyratis, laciniis incisis, summis linearibus integerrimis, racemis elongatis, siliculis ellipticis stigmate sessili apiculatis. *C. B. S.*

lineare Cand. 10. L. foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis oblongis, caulinis lineari-subulatis integerrimis, calycibus pubescentibus, siliculis ovatis.

† *pinnatum* Thunb. 11. L. foliis fasciculatis pinnatifidis glabris, siliculis emarginatis. *C. B. S.*

bipinnatum Thunb. 12. L. foliis radicalibus 2-3pinnatis glabris, laciniis filiformibus, superioribus 3fidis. *C. B. S.*

** *Herbaceae.*

† *Siliculis apice attenuatis s. rotundatis, haud emarginatis.*

α. Foliis indivisis.

Draba 13. L. foliis cordato-sagittatis amplexicaulibus oblongis dentatis, racemis corymbosis, siliculis ovatis turgidis stylo coronatis. *Europ. med. et austr.* (Cochlearia Draba L. spec. 2. Cardaria Desv. Cardiolepis Wallr.)

chalepense 14. L. foliis sagittato-lanceolatis amplexicaulibus dentatis, siliculis ellipticis compressis stylo coronatis. *Syria.* (L. oxyotum Cand.)

glastifolium Desf. 15. L. foliis caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus basi subdentatis, siliculis obovato-ellipticis stylo coronatis. *Numidia.* (Thlaspi Poir.)

amplexicaule W. 16. L. foliis caulinis sagittato-lanceolatis amplexicaulibus apice dentatis, siliculis subrotundis stylo terminatis. *Sibir.*

† cordatum W. herb. 17. L. foliis caulinis cordato-oblongis integerrimis amplexicaulibus glaucis, siliculis ellipticis. *Sibir.*

flexuosum Thunb. 18. L. foliis caulinis semiamplexicaulibus oblongo-linearibus basi nervosis, siliculis ovatis stylo brevissimo apiculatis, caule decumbente flexuoso. *Afric. austr.*

crassifolium Kit. 19. L. foliis carnosis, inferioribus petiolatis ovalibus nervosis, superioribus sagittato-ovatis amplexicaulibus, siliculis ovatis obtusis stylo brevissimo apiculatis. *Hungar. Tauria. Ad Volgam.* (L. verrucosum Cand.)

latifolium 20. L. foliis ovato-oblongis dentato-serratis, infimis longe petiolatis summis subsessilibus, racemis paniculatis, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *Europ. Sibir.* (L. affine Ledeb. var.)

crispum Desv. 21. L. foliis obovatis profunde dentatis subcrispis carnosis, siliculis subovalibus stigmate apiculatis. *Nov. Holl. austr.*

iberioides Desv. 22. L. foliis linearibus, inferioribus apice dentatis, siliculis ellipticis. *Ins. Mascaren.*

β. Foliis divisis.

coronopifolium Fisch. 23. L. foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis distantibus, summis linearibus integerrimis, ramis paniculatis, siliculis lanceolatis stylo coronatis. *Ad Volgam et in Sibir. austr.*

lyratum 24. L. foliis lyratis, laciniis inciso-dentatis, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *Armenia.*

Iberis 25. L. foliis inferioribus lanceolatis subpinnatifidis vel inciso-serratis, superioribus linearibus integerrimis, caule ramosissimo, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *Europ. med. et austr.* (L. graminifolium L.)

capense Thunb. 26. L. foliis inferioribus oblongis pinnatifidis, superioribus lanceolatis serratis, summis linearibus integerrimis, floribus 2andris, siliculis ovatis stigmate apiculatis. *C. B. S.*

†† Siliculis emarginatis.

α. Foliis indivisis.

campestre R.Br. 27. L. foliis sagittatis subdentatis pubescentibus, siliculis subalatis lepidoto-punctatis. *Europ.* (Thlaspi campestre L., Iberis Wallr.)

hirtum Hook. 28. L. foliis sagittatis subdenticulatis villosis, siliculis oblongis profunde emarginatis hirsutis. *Anglia. Scotia. Europ. austr.* (Thlaspi L.)

rotundum Cand. 29. L. foliis caulinis lanceolato-linearibus acutiusculis subcarnosis siliculisque profunde emarginatis glabris. *Nov. Holl. versus Africum.* (Lepia rotunda Desv.)

spinescens Cand. 30. L. foliis superioribus linearibus apice inciso-dentatis, ramis divaricatis apice spinescentibus, siliculis laevibus emarginatis, stylo brevissimo. *Syria.*

virginicum 31. L. foliis lineari-lanceolatis inciso-serratis glabris, siliculis orbiculatis emarginatis laevibus. *Amer. bor.*

hyssopifolium Desv. 32. L. foliis lineari-lanceolatis remote denticulatis glabris, ramis subpubescentibus, siliculis ovalibus obtuse emarginatis. *Nov. Holl.*

caespitosum Desv. 33. L. foliis radicalibus confertis linearibus pilosis glaucis persistentibus, racemo paucifloro, siliculis ovatis anguste emarginatis. *Armenia.*

spicatum Desv. 34. L. foliis linearibus integerrimis erectis glabris, floribus subspicatis, siliculis orbiculatis emarginatis laevibus. *Ad fret. Magellan.*

oleraceum Forst. 35. L. foliis inferioribus oblongis profunde serratis, superioribus cuneato-linearibus apice cuspidato-serratis, siliculis obtuse emarginatis. *Nov. Zeeland. Nov. Holl.* (L. cuneifolium Cand.)

Piscidium Forst. 36. L. foliis oblongo-lanceolatis antice paucidentatis, siliculis obovato-oblongis emarginatis. *Ins. oceani austr.* (L. 2dentatum Montin., L. oleraceum Ait.)

† *foliosum* Desv. 37. L. foliis oblongis obtusis apice dentatis subcarnosis, siliculis ovali-rhombeis emarginatis. *Terra Diemen.*

β. Foliis divisis.

sativum 38. L. foliis pinnatifido-incisis integrisque glabris, siliculis orbiculatis marginatis emarginatis. *Persia. Syria. Aegyptus.* (Thlaspi sativum Crantz. L. obovatum Kit. var. foliis lyratis.)

Humboldtii Cand. 39. L. foliis pinnatifidis glabris, calycibus persistentibus petala superantibus, siliculis ovatis emarginatis stylo brevi apiculatis. *Quito.* (Senebiera dubia Kunth.)

spinosum 40. L. foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus linearibus integerrimis, siliculis oblongis bifidis glabris. *Graecia.* (Nil spinosi in herba.)

Menziesii Cand. 41. L. foliis pubescentibus, inferioribus pinnatifidis, laciniis incisis, superioribus linearibus integerrimis, siliculis orbiculatis retusis. *Ora occ. Amer. bor.*

pubescens Desv. 42. L. foliis glabris pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis, caule prostrato pedicellisque villosis, siliculis retusis. *Brasil.*

Chichicara Desv. 43. L. foliis glabris pinnatifidis, laciniis denticulatis, superioribus ovato-oblongis inaequaliter dentatis, siliculis obovatis emarginatis. *Brasil.*

bonariense 44. L. foliis pinnatifidis ciliatis, laciniis incisis, caule glabro, floribus minimis diandris, siliculis orbiculatis emarginatis. *Ad fl. Plata.* (Thlaspi multifidum et bonariense Poir.)

Cardamines 45. L. foliis lyrato-pinnatis glabris, foliolis subintegerrimis, floribus parvis, siliculis retusis. *Hispania.*

vesicarium 46. L. foliis pinnatis glabris, foliolis linearibus, geniculis caulinis inflatis, siliculis ellipticis retusis. *Caucas. Persia.*

incisum Roth. 47. L. foliis infimis lyrato-pinnatis, superioribus lato-lanceolatis inciso-dentatis, summis linearibus integerrimis, floribus parvis 2andris, siliculis orbiculatis retusis. *Caucas. Bessarabia.* (L. Pollichii Roth. fl. germ., obovatum Kit., angulosum Urv.)

ruderale 48. L. foliis infimis pinnatifidis superioribus linearibus integerrimis, floribus 2andris apetalis, siliculis ovatis emarginatis. *Europ. omnis.* (Ad Volgam obvia est var. foliis omnibus integerrimis.)

bipinnatifidum Desv. 49. L. foliis 2pinnatifidis, laciniis multifidis, racemis oppositifoliis multifloris, ramis pubescentibus, siliculis ovalibus emarginatis. *Amer. austr.*

perfoliatum 50. L. foliis inferioribus 2pinnatis, laciniis linearibus incisis, superioribus cordatis amplexicaulibus integerrimis, siliculis ellipticis retusis. *Hispania. Austria. Transylvan. Persia. Syria.*

2291. BIVONAEA Cand.

lutea Cand. *Sicil.* Herba humilis, foliis cordatis obtusis subdentatis amplexicaulibus glaucis, floribus racemosis luteis. (Thlaspi luteum Bivon.)

2292. AETHIONEMA R. Br.

* *Siliculis bilocularibus.*

coridifolium Cand. 1. Ae. fruticosum, foliis confertis linearibus, inferioribus patulis, silicularum alis integerrimis. *Libanus.*

membranaceum Cand. 2. Ae. fruticulosum, foliis remotis oblongo-linearibus appressis, valvarum alis integerrimis. *Persia.*

stylosum Cand. 3. Ae. fruticulosum, foliis ovato-lanceolatis integerrimis, staminibus majoribus connatis, stylo elongato. *Syria.* (Thlaspi carneum Russel.)

saxatile R.Br. 4. Ae. fruticulosum, foliis oppositis obovato-oblongis glaucescentibus, staminibus majoribus dentatis, stylo brevissimo, valvarum alis subintegerrimis vel obsolete crenulatis. *Europ. med. et austr.* (Thlaspi saxatile et peregrinum L., Lepidium et Thlaspi marginatum Lapeyr. Aeth. gracile Cand, valde dubium.)

*cappadocicum** 5. Ae. herbaceum, foliis cordatis amplexicaulibus glaucis integerrimis, siliculis aggregatis, valvarum alis latissimis integerrimis. *Asia minor. Caucas.* (Iberis arabica L., Thlaspi arabicum M. B., Aeth. Buxbaumii Cand.)

cristatum Cand. 6. Ae. herbaceum, foliis ovato-lanceolatis petiolatis glaucis, valvarum alis grosse dentato-cristatis. *Syria. Persia.* (Thlaspi arabicum β. Desv.)

** *Siliculis 1locularibus.*

polygaloides Cand. 7. Ae. suffruticosum, foliis oblongo-linearibus glaucis, siliculis utrinque emarginatis, valvarum alis integerrimis. *Ins. Chios.*

monospermum R. Br. 8. Ae. herbaceum, foliis obovatis ovalibusque coriaceis sessilibus, siliculis emarginatis 1spermis, valvarum alis integerrimis. *Hispania.*

2293. VELLA.

Pseudocytisus 1. V. fruticosa, foliis obovatis rigidiusculis hispidis, floribus laxe spicatis, filamentis majoribus connatis, fructibus glabriusculis. *Hispania.*

annua 2. V. herbacea, foliis pinnatifidis, floribus racemosis, filamentis omnibus liberis, fructibus setosis. *Europ. austr.* (Carrichtera Vellae Cand.)

2294. SUBULARIA.

aquatica *Europ. med. et bor.* Herba aquatica pusilla unguicularis, foliis lineari-subulatis, floribus paucis pedicellatis albis.

2295. FARSETIA Turr. Cand.

* *Fruticosae.*

aegyptiaca Turr. 1 F. foliis linearibus siliculisque ovalibus incano-sericeis, staminibus edentulis. *Aegypt. Afric. bor.* (Cheiranthus Farsetia L., Lunaria scabra et Cheir. linearis Forsk., Farsetia cheiranthoides R. Br.)

suffruticosa Cand. 2. F. foliis lanceolatis integerrimis tomentosis, filamentis minoribus dentatis, siliculis subrotundis glabris. *Persia.* (Lunaria suffruticosa Vent.)

lunarioides R. Br. 3. F. foliis obovato-oblongis petiolatis siliculisque ovalibus tomentosis, filamentis minoribus dentatis. *Ins. maris aegei.* (Alyssum lunarioides et Lunaria graeca W.)

eriocarpa Cand. 4. F. foliis oblongis stellato-pubescentibus, siliculis dense sericeo-lanatis. *Cyprus.*

triquetra Cand. 5. F. foliis obovato-oblongis petiolatis canescentibus, ramis triquetris, staminibus edentulis, silicula elliptica stellato-pubescente, stylo longo deciduo. *Dalmatia.*

mutabilis R. Br. 6. F. foliis lineari-lanceolatis obtusis undulatis stellato-pubescentibus, petalis bilobis, staminibus minoribus basi dentatis, siliculis ellipticis glabris. *Ins. ion.* (Alyssum mutabile Vent. Draba mutabilis Desv.)

obliqua * 7. F. foliis sublinearibus undulatis canescentibus, petalis bifidis, siliculis oblique ellipticis stellato-pubescentibus incanis. *Neapol. Sicil.* (Alyssum obliquum Sm., Berteroa Cand.)

orbiculata * 8. F. foliis incanis, radicalibus oblongis sinuatis, caulinis lanceolatis integerrimis, floribus minimis, siliculis suborbiculatis stylo filiformi coronatis. *Macedonia.* (Alyssum orbiculatum Urv., Berteroa Cand.)

peruviana * 9. F. foliis ovali-oblongis utrinque attenuatis ftellato-pubefcentibus, pedicellis bracteatis, petalis obcordatis, ftaminibus edentulis, filiculis ovato-oblongis fcabris. *Peru.* (Berteroa Cand.)

** *Herbaceae.*

incana R. Br. 10. F. foliis lanceolatis incanis, petalis 2fidis, filiculis ovali-oblongis pubefcentibus. *Europ.* (Alyffum L., Draba cheiranthifolia Lam., Mönchia incana Roth., Veficaria Desv., Berteroa Cand.)

clypeata R. Br. 11. F. foliis oblongis repandis ftellato-pubefcentibus hirfutiusculis, petalis integris, filiculis oblongis pubefcentibus. *Sicilia. Graecia. Tauria. Afia minor.* (Alyffum clypeatum L., Draba Lam., Lunaria canefcens W.)

parviflora * 12. F. foliis glabris, inferioribus obovato-oblongis crenatis, fuperioribus linearibus, filiculis corymbofis longe pedicellatis glabris. *Aegypt.* (Lunaria parviflora Delil., Savignia Cand.)

libyea * 13. F. foliis fubfpathulato-linearibus integerrimis, filiculis corymbofis hifpidiusculis. *Afric. boreal.* (Lunaria libyca Viv.)

linifolia Andrz. 14. F. foliis linearibus integerrimis cano-pubefcentibus, filiculis ellipticis glaberrimis. *Hifpania. Podol. Caucaf. Syria.* (Alyffum minimum Pall., linifolium et illyricum W., linearifolium Lag., Meniocus ferpyllifolius Desv., linifolius Cand.)

2296. AUBRIETIA Adanf.

deltoidea Cand. 1. A. caule procumbente, foliis fubfpathulatis utrinque 1dentatis filiculisque villofis, ftylo elongato. *Neapol. Sicil. Creta. Afia minor.* (Alyffum deltoideum L., Farfetia R. Br., Veficaria Poir., Draba hefperidiflora Lam., Arabis purpurea Sibth.)

† *lepidioides* * 2. A. caule erecto, foliis pinnatis fubcarnofis linearibus, filiculis corymbofis glabris, ftylo elongato. *C. B. S.* (Peltaria capenfis L. fil., Lunaria pinnata Thunb., Farfetia pinnata et Aurinia capenfis Desv., Heliophila lepidioides Link., H. Peltaria Cand., Trentepohlia lepidioides Roth.)

† *diffufa* * 3. A. caule erecto, foliis pinnatis filiformibus, filiculis racemofis glabris. *C. B. S.* (Lunaria diffufa Thunb., Farfetia Desv., Heliophila Cand.)

2297. VESICARIA Lam.

utriculata Lam. 1. V. caule fuffruticofo foliisque lanceolatis glabris, calycibus bafi faccatis. *Gallia. Italia. Hungar.* (Alyffum L.)

Ludoviciana Cand. 2. V. caule fuffruticofo, foliis fpathulato-linearibus integerrimis ftellato-pubefcentibus incanis, filiculis tomentofis. *Ad fl. Miffuri.* (Myagrum argenteum Pursh.)

cretica Poir. 3. V. caule fruticoso, foliis lanceolatis repando-sinuatis tomentosis, siliculis glabris, seminibus alatis. *Creta.* (Alyssum L. V. fruticulosa Desv.)

vestita Desv. 4. V. caule suffruticoso, foliis linearibus acutis integerrimis tomentosis, calycibus persistentibus, siliculis glabris, seminibus apteris. *Persia.*

arctica Richards. 5. V. caule suffruticoso humili, foliis spathulatis stellato-lepidotis incanis integerrimis, siliculis glabris. *Amer. bor. arctic.* (Alyssum arcticum Wormsk. Hornem.)

paniculata Desv. 6. V. caule suffruticoso, foliis obovatis integerrimis glabris, racemis paniculatis, siliculis ovatis. *Creta.* (Alyssum paniculatum Desf.)

arenosa Richards. 7. V. caule suffruticoso, foliis inferioribus subrhombeis obsolete sinuato-dentatis stellato-pubescentibus, siliculis incanis. *Litus maris glacialis Amer. bor.*

sinuata Poir. 8. V. caule herbaceo, foliis lanceolatis basi attenuatis sinuato-dentatis, siliculis glabris. *Hispania. Italia.* (Alyssum sinuatum L.)

reticulata Lam. 9. V. caule herbaceo, foliis oblongo-linearibus subdentatis glabris, siliculis reticulatis. *Armenia. Syria.* (Alyssum Vesicaria L.)

cochlearioides * 10. V. caule herbaceo, foliis oblongis obtusis sinuato-dentatis subcarnosis glabris, calycibus persistentibus fructiferis inflatis. *Ind. or.* (Alyssum cochlearioides Roth.)

2298. DRABA.

I. *Scapigerae.*

* *Floribus flavis.*

† *Stylo filiformi: foliis rigidis ciliatis: pedunculis elongatis scapiformibus.*

aizoides 1. Dr. foliis confertis lineari-lanceolatis carinatis rigidis, staminibus petala aequantibus, stylo eadem superante. *Montes Europ. med.* (Dr. alpina Crantz., ciliaris L. W., Alyssum ciliatum Lam.)

brachystemon Cand. 2. Dr. foliis confertis linearibus elongatis carinatis rigidis, staminibus styloque corolla brevioribus. *Patria?* (Dr. aizoides Curt.)

Aizoon Wahlenb. 3. Dr. foliis confertis lineari-lanceolatis carinatis rigidis, siliculis hirtis stylo multo longioribus. *Bavaria. Austria. Transsylvan. Carpathi montes.* (Dr. ciliaris Schrank.)

cuspidata MB. 4. Dr. foliis confertis linearibus acutiusculis carinatis, pedunculis calycibusque hirsutis, siliculis hispidis stylum subexcedentibus. *Italia. Tauria. Transsylv.* (Dr. aspera Bertol., ciliaris Baumg.?)

rigida W. 5. Dr. foliis confertissimis oblongis obtusis carinatis subciliatis, pedunculis calycibusque glabris. *Caucas.* (Dr. bryoides Cand.)

olympica Sibth. 6. Dr. foliis confertissimis linearibus acutis carinatis ciliatis, pedunculis siliculisque ovatis villosis,

ftylo breviffimo. *Graecia. Afia minor.* (Dr. aizoides Sm.)

bruniaefolia Stev. 7. Dr. foliis confertis linearibus acutiusculis carinatis ciliatis, pedunculis filiculisque ovalibus villofis, ftylo abbreviato. *Caucaf.*

ericaefolia Stev. 8. Dr. foliis confertis linearibus acutiusculis carinatis ciliatis, pedunculis filiculisque oblongis glaberrimis, ftylo abbreviato. *Caucaf.*

pilofa Adam. 9. Dr. foliis linearibus carinatis ciliatis, pedunculis glabris fub-2floris, calycibus pilofis, petalis ftamina duplo fuperantibus, filiculis ovato-rotundis glabris. *Sibir. orient.*

afpera Adam. 10. Dr. foliis linearibus carinatis ciliatis, pedunculis calycibusque glabris, petalis ftamina duplo fuperantibus, filiculis oblongis laevibus, ftylo fubnullo. *Ad oftia fl. Lenae.* (75° lat. bor.)

†† *Stylo fubnullo: fcapigerae molles.*

vefıcaria Desv. 11. Dr. foliis confertiffimis oblongo-linearibus fcapoque paucifloro ftellato-hirfutiusculis, filiculis ovatis fubinflatis hirfutis. *Syria.*

algida Adam. 12. Dr. foliis oblongis planis calycibusque fimpliciter pilofis, fcapo racemofo, filiculis oblongis glabris. *Ad oftia fl. Lenae.* (75° lat. bor.)

alpina 13. Dr. foliis oblongo-lanceolatis enerviis integerrimis fcapoque paucifloro fimpliciter pilofis (pilis ramofis intermixtis), filiculis oblongis glabris. *Scandinavia arctica.* (Dr. pauciflora R. Br.)

glacialis Adam. 14. Dr. foliis lineari-lanceolatis integerrimis fcapoque ftellato-pilofis, calycibus villofis, filiculis ovatis glabris. *Litus maris glacialis Sibir. or.*

repens MB. 15. Dr. caule foliato bafi ftolonifero, foliis lanceolatis integerrimis, fetulis bipartitis centro appreffis, calycibus filiculisque oblongis glabris. *Caucaf.*

Gmelini Adam. 16. Dr. furculis caefpitofis, foliis lanceolatis pube ftellata hifpidis, fcapis nudis calycibusque pilofis, filiculis oblongis glabris. *Sibir.*

tridentata Cand. 17. Dr. foliis fpathulato-lanceolatis apice fub-3dentatis hifpidis, pilis 2-3fidis, fcapo racemifero calycibus filiculisque oblongis glabris. *Caucaf.* (Dr. rupeftris W. herb.)

hifpida W. 18. Dr. foliis obovatis fubdentatis hifpidis, pilis rigidis bifidis divaricatis, filiculis ovalibus glabris. *Afia minor.*

incomta Stev. 19. Dr. furculis caefpitofis ramofis, foliis lanceolatis obtufiusculis incano-villofis, fcapo calycibusque villofiusculis, pedicellis flore brevioribus, filiculis oblongis incanis. *Caucaf.*

molliffima Stev. 20. Dr. furculis caefpitofis, foliis oblongis obtufis, fcapo pedicellisque flore longioribus glabris, calycibus pilofiusculis, filiculis lanceolatis glabris. *Caucaf.*

aretioides Humb. 21. Dr. furculis caefpitofis ramofis, foliis obovatis obtufis fericeo-villofis albidis, fcapis pauciflo-

ris, siliculis ovatis. *Alp. Quito.* (Aretia cana W. herb.)

** *Floribus albis.*

† *Petalis indivisis: perennes.*

Liljebladii Wallm. 22. Dr. caespitosa, foliis oblongis integerrimis pube stellata caesio-incanis, siliculis lanceolatis glabris. *Scandinavia arctica. Amer. bor.* (Dr. hirta Oed., nivalis Liljebl., muricella Wahlenb.)

Wormskioldii Fisch. 23. Dr. foliis oblongis utrinque 1dentatis scapoque 1phyllo corymbifero pilosis, pube apice ramosa, siliculis oblongis glabris. *Sibir. or. extrema.*

hirta 24. Dr. radice stolonifera, foliis lanceolatis denticulatis integerrimisque scapoque racemifero sub-2phyllo pube ramosiuscula pilosis, siliculis oblongis glabris. *Europ. et Amer. bor. arctica.* (Dr. pyrenaica Oed., nivalis Cand.)

corymbosa R. Br. 25. Dr. foliis dense caespitosis oblongis integerrimis basi attenuatis scapoque corymbifero stellata pube pilosis, siliculis ellipticis hispidulis. *Amer. bor. ad sinum Baffini.*

oblongata R. Br. 26. Dr. foliis caespitosis oblongo-linearibus integerrimis scapoque racemifero pube flocoso-stellata villosis, siliculis elliptico-oblongis villosis. *Amer. bor. ad sinum Baffini.*

borealis Cand. 27. Dr. foliis oblongis basi attenuatis integerrimis pube stellata villosis, scapo 1phyllo hirsuto, siliculis ovatis glabris. *Ins. Pauli in mari camtschatico.* (58° lat. bor.)

rupestris R. Br. 28. Dr. foliis lanceolatis subintegerrimis scapoque sub-2phyllo pilosis, pilis simplicibus stellatisque, siliculis lanceolatis stellata pube hirsutiusculis. *Scotia. Norvegia.* (Dr. hirta Sm.)

Wahlenbergii Hartm. 29. Dr. foliis oblongis ciliatis glabriusculis, scapo humili paucifloro siliculisque ovalibus glaberrimis. *Scandinavia arctica. Grönland. Alp. summ. helvet.* (Dr. androsacea Wahlenb. excl. syn., lapponica W. Cand., ciliaris Wahlenb. helv., helvetica Cand., glabella Pursh.)

fladnizensis Wulff. 30. Dr. foliis oblongis glabris nitidis rigide ciliatis, scapo paucifolio siliculisque oblongis laevibus. *Carinthia. Croatia. Transsylvania.* (Dr. ciliata Scop., ciliaris Holt., androsacea W.)

stellata Jacq. 31. Dr. foliis oblongis obtusiusculis integerrimis pube stellata tomentosis, scapo sub-2phyllo pubescente, siliculis oblongis glabriusculis. *Alp. Europ. med.* (Dr. hirta Vill. Townsend., austriaca Crantz., tomentosa Wahlenb., dubia Sut., laevipes Cand. var.)

uralensis W. 32. Dr. foliis oblongis basi attenuatis utrinque 2dentatis scapoque racemifero oligophyllo pube minuta stellata incanis, staminibus subdentatis, siliculis ovalibus incano-pubescentibus. *Ural. Po-*

dolia, Volhynia. (Alyssum podolicum Bess. Schivereckia Andrz. Cand.)

lactea Adam. 33. Dr. foliis oblongo-linearibus utrinque attenuatis integerrimis pubescentibus, scapo glabro corymbifero, siliculis elliptico-oblongis laevibus. *Ad ostia Lenae in Sibir. orient.*

calycina Desv. 34. Dr. foliis caespitosis oblongis basi attenuatis pilosiusculis, scapo filiformi glabro 1floro, siliculis linearibus laevibus. *Peru.*

†† *Petalis bipartitis: annuae. Erophilae Cand.*

verna 35. Dr. foliis oblongis subdentatis pube stellata pilosiusculis, scapo nudo racemifero, siliculis oblongis glabris. *Europ. omnis. Asia med. Amer. bor.* (Dr. caroliniana Bart., praecox Stev. varr.)

minutissima W. herb. 36. Dr. foliis ellipticis petiolatis integerrimis pilosiusculis, scapo nudo sub-3floro. *Ad Constantinopolin.*

muscosa R. et P. 37. Dr. foliis oblongis ciliatis crassiusculis, scapo paucifloro, siliculis ovalibus glabris pedicellos subsuperantibus. *Peru.*

Pumilio R. Br. 38. Dr. foliis radicalibus oblongis integerrimis longe petiolatis, scapo 1floro, floribus minimis, siliculis ovatis. *Terra Diemen.*

II. *Caule folioso.*

* *Perennes.*

† *alyssoides* Humb. 39. Dr. caule suffruticoso ramoso, ramulis tomentosis, foliis sessilibus ovato-oblongis subdentatis tomentoso-hirsutis, floribus racemosis (albis), siliculis ovatis acutis. *Amer. austr.*

† *Bonplandiana* Kunth. 40. Dr. caule suffruticoso procumbente, ramis foliosis, foliis imbricatis sessilibus ovatis incano-tomentosis, floribus axillaribus pedunculatis (violaceis), siliculis ovato-oblongis. *Quito.*

jorullensis Humb. 41. Dr. caule ramoso villoso, foliis oblongis subintegerrimis pilosiusculis petiolatis, racemis viscido-pubescentibus, floribus flavis, petalis 2lobis, siliculis subrotundo-ovatis pilosis. *Mexico.*

tolucensis Humb. 42. Dr. caule ramoso hirsuto, foliis radicalibus spathulatis, caulinis oblongis incano-villosis, racemis terminalibus confertis, siliculis ovatis glabris. *Mexico.*

siliquosa MB. 43. Dr. caule subramoso foliato, foliis lineari-lanceolatis subdentatis pubescentibus, siliculis linearibus glabris. *Caucas.*

** *Annuae s. biennes.*

† *Floribus flavis.*

aurea Vahl. 44. Dr. caule simpliciusculo folioso villosiusculo, foliis integerrimis stellato-pubescentibus, radicalibus spathulatis, caulinis lanceolatis, flori-

bus racemosis, siliculis linearibus pubescentibus. *Grönland.*

nemorosa 45. Dr. caule ramoso folioso foliisque subovato-oblongis sessilibus dentatis ramulose pubescentibus, siliculis oblongis pilosiusculis tandem glabratis. *Suecia.* (*Gestricia* Östling.) *Transsylvan. Tauria. Caucas. Asia minor. Japon. Amer. bor.* (Dr. nemoralis Ehrh., muralis Thunb. MB., pontica Desf., lutea Gilib. Cand.)

†† *Floribus albis.*

muralis 46. Dr. caule subramoso foliisque dentatis stellata pube hirsutiusculis, infimis spathulatis, caulinis subcordato-ovatis amplexicaulibus, siliculis oblongis glabris pedicello multo brevioribus. *Europ. omnis. Afric. bor.* (Dr. nemorosa All.)

incana 47. Dr. caule subramoso foliisque ovato-oblongis dentatis stellato-pubescentibus incanis, siliculis oblongis obliquis glabriusculis pedicello longioribus. *Europ. Asia et Amer. bor.* (Dr. confusa Ehrh. . Dr. contorta Ehrh. est var. altior. Alyssum dentatum Nutt. videtur huc pertinere, licet pedicelli longiores sint.)

cinerea Adam. 48. Dr. caule simplici laxo foliisque oblongo-linearibus integerrimis pubescentibus, siliculis oblongis pilosiusculis pedicello brevioribus. *Sibir. arctica.* (Cochlearia siliquosa Schlecht. Cand.)

magellanica Lam. 49. Dr. caule simplici foliisque lanceolatis integerrimis pube stellata villosis, siliculis villosiusculis pedicello brevioribus. *Ad fretum Magellan.*

Arabis Pers. 50. Dr. caule subramoso foliisque lanceolatis acutis dentatis stellato-pubescentibus, siliculis linearibus acuminatis glabris erectis pedicello longioribus. *Amer. bor.* (Dr. arabisans Mx.)

† *davurica* Cand. 51. Dr. caule ramoso foliisque ovatis dentatis stellato-pubescentibus, siliculis oblongis glabris pedicellos aequantibus. *Davuria.*

† *unalascensis* Cand. 52. Dr. caule simplici foliisque ovato-oblongis integerrimis stellato-pubescentibus, siliculis oblongis hirsutiusculis. *Ins. Aleut.*

caroliniana Walt. 53. Dr. caule basi folioso foliisque obovato-subrotundis integerrimis hispidis, racemis siliculisque glabris pedicello longioribus. *Amer. bor.* (Dr. hispidula Mx.)

spathulata * 54. Dr. foliis spathulatis paucidentatis pube ramosa pilosiusculis, siliculis lanceolatis stylo brevi apiculatis pedicello brevioribus. *Ins. Aleut.* (Cochlearia Schlechtend. Cand.)

falsa * 55. Dr. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus cauleque ramoso stellato-pubescentibus, siliculis lanceolatis stylo conico superatis pedicello brevioribus. *Sibir.* (Cochlearia Schlechtend. Cand.)

2299. Cochlearia.

* *Genuinae, siliculis subglobosis s. ovatis.*

saxatilis Lam. 1. C. foliis radicalibus spathulato-oblongis dentatis, caulinis spathulato-linearibus, siliculis lentiformibus laevibus. *Gallia. Helvetia. Italia. Austria. Transsylvania.* (Myagrum saxatile L., Camelina Pers., Alyssum rupestra W.)

auriculata Lam. 2. C. foliis radicalibus lyratis, caulinis inferioribus spathulatis subpetiolatis, superioribus sagittato-linearibus, siliculis lentiformibus laevibus. *Carinthia. Gall. austr.* (Myagrum auriculatum Cand. suppl.)

microcarpa Cand. 3. C. foliis oblongis denticulatis basi auriculatis amplexicaulibus, siliculis globosis. *Sibir.*

glastifolia 4. C. foliis cordato-sagittatis amplexicaulibus integerrimis glaucis, siliculis subglobosis reticulato-venosis, seminibus muricatis. *German. austr. Gallia.*

oblongifolia Cand. 5. C. foliis caulinis oblongis obtusis integerrimis sessilibus, summis brevissime auriculatis, siliculis subglobosis. *Camtschatca. Ins. Pauli in mari camtschat.*

officinalis 6. C. foliis dentato-angulatis glaberrimis, radicalibus cordatis petiolatis, caulinis amplexicaulibus, siliculis globosis pedicello brevioribus. *Europ. bor. Carpath. et Pyren.* (C. pyrenaica Cand. C. grönlandica L., foliis radicalibus reniformibus integerrimis petiolatis subcarnosis, caulinis ovato-oblongis, siliculis ovato-subglobosis, in Ins. Laaland, Willius in Bartholin act. havn. In Scotia Don. Nec Hornemann. nec Hooker. agnoscunt hanc plantam tanquam speciem, sed minorem habent varietatem C. officinalis.)

danica 7. C. foliis omnibus petiolatis cordatis angulatis, siliculis elliptico-globosis. *Ad lit. mar. Europ. boreal.*

anglica 8. C. foliis radicalibus ovatis subintegerrimis longe petiolatis, caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus subdentatis, siliculis elliptico-globosis. *Armorica. Anglia. Dania. Norvegia. Grönland. Sibir.* (C. arctica Schlechtend. Cand.)

lenensis Adam. 9. C. foliis radicalibus petiolatis reniformibus integerrimis, caulinis oblongis subdentatis, siliculis ovato-subglobosis. *Sibir. arctica.*

† *tridactylites* Banks. 10. C. foliis caulinis subtrilobis, siliculis ovato-globosis. *Amer. bor. ad sinum Hudson.*

** *Siliculis oblongis.*

Armoracia 11. C. foliis radicalibus oblongis crenatis, caulinis lanceolatis elongatis inciso-serratis, sepalis patulis, siliculis elliptico-oblongis, radice carnosa maxima. *Europ.*

macrocarpa Kit. 12. C. foliis radicalibus cordato-oblongis margine cartilagineo-crenatis, caulinis lanceolatis inci-

so-dentatis, sepalis erectis, siliculis elliptico-oblongis. *Hungar. Transsylvan.*

sisymbrioides Cand. 13. C. foliis caulinis amplexicaulibus ovato-lanceolatis inciso-dentatis, siliculis oblongis. *Sibir. arctic.*

grandiflora Cand. 14. C. foliis caulinis cordato-oblongis obtuse dentatis, siliculis oblongis. *Sibir. austr. ad fl. Amur.*

integrifolia Cand. 15. C. foliis radicalibus lyratis, caulinis superioribus lanceolatis integerrimis, siliculis oblongis. *Imaus.*

† *saxifragaefolia* Cand. 16. C. foliis radicalibus reniformibus palmatifido-incisis glabris, caulinis ovatis trilobis, summis linearibus, siliculis oblongis. *Persia.*

velutina Cand. 17. C. foliis pube ramosa villosis, radicalibus pinnatis, foliolis ovatis obtusis, summis linearibus, siliculis oblongis. *Mesopotamia.*

*** *Habitu desciscens.*

acaulis Desf. 18. C. caule humili brevissimo, foliis longe petiolatis subcordato-ovatis obtusis subintegerrimis, pedunculis radicalibus s. axillaribus 1floris, silicula elliptico-oblonga. *Lusitania. Mauritania.* (C. pusilla et olyssiponensis Brot.)

2300. THLASPI.

* *Fructibus oligospermis* (seminibus 4-8).

latifolium MB. 1. Thl. foliis omnibus petiolatis dentatis, inferioribus cordato-reniformibus, summis oblongis, siliculae septo crasso. *Caucas.* (Lepia latifolia Desv.)

ceratocarpon Murr. 2. Thl. foliis radicalibus petiolatis obovato-oblongis, caulinis sessilibus hastato-lanceolatis subdenticulatis, siliculis bicornibus glabris. *Sibiria.* (Lepidium ceratocarpon Pall.)

montanum 3. Thl. surculis repentibus, foliis radicalibus spathulato-oblongis integerrimis, caulinis sagittatis amplexicaulibus, petalis calyce majoribus, siliculis obcordatis 4spermis, stylo filiformi. *Europ. med.* (Thl. alpinum Crantz. Jacq., praecox Wulff. Draba carnica Scop.)

alpestre 4. Thl. radice perenni (non stolonifera), foliis radicalibus petiolatis ellipticis repandis, caulinis sagittatis amplexicaulibus, petalis calycem aequantibus, silicula retusa sub-8sperma, stylo filiformi. *Europ. media.* (Thl. montanum Huds. Hutchinsia corymbosa Gay.?)

perfoliatum 5. Thl. radice annua, caule ramoso, foliis subdentatis, radicalibus petiolatis, caulinis cordato-sagittatis, petalis calycem aequantibus, siliculis obcordatis 8spermis, stigmate subsessili. *Europ. med. Asia med.* (Thl. alpestre Huds.)

alliaceum 6. Thl. radice annua, caule simpliciusculo, foliis radicalibus petiolatis oblongis repandis sublyratis, caulinis sagittatis obtusis, petalis calycem subae-

quantibus, siliculis retusis 8spermis, stylo nullo. *Europ. med. et austr. Amer. bor.* (Thl. heterophyllum Cand.)

cochleariforme Cand. 7. Thl. foliis inaequaliter argute dentatis glaucis, inferioribus petiolatis oblongis, superioribus cordatis amplexicaulibus, petalis calycem subexcedentibus, siliculis emarginatis, stylo brevissimo. *Sibir.*

magellanicum Pers. 8. Thl. foliis radicalibus ovalibus subintegerrimis petiolatis, caulinis oblongis obtusis sessilibus, petalis calycem aequantibus, siliculis truncatis 8spermis, stylo abbreviato. *Ad fretum Magellan.*

** *Fructibus polyspermis.*

Bursa 9. Thl. foliis radicalibus subruncinato-pinnatifidis, caulinis sagittatis dentatis, siliculis obcordatis. *Per omnem fere terrarum orbem.* (Capsella Mönch. Cand.)

umbellatum Stev. 10. Thl. foliis acute dentatis, radicalibus subrotundis petiolatis, caulinis subsagittatis semiamplexicaulibus, siliculis obcordatis, stigmate sessili, nervo alas cingente. *Persia bor.*

arvense 11. Thl. foliis omnibus sagittato-oblongis sinuato-dentatis siliculisque suborbiculatis obcordatis. *Europ. omnis et Amer. bor.* (Thl. collinum MB. et baicalense Cand. varr.)

orbiculatum Stev. 12. Thl. foliis superioribus amplexicaulibus integerrimis, siliculis orbiculatis emarginatis striatis, nervo alas cingente. *Caucas.*

† *samolifolium* Cand. 13. Thl. foliis ovatis obtusis integerrimis, inferioribus breviter petiolatis, petalis emarginatis. *Asia minor.* (Alyssum samolifolium Desf.)

† *tuberosum* Nutt. 14. Thl. radice tuberosa, foliis ovato-rhomboideis obsolete dentatis sessilibus glabris, radicalibus longe petiolatis, caule humili pubescente, siliculis suborbiculatis. *Pensylvan.*

2301. CAMELINA Crantz.

sativa Crantz. 1. C. foliis sagittatis lanceolatis subdentatis, siliculis pyriformibus bicostatis stylo coronatis. *Europ. omnis. Asia med.* (Myagrum sativum L., Alyssum Scop., Mönchia Roth... Myagrum dentatum W., Bauhini C. C. Gmel., pinnatifidum Ehrh., Camelina sylvestris Wallr. et microcarpa Andrz. varr.)

armeniaca Desv. 2. C. foliis lineari-lanceolatis integerrimis pubescentibus, siliculis obconicis elongatis stylo brevi coronatis. *Armenia.*

austriaca R. Br. 3. C. foliis oblongo-lanceolatis dentatis basi auriculatis, siliculis obovato-subglobosis bicostatis stylo longo coronatis. *Silesia. Austria. Transsylvan. Tauria. Caucas. Sibir.* (Myagrum austriacum Jacq., Nasturtium Crantz.)

barbareaefolia Cand. 4. C. foliis oblongis pinnatifidis basi auriculatis, caule basi villoso, siliculis subglobosis stylo longo coronatis. *Sibir. austr.*

2302. STENOPETALUM R. Br.

lineare R. Br. *Nov. Holl. austr.* Herba tenuissima filiformis, foliis gracilibus lineari-filiformibus, floribus racemosis flavidis.

2303. EUTREMA R. Br.

Edwardsii R. Br. 1. E. foliis petiolatis ovato-lanceolatis, floribus corymbosis. *Ins. Melvill. Amer. bor.* (75° lat. bor.)

Rossii * 2. E. foliis petiolatis ovatis dentatis, floribus corymbosis. *Ora occ. sinus Baffini.* (Cochlearia fenestrata R. Br.)

Humboldtii * 3. E. foliis imbricatis linearibus, floribus axillaribus solitariis. *Alp. Quito.* (Draba Humboldtii Desv., Eudema rupestris Humb.)

Bonplandii * 4. E. foliis confertis spathulatis ciliatis, floribus axillaribus solitariis. *Alp. Quito.* (Draba nubigena Desv., Eudema Humb.)

2304. PSYCHINE Desf.

numidica * 1. Ps. caule ramoso hispido, foliis cordato-oblongis dentatis hirsutiusculis, siliculis apice truncatis. *Numidia.* (Ps. stylosa Desf., Thlaspi Psychine W.)

arabica * 2. Ps. caule ramoso glaberrimo, foliis cordato-oblongis subintegerrimis laevibus, siliculis apice rotundato-attenuatis. *Aegypt. super.* Sieber. *Arabia.* Forsk. (Subularia purpurea Forsk. Thl. arabicum Vahl. Schouwia Cand.)

III.

SILIQUOSAE.

2305. STEVENIA Adam.

alyssoides Adam. 1. St. caule adscendente ramosissimo foliisque oblongo-linearibus pube stellata villosis, siliquis pedicello brevioribus. *Ad fl. Lenam sub circ. arctico.*

cheiranthoides Cand. 2. St. caule stricto foliisque linearibus pube stellata villosis, siliquis pedicello longioribus. *Sibiria.* (Cheiranthus salinus W. herb.)

2306. BRAYA Sternb.

alpina Sternb. 1. Br. foliis lineari-lanceolatis subintegerrimis, racemis contractis. *Carinthia.*

2.

glabella Richardf. 2. Br. foliis linearibus remote dentatis, racemo fructifero laxo elongato. *Ad fl. cupri Amer. bor. fub circ. arctico.*

2307. NASTURTIUM R. Br.

** *Foliis indivifis.*

bengalenfe Cand. 1. N. foliis obovato-oblongis apice dentatis, pedicellis bracteatis filiqua turgida fubbrevioribus. *Bengal.*

indicum Cand. 2. N. foliis ovato-lanceolatis incifo-ferratis utrinque attenuatis laevibus, floribus apetalis, filiquis teretiusculis pedicellos fuperantibus. *Ind. orient. Java. China.* (Sifymbrium indicum L., dubium Perf., S. Sinapis N. L. Burm., apetalum Desf.)

glaucophyllum Cand. 3. N. foliis radicalibus petiolatis obovato-orbiculatis crenatis coriaceis, caule elongato dichotomo aphyllo fquamato, filiquis oligofpermis. *Perfia.*

fagittatum R. Br. 4. N. foliis haftato-fagittatis oblongis obtufis pubefcentibus, radicalibus petiolatis bafi auriculatis, caulinis amplexicaulibus, filiquis deflexis. *Ad mare cafpium.* (Sifymbrium molle Jacq., fagittatum Ait. W.)

burfifolium Cand. 5. N. foliis villofis, radicalibus incifo-pinnatifidis, caulinis fagittatis integerrimis acuminatis, filiquis glabris. *Camtfchatca.*

natans Cand. 6. N. foliis natantibus oblongo-linearibus integerrimis, fubmerfis multifido-capillaceis, petalis calycem fubaequantibus, filiquis breviffimis obovatis. *Sibir. media in fl. Alei ditionis Kolivan.*

** *Foliis pinnatifidis.*

amphibium R. Br. 7. N. foliis oblongis pinnatifidisque ferratis, petalis calyce majoribus, filiquis ellipticis ftylo coronatis, caule bafi radicante. *Europ. Afia et Amer. bor.* (Sifymbrium amphibium L.)

fylveftre R. Br. 8. N. foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis incifo-ferratis, petalis calyce majoribus, filiquis teretiusculis ftylo coronatis, caule afcendente. *Europ. Afia et Amer. bor.* (Sifymbrium fylveftre L.)

anceps Cand. 9. N. foliis oblongis ferratis pinnatifidisque, auriculis amplexicaulibus glaberrimis, petalis calyce majoribus, filiquis utrinque attenuatis ancipitibus, caule repente. *German. med. et bor. Dania. Suecia.* (Sifymbrium anceps Wahlenb., amphibium Vahl.)

paluftre Cand. 10. N. foliis lyrato-pinnatifidis glabris, laciniis obtufe dentatis, auriculis amplexicaulibus ciliatis, petalis calycem aequantibus, filiquis turgidis, radice fufiformi. *Europ. omnis. Afric. Afia et Amer. bor.* (Sifymbrium paluftre Leyff. Poll., ter-

restre Wither. Sm., pusillum Vill., barbareaefolium Delil., mexicanum Sess. varr.)

portoricense * 11. N. foliis interrupte pinnatifidis glabris, laciniis oblongis obtusis repando-crenatis, petalis calyce minoribus, siliquis teretiusculo-linearibus stigmate subsessili coronatis. *Portorico. Hispaniola.* Bertero.

pyrenaicum R. Br. 12. N. foliis radicalibus petiolatis obovatis lyratisque, caulinis amplexicaulibus decursive pinnatis, laciniis linearibus integerrimis, siliculis ovalibus stylo capillari coronatis. *Europ. austr.* (Sisymbrium pyrenaicum L.)

lippizense Cand. 13. N. foliis radicalibus obovatis dentatis sublyratisque, caulinis subpinnatis, laciniis linearibus integerrimis, petalis calyce majoribus, siliquis linearibus declinatis stylo brevi coronatis. *Carinthia. Croatia. Dalmatia. Thracia.* (Sisymbrium lippizense Wulff.)

coronopifolium Cand. 14. N. foliis lanceolatis pinnatifido-dentatis pubescentibus, laciniis obtusiusculis integerrimis, pedunculis scapiformibus, petalis calycem superantibus, siliquis linearibus apice curvatis stigmate subsessili coronatis. *Numidia.* (Sisymbrium coronopifolium Desf.)

ceratophyllum Cand. 15. N. foliis linearibus pinnatifido-dentatis glabriusculis, laciniis abbreviatis distantibus, siliquis oblongo-linearibus utrinque attenuatis stigmate subsessili coronatis. *Numidia.* (Sisymbrium ceratophyllum Desf.)

bonariense Cand. 16. N. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus subintegerrimis remotis, racemis laxis, corolla calycem subaequante, siliquis tereti-compressis suberectis. *Ad fl. Plata.* (Sisymbrium bonariense Poir.)

† *diffusum* Cand. 17. N. foliis subpinnatifidis ovali-oblongis dentatis glabris petiolatis, siliquis teretibus pedicello longioribus stylo distinctis, caule diffuso. *Java.*

† *apetalum* Cand. 18. N. foliis hastato-pinnatifidis tomentosis, floribus apetalis, siliquis teretiusculis obtusis. *Cochinchina.* (Sisymbrium apetalum Lour.)

*** *Foliis pinnatis.*

officinale R. Br. 19. N. foliolis subcordato-oblongis obtusis repandis, (floribus albis,) siliquis teretiusculis subdeclinatis. *Europ. Asia. Africa. Amer. bor. et austr.* (Sisymbrium Nasturtium L.)

micranthum Cand. 20. N. foliis lyrato-pinnatis pubescentibus, foliolis inciso-laciniatis, petalis calyce minoribus, siliquis erectis oblongo-linearibus. *Ind. or.*

madagascarense Cand. 21. N. foliis lyrato-pinnatis glabris, foliolis inciso-lobatis, floribus minimis, siliquis declinatis ovato-oblongis. *Madagascar.*

microspermum Cand. 22. N. foliis glabris, inferioribus pinnatis, foliolis ovato-oblongis inciso-dentatis, floribus minimis, siliquis erectis teretiusculis. *China.*

clandestinum * 23. N. foliis lyrato-pinnatis, foliolis petiolatis cordato-subrotundis repandis, floribus apetalis, siliquis teretiusculis elongatis. *Brasil.*

† *album* * 24. N. foliis pinnatis cauleque erecto incano-pubescentibus, foliolis spathulato-linearibus subincisis, petalis calycem coloratum superantibus, siliquis tereti-linearibus stigmate capitato coronatis. *Ad lacum Baical in Sibir. austr.* (Sisymbrium album Pall.)

† *multifidum* * 25. N. foliis interrupte pinnatis pubescentibus, foliolis pinnatifidis rotundato-lobatis, siliquis oblongis stylo destitutis. *Florida.* (Cardamine multifida Banks. Pursh.)

† *Menziesii* * 26. N. foliis pinnatis pube stellata canescentibus, foliolis pinnatifidis inciso-dentatis, siliquis oblongis stigmate sessili coronatis. *Ora occ. Amer. bor.* (Cardamine? Menziesii Cand.)

† *myriophyllum* * 27. N. foliis 2pinnatis cauleque erecto ramoso pube stellata canescentibus, foliolis oblongis obtusis incisis, racemis strictis, floribus parvis, siliquis lanceolatis glabris erectis stylo brevissimo terminatis. *Quito.* (Sisymbrium myriophyllum W. herb. Humb.)

2308. MORETTIA Cand.

philaea * *Syene.* Sieber. *Philae ins. Nili.* Nectoux. Fruticulus omnis pube ramosa hirsutus incano-tomentosus, foliis oblongis subdentatis, floribus axillaribus siliquisque folia aequantibus. (Sinapis Philaeana Delil.)

2309. DENTARIA.

* *Foliis verticillatis, stylo elongato.*

polyphylla Kit. 1. D. foliis ternis alternisque petiolatis subdecursive pinnatis, foliolis lanceolatis grosse serratis ciliatis, floribus corymbosis. *Croatia. Alp. rhaet. Pedemont.*

enneaphylla 2. D. foliis ternis petiolatis ternatis, foliolis oblongis acuminatis inaequaliter serratis glabris, floribus corymbosis (albidis), staminibus petala subaequantibus. *Alpestria Europ. med.* (Cardamine R. Br.)

glandulosa Kit. 3. D. foliis ternis petiolatis ternatis, foliolis lanceolatis grosse dentatis, axillis glanduliferis, racemis paucifloris, staminibus corolla (rubra) brevioribus. *Hungar. Transsylvan.*

laciniata Mühlb. W. 4. D. foliis ternis alternisque petiolatis, foliolis palmatis 3-5partitis, laciniis lineari-lanceolatis inciso-serratis, axillis subglanduliferis, staminibus corolla (alba) multo brevioribus. *Amer. bor.* (D. concatenata Mx.)

** *Foliis caulinis alternis ternatis, digitatis.*

trifolia Kit. 5. D. foliis ternatis, foliolis oblongis venofis obtufe dentatis ciliatis, axillis glanduliferis, floribus corymbofis (albidis). *Croatia.*

maxima Nutt. 6. D. foliis ternatis, foliolis ovalibus incifo acute dentatis, lateralibus fublobatis, axillis eglandulofis, floribus racemofis (rubentibus). *Amer. boreal.*

diphylla Mx. 7. D. foliis binis ternatis, foliolis lobatis obtufe mucronato-dentatis bafi attenuatis ciliatis, floribus racemofis (albidis). *Amer. bor.*

heterophylla Nutt. 8. D. foliis binis petiolatis ternatis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis ciliatis, floribus racemofis (rubentibus). *Penfylvan.*

tenuifolia Ledeb. 9. D. foliis binis petiolatis ternatis, foliolis linearibus obtufis paucidentatis, corymbo paucifloro (floribus albis). *Imaus. Sibir.* (D. 3fida Lam.?)

tenella Pursh. 10. D. foliis binis feffilibus ternatis, foliolis lineari-ellipticis integerrimis, floribus racemofis (purpureis). *Ora occ. Amer. bor.*

digitata Lam. 11. D. foliis digitato-palmatis, foliolis lanceolatis ferratis ciliatis, caule flexuofo, floribus corymbofis (rubentibus, nonnunquam albidis). *Europ. med.* (D. pentaphyllos *β. γ.* L. Cardamine pentaphylla R. Br.)

*** *Foliis caulinis alternis pinnatis.*

pinnata Lam. 12. D. foliolis oblongo-lanceolatis remote ferratis ciliatis, floribus corymbofis longe pedicellatis (albis). *Gallia. Helvetia. Italia.* (D. heptaphyllos C. Bauh. Vill., Cardamine pinnata R. Br.)

quinquefolia MB. 13. D. foliolis omnibus discretis lanceolatis obtufe ferratis, floribus corymbofis, ftaminibus abbreviatis. *Tauria. Caucaf. Ucrania.* (D. caucafica W. herb.)

hypanica Beff. 14. D. foliis decurfive pinnatis, foliolis lanceolatis inaequaliter dentatis, axillis bulbiferis. *Beffarabia et Podolia.* (Hypanis citerior fl. Bug.)

bulbifera 15. D. foliis inferioribus pinnatis, fuperioribus ternatis, fummis fimplicibus, foliolis lanceolatis ferratis, axillis bulbiferis, floribus corymbofis (albis f. rubentibus). *Montofa umbrofa Europ. et Afiae med.* (Cardamine bulbifera R. Br.)

microphylla W. 16. D. foliis omnibus pinnatis 3-5jugis, foliolis lineari-lanceolatis fubdentatis, axillis nudis. *Caucaf. Sibir.*

2310. PTERONEVRON Cand.

carnofum Cand. 1. Pt. foliis pinnatis carnofis glaucefcentibus, foliolis obovato-fubrotundis integerrimis. *Croatia. Dalmatia.* (Cardamine carnofa Kit.)

graecum Cand. 2. Pt. foliis pinnatis membranaceis, foliolis profunde lobatis fubdentatis. *Italia. Graecia.* (Cardamine graeca L.)

2312. CARDAMINE.

* *Foliis indiviſis.*

rhomboidea Cand. 1. C. radice tuberoſo-fibroſa, caule ſimplici, foliis elliptico-rhombeis obtuſis repando-dentatis petiolatis glabris. *Amer. bor.* (Arabis tuberoſa et rhomboidea Perſ.)

rotundifolia Mx. 2. C. radice fibroſa, caule debili procumbente, foliis orbiculatis ſubdentatis petiolatis glabris. *Amer. bor.*

ſpathulata Mx. 3. C. caule decumbente, foliis radicalibus ſpathulatis integerrimis pube 3partita pubeſcentibus, caulinis linearibus. *Carolina.*

aſarifolia 4. C. caule erecto, foliis petiolatis reniformi-cordatis repando obtuſe dentatis, ſuperioribus ſubpeltatis, ſiliquis elongatis. *Gallia prov. Italia.*

† *indica* N. L. Burm. 5. C. caule erecto, foliis petiolatis glabris, inferioribus ovatis obtuſis crenulatis, ſummis obovato-oblongis, ſiliquis linearibus. *Java.*

ſtyloſa Cand. 6. C. caule erecto, foliis caulinis ſagittato-oblongis acutis calloſo-denticulatis ſemiamplexicaulibus glabris, ſiliquis patulis, ſtylo elongato. *Nov. Holl.*

chenopodifolia Perſ. 7. C. caule procumbente, foliis ovatis petiolatis ſublobato-ſinuatis glabris, ſiliquis erectis, ſtigmate ſeſſili. *Monte Video.*

bellidifolia 8. C. caule humili, foliis radicalibus longe petiolatis ovatis integerrimis, caulinis ſubnullis vel oblongis ſubdentatis ſeſſilibus, ſiliquis ſtrictis elongatis. *Alp. Scandinav. Inſ. Melvill. Amer. bor. Sibir. Europ. med.* (C. alpina W. et heterophylla Baumg. varr.)

** *Foliis plerisque tripartitis ſ. ternatis.*

uniflora Mx. 9. C. foliis radicalibus 3lobis ſubrotundis obtuſis glabris, ſcapo 1floro. *Kentucky Amer. bor.*

trifolia 10. C. foliis radicalibus longe petiolatis ternatis, foliolis ſubrotundis obtuſe mucronato-dentatis, ramis imis ſarmentoſis, caule oligophyllo, panicula corymboſa. *Auſtria. Hungar. Tranſſylv.*

† *ſcutata* Thb. 11. C. foliis radicalibus petiolatis ovato-ſubrotundis, terminali criſpo, ſcapo nudo. *Japon.*

† *tuberoſa* Cand. 12. C. foliis radicalibus longe petiolatis reniformibus crenatis, caulinis ternatis ſubrotundis crenato-dentatis, racemo paucifloro, radice tuberoſa. *Chili.*

chilenſis Cand. 13. C. caule erecto flexuoſo glabro, foliis petiolatis ternatis ſupra pubeſcentibus, foliolis oblique ovato-lanceolatis crenatis, floribus racemoſis. *Chili.*

borbonica Perſ. 14. C. caule ramoſo glabriuſculo, foliis longe petiolatis ternato-ſubpinnatis piloſis ſubtus caneſcentibus, foliolis ovatis acuminatis ſubdentatis, ſiliquis erectis. *Inſ. Maſcaren. Arabia.* (C. africana Vahl.)

africana 15. C. caule ramofo, foliis longe petiolatis rhombeis acuminatis inaequaliter mucronato-dentatis glabris, petalis calycem fubaequantibus, filiquis patentibus. *C. B. S.*

*Burchellii** 16. C. caule ramofo decumbente, foliis petiolatis ternatis fupra pilofiusculis fubtus glabris, foliolis ovatis acuminatis inaequaliter dentatis, petalis calycem duplo fuperantibus, filiquis erectis. *Afric. auftr.* (C. anteniquina Burch. errore typographi l. *Houtniqua.*)

bonarienfis Perf. 17. C. caule ramofo, foliis glabris petiolatis, inferioribus ternatis fubrotundis repandis, fuperioribus trilobis integrisque obtufis, filiquis erectis. *Ad fl. Plata.*

microphylla Adam. 18. C. foliis radicalibus petiolatis ternato-pinnatis glabris, foliolis obovatis minutis, fcapo paucifloro, folio florali 3dentato, filiquis erectis. *Sibir. bor.* (C. minuta W. herb.)

refedaefolia 19. C. foliis petiolatis glabris, radicalibus fubrotundis integris, caulinis ternatis f. lyrato-pinnatis, petiolis bafi bidentatis, filiquis erectis. *Alp. Europ. med.* (C. heterophylla Lapeyr.)

thalictroides All. 20. C. caule debili flexuofo foliisque glabris, foliis radicalibus fimplicibus, fuperioribus ternatis fubpinnatisque, foliolis fubrotundis obtufe lobatis, filiquis elongatis. *Alp. cott. grai. Delphinat.* (C. Plumerii Vill.)

**** Foliis plerisque pinnatis.*

granulofa All. 21. C. radice tuberofo-granulofa, foliis radicalibus longe petiolatis fubrotundis integris, caulinis pinnatis, foliolis fubrotundo-ellipticis repandis, filiquis erectis. *In pratis ad Auguftam Taurinor.*

amara 22. C. caule bafi radicante folido, foliolis ellipticis repando-angulato-dentatis glabris, floribus corymbofis, petalis integerrimis, antheris fufcis, filiquis ftylo filiformi coronatis. *Europ. Sibir.* (C. trifolia Wahlenb. lapp.?)

uliginofa MB. 23. C. caule bafi ftolonifero, foliolis angulato-dentatis obtufiusculis, radicalibus fubrotundis caulinis oblongis, floribus corymbofis, petalis integerrimis, antheris flavis, ftylo breviffimo. *Tauria. Ucrania. Galicia. Sibiria.* (C. dentata Schult.)

prorepens Fifch. 24. C. caule bafi ftolonifero filiquisque ftylo filiformi coronatis pubefcentibus, foliis pinnatis fubcarnofis glabris, foliolis fubrotundo-ovatis fubintegerrimis, terminali fub-3lobo. *Sibir. orient.*

pratenfis 25. C. caule erecto fiftulofo, foliolis inferioribus fubrotundo-ovatis dentatis, fuperioribus linearibus integerrimis, antheris flavis, filiquis ftylo breviffimo ftigmateque capitato apiculatis. *Europ. omnis. Afia et Amer. bor.*

pensylvanica Mühlb. 26. C. caule erecto ramoso, foliis sublyrato-pinnatifidis pinnatisque, foliolis cuneatis paucidentatis, petalis calycem aequantibus, siliquis patulis gracilibus stigmate subsessili apiculatis. *Pensylvania.*

parviflora 27. C. caule erecto foliisque pinnatis glabris, foliolis inferioribus spathulato-linearibus obtusis, summis linearibus, petalis angustis, siliquis erecto-patulis. *Gallia. Transsylvania. Sibir. Amer. bor.* (C. virginica L. et teres Mx. sec. Mühlenb. exemplar.)

hirsuta 28. C. caule erecto subflexuoso solido foliisque pinnatis hirsutiusculis, foliolis subdentatis, radicalibus subrotundis, superioribus oblongis, petalis spathulato-linearibus calycem excedentibus, siliquis obtusiusculis. *Montosa Europae totius.* (C. Impatiens fl. dan., flexuosa With.)

sylvatica Link. 29. C. caule erecto fistuloso retrorsum piloso, foliis pinnatis, foliolis oblongis sinuato-dentatis, petalis amplis calycem multo excedentibus, siliquis patulis subulatis. *Sylvatica Europ. totius.* (C. hirsuta fl. dan.)

umbrosa Andrz. 30. C. caule erecto foliisque pinnatis glabris, foliolis integerrimis mucronatis, pedicellis subturbinatis, petalis oblongis, siliquis patulis stylo brevissimo crasso terminatis. *Volhynia.*

Impatiens 31. C. caule erecto glabriusculo, foliis pinnatis multijugis, foliolis incisis, stipulis lanceolatis ciliatis reflexis, floribus subapetalis. *Montosa totius Europae et Asiae med.*

chelidonia 32. C. caule ramoso flexuoso foliisque pinnatis subbijugis glabris, foliolis subrotundis obtuse lobatis, siliquis hirsutis. *Italia. Croatia.*

latifolia Vahl. 33. C. caule subramoso, foliis pinnatis subbijugis glabris, foliolis ovatis sinuato-dentatis, siliquis linearibus laevibus stigmate coronatis. *Hispan. Pyren. Italia.* (C. chelidonia Lam., raphanifolia Pourr.)

macrophylla W. 34. C. caule erecto foliisque sub-3jugis amplis pubescentibus, foliolis oblongis utrinque acuminatis grosse serratis, floribus racemosis. *Sibir.* (C. chelidonia Pall.)

† *petiolaris* Cand. 35. C. caule erecto foliisque sub-5jugis glabris, foliolis petiolatis ovatis sublobatis dentatis, siliquis erectis stylo brevissimo crasso terminatis. *Caucasus.*

pectinata Pall. 36. C. caule erecto foliisque 3jugis glabris, foliolis petiolatis subcordato-ovatis pectinato-incisis, siliquis tenuissimis stylo terminatis. *Persia.*

hederacea Cand. 37. C. caule tenero subramoso foliisque glabris, inferioribus longe petiolatis cordatis 3lobis, superioribus pinnatis bijugis, foliolis subcarnosis lobatis, floribus parvis, siliquis tenuissimis. *Syria.* Labillard.

glacialis Cand. 38. C. caule tenero foliisque subbijugis pubescentibus, foliolis lateralibus minimis subdenticulatis,

terminali maximo orbiculato crenato, racemo paucifloro, filiquis gracillimis. *Terra ignis.* (Sifymbrium glaciale Forft.)

debilis Banks. 39. C. caule tenero foliisque bijugis glabris, foliolis lateralibus ovatis, terminali reniformi fub-3dentato, floribus parvis racemofis, filiquis erectis. *Nov. Zeeland. Inf. Triftan d'Acunha?* (C. propinqua Carmich. Sifymbrium heterophyllum Forft.)

farmentofa Forft. 40. C. caule erecto bafi ftolonifero foliisque fub-3jugis glabris, foliolis ovatis groffe dentatis, racemis elongatis, floribus parvis. *Inf. humiles in archipelag. Georg.*

glauca * 41. C. caule diffufo ramofiffimo, foliis pinnatis fubcarnofis glaucis laevibus, foliolis obovatis, terminali 3lobo, floribus corymbofis, filiquis linearibus elongatis ftylo tenui coronatis. *Calabria. Sicilia. Dalmatia?* (C. thalictroides Tin., corydaloides Guffon., maritima Portenfchl.?)

digitata Richardf. 42. C. caule bafi repente foliisque digitato-pinnatis glabris, foliolis linearibus integerrimis. *Lit. mar. glacialis in Amer. bor.*

2312. NEVROLOMA Andrz.

arabidiflorum Cand. 1. N. foliis radicalibus oblongis acutis fubdentatis carnofis, fcapo fimplici corymbifero, petalis integerrimis. *Sibir. orient.* (Arabis grandiflora L., Hefperis arabidiflora Cand. fyft. Cheiranthus fcapiger Adam. Hefperis et Nevroloma fcapigerum Cand.)

nudicaule Cand. 2. N. foliis radicalibus lineari-oblongis fubdentatis glabris, fcapo racemifero, filiquis fubnodulofis. *Sibir. or. Ora occ. Amer. bor.* (Cardamine nudicaulis L., articulata Pursh.)

arcticum * 3. N. foliis radicalibus imbricatis lanceolatis fubintegerrimis, fcapo corymbifero, filiquis lineari-oblongis. *Inf. Melvill.* (75° lat. bor.) (Parria arctica R. Br.)

2313. ARABIS.

I. *Seminibus haud marginatis.*

* *Foliis fubamplexicaulibus.*

† *Glabrae.*

braffifaeformis Wallr. 1. A. caule fimplici foliisque glaucis glaberrimis, radicalibus fpathulatis caulinis cordato-fagittatis acutis integerrimis. *Hercynia. Thuringia. Palatinat. Gallia. Hifpania. Transfylvan.* (Braffica alpina L. Eryfimum alpinum Baumg. Cand. Conringia alpina Link. Turritis Braffica Leers.)

refedaeflora Humb. 2. A. caule ramofo foliisque cordato-lanceolatis remote dentatis glabris. *Nov. Granat.* (Nafturtium arabiforme Cand.)

ciliata R. Br. 3. A. caule fimplici glaberrimo, foliis ciliatis fubdentatis, radicalibus obovatis, caulinis femiamplexicaulibus, filiquis erectis. *Auftria. Helvetia. Hibernia.* (Turritis alpina L. fyft. ed. 13. ciliata W.)

†† *Pubefcentes.*

toxophylla MB. 4. A. caule ramofo foliisque pube ftellata fparfis, radicalibus obovato-oblongis fubintegerrimis, caulinis cordato-lanceolatis, petalis fpathulatis longe unguiculatis. *Ad Volgam et Boryfthenem.*

hirfuta Scop. 5. A. caule fimplici ftricto foliisque pube ramofa hirfutis, radicalibus obovato-oblongis repando-dentatis, caulinis cordato-fagittatis fubdenticulatis, petalis fpathulatis erecto-patulis, filiquis ftrictis. *Europ. et Amer. bor.* (Turritis hirfuta L., praecox Sm., fagittata Bertol., ovata Pursh., Arabis montana Lam., fagittata Cand., longifiliqua Wallr., curtifiliqua Fries., planifiliqua Perf. varr.)

crifpata W. 6. A. caule fuperne ramofo foliisque pube ftellata hirfutiusculis, radicalibus obovato-oblongis bafi profunde dentatis, caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus inaequaliter dentatis undulatis, petalis fubfpathulato-linearibus elongatis erectis, filiquis elongatis patentibus. *Carniolia. Calabria.* (A. undulata Link. var.)

ftenopetala Cand. 7. A. caule ftricto foliisque fupra pube ftellata hifpidiusculis, radicalibus obovato-lanceolatis in petiolum decurrentibus dentatis, caulinis cordato-ovatis, petalis linearibus anguftis, filiquis ftrictiffimis torulofis. *Patria?*

faxatilis All. 8. A. caule fimplici foliisque fubdentatis pube ftellata fcabris, radicalibus obovato-oblongis, caulinis cordatis amplexicaulibus, filiquis patulis fubtetragono-compreffis ftriatis. *Gallia auftr. Ital. fuper.* (A. nova Vill.)

auriculata Lam. 9. A. caule fimpliciusculo foliisque pube ramofa hirfutis, radicalibus ovalibus fubintegerrimis, caulinis cordato-oblongis dentatis, pedicellis calycem fubaequantibus, filiquis patulis linearibus. *Europ. med. et auftr.* (A. afpera All., recta Vill., patula Weinm. Wallr. Turritis patula Ehrh.)

Stelleri Cand. 10. A. caule fuperne ramofo foliisque pube fubfimplici hifpidis, radicalibus fpathulato-oblongis petiolatis, caulinis cordatis dentatis, floribus corymbofis, petalis obovato-oblongis. *Camtfchatca.* (A. camtfchatica W. herb.)

laxa Sm. 11. A. caule fimpliciusculo colorato, foliis radicalibus obovatis lyrato-dentatis hifpidis, caulinis cordatis glaberrimis, filiquis longiffimis anguftiffimis deflexis. *Peloponnef.*

mollis Stev. 12. A. caule afcendente fimpliciusculo foliisque pube minima ftellata canefcentibus, radicalibus

cordato-subrotundis grosse crenatis, caulinis amplexicaulibus inciso-serratis, petalis obovatis, siliquis linearibus. *Caucas.*

albida Stev. 13. A. caule ascendente foliisque pube molli ramosa albido-floccoso-villosiusculis, radicalibus spathulatis grandidentatis, caulinis cordato-sagittatis, petalis amplis obovatis, siliquis erecto-patulis glabris. *Caucas. Persia.* (A. alpina MB., caucasica W., Cheiranthus mollis Hornem. A. longifolia Cand. var.)

Billarderii Cand. 14. A. caule tenero foliisque pube ramosa incano-tomentosis, radicalibus obovatis paucidentatis, superioribus basi attenuatis amplexicaulibus, siliquis patulis. *Syria.* Labillard.

brevifolia Cand. 15. A. caule glabriusculo, foliis pube ramosa densa villoso-tomentosis, radicalibus obovatis paucicrenatis, caulinis cordato-sagittatis integerrimis, siliquis patulis subincurvis. *Syria.* Labillard.

thyrsoidea Sm. 16. A. caule tenero foliisque obovatis obtuse dentatis pube stellata incano-tomentosis, caulinis ovatis subamplexicaulibus, racemo capitato, siliquis curvato-ascendentibus. *Olymp. Asiae min.*

alpina 17. A. caule subramoso foliisque sinuato-dentatis pube ramosa villosis, radicalibus obovato-oblongis (interdum sublyrato-runcinatis), caulinis profunde cordatis amplexicaulibus, siliquis compressis linearibus subincurvis. *Europae alpestria. Hispania. Islandia. Grönland. Labrador. Atlas. Madera.* (Turritis verna Lam.)

viscosa Cand. 18. A. caule pube simplici hirsuto superne viscoso, foliis paucidentatis pube ramosa scabris, radicalibus obovato-oblongis, caulinis cordato-ovatis amplexicaulibus, calycibus hirsutis. *Persia bor.*

rosea Cand. 19. A. caule gracili apice glabro, foliis pube subramosa scabris, radicalibus obovato-oblongis obtuse dentatis, caulinis cordatis obtusis semiamplexicaulibus, siliquis erectiusculis linearibus stigmate simplici apiculatis. *Calabria.*

verna R. Br. 20. A. caule erecto foliisque pube 3partita hirsutis, radicalibus spathulato-oblongis grosse serratis, caulinis profunde cordatis inaequaliter dentatis, calycibus hispidis brevissime pedicellatis, siliquis linearibus compressis. *Europ. austr. Atlas.* (Hesperis verna L., Turritis purpurea Lam.)

** *Foliis sessilibus.*

† *Glabriusculae.*

Allionii Cand. 21. A. caule ascendente subramoso flexuoso, foliis radicalibus obovatis subintegerrimis, caulinis sessilibus ovatis serratis subciliatis, petalis linearibus. *German. austr. Pedemont.* (Turritis stricta All. nemorensis Wolf.)

procurrens Kit. 22. A. caule basi stolonifero erecto strigilloso, foliis glabris integerrimis margine pube appressa

2partita ciliatis, radicalibus spathulatis caulinis oblongis sessilibus, siliquis patulis torulosis. *Bannatus. Servia.* (A. praecox W.)

vochinensis * 23. A. caule basi radicante ascendente glabriusculo, foliis radicalibus obovatis subintegerrimis laevibus pube appressa ciliatis, siliquis patulis planis abbreviatis stylo terminatis. *Alp. carn. jul.* (Draba mollis Scop., Subularia alpina W.)

petraea Lam. 24. A. caule ascendente foliisque glabris, radicalibus spathulatis paucidentatis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis, siliquis patulis linearibus stigmate apiculatis. *Europ. Amer. bor.* (Cardamine petraea L., hastulata Sm., Card. faeroensis Horn. et A. lyrata L. var. foliis radicalibus lyratis.)

Halleri 25. A. caule ramoso basi pubescente stolonifero, foliis radicalibus lyratis glabriusculis, caulinis oblongis inciso-dentatis, siliquis torulosis stylo coronatis. *Hercynia. German. austr. Italia. Hungar. Transsylvan.* (Cardamine stolonifera Scop., Arabis stolonifera Horn. Cand.)

ambigua Cand. 26. A. foliis radicalibus sublyratis ciliatis, caulinis lanceolatis sessilibus integerrimis apice barbatis, siliquis linearibus patulis. *Camtschatca.* (Sisymbrium Tilesii Ledeb.)

†† *Pubescentes.*

hispida L. fil. 27. A. caule ramoso inferne hispido, foliis radicalibus lyrato-runcinatis pube ramosa hirsutis, caulinis sessilibus oblongis incisis, siliquis linearibus patentibus. *Europ. med. et bor.* (Cardamine petraea fl. dan., Arabis Thaliana Crantz. et Crantzina Ehrh. sunt. varr. foliis radicalibus minus lyratis.)

arenosa Scop. 28. A. caule hispido, foliis radicalibus caulinisque inferioribus lyratis pube bifurca hispidis, siliquis patentibus planiusculis. *Europ.* (Sisymbrium arenosum L.)

stricta Huds. 29. A. caule ascendente basi hispido, foliis pube simplici bifurcaque sparsa hispidiusculis, radicalibus sinuato-pinnatifidis sublyratis, caulinis sessilibus serratis, racemo stricto paucifloro, siliquis scabris. *Anglia. Gallia. Italia. Transsylvan. Amer. bor.* (A. hispida Ait., hirta Lam., Turritis Raii Vill.)

muralis Bertol. 30. A. caule ascendente inferne foliisque hispidis, radicalibus spathulatis dentatis, caulinis ovatis denticulatis sessilibus, racemo elongato siliquisque strictis torulosis. *Etruria. Liguria. Gallia prov.?*

spathulata Cand. 31. A. caule gracili glabro, foliis integerrimis pube sparsa asperis ciliatis, radicalibus spathulatis mucronatis, caulinis subrotundis parvis, racemo brevi, siliquis erectis. *Monte Video.* (Sisymbrium spathulatum Poir.)

incana Roth. 32. A. caule stricto folioso ad apicem sublanato, foliis omnibus oblongis basi attenuatis sessilibus dentatis pube ramosa incano-villosis, siliquis linearibus erecto-patulis. *Helvetia. Gallia ad fl. Ligerim.*

serpyllifolia Vill. 33. A. caule caespitoso ascendente, foliis omnibus oblongis subintegerrimis pube stellata sparsa scabris, racemo laxo, siliquis elongatis. *Gallia austr.*

Thaliana 34. A. caule gracili subramoso foliisque pube brevissima ramosa pubescentibus, radicalibus spathulato-oblongis subdentatis, caulinis paucis oblongis, siliquis patulis. *Europ. omnis. Asia med. Amer. bor. et austr.?* (A. ramosa Lam. Sisymbrium bellidifolium Poir.?)

pubescens Poir. 35. A. caule erecto stricto, foliis siliquisque erectis pubescentibus, foliis obtuse dentatis, radicalibus spathulato-oblongis, caulinis lanceolatis, petalis linearibus. *Numidia. Hispania?* (Turritis pubescens Desf. A. parvula Dufour. Cand.?)

lasioloba Link. 36. A. caule elato superne ramosissimo siliquisque stellulato-tomentosis, foliis radicalibus lyratis, caulinis lanceolatis dentatis sessilibus, racemis confertis parvifloris, siliquis patentibus stylo subulato terminatis. *Mexico.*

*** *Foliis petiolatis.*

cebennensis Cand. 37. A. caule elato ramoso pilis sparsis obsito, foliis omnibus petiolatis inferioribus cordatis pubescentibus, superioribus ovatis acuminatis sinuato grosse dentatis glabriusculis, racemis axillaribus, siliquis planiusculis. *Tractus Gebennarum Galliae.* (Hesperis inodora Gouan.)

ovirensis Wulff. 38. A. caule basi radicante stolonifero foliisque glabris, radicalibus subrotundis, caulinis oblongis repando-dentatis in petiolum attenuatis, siliquis linearibus. *Carinthia. Transsylvan.*

II. *Seminibus marginato-alatis.*

* *Foliis amplexicaulibus.*

Turrita 39. A. caule simplici foliisque denticulatis pubescentibus, radicalibus oblongis, caulinis cordato-lanceolatis, siliquis margine incrassatis recurvis. *Europ. austr. Anglia (in muris Cantabrig.).* (A. ochroleuca Lam., umbrosa Crantz.)

pendula 40. A. caule sulcato foliisque serratis hispidis, radicalibus ovato-oblongis, caulinis basi dilatata cordatis, siliquis pendulis gracilibus margine aequalibus. *Sibir.* (A. Patriniana Cand.)

oxyota Cand. 41. A. caule ramoso hispido, foliis caulinis acute sagittatis linearibus stellato-pubescentibus, siliquis erectiusculis. *Ind. or.*

laevigata Cand. 42. A. caule simplici foliisque superioribus glaberrimis, radicalibus obovatis denticulatis scabris

ſubtus discoloribus, caulinis ſagittatis integerrimis, ſiliquis elongatis recurvis. *Amer. bor.* (Turritis laevigata Mühlenb.)

daſycarpa Andrz. 43. A. caule baſi ſtolonifero pubeſcente, foliis ſiliquisque compreſſis ſtellata pube hirſutis, foliis radicalibus oblongis obtuſe dentatis, caulinis haſtatis integerrimis. *Podolia. Tranſſylvan.* (A. recta Baumg.)

** *Foliis ſeſſilibus.*

nivalis * 44. A. caule ſimplici foliisque oblongis denticulatis glabris, ſiliquis racemoſis compreſſis pendulis. *Imaus.* (Cardamine nivalis Pall., Macropodium R. Br. Cand.)

canadenſis 45. A. caule ſimplici glabro, foliis ſubſeſſilibus oblongo-lanceolatis ſubdentatis ſubpubeſcentibus, ſiliquis compreſſis pendulis ſubfalcatis ſtylo coronatis. *Amer. bor.* (A. falcata Mx.)

bellidifolia 46. A. caule aſcendente foliisque ſubintegerrimis glabris, radicalibus obovato-oblongis, caulinis ovatis, racemo nutante, ſiliquis erectis elongatis. *Alp. Europ. med.* (A. intermedia Hopp. var. foliis ciliatis, caulinis ſubdentatis: A. pumila Wulff. (A. ſcabra All., nutans Mönch. W., Turritis alpina Braun.) alia var. foliis ſcabris ſubdentatis.)

coerulea Wulff. 47. A. caule erecto foliisque glabriusculis, radicalibus ſpathulatis ſubdentatis, caulinis ſubbinis oblongis, ſiliquis cernuis abbreviatis. *Alp. ſummae Carinth. Salisburg. Tranſſylvan.*

ſtellulata Bertol. 48. A. caule humili paucifolio, foliis radicalibus obovatis obtuſis integerrimis pube ramoſa incano-hirſutis, racemo paucifloro, ſiliquis rectis linearibus compreſſis. *Mons Baldus et Apennin.* (A. pumila Pollin.)

collina Tenor. 49. A. caule erecto, foliis radicalibus obovatis baſi profunde dentatis ſublyratis, caulinis ſeſſilibus oblongis dentatis pube ſtellata incano-villoſiusculis, ſiliquis linearibus erectis. *Neapol.*

Heliophila Cand. 50. A. foliis caulinis remotis linearibus pube appreſſa 2partita caneſcentibus, ſiliquis compreſſis linearibus. *Ind. or. Java.* (Heliophila caneſcens W.)

2314. TURRITIS.

glabra 1. T. caule elato ſtricto, foliis radicalibus lanceolatis ſinuato-dentatis hirſutiusculis, caulinis ſagittatis amplexicaulibus glaberrimis, ſiliquis ſtrictiſſimis elongatis. *Europ. omnis. Sibir.* (Arabis lucida L., perfoliata Lam., Siſymbrium ſimpliciſſimum Lapeyr.)

ſalſuginoſa Cand. 2. T. caule flexuoſo ramoſo, foliis cordatis ſubcarnoſis glaucis, ſiliquis patulis obtuſiusculis. *Sibir.* (Siſymbrium ſalſugineum Pall.)

hispidula Cand. 3. T. caule ramoso foliisque pube ramosa pilosis, caulinis sagittatis amplexicaulibus subserratis, siliquis erectis pubescentibus. *Quito.* (Arabis andicola Kunth.)

Löselii R. Br. 4. T. caule hirto ramoso, foliis runcinatis pilosis, siliquis patentibus glabris. *German. Ital. Borussia. Tauria. Graecia.* (Sisymbrium Löselii L. Leptocarpaea Cand.)

2315. BARBAREA R. Br.

vulgaris R. Br. 1. B. foliis lyratis crenatis basi auriculatis, lobo terminali subrotundo, lateralibus obovatis, petalis spathulato-linearibus, siliquis strictis. *Europ. omnis. Sibiria.* (Erysimum Barbarea L. Sisymbrium Crantz. Barb. stricta Andrz. Bess.)

arcuata Reichenb. 2. B. foliis lyratis angulato-repandis basi auriculatis, lobo terminali subrotundo, lateralibus oblongis, petalis obovatis, siliquis patulo-incurvis. *Germania med. Volhynia. Tauria.* (Erysimum Barbarea MB., Barb. taurica Cand. sub Ch. iberico s. laevigato in W. herb. Sed adest etiam genuinus Ch. ibericus a Mussin Puschkin acceptus.)

praecox R. Br. 3. B. foliis inferioribus lyrato-interrupte pinnatis, superioribus pinnatifidis, laciniis lineari-oblongis integerrimis, petalis obovatis, siliquis erecto-patulis. *Anglia. Gallia. Etruria.* (Erysimum Barbarea β. L., E. praecox Sm.)

plantaginea Cand. 4. B. foliis inferioribus lyratis, lobo terminali maximo subcordato, lateralibus minimis, foliis superioribus ovatis dentatis, siliquis arcuatis. *Asia minor.* (Sisymbrium Barbareae L.)

† *integrifolia* Cand. 5. B. foliis radicalibus oblongis obtusis integerrimis petiolatis, caulinis auriculatis, racemis oppositifoliis. *Asia minor.* (Sisymbrium cappadocicum Tourn.)

2316. NOTOCERAS R. Br.

canariense R. Br. 1. N. caule diffuso, foliis oblongis basi attenuatis subintegerrimis substrigilloso-glabris, petalis angustissimis aequalibus, cornubus siliquae subulatis. *Ins. Canar.* (Erysimum bicorne Ait.)

hispanicum Cand. 2. N. caule prostrato, foliis oblongo-linearibus integerrimis strigosis, petalis inaequalibus, cornubus siliquae subulatis. *Hispania.* (Diceratium prostratum Lag.)

Sibthorpii * 3. N. caule erecto, foliis pinnatifidis incanis, petalis oblongis, cornubus siliquae torulosae subulatis. *Graecia?* (Cheiranthus bicornis Sibth. Sm.)

cardaminaefolium Cand. 4. N. caule simplici erecto, foliis pinnatis glabris, foliolis subrotundis, terminali trilobo, petalis subaequalibus, cornubus siliquae compressis ob-

tuſiusculis. *Aſia minor. Thracia. Cyprus.* (Lepidium cornutum Sibth. Sm., Andrzeiowskia Cardamine Reichenb.)

quadricorne Cand. 5. N. caule erecto foliisque oblongo-lanceolatis ſubdentatis incano-pubeſcentibus, floribus apetalis, ſiliquis villoſis apice 4cornibus. *Ditio Caſan. Ruſſiae.* (Eryſimum 4corne Steph. W.)

2317. CHEIRANTHUS.

* *Seminibus haud marginatis.*

Cheiri 1. Ch. caule herbaceo vel ſuffruticoſo, foliis lanceolatis acutis glabris vel pube appreſſa 2partita ſubtus caneſcentibus, ſiliquis linearibus, ſtigmatis lobis recurvis. *Europ. med. et auſtr.* (Ch. fruticuloſus L. var.)

alpinus 2. Ch. caule gracili ſimpliciſſimo, foliis lanceolatis ſubdentatis ſtellato-pubeſcentibus, ſiliquis elongatis patulis linearibus, ſeminibus apice appendiculatis. *Scandinavia arctica.*

ochroleucus Hall. fil. 3. Ch. caule baſi decumbente, foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis glabriusculis (ſ. pube appreſſa ſcabriusculis), ſiliquis erectis ſtylo filiformi apiculatis. *Jura.* (Ch. dubius Suter., Eryſimum ochroleucum *α.* Cand. fl. gall. Ch. decumbens W.)

† *pygmaeus* Adam. 4. Ch. caule ſimpliciſſimo aſcendente, foliis lineari-lanceolatis integerrimis hiſpidulis, racemo corymboſo, (floribus violaceis,) ſiliquis longiſſimis ſubtetragono-compreſſis. *Litora maris glacialis in Sibir.*

† *Pallaſii* Pursh. 5. Ch. caule ſimplici foliisque lanceolato-linearibus utrinque attenuatis repando-dentatis glabriusculis, ſiliqua teretiuscula ſtylo brevi coronata. *Ora occid. Amer. bor.* (Ch. denticulatus W. herb.)

** *Seminibus marginatis: caule fruticoſo.*

tenuifolius Herit. 6. Ch. foliis linearibus integerrimis ſubſericeis. *Madera.*

linifolius Perſ. 7. Ch. foliis linearibus ſubſerratis ſcabris confertis, pedicellis calyce brevioribus, ſiliquis teretiusculis calycem triplo ſuperantibus. *Hiſpania.* (Heſperis linifolia Desf.)

mutabilis Herit. 8. Ch. foliis lineari-lanceolatis argute ſerratis glabriusculis, racemo longe pedunculato, floribus verſicoloribus. *Madera. Teneriffa.*

ſcoparius Brouſſ. W. 9. Ch. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſcabris erectis ſubcaneſcentibus, pedicellis calycem ſubaequantibus, floribus verſicoloribus. *Teneriffa.* (Heſperis cinerea Poir.)

ſemperflorens Schousb. 10. Ch. foliis lineari-lanceolatis integerrimis ſcabriusculis, pedicellis calyce brevioribus, floribus

albis. *Mauritania.* (Ch. linearis Vent., mutabilis Brouss. in W. herb., frutescens Pers., Hesperis semperflorens *α.* et frutescens Poir.)

*** *Dubii.*

pulchellus W. 11. Ch. foliis lineari-lanceolatis subspinuloso-serratis strigillosis, calycibus glabris. *Asia minor.*

odoratus Pall. 12. Ch. caule simplici erecto glabro, foliis omnibus albido dense tomentosis, radicalibus pinnatifido-serratis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus cartilagineo-dentatis, floribus racemoso-spicatis, calycibus glabris. *Persia bor.*

2318. MATTHIOLA R. Br.

* *Stigmatibus dorso incrassatis ecornibus.*

incana R. Br. 1. M. caule suffruticoso s. herbaceo, foliis lanceolatis obtusis incanis sessilibus, siliquis subcylindricis. *Anglia. Europ. austr. ad litora maris.* (Cheiranthus incanus, annuus L., fenestralis L. fil., glaber Mill. sunt varietates constantes s. subspecies.)

elliptica R. Br. 2. M. caule suffruticoso ramoso tortuoso, foliis petiolatis ellipticis siliquisque teretibus pube stellata tomentosis. *Abyssinia.*

sinuata R. Br. 3. M. caule herbaceo ramoso foliis siliquisque glandulosis flocoso-tomentosis, foliis oblongis inferioribus sinuatis. *Anglia. Europ. austr. Afr. bor.* (Cheiranthus sinuatus L.)

odoratissima R. Br. 4. M. caule erecto ramoso, foliis pinnatifidis tomentosis, siliquis compressis elongatis brevissime pedicellatis tomentoso-villosis. *Tauria. Caucas.* (Cheiranthus odoratissimus Pall. MB.)

tristis R. Br. 5. M. caule basi suffruticoso ramoso, foliis linearibus subdentatis tomentosis, floribus subsessilibus, siliquis teretiusculis incanis apice bituberculatis. *Europ. austr. Afric. bor.* (Cheiranthus tristis L., Hesperis angustifolia Lam. Ch. hilaris W. herb. var. culta.)

varia Cand. 6. M. caule simpliciusculo, foliis linearibus obtusis integerrimis incano-villosis, floribus subsessilibus, siliquis compressis scabris apice bituberculatis. *Italia super. Graecia.* (Cheiranthus varius Sibth. Sm., tristis Suffren.)

tatarica Cand. 7. M. caule simpliciusculo glabro, foliis oblongis dentato-pinnatifidis tomentosis, siliquis teretiusculis subtorulosis glaberrimis. *Sibir. austr. Ad fl. Tanaim.* (Hesperis tatarica Pall.)

torulosa Cand. 8. M. caule erecto foliisque linearibus subintegerrimis flocoso-tomentosis, siliquis subtorulosis glanduloso-hispidis. *Afric. austr.* (Cheiranthus torulosus Thunb.)

9.

tenella Cand. 9. M. caule simpliciusculo foliisque oblongis sinuato-dentatis pube stellata canescentibus, siliquis pubescentibus apice 2tuberculatis. *Cyprus.* Labillard.

graeca Sweet. 10. M. foliis oblongis obtusis basi attenuatis integerrimis glabris, siliquis apice 2tuberculatis. *Graecia.* (Cheiranthus graecus Juss. Pers.)

acaulis Cand. 11. M. caule subnullo, foliis linearibus angustissimis pinnatifido-dentatis tomentosis, floribus subradicalibus racemosis. *Aegypt.* (Cheiranthus acaulis Balb.)

*nana** 12. M. caule pygmaeo, foliis oblongo-linearibus obtuse pinnatifidis pube stellata incano-villosiusculis, floribus minimis subcorymbosis. *Sibiria.* (Cheiranthus nanus W. herb. Pallas. Sisymbrium nanum Cand.)

*** Siliquis apice tricuspidatis.*

coronopifolia Cand. 13. M. caule fruticoso ramoso, foliis linearibus hastatis pinnatifidisque incano-tomentosis, siliquis brevissime pedicellatis linearibus incanis. *Sicilia. Attica. Hispania?* (Cheiranthus coronopifolius Sibth. Sm.)

oxyceras Cand. 14. M. caule ramoso glanduloso, foliis lanceolatis incano-villosis, inferioribus sinuatis superioribus integerrimis, siliquis subsessilibus patentissimis glanduloso-villosis, cuspidibus lateralibus reflexis. *Syria. Persia.* (Cheiranthus syriacus W. herb.)

livida Cand. 15. M. caule ramosissimo, foliis oblongo-linearibus glanduloso-tomentosis, infimis sinuatis, siliquis subsessilibus glanduloso-villosis, cuspidibus ascendentibus stigmate longioribus. *Aegypt.* (Cheiranthus tristis Forsk., lividus Delil.)

*macropetala** 16. M. caule ramoso foliisque sublinearibus sinuato-dentatis pube stellata subvillosis, petalis acutis undulatis elongatis, germine tricuspide eglanduloso. *Ad fl. Tigrim.* (Cheiranthus longipetalus Vent. Matthiola longipetala Cand.)

tricuspidata R. Br. 17. M. caule erecto herbaceo ramoso foliisque lanceolatis sinuato-pinnatifidis villoso-tomentosis, siliquarum cuspidibus subaequalibus. *Ad litora maris mediterran.* (Cheiranthus tricuspidatus L., Hesperis Lam.)

parviflora R. Br. 18. M. caule herbaceo ramoso foliisque lanceolatis repando-dentatis tomentosis, siliquae sessilis cuspidibus lateralibus acutis media obtusa longioribus. *Hispania austr. Mauritania.* (Cheiranthus parviflorus Schousb., Hesperis Poir. Matthiola lunata Cand.)

*lacera** 19. M. caule erecto ramoso, foliis runcinato-pinnatifidis acuminatis glabriusculis, laciniis basi dentatis, calycibus pilosis, siliquis torulosis. *Hispania.* (Cheiranthus lacerus L. sp. Hesperis lacera syst. veg.)

pumilio Cand. 20. M. caule breviffimo, foliis oblongis obtufiffimis finuato-pinnatifidis in petiolum decurrentibus ftellato-tomentofis, filiquae cufpidibus obtufis. *Rhodus.* (Cheiranthus pumilio Sibth. Sm.)

humilis Cand. 21. M. caule breviffimo, foliis oblongis finuato-dentatis fubincanis, floribus racemofo-fpicatis, filiquae demum glabrae cufpidibus breviffimis. *Aegypt.*

2319. MALCOLMIA R. Br.

africana R. Br. 1. M. caule ramofo foliisque oblongis fubdentatis pube ramofa hifpidis, filiquis feffilibus hirtis. *Europ. auftr. Afric. bor.* (Hefperis africana L., diffufa Lam., hifpida Roth.)

taraxacifolia Cand. 2. M. caule ramofo foliisque oblongis incifo-dentatis pube divifa fparfa hifpidiusculis, filiquis breviter pedunculatis elongatis glabris. *Patria?*

laxa Cand. 3. M. caule ramofo fuperne glabro, foliis ovato-lanceolatis dentato-angulatis glabriusculis, filiquis elongatis rigidis laevibus. *Sibir.* (Cheiranthus an chius Pall. Hefperis laxa Lam.)

chia Cand. 4. M. caule ramofo foliisque obovatis fubintegerrimis pube appreffa fcabris, filiquis pubefcentibus ftylo breviffimo apiculatis. *Graecia.* (Cheiranthus chius L., Hefperis chia Lam.)

maritima R. Br. 5. M. caule ramofo foliisque obovato-oblongis fubdentatis pube divifa appreffa fcabris, filiquis pubefcentibus ftylo longo cufpidatis. *Europ. auftr. Numidia.* (Cheiranthus maritimus L., Hefperis Lam.)

incraffata Cand. 6. M. caule ramofo foliisque ovali-oblongis integerrimis pube divifa appreffa fcabris, pedicellis fructiferis incraffatis, filiquis pubefcentibus. *Inf. maris aegei.*

arenaria Cand. 7. M. caule ramofo, foliis inferioribus lanceolatis dentatis fuperioribus anguftioribus integerrimis pube ftellata villofiusculis, filiquis feffilibus patulis torulofis. *Afric. bor.* (Hefperis arenaria Desf.)

*aegyptiaca** 8. M. caule bafi fuffruticofo ramofo filiquisque pedicellatis torulofis ftylo brevi apiculatis pube ftellata canefcentibus, foliis lineari-oblongis integerrimis albido-tomentofis. *Ad pyramidas Aegypt.* (Cheiranthus lividus Sieber.)

parviflora Cand. 9. M. caule ramofo foliisque lineari-oblongis fubintegerrimis fublanato-tomentofis, pedicellis fructiferis incraffatis, filiquis patulis elongatis gracilibus pubefcentibus. *Gallia auftr. Italia. Corfica.* (Hefperis parviflora Cand. fl. gall., pumila Poir.)

litorea R. Br. 10. M. ramis virgatis foliisque lineari-lanceolatis obtufis fubintegerrimis albo-tomentofis, filiquis pedicellatis incanis. *Gallia occid. Europ. auftr. Mauritania.* (Cheiranthus litoreus L., unguiculatus Pourr. in W. herb., Hefperis Lam.)

lyrata Cand. 11. M. caule ramofo foliisque pube appreffa 2partita canefcentibus, inferioribus lyratis petiolatis

fuperioribus oblongis feffilibus fubdentatis, filiquis pedicellatis erectis pubefcentibus. *Cyprus.* (Cheiranthus lyratus Sibth. Sm.)

alyffoides Cand. 12. M. caule ramofo foliisque imbricatis obovato-fpathulatis fubintegerrimis ftellato-tomentofis, filiquis fubfeffilibus. *Lufitan.* (Hefperis alyffoides Perf.)

patula Cand. 13. M. caule ramofo diffufo foliisque linearibus fubintegerrimis ftellato-tomentofis, filiquis pedicellatis gracilibus ftylo longo cufpidatis pubefcentibus. *Hifpania.* (Hefperis arenaria Lag.)

*triloba** 14. M. caule bafi ramofo foliisque linearibus obtufis finuato-pinnatifidis ftellato-tomentofis incanis, filiquis pedicellatis torulofis ftylo longo cufpidatis incano-pubefcentibus *Mauritania. Hifpania. Afia minor.* (Cheiranthus 3lobus L. Hefperis pinnatifida Desf., erofa Lag.? M. Brouffonetii Cand.) [Malcolmia lacera Cand. ex hac et Matthiola lacera* eft compofita.]

*exacoides** 15. M. foliis glabris glaucis fubdentatis, radicalibus obovatis, caulinis oblongis acutis, racemis paucifloris. *Libanus.* Labillard. (Sifymbrium exacoides Cand.)

2320. HESPERIS.

alyffifolia Cand. 1. H. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ftellato-fubtomentofis, pedicellis calycem villofiffimum aequantibus, petalis oblongo-linearibus fubundulatis. *Perfia.*

triftis 2. H. foliis oblongo-lanceolatis fubdentatis fuperioribus feffilibus hirfutis, pedicellis elongatis rigidis, filiquis compreffis, futuris incraffatis. *Auftria. Hungar. Transfylvan. Tauria. Italia.* (Cheiranthus lanceolatus W.)

laciniata All. 3. H. caule ramofo filiquisque glandulofo-hirfutiusculis, foliis dentato-finuatis, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis acuminatis feffilibus. *Gallia auftr. et orient. Pedemont. Italia. Ucrania.* (H. hieracifolia Vill., villofa Cand. Cheiranthus laciniatus Poir. Hefp. fuaveolens Beff.)

runcinata Kit. 4. H. caule apice diffufe ramofo fubvifcido-villofo, foliis inferioribus lyratis, fuperioribus ovato-oblongis finuato-dentatis, filiquis glabris. *Hungar.*

matronalis 5. H. caule villofiufculo fubramofo, foliis ovato-lanceolatis acuminatis finuato-dentatis, filiquis erectis glabris. *Europ. Sibir.* (H. inodora et fibirica L.)

nivea Baumg. 6. H. caule hirto, foliis ovato-lanceolatis dentatis hirfutis, inferioribus petiolatis fuperioribus amplexicaulibus, filiquis pilofis patulis. *Alp. dinar.*

heterophylla Tenor. 7. H. caule diffufo foliisque pubefcentibus, inferioribus ellipticis fubintegerrimis, fuperioribus ovato-lanceolatis ferratis, filiquis erectis gracilibus fubpubefcentibus. *Neapol.*

Steveniana Cand. 8. H. caule fimplici filiquisque hifpidis, foliis radicalibus glabriusculis runcinatis, fuperioribus ovato-lanceolatis incifo-dentatis hifpidiusculis. *Tauria.*

aprica Poir. 9. H. caule fimplici retrorfum hifpido, foliis fpathulato-oblongis linearique lanceolatis hirfutis fubintegerrimis, floribus corymbofis. *Sibir.* (Cheiranthus apricus Steph. W., Hefperis Cheiranthus Perf.)

*hyrcanica** 10. H. caule fruticofo denfe foliofo humili fuperne hirfutiffimo, foliis radicalibus fpathulato-linearibus albo-tomentofis, floralibus linearibus calycibusque hirtis. *Perfia bor.* (Cheiranthus verficolor Pall. in W. herb.)

bicufpidata Cand. 11. H. caule fimplici foliisque lanceolatis acutis fubdentatis ftellato-pubefcentibus, filiqua ftigmatibus conniventibus coronata. *Afia minor.* (Cheiranthus 2cufpidatus W., Hefp. cufpidata Poir.)

nitens Viv. 12. H. caule ramofiffimo foliisque oblongo-linearibus obtufis integerrimis feffilibus glaberrimis, filiquis breviffime pedicellatis compreffo-fubtetragonis ftigmate duplici coronatis. *Regio Cyrenaica.*

ramofiffima Desf. 13. H. caule ramofiffimo herbaceo foliisque oblongo-linearibus fubintegerrimis incano-fubtomentofis, filiquis gracilibus fcabris torulofis. *Sicilia. Numidia. Aegypt. Afia minor.*

pygmaea Delil. 14. H. caule ramofo foliisque oblongis obtufis finuatis pube ftellata fcabris, filiquis tenuiffimis glabris. *Syria. Aegypt.*

pulchella Cand. 15. H. caule fubramofo glabro bafi foliofo, foliis finuato-pinnatifidis pube ramofa ciliatis, filiquis pedicellatis glabris. *Syria?*

pinnatifida Mx. 16. H. caule fubramofo glabro fulcato, foliis inferioribus bafi pinnatifidis, fuperioribus ovato-lanceolatis inaequaliter dentatis, filiquis pedicellatis torulofis fcabris. *Ad fl. Ohio.*

crenulata Cand. 17. H. caule ramofo fcabro, foliis oblongis obtufis amplexicaulibus crenatis filiquisque glabris. *Mefopotamia.*

diffufa Banks. 18. H. caule fuffruticofo, foliis coriaceis inferioribus obovato-oblongis fubdentatis, fuperioribus linearibus paucis. *Madera.* (Sinapis frutefcens Ait., anguftifolia Cand.)

2321. SISYMBRIUM.

** Foliis indivifis.*

filifolium W. 1. S. caule humili, foliis linearibus anguftiffimis, filiquis axillaribus linearibus fcabris. *Provinc. Cafan Ruffiae orient.* (Leptaleum Cand.)

lineare Cand. 2. S. caule ramofo, ramis fuperne villofis, foliis linearibus integerrimis hifpidiusculis ciliatis, racemis corymbofis, filiquis glabris tenuiffimis. *Sibir.* (Cheiranthus leptophyllus W. herb.)

integrifolium 3. S. caule ramofo filiquisque fubtorulofis glandulofo-muricatis, foliis linearibus integerrimis glandu-

lofo-villofis. *Sibir.* (Hefperis glandulofa Perf. Andreofkia Cand. prodr.)

† *eglandulofum* Cand. 4. S. caule ramofo villofo filiquisque glabris eglandulofis, foliis linearibus integerrimis. *Sibir.*

contortuplicatum Cand. 5. S. caule ramofo filiquisque torulofis fubcontortis hifpidulis, foliis radicalibus runcinatis caulinis lanceolatis fubdentatis. *Ad Volgam et in Albania veteri.* (Cheiranthus Steph. W., Hefperis M. B.)

junceum M. B. 6. S. caule ramofo foliisque glaucis laevibus, ramis virgatis, foliis radicalibus runcinatis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis. *Hungar. Transfylvan. Beffarabia. Tauria. Sibir.* (Braffica polymorpha Murr., Cheiranthus junceus Kit., Eryfimum junceum W.)

hifpanicum Jacqu. 7. S. caule ramofo, foliis lanceolatis fubdentatis glabris glaucefcentibus, filiquis gracilibus erectis. *Hifpan.*

peruvianum Cand. 8. S. caule ramofo hirfuto, foliis oblongis groffe dentatis hirfutiusculis, floribus racemofis bracteatis, bracteis coloratis dentatis pedicellos fuperantibus, filiquis patentibus hifpidis. *Peru.*

ftrictiffimum 9. S. caule elato foliisque oblongo-lanceolatis denticulatis pubefcentibus, racemis ebracteatis, filiquis ftrictis glaberrimis. *Europ. med.*

torulofum Desf. 10. S. caule ramofo foliisque oblongo-lanceolatis hifpidis, radicalibus incifo-pinnatifidis, caulinis obtufe ferratis, filiquis torulofis hifpidulis. *Afric. bor. Cyprus.*

*Pallafii** 11. S. caule ramofo, foliis omnibus linearibus integerrimis glabris, inferioribus obtufis fuperioribus anguftis acutis, calycibus longe pilofis, filiquis tenuibus erecto-patulis. *Sibir.?* (S. tenuifolium Pall. in W. herb.)

Kahikir Mart. 12. S. caule gracili afcendente fuperne nudo, foliis oblongo-linearibus acutis bafi attenuatis fubintegerrimis hirfutiusculis, ramis racemiferis elongatis, calycibus hifpidis, petalis linearibus, filiquis gracilibus elongatis glabris. *Patria?*

atrovirens Horn. 13. S. caule diffufe ramofo foliisque oblongis denticulatis bafi auriculatis glabris, petiolis bafi dilatatis amplexicaulibus, filiquis fubarcuatis laevibus. *China.*

nitidulum Lag. 14. S. caule afcendente fimpliciusculo fuperne glabro aphyllo, foliis oblongis incifo-dentatis petiolatis, racemo laxo, filiquis longe pedicellatis glabris. *Hifpania.*

fubhaftatum W. 15. S. caule diffufo foliisque glaberrimis, radicalibus runcinatis, caulinis fubhaftatis lanceolatisque integerrimis, filiquis elongatis rigidis patentiffimis laevibus. *Inf. maris aegei.* (Braffica fubhaftata W. fp., Sif. affine W. fuppl.)

** *Foliis pinnatifidis, runcinatis.*

† *Siliquis axillaribus.*

polyceraton. 16. S. caule diffufo foliisque glabris, inferioribus lyrato-runcinatis, fuperioribus repando-dentatis

haftatis, filiquis fubaggregatis breviffime pedicellatis arcuatis fcabris. *Europ. auftr.*

villofum Lag. 17. S. caule diffufo, filiquis elongatis arcuatis villofis fubfeffilibus, foliis omnibus runcinatis. *Hifpania.* (S. hirfutum Cand.)

runcinatum Lag. 18. S. caule diffufo glabro, foliis inferioribus runcinato-dentatis, fuperioribus lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis filiquisque incurvis laevibus. *Hifpania.*

fupinum 19. S. caule erecto fcabro, foliis petiolatis finuato-pinnatifidis, filiquis pedicellatis remotis glabris fubarcuatis ftylo brevi craffo coronatis. *Inf. Oeland. Mons Jura. Ad Sequanam et Rhodanum.* (Arabis fupina Lam.)

rigidum M. B. 20. S. caule erecto, foliis lineari-lanceolatis finuato-dentatis pinnatifidisque hirfutis, racemis paucifloris breviffime pedunculatis oppofitifoliis, filiquis rectis hifpidis. *Tauria. Sibir.* (Eryfimum polyceraton et cornutum Pall., Hefperis rigida Stev.)

†† *Siliquis racemofis.*

α. *Foliis pubefcentibus.*

† *fetofum* Ledeb. 21. S. caule fimplici erecto fuperne glabro, foliis radicalibus lyratis argute denticulatis hifpidis, caulinis paucis exiguis lanceolatis feffilibus, racemo paucifloro, filiquis hifpidis. *Perfia bor.*

† *cinereum* Desf. 22. S. caule ramofo foliisque linearibus pinnatifidis obtufis pubefcentibus, filiquis villofiusculis. *Numidia.*

pectinatum Fifch. 23. S. caule fubramofo foliisque pectinato-pinnatifidis pilofis glandulofo-muricatis, laciniis linearibus acutis, filiquis fubtorulofis glabriusculis. *Sibir.* (Cheiranthus pinnatifidus et Sifymbrium muricatum W. herb., Hefperis pinnata Perf., punctata et pilofa Poir., Arabis grandiflora Pall. Andreoskia Cand. prodr.)

pumilum Steph. W. 24. S. caule erecto foliis filiquisque pube minutiffima ftellata fcabris, foliis inferioribus runcinatis, fuperioribus fagittatis lanceolatis finuato-dentatis. *Perfia bor. Caucaf.*

hirfutum Lag. 25. S. caule fimpliciffimo humili filiquisque feffilibus pilofis, foliis radicalibus lyratis hirfutiusculis, caulinis paucis lanceolatis. *Hifpania.*

Columnae Jacqu. 26. S. caule incano villofo, foliis runcinatis pubefcentibus, laciniis fuperiorum linearibus, filiquis erectis ftrictis glabris f. pubefcentibus. *Europ. auftr. Afia minor.* (S. orientale et altiffimum L., Löfelii Thuill.)

officinale Scop. 27. S. caule ramofo foliisque runcinatis pubefcentibus, filiquis cauli appreffis fubvillofis. *Europ. omnis. Afric. bor. Amer. bor.* (Eryfimum officinale L.)

obtusangulum W. 28. S. caule inferne retrorfum hifpido, foliis lyratis pubefcentibus, lobis obtufis dentatis, fuperiorum

anguſtis acutius dentatis, ſiliquis patulis ſubtoruloſis glabris. *Hiſpania. Gallia. Helvetia.* (Sinapis naſturtiifolia et hiſpanica Lam.)

lyratum Burm. 29. S. caule inferne foliisque inferioribus lyrato-runcinatis hirſutis, ſuperioribus oblongis dentatis glabris, ſiliquis patulis glabriuſculis. *C. B. S.*

Burchellii Cand. 30. S. caule hirto, foliis pinnatis pinnatifidisque piloſis, foliolis ovatis angulato-dentatis, ſiliquis erectiuſculis ſcabris. *Afric. auſtr.*

gariepinum Burch. 31. S. caule ramis divaricatis ſubſtellato-appreſſe pubeſcentibus, foliis pinnatifidis piloſiuſculis glaucis, laciniis dentatis acutiuſculis, ſiliquis rigidis ſcabris. *Afric. auſtr.*

pannonicum Jacqu. 32 S. caule retrorſum hiſpido, foliis inferioribus runcinatis hiſpidulis, ſuperioribus pinnatis linearibus integerrimis glabris, ſiliquis patentiſſimis elongatis gracilibus laevibus. *Helvetia. Hungaria. Transſylvan. Tauria. Caucaſ.* (S. Sinapios Retz. Sinapiſtrum Crantz.)

β. Foliis glabris.

pinnatifidum Cand. 33. S. caule aſcendente inferne pubeſcente, foliis lyratis glabris, ſuperioribus anguſtioribus, (floribus albis), ſiliquis patulis ſtigmate ſeſſili obtuſo terminatis. *Gallia. Italia. Helvetia.* (S. burſifolium Gouan., dentatum All., Arabis pinnatifida Lam., Cardamine runcinata Pourr.)

gallicum W. 34. S. caule aſcendente inferne pubeſcente, foliis ſublyratis ſinuato-pinnatifidis glabris, racemo laxo, (floribus albidis), ſiliquis patentibus ſtylo longo terminatis toruloſis glabris. *Gallia?*

burſifolium 35. S. caule ſubramoſo humili foliisque lyratis glabris, floribus (albis) breviſſime pedicellatis, ſiliquis rigidis patentiſſimis laevibus ſtylo brevi terminatis. *Sicilia. Pyren.* (Heſperis dentata L., Arabis burſifolia Lam.)

aſperum 36. S. caule ramoſo foliisque pinnatifido-ſinuatis glabris, laciniis obtuſis ſubdentatis, pedicellis rigidis breviſſimis, (floribus flavidis), ſiliquis aſperis ſtylo brevi terminatis. *Gallia auſtr. Hiſpania. Luſitan.*

ramuloſum Delil. 37. S caule ramis gracilibus virgatis, foliis inferioribus lyrato-pinnatifidis, ſuperioribus oblongo-linearibus ſubintegerrimis, racemis laxis paucifloris, ſiliquis laeviſſimis. *Aegypt.*

graecum W. herb. 38. S. caule decumbente diffuſo foliisque petiolatis ſublyratis, lobis repando-dentatis, petalis fugacibus minimis, ſiliquis patentiſſimis laevibus obtuſi . *Patria?*

Irio 39. S. caule foliisque runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis, ſiliquis erectis gracilibus laevibus. *Europa. Arabia.* (S. pinnatifidum Forsk., glabrum W.)

eryſimoides Desf. 40. S. caule ſimpliciuſculo foliisque lyratis glabris, laciniis argute dentatis, terminali maxima ſublo-

bata, floribus exiguis, siliquis pedicellatis patentissimis elongatis. *Numidia. Hispania.* (S. rigidulum Lag.)

acutangulum Cand. 41. S. caule subramoso, foliis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis sinibusque acutis, pedicellis filiformibus, calyce patentissimo, siliquis scabris erecto-contortis. *Gallia. Italia.* (Sinapis pyrenaica L., Erysimum pyrenaicum Vill., Sisymbrium sinapoides R. Br.)

taraxacifolium Cand. 42. S. caule inferne piloso, foliis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis acutissimis subdentatis, calyce erectiusculo, siliquis glabris declinatis. *Gallia provinc. Hispania.* (S. fugax Lag., contortum ej.?)

Zeae * 43. S. caule erecto subramoso, foliis inferioribus lyratis repando-dentatis, superioribus hastato-angulatis, petalis calycem aequantibus, siliquis gracillimis sessilibus incurvo-patulis. *Hispan.* (S. nitidum Zeae.)

austriacum Jacqu. 44. S. caule erecto foliisque plerisque runcinatis glabris, laciniis approximatis dentatis acutis subaequalibus, foliis summis linearibus, racemis corymbosis, calyce patente, siliquis erecto-patulis strictis glabris obtusis. *German. med. et austr. Helvetia. Gallia. Italia.* (S. Tillerii et eckartsbergense W., erysimifolium Pourr., multisiliquosum Hofm.)

*** *Foliis pinnatis.*

tanacetifolium 45. S. caule simplici foliisque pinnatis petiolatis subpubescentibus, foliolis lanceolatis inciso-serratis, racemis corymbosis, siliquis pedicello brevioribus subclavatis glabris erectis. *Helvetia. Italia. Gallia austr.*

multifidum W. herb. 46. S. caule erecto teretiusculo glabro, foliis inferioribus hirsutis, foliolis lanceolato-linearibus dentatis, infimis reflexis, foliolis summis filiformibus glabris, floribus paniculatis, siliquis longissimis flexuosis gracilibus stigmate crasso coronatis. *Patria?*

**** *Foliis decompositis.*

Sophia 47. S. caule erecto, foliis 2pinnatis glauco-pubescentibus, laciniis linearibus, petalis calyce brevioribus, siliquis pedicellatis erectis glabris. *Europ. omnis.* (S. parviflorum Lam.)

persicum * 48. S. caule ramoso pubescente, foliis 2pinnatis glabris, laciniis linearibus apice subdilatatis subdentatis, petalis calycem excedentibus, siliquis patentibus pedicellatis glabris. *Persia.*

canescens Nutt. 49. S. foliis 2pinnatis canescentibus, laciniis obtusis dentatis, petalis calycem aequantibus, siliquis cla-

vatis pedicello brevioribus. *Amer. bor. et auftr.* (S. Sophia Pursh., brachycarpon Richardf., myriophyllum W. herb.)

tripinnatum Cand. 50. S. caule ramofo foliisque 3pinnatis pube ftellata villofis, laciniis oblongo-linearibus fubdentatis, floribus parvis, filiquis gracilibus elongatis glabris. *Afric. auftr.* (Sinapis? tripinnata Burch.)

millefolium Ait. 51. S. caule fuffruticofo, foliis fub-3pinnatis incanis, foliolis obtufis crenatis, petalis calycem fuperantibus, filiquis pedicellatis patulis acuminatis. *Teneriffa.* (Sinapis millefolia Jacqu.)

***** *Dubium.*

feptulatum Cand. 52. S. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus acuminatis fubdentatis, filiquis patulis, fepto in loculis femina impreffa gerente. *Syria.* (Alex. Ruffell). Novum potius genus effe videtur.

2322. Erysimum.

* *Genuina, calyce erecto deciduo, filiquis exacte tetragonis.*

† *Foliis integerrimis.*

fuffruticofum * 1. E. caule fuffruticofo, foliis fafciculatis lanceolatis acutis integerrimis pube fub-2partita appreffa fcabris, calyce unguibus petalorum breviori, filiquis ftrictis ftylo breviusculo coronatis. *Hifpania.* (Cheiranthus filenifolius W.)

caefpitofum Cand. 2. E. caule fuffruticofo, foliis fpathulato-linearibus integerrimis pube 2partita canefcentibus, filiquis erectis ftylo breviusculo coronatis. *Perfia bor.*

helveticum Cand. 3. E. caule herbaceo angulato, foliis linearibus obtufis fubintegerrimis pube 2partita incanis, petalorum laminis obovatis, filiquis canefcentibus ftylo ftigmateque emarginato coronatis. *Alp. cott. pennin. carpath.* (Cheiranthus helveticus Jacqu., pumilus Schleich. Hornem.? Eryfimum pallens Perf.)

canefcens Roth. 4. E. caule diffufe ramofo foliisque lineari-lanceolatis integerrimis pube 2partita appreffa canefcentibus, unguibus petalorum calycem excedentibus, laminis obovatis, filiquis erectis ftigmate fubfeffili coronatis. *Europ. auftr.* (E. diffufum Ehrh., Redowskii Weinm., Andrzceiovianum Bell., fylveftre Scop., Cheiranthus alpinus Jacqu.)

leptophyllum Andrz. 5. E. caule ramofo foliisque lineari-lanceolatis integerrimis pube appreffa 2partita fcabris canefcentibus, filiquis patulis pube ftellata incanis. *Caucaf.* (Cheiranthus leptophyllus M. B.)

ftrigofum Cand. 6. E. caule fubramofo foliisque lanceolatis integerrimis pube 3partita ftrigofis, filiquis erectis ftig-

mate ſeſſili 2partito coronatis. *Sibir.* (Cheiranthus ſtrigoſus Ledeb.)

** *Foliis dentatis.*

leptoſtylum Cand. 7. E. caule herbaceo ſimpliciusculo, foliis lanceolatis remote ſubdentatis pube 3partita incanis, petalorum laminis orbiculatis, ſiliquis ſtylo filiformi coronatis. *Ad fl. Tanaim. Caucaſ.* (E. grandiflorum M. B.)

exaltatum Andrz. 8. E. caule elato paniculato, foliis radicalibus ſpathulatis, caulinis lineari-lanceolatis patentibus remote denticulatis, petalis retuſis, glandulis externis 3lobis, ſiliquis patentibus incraſſatis incanis ſtylo breviſſimo coronatis. *Podolia auſtr.*

odoratum Ehrh. 9. E. caule ramoſo, foliis lanceolatis inciſo-ſinuato-dentatis pube 3partita ſcabris, unguibus petalorum calycem ſubaequantibus, laminis ſubrotundis, ſiliquis ſtrictis elongatis ſtigmate 2lobo coronatis. *Hungar.*

virgatum Roth. 10. E. ramis ſtrictis virgatis pube appreſſa 2partita ſcabris, foliis lanceolatis denticulatis pube 3partita ſcabris, unguibus petalorum calyces excedentibus, lamina oblonga, ſiliquis ſtrictis erectis ſtylo breviſſimo ſtigmateque 2lobo coronatis. *German. med.* (E. durum Presl.)

longiſiliquum Schleich. 11. E. ramis erectis pube appreſſa 2partita ſcabriusculis, foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis pube 3partita ſcabris, petalorum unguibus calycem aequantibus, laminis oblongis, ſiliquis ſtrictis elongatis glabris ſtylo brevi ſtigmateque 2lobo coronatis. *Helvetia. German. med.*

crepidifolium Reichenb. 12. E. caule ramoſo, foliis linearibus apice dilatatis ſinuato-dentatis pube 3partita ſcabris, unguibus petalorum calycem excedentibus, ſiliquis longiſſimis patentibus ſtigmate ſubſeſſili coronatis. *German. med.* (E. hieracifolium Cand.)

hieracifolium 13. E. caule ramoſo ſtricto, foliis lanceolatis patulis remote dentatis pube 3partita ſcabriusculis viridibus, unguibus petalorum calycem aequantibus, ſiliquis erectis ſtigmate ſubſeſſili coronatis. *Europ.* (E. ſtrictum Gärtn.)

aureum M. B. 14. E. caule ramoſo, foliis lanceolatis remote dentatis pube 3partita ſcabris viridibus, unguibus petalorum calycem excedentibus, ſiliquis patentibus ſtylo breviusculo coronatis. *Caucaſ.*

cheiranthoides 15. E. caule ramoſo pube 2partita foliisque lanceolatis ſubdentatis pube 3partita ſcabris, ſiliquis erecto-patulis ſtigmate parvo ſubſeſſili coronatis. *Europ. omnis. Sibir. Amer. bor.* (E. parviflorum Perſ. Cheiranthus eryſimoides Hudſ., turritoides Lam., aquaticus Lejeun., Er. ſylvaticum M. B.)

repandum 16. E. caule ramoſo, foliis radicalibus runcinatis caulinis lineari-lanceolatis canaliculatis ſinuato-dentatis pube appreſſa 2partita ſcabris, petalis ſpathulato-linearibus, ſiliquis patentiſſimis ſubſeſſilibus elongatis obtuſis toruloſis. *Europ. med.*

Afia med. (Er. ramofiffimum Crantz., Cheiranthus ramofiffimus Lam., tenellum Cand.?)

collinum Andrz. 17. E. caule angulato ramofo foliisque pube ftellata fcabris, inferioribus fpathulatis angulato-dentatis fuperioribus lineari-lanceolatis fubintegerrimis, petalis fpathulato-linearibus, filiquis erectis gracilibus fubafperis. *Caucaf.* (Cheiranthus collinus M. B.)

verficolor Andrz. 18. E. caule ftricto pube 2partita foliisque 3partita incanis, inferioribus runcinatis fuperioribus linearibus fubintegerrimis, filiquis teretiusculis canefcentibus. *Caucaf. Perfia bor.* (Cheiranthus leucanthemus Steph. W., verficolor M. B.)

Cheiranthus Perf. 19. E. caule afcendente fimplici, foliis fublanceolatis finuato-dentatis pube 3partita fcabriusculis, petalorum lamina ampla obovata, filiquis erectis ftylo ftigmateque 2lobo coronatis. *Europ.* (E. lanceolatum R. Br., diffufum Ker., cheiranthoides Crantz., murale Desf., dubium Cand, alpinum Perf., cheiriflorum Wallr., Hefperis Scop., Cheiranthus eryfimoides L., alpinus Vill.)

ibericum Cand. 20. E. caule ramofo glabro, foliis radicalibus runcinatis, caulinis oblongo-lanceolatis finuato-mucronato-dentatis (pube minima fparfa fubramofa) glabriusculis, filiquis elongatis glabris obtufis. *Caucaf.* (Cheiranthus ibericus Adam. W. M. B., armeniacus Sims.)

longifolium Cand. 21. E. foliis lineari-lanceolatis elongatis repando-fubdentatis, petalorum laminis obovatis, filiquis erectis pubefcentibus, ftylo longiusculo. *Numidia.* (E. grandiflorum Desf.)

altiffimum Lejeun. 22. E. caule diffufo foliisque lanceolatis fubdentatis pube appreffa fcabris, petalorum laminis emarginatis, filiquis erectis canefcentibus ftylo abbreviato ftigmateque 2lobo coronatis. *Belgium.*

rhaeticum Cand. 23. E. caule angulato foliisque lineari-lanceolatis remote denticulatis pube appreffa 2partita fcabris, filiquis longiffimis patulis ftylo ftigmateque capitato terminatis. *Alp. rhaet.* (Cheiranthus rhaeticus Schleich.)

† *gracile* Cand. 24. E. caule angulato fubramofo foliisque lineari-lanceolatis dentatis pube 2-3partita fcabris, petalorum laminis obovatis, filiquis erectis pube ftellata fcabris, ftylo fubnullo. *Caucaf.*

rigidum Cand. 25. E. caule ramofiffimo foliisque lineari-lanceolatis acute dentatis pube appreffa 2partita fcabris, filiquis patulis rigidis, ftylo fubnullo. *Syria.* Labillard.

fcabrum Cand. 26. E. caule fimpliciusculo foliisque linearibus pube appreffa 2partita canefcentibus, inferioribus fpathulatis fubdentatis, fuperioribus fubintegerrimis, filiquis erectis tuberculato-fcabris, ftylo filiformi. *Libanus.* Labillard.

afperum Cand. 27. E. caule angulato foliisque pube appreffa 2partita fubcanefcentibus, radicalibus fubruncinatis finuato-dentatis, caulinis linearibus integerri-

mis, siliquis patentibus scabris stylo crasso terminatis. *Ad fl. Missuri.* (Erysimum lanceolatum Pursh., Cheiranthus asper Nutt.)

** *Descissentia,*

† *calyce patulo.*

Alliaria 28. E. caule foliisque petiolatis cordatis glabris, siliquis erectis tetraëdris pedicello multo longioribus. *Europ. omnis. Asia med.* (Alliaria officinalis Andrz. Cand.)

† *brachycarpon** 29. E. caule foliisque petiolatis subrotundis crenatis villosis, siliquis lanceolatis pubescentibus pedicellos subaequantibus. *Caucas.* (Raphanus tauricus Adam., rotundifolius M. B., Alliaria brachycarpa Andrz. Cand.)

†† *Glabritie partium et foliis amplexicaulibus.*

perfoliatum Crantz. 30. E. glaberrimum glaucum, foliis radicalibus obovatis, caulinis cordatis obtusis amplexicaulibus integerrimis, siliquis 4gonis venosis patentibus. *Europ. omnis. Asia med. Japon.* (Brassica orientalis L., perfoliata Lam., Erys. orientale R. Br. Conringia perfoliata Link. Er. austriacum Baumg. (Brassica austriaca Jacqu.) nonnisi floribus minoribus ochroleucis differt.

††† *Calyce subsessili, stylo longo persistente: Syreniae* Andrz.

siliculosum Cand. 31. E. foliis linearibus incanis integerrimis, siliquis patentiusculis 4gono-globosis stylo brevioribus, calyce tectis. *Caucas. bor. Ad Volgam.* (Cheiranthus siliculosus M. B.)

*siculum** 32. E. foliis lineari-lanceolatis glabris integerrimis, siliquis 4gono-ancipitibus incanis stylo brevioribus calyce tectis. *Sicilia.*

sessiliflorum R. Br. 33. E. foliis linearibus canaliculatis glabriusculis, calycibus sessilibus deciduis, siliqua lata stylum filiformem aequante. *Tauria. Caucas. Sibir.* (Cheiranthus montanus Pall., 4angulus Herit., cornutus Lam., Erysimum cornutum Pers.)

angustifolium Ehrh. 34. E. foliis linearibus angustissimis incanis, calycibus sessilibus deciduis, siliquis 4gonis stylo filiformi multo longioribus. *Hungar. Transsylvan. Podolia.* (Cheiranthus canus Pill. et Mitterp., virgatus Poir.)

cuspidatum Cand. 35. E. foliis oblongis sinuato-dentatis scabris, calycibus brevissime pedicellatis deciduis, siliquis appressis 4gono-ancipitibus stylo triplo longioribus. *Tauria. Caucas. Asia minor.* (Cheiranthus cuspidatus M. B., bithynicus Pers.)

† *rupestre* Cand. 36. E. foliis subdentatis pube ramosa scabris, radicalibus spathulatis, caulinis oblongis, caule suffruticoso. *Asia minor.* (Cheiranthus rupestris Sibth. Sm.)

2323. STANLEIA Nutt.

pinnatifida Nutt. 1. St. caule elato, foliis interrupte pinnatifidis sublyratis subcarnosis, racemis multifloris. *Louisiana.* (Cleome pinnata Pursh.)

† *cartilaginea** 2. St. foliis petiolatis pinnatifidis cartilagineo-carnosis, laciniis linearibus obtusis subdentatis, floribus corymbosis. *Tauria.* (Sisymbrium cartilagineum Pall. Cand.)

gracilis Cand. 3. St. caule gracili, foliis superioribus oblongis obtusis integerrimis, racemis abbreviatis. *Amer. bor.*

amplexifolia Nutt. 4. St. foliis amplexicaulibus integerrimis glaucis, floribus corymbosis, siliquis nutantibus. *Florida.*

2324. BRASSICA.

* *Siliqua stylo tereti haud mutato terminata.*

† *Siliqua sessilis.*

α. *Foliis superioribus amplexicaulibus.*

oleracea 1. Br. glaberrima glauco-pruinosa, foliis subcarnosis, radicalibus lyratis, caulinis superioribus cordato-oblongo-lanceolatis denticulatis. *Anglia. Graecia.* Subspecies cultu vel solo ortae ac fere constantes:

α. viridis Magnol., caule tereti elongato, foliis expansis, racemis paniculatis.

β. sabellica Renealm., caule subsimplici, foliis sinuato-lobatis, lobis multifidis.

γ. crispa Camer., foliis junioribus subcapitatis, demum patulis bullatis crispatisve.

δ. capitata Lobel., foliis concavis non bullatis ante anthesin in capitulum congestis albidis s. rubentibus.

ε. Caulorapum Lobel., caule ad originem foliorum tumido subgloboso. (Br. gongylodes C. Bauh.)

ζ. cauliflora Renealm., racemorum pedunculis corymbosis confertis ante anthesin valde carnosis abbreviatis, floribus saepe abortientibus. (Br. asparagoides Dalech.)

η. oleifera Mönch.

ϑ. Napus L., radice fusiformi.

ι. praecox Kit., radice annua.

campestris 2. Br. foliis radicalibus lyratis subcarnosis glaucescentibus cauleque inferne hispidis, caulinis superioribus oblongis inciso-dentatis ramisque glaucis glabris. *Per omnem Europam passim.* (Napobrassica est subspecies radice tumida napiformi.)

Rapa 3. Br. foliis radicalibus sublyratis viridibus setoso-scabris, caulinis summis cordato-lanceolatis subintegerrimis glabris, calyce patente. *Europa passim.*

cretica Lam. 4. Br. fuffruticofa glaberrima, foliis inferioribus petiolatis fubrotundo-ovatis crenulatis, fuperioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, filiquis patulis, ftylo fubdilatato. *Creta. Graecia.*

chinenfis 5. Br. herbacea glaberrima glaucefcens, foliis inferioribus petiolatis ovalibus fubintegerrimis, floralibus amplexicaulibus lanceolatis fubincifis, unguibus petalorum calyce brevioribus. *China.*

violacea 6. Br. herbacea, foliis oblongis acute dentatis glabris, floralibus pedicellos ftipantibus integerrimis, pedicellis calycibus germinibusque villofis. *China.*

β. *Foliis fuperioribus feffilibus f. nullis.*

hybrida Tenor. 7. Br. caule bafi fuffruticofo fuperne glabro foliato, foliis laevibus, inferioribus lyratis denticulatis, fummis fubhaftatis feffilibus, calycibus breviffime pedicellatis coloratis claufis. *Neapol.*

incana Tenor. 8. Br. caule bafi fuffruticofo foliisque incano-villofiusculis, inferioribus lyratis denticulatis, lobo terminali maximo, caulinis paucis oblongis feffilibus, racemo fubcompofito, calycibus longe pedicellatis fubpatulis. *Neapol.*

Gravinae Tenor. 9. Br. caule foliisque hifpidis, inferioribus lyrato-runcinatis, laciniis inferioribus foliisque fuperioribus fubintegerrimis, calycibus patulis, filiquis glabris. *Neapol.*

lyrata Desf. 10. Br. caule afcendente foliisque hifpidis, radicalibus lyratis, caulinis paucis incifis, filiquis turgidis abbreviatis hifpidiusculis. *Afric. bor.*

† *Heleniana* Burch. 11. Br. caule afcendente foliisque lyrato-pinnatifidis hifpidiusculis, petalis longe unguiculatis venofis. *Inf. Helenae.*

magellanica Juff. Perf. 12. Br. caule erecto herbaceo foliisque pectinato-pinnatifidis glabris, racemis fubcorymbofis, filiquis ftylo fubnullo terminatis. *Ad fret. Magellan.*

pinnatifida Desf. 13. Br. caule erecto foliisque pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis elongatis ferratis, calycibus claufis, filiquis glabris cufpidatis. *Afric. bor. Hifpan. auftr.*

Erucaftrum 14. Br. caule erecto herbaceo foliisque pinnatifidis ftrigofis, laciniis oblongis obtufis irregulariter dentatis, calycibus patulis, filiquis glabris ftylo craffiusculo terminatis. *German. occid. Gallia. Helvetia. Italia.* (Eryfimum Scop., Eruca Baumg., Sifymbrium Vill.)

† *humilis* Cand. 15. Br. foliis radicalibus carnofis pinnatifidis glabriusculis, fcapo corymbifero, filiquis torulofis ftylo craffiusculo terminatis. *Gallia auftr.*

repanda Cand. 16. Br. foliis radicalibus carnofis fpathulatis repando-dentatis glabris, fcapo corymbifero, filiquis elongatis applanatis ftylo terminatis. *Gallia occid. et auftr.* (Sifymbrium monenfe Vill., repandum W.)

†† *Siliqua substipitata: Günthera* Andrz.

elongata Ehrh. 17. Br. caule herbaceo ramoso glauco-pruinoso, foliis radicalibus sinuato-pinnatifidis hispidulis, superioribus glabris subintegerrimis, calycibus patulis. *Hungar. Transsylvan. Podolia. Tauria. Caucas.*

** *Siliqua stylo dilatato (rostro subancipiti) coronata.*

Sabularia Brot. 18. Br. caule herbaceo foliisque hispidulis, radicalibus pinnatifido-runcinatis, laciniis ovatis dentatis, caulinis simpliciter pinnatifidis, racemis laxis, siliquis torulosis rostro ancipiti terminatis. *Lusitania.* (Sisymbrium Parra L.)

monensis Huds. 19. Br. caule herbaceo simplici, foliis runcinato-pinnatifidis subcarnosis glaucescentibus, infimis hispidiusculis, laciniis distantibus linearibus subdentatis, racemis elongatis. *Ins. Mona. Scotiae litora occid.* (Sisymbrium monense L. sp. ed. 1.)

Cheiranthus Vill. 20. Br. caule ramoso basi foliisque inferioribus hirtis, foliis pinnatifidis subruncinatis, laciniis distantibus linearibus subintegerrimis, calycibus clausis, petalis venosis, rostro siliquae 1spermo. *Gallia med. et austr. Italia.* (Sinapis Tournefortii et recurvata All., Br. montana Cand. fl. gall.)

cheiranthiflora Cand. 21. Br. caule ramoso hispidulo, foliis glabris, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis, laciniis inciso-serratis, calycibus clausis, petalis eveniis, rostro siliquae abbreviato aspermo. *Hispania. Gallia.* (Raphanus cheiranthiflorus W.)

Tournefortii Gouan. 22. Br. caule ramoso foliisque lyrato-pinnatifidis hirsutiusculis, laciniis ovatis dentatis, siliquis longe pedicellatis subdeflexis anguste rostratis. *Hispania. Aegypt.* (Eruca erecta Lag.)

laevigata Lag. 23. Br. caule glaberrimo glauco, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis hirtis, laciniis inciso-dentatis, caulinis paucis linearibus, siliquis anguste rostratis. *Hispania.*

valentina Cand. 24. Br. caule basi foliisque inferioribus pinnatifidis hirsutis, laciniis oblongis subdentatis, caulinis glabris subintegerrimis, siliquis anguste rostratis. *Hispania.* (Sisymbrium valentinum L.)

fruticulosa Cyr. 25. Br. caule basi suffruticoso hispido, foliis inferioribus lyratis scabris, lobis obtusis, terminali repando-lobato, calycibus patulis, siliquis torosis brevirostratis. *Neapol. Sicil. Hispan. Afric. bor.* (Br. rupestris Rafin. Sinapis radicata Desf.)

Richerii Vill. 26. Br. caule foliisque glabris, inferioribus petiolatis ovalibus, caulinis paucis lineari-lanceolatis integerrimis, siliquae rostro compresso 2spermo. *Gallia occid. et austr. Italia super.*

*cyrenaica** 27. Br. caule foliisque superioribus amplexicaulibus cordato-ovatis serrulatis glabris, calycibus clausis,

ſiliquae toruloſae roſtro tetragono-ancipiti obtuſo. *Regio Cyren.* (Raphanus amplexicaulis Viv.)

fragilis Sieb. 28. Br. caule foliisque oblongis in petiolum decurrentibus inaequaliter dentatis glabriusculis, racemo elongato, pedicellis hiſpidulis, ſiliquis erectis ſtipitatis ſtylo craſſo breviusculo coronatis. *Aegypt.*

montana Rafin. 29. Br. ſuffruticoſa glaberrima, foliis petiolatis ſublyrato-inciſis groſſe dentatis, floralibus linearibus integerrimis, floribus paniculatis, ſiliquis turgidis roſtro craſſo aſpermo terminatis. *Sicil.* (Br. cretica Tin.)

† *eryſimoides* Sieb. 30. Br. caule ramoſo foliisque lyratis hiſpidulis, ſiliquis erectis longe roſtratis retrorſum hiſpidis. *Aegypt.*

† *pinnata* * 31. Br. caule foliisque pinnatis glabris, foliolis linearibus obtuſis ſubintegerrimis, ſiliquis patulis furfuraceo-toruloſis longe roſtratis. *Ad magnam Syrtim Afric. bor.* (Raphanus pinnatus Viv.)

Eruca 32. Br. caule foliisque lyrato-pinnatifidis hirſutiusculis, racemi pedicellis abbreviatis, petalis venoſis, ſiliquae glabrae roſtro lato ancipiti. (Eruca ſativa Lam., Br. hiſpida Tenor.)

veſicaria 33. Br. caule foliisque runcinato-pinnatifidis ſubtus piloſis, calyce ſubinflato hirſuto, ſiliquae retrorſum hiſpidae roſtro enſiformi glabriusculo. *Hiſpania.* (Eruca veſicaria Cav. Cand.)

2325. SINAPIS.

** Siliqua glabra.*

amplexicaulis Cand. 1. S. caule ramoſo foliisque cordatis amplexicaulibus ſubintegerrimis glabris, ſiliquis oblongis abbreviatis ſtylo tenui coronatis erectis longe pedicellatis. *Sicil. Numidia.* (Siſymbrium amplexicaule Desf.)

lanceolata Cand. 2. S. caule ramoſo, foliis inferioribus oblongis inciſo-dentatis, ſuperioribus lanceolatis ſubintegerrimis, racemis elongatis. *Ind. occid.*

laevigata 3. S. glaberrima, foliis inferioribus lyratis petiolatis, ſummis lineari-lanceolatis. *Hiſpania. Luſitania.* (S. campeſtris Jacqu. fil.)

integrifolia W. 4. S. glaberrima, foliis inferioribus obovato-oblongis petiolatis duplicato-dentatis, ſuperioribus ſeſſilibus integerrimis. *Ind. or. China.*

braſſicata 5. S. glaberrima, foliis inferioribus lyratis, ſuperioribus cordato-oblongis amplexicaulibus. *China.* (S. auriculata Cand., japonica Thunb.)

juncea 6. S. glaberrima, ramis virgatis, foliis amplexicaulibus, inferioribus oblongis dentatis, ſuperioribus lanceolatis ſubintegerrimis. *China.*

chinenſis 7. S. caule baſi foliisque lyratis ſubtus pubeſcentibus, laciniis ſubdentatis. *China.*

nigra 8. S. glabriuscula, foliis inferioribus lyratis, ſuperioribus lanceolatis, ſiliquis erectis ſtylo breviusculo coronatis. *Europ. Aſia med.* (S. Oliveriana Cand., cernua Thunb.)

9.

retrorfa Burch. 9. S. caule bafi retrorfum hifpido, foliis lyrato-pinnatis bafi auriculatis pubefcentibus. *Afric. auftr.*

arvenfis 10. S. caule foliisque inferioribus lyratis fuperioribus oblongis dentatis pilofis, filiquis erectis angulatis torulofis. *Europ.* (S. timoriana Cand.)

taurica Fifch. 11. S. caule foliisque inferioribus fublyratis fuperioribus oblongis dentatis glabris, filiquis erectis 4gonis nervofis ftylo ancipiti coronatis. *Tauria.*

Allionii Jacqu. 12. S. glabra ramofa, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis fubdentatis, filiquis oblongis laevibus roftrum tenue aequantibus. *Aegypt.*

turgida Delil. 13. S. glabra, foliis oblongis inaequaliter repando-ferratis, filiquis ovatis nervofo-reticulatis roftrum conicum fubaequantibus. *Aegypt.* (Raphanus turgidus Perf.)

incana 14. S. caule foliisque inferioribus lyratis villofis, filiquis appreffis oligofpermis roftro ovato coronatis. *Europ. auftr.* (Myagrum hifpanicum L., Cordylocarpus pubefcens Sm.)

fubbipinnatifida Lag. 15. S. caule fcabro ramofo, foliis pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis obtufis finuato-pinnatifidis, filiquis patentibus ftylo breviusculo coronatis. *Hifpania.*

Kaber Cand. 16. S. caule pubefcente, foliis oblongis incifo-ferratis glabris, filiquis rigidis laevibus ftylo conico coronatis. *Perfia?*

haftata Desf. 17. S. caule foliisque lyrato-pinnatifidis glabris, filiquis erectis linearibus torulofis roftro enfiformi longioribus. *Nov. Holl.*

leptopetala Cand. 18. S. caule foliisque runcinato-pinnatifidis hifpidis, petalis linearibus, filiquis patulis. *C. B. S.*

***Siliqua pubefcente f. hifpida.*

alba 19. S. caule foliisque lyrato-pinnatifidis glabriusculis, filiquis torofis hifpidis oligofpermis roftro ancipiti brevioribus. *Europ. med. et auftr.* (S. foliofa W.)

hifpida Schousb. 20. S. caule retrorfum foliisque lyratis hifpidis, filiquis roftroque linearibus hifpidiusculis. *Mauritania. Teneriffa. Hifpania.* (S. flexuofa Lam.)

disfecta Lag. 21. S. caule ramofo hifpidiusculo, foliis interrupte decurfive pinnatis, foliolis linearibus obtufis dentato-incifis remotis, filiquis pubefcentibus roftro glabro brevioribus. *Hifpania.*

heterophylla Lag. 22. S. caule foliisque petiolatis fcabris, inferioribus lyratis, fuperioribus lanceolatis fubintegerrimis, filiquis ftrictis erectis retrorfum hifpidis roftro ovato longioribus. *Hifpania.*

orientalis 23. S. caule filiquisque erectis retrorfum hifpidis fub-4gonis roftro tenui brevioribus, foliis inferioribus lyratis fuperioribus oblongis incifis. *German. auftr. Helvet. Hifpania.*

circinata Desf. 24. S. caule villofo, foliis lyratis fubftrigofis, lobo terminali maximo circinato, filiquis hirtis roftrum aequantibus. *Afric. bor. Sicil.*

pubeſcens 25. S. caule baſi ſuffruticoſo, foliis lyratis ſiliquisque erectis villoſis, lobo foliorum terminali ovato. *Neapol. Sicil. Hiſpan. Inſ. ion.*

geniculata Desf. 26 S. glabriuscula, foliis inferioribus lyratis, ſummis lanceolatis, ſiliquis pubeſcentibus mucrone geniculato inflexo obtuſiusculo terminatis. *Afric. bor.*

2326. MORICANDIA Cand.

arvenſis Cand. 1. M. ſiliquis ſub-4gonis, foliis oblongis repandis glabris glauceſcentibus, ſuperioribus cordatis amplexicaulibus. *Europ. auſtr. Afric. bor.* (Braſſica arvenſis L., ſuffruticoſa Desf., Turritis arvenſis R. Br.)

heſperidiflora Cand. 2. M. ſiliquis compreſſis, valvis 1nerviis, foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis ſinuato-dentatis ſubinciſis. *Aegypt.* (Heſperis acris Forsk.)

teretifolia Cand. 3. M. ſiliquis compreſſis, valvis enerviis, foliis carnoſis teretibus glaucis pinnatis, laciniis filiformibus obtuſis. *Numidia. Aegypt.* (Braſſica teretifolia Desf.)

2327. DIPLOTAXIS Cand.

* *Stigmate ſubſeſſili, ſiliquis pendulis.*

craſſifolia Cand. 1. D. foliis oblongis carnoſis baſi attenuatis inciſo-lobatis irregulariter dentatis hiſpidiusculis, racemis paniculatis, ſiliquis pedicellatis. *Sicilia.* (Sinapis craſſifolia Rafin.)

Lagaſcae Cand. 2. D. foliis pinnatifidis piloſiusculis, laciniis linearibus diſtantibus, ſiliquis pedicellatis. *Hiſpania.*

pendula Cand. 3. D. caule erecto inferne piloſo, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus duplicato-ſerratis hirſutis, ſiliquis pedicellatis linearibus truncatis. *Afric. bor.* (Siſymbrium pendulum Desf.)

hiſpida Cand. 4. D. caule foliisque obovato-oblongis in petiolum decurrentibus hiſpidis, ſiliquis breviter pedicellatis. *Aegypt. Syria.* (Siſymbrium Hara Forsk., hiſpidum Vahl.)

** *Siliquis erectis ſtylo coronatis.*

*ſimplex** 5. D. caule ſubnudo glabro, foliis radicalibus oblongo-linearibus remote dentatis, caulinis paucis linearibus integerrimis, roſtro ſiliquae filiformi, ſtigmate capitato. *Afric. bor.* (Siſymbrium ſimplex Viv.)

muralis Cand. 6. D. caule ſubnudo aſcendente retrorſum piloſiusculo, foliis radicalibus ſublyratis ſ. oblongis inciſo-dentatis glabris, caulinis pauciſſimis, roſtro ſiliquae truncato abbreviato. *Anglia. Europ. med.* (Siſymbrium murale L., Erucaſtrum Gouan., Barrelieri et monenſe Thuill.)

Barrelieri Cand. 7. D. caule erecto fubnudo fuperne glabro ramofo, foliis radicalibus confertis lyrato-runcinatis hirfutis, lobis dentatis, foliis caulinis paucis linearibus ferratis. *Ital. Hifpan.* (Sifymbrium Barrelieri L.)

fcapofa Cand. 8. D. fcapo nudo breviffimo foliisque radicalibus oblongis pinnatifidis glabris, lobis brevibus obtufis. *Inf. Lopadufa* (hodie Lampedufa) *inter Meliten et Afric. bor.* Labillard.

viminea Cand. 9. D. fcapo nudo decumbente folia radicalia lyrata obtufiffima laevia aequante, lobis foliorum repandis, petalis anguftis calycem fubaequantibus, filiquis patulis ftylo brevi coronatis. *Gallia. Ital. Sicilia.* (Sifymbrium vimineum L.)

faxatilis Cand. 10. D. caule fubnudo erecto, foliis radicalibus fubcarnofis pinnatifidis pilofiusculis, laciniis diftantibus integerrimis obtufiusculis, filiquis ftylo brevi conico coronatis, feminibus fub-2ferialibus. *Europ. auftr.* (Sifymbrium monenfe L. fp. ed. 2., faxatile Lam., repandum Poir., murale et vimineum MB.)

tenuifolia Cand. 11. D. caule ramofo foliofo, foliis glabris fubbipinnatifidis pinnatifidisque, laciniis diftantibus fublinearibus integerrimis, racemis elongatis nudis erectis, filiquis ftylo brevi coronatis. *Europ. paffim.* (Sifymbrium tenuifolium L., laevigatum W., acre Lam., Braffica muralis Hudf., Sinapis tenuifolia R. Br.)

catholica Cand. 12. D. caule ramofo foliofo glabriusculo, foliis multifidis, laciniis lineari-lanceolatis incifo-ferratis acutis, filiquis erectiusculis ftylo tereti coronatis. *Calabria. Hifpania. Lufitania.* (Sifymbrium catholicum L.)

virgata Cand. 13. D. caule foliofo fuperne glabro, foliis petiolatis pinnatifidis, laciniis obtufis dentatis, filiquis ftylo enfiformi coronatis. *Hifpania.*

erucoides Cand. 14. D. caule ramofo fcabro, foliis fublyrato-pinnatifidis, laciniis oblongis dentatis, filiquis patentibus ftylo enfiformi coronatis. *Hifpan. Gallia auftr. Italia. Afric. bor. Mefopotamia.* (Sinapis erucoides L., Sifymbrium Desf.)

ramofiffima * 15. D. caule ramofiffimo foliisque lanceolatis fubintegerrimis glaberrimis, racemis longe pedunculatis, filiquis ftylo tereti coronatis. *Patria?*

2328. ERUCARIA Gärtn.

aleppica Gärtn. 1. E. filiqua ftylifera, foliis fubbipinnatifidis pinnatifidisque glaberrimis, laciniis linearibus obtufiusculis fubintegerrimis. *Inf. maris aegei. Afia minor. Syria. Aegypt.* (Bunias myagroides L., Cordylocarpus laevigatus W., Cakile myagroides Poir., Didefmus Desv.)

Oliverii * 2. E. filiqua ftylifera fcabra, foliis pinnatifidis pubefcentibus, laciniis linearibus obtufe dentatis. *Mefopotamia.* (Raphanus? cakiloideus Cand.)

† *tenuifolia* Cand. 3. E. filiqua ftylifera fub-3fperma, foliis bipinnatis glabris, foliolis lineari-fubulatis. *Hifpania.* (Sinapis hifpanica L., Cordylocarpus tenuifolius Sm.)

latifolia Cand. 4. E. filiqua ftylifera, foliis pinnatifidis glabriusculis, laciniis oblongis incifo-dentatis. *Aegypt. Syria.*

hypogaea Viv. 5. E. filiqua ftylifera, foliis pinnatis, foliolis feffilibus triangulari-falcatis, fcapo nudo unifloro. *Corfica auftr.* (Sifymbrium monanthon Viv. fl. libyc.)

craffifolia Delil. 6. E. filiqua ftigmate fubfeffili coronata, foliis bipinnatifidis carnofis, laciniis linearibus obtufis. *Aegypt.* (Braffica craffifolia Forsk.)

hyrcanica Cand. 7. E. filiqua ftigmate feffili coronata, foliis oblongis bafi attenuatis groffe dentatis. *Perfia bor.*

2329. SCHIZOPETALON Sims.

Walkeri Sims. *Chili.* Herba ramofa, foliis inferioribus finuato-pinnatifidis, fuperioribus lanceolato-linearibus obtufe dentatis pube ftellulata, floribus racemofis albis.

2330. CHAMIRA Thunb.

cornuta Thb. *C. B. S.* Herba fubfcandens, foliis cordatis angulato-dentatis glabris, floribus racemofis albis. (Heliophila circaeoides L. f. W.)

2331. HELIOPHILA.

* *Siliquae moniliformes: herbaceae glabrae.*

pufilla 1. H. foliis lineari-fubulatis integerrimis. *C. B. S.*

tenuifiliqua Cand. 2. H. foliis linearibus integerrimis, filiquis tenuiffimis. *C. B. S.*

longifolia Cand. 3. H. foliis linearibus integris f. 3partitis, filiquis tenuiffimis. *C. B. S.*

amplexicaulis 4. H. foliis infimis oppofitis fuperioribus alternis amplexicaulibus cordato-lanceolatis integerrimis glaucefcentibus, filiquis fubdeflexis. *C. B. S.* (Trentepohlia integrifolia Roth. catal. 2. 76.)

fonchifolia Cand. 5. H. foliis radicalibus pinnatifidis, laciniis foliisque fuperioribus linearibus fubintegerrimis. *C. B. S.*

disfecta Thb. 6. H. foliis alternis lineari-fubulatis 3partito-pinnatifidis, filiquis gracillimis ftigmate craffo nodofo terminatis. *C. B. S.*

rivalis Burch. 7. H. foliis pinnatifidis linearibus acutis, petalis obovatis, filiquis erectiusculis ftylo brevi apiculatis. *Afric. auftr.*

variabilis Burch. 8. H. foliis pinnatifidis linearibus elongatis acutis, petalis oblongo-linearibus, filiquis erectiusculis. *Afric. auftr.*

seselifolia Burch. 9. H. foliis pinnatifidis lineari-subulatis, staminibus lateralibus appendiculatis, siliquis erectiusculis. *Afric. austr.*

pendula W. 10. H. foliis pinnatis lineari-filiformibus sulcatis, staminibus edentulis, siliquis pendulis. *Afric. austr.* (H. pinnata Vent. Trentepohlia Roth. catal. 2. 73.)

lepidioides Link. 11. H. foliis pinnatis subcarnosis linearibus canaliculatis, siliquis ovato-oblongis oligospermis. *C. B. S.* (Trentepohlia Roth nov. spec.)

trifida Thb. 12. H. foliis 3partito-pinnatis subfiliformibus, siliquis patentibus. *C. B. S.* (H. pinnata L. fil.)

** *Siliquae lineares.*

† *Frutescentes.*

cleomoides Cand. 13. H. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, staminibus subaequalibus, siliquis stipitatis compressis. *Afric. austr.* (Cleome capensis L. Cheiranthus strictus L. fil.)

incana Ait. 14. H. foliis obovato-oblongis subcarnosis ramisque incano-villosis, staminibus lateralibus appendiculatis, siliquis linearibus tomentosis stylo crasso conico coronatis. *C. B. S.* (H. frutescens Lam.)

virgata Burch. 15. H. foliis ovato-oblongis subcarnosis integerrimis subdentatisque ramisque glabris, siliquis linearibus subdeflexis stylo longo filiformi coronatis. *Afric. austr.*

glauca Burch. 16. H. foliis oblongis subcoriaceis integerrimis glabris ramisque virgatis glaucis, superioribus sublinearibus acutis, staminibus edentulis, siliquis linearibus erectis stylo acuminatis oligospermis. *Afric. austr.*

stylosa Burch. 17. H. foliis linearibus acutis integerrimis, staminibus edentulis, siliquis linearibus stylo filiformi coronatis pendulis. *Afric. austr.*

linearifolia Burch. 18. H. foliis linearibus acutis integerrimis, staminibus lateralibus appendiculatis, siliquis linearibus stylo terminatis erectis. *Afric. austr.*

succulenta Banks. 19. H. foliis semiteretibus carnosis acutiusculis glabris, siliquis linearibus stylo terminatis patulis. *Afric. austr.* (H. platysiliqua R. Br., Cheiranthus carnosus Thunb.)

suavissima Burch. 20. H. foliis lineari-subulatis, staminibus edentulis, siliquis linearibus stylo terminatis patulis. *Afric. austr.*

subulata Burch. 21. H. pubescens, foliis lineari-subulatis acutissimis, siliquis linearibus stylo cuspidatis patulis. *Afric. austr.*

scoparia Burch. 22. H. foliis lineari-subulatis rigidis subfasciculatis, ramis virgatis, racemis paucifloris, staminibus edentulis, siliquis linearibus erectis stylo brevi coronatis. *Afr. austr.* (Cheiranthus strictus Poir.)

fascicularis Cand. 23. H. foliis filiformibus alternis, siliquis linearibus stylo acuminatis erectis. *C. B. S.*

abrotanifolia Cand. 24. H. foliis 3fido-pinnatifidis subulatis, siliquis linearibus stigmate apiculatis patentibus. *C. B. S.*

††*Herbaceae.*

pilosa Lam. 25. H. foliis linearibus trifidisque calycibusque pilosiusculis, staminibus lateralibus dentatis, siliquis linearibus pedicellatis stylo incrassato terminatis. *C. B. S.* (H. integrifolia L., arabioides Sims.)

digitata 26. H. foliis ovalibus integris sub-5fidisque pilosiusculis, siliquis linearibus. *C. B. S.*

incisa Cand. 27. H. foliis oblongis basi attenuatis apice lobato-incisis glabris, siliquis angustissimis pendulis. *C. B. S.*

coronopifolia 28. H. foliis pinnatifidis linearibus glabris, siliquis linearibus angustissimis erectis. *C. B. S.*

trifurca Burch. 29. H. foliis linearibus angustissimis 3partitis glabris, siliquis linearibus deflexis. *Afric. austr.* (H. 3partita Thunb.)

pectinata Burch. 30. H. foliis pectinato-pinnatifidis glabris, laciniis approximatis linearibus, siliquis subapiculatis pendulis. *Afric. austr.* (Lunaria elongata Thb.?)

foeniculacea R. Br. 31. H. pilosiuscula, foliis pinnatis 2pinnatisque filiformibus, siliquis subapiculatis patulis. *C. B. S.*

chamaemelifolia Burch. 32. H. pilosiuscula, foliis pinnatis linearibus acutis integerrimis, siliquis mucronulatis erectis. *Afric. austr.*

crithmifolia W. 33. H. villosa, foliis pinnatis subcarnosis lineari-filiformibus, petalis calycem subaequantibus, siliquis subapiculatis nutantibus. *Afric. austr.* (H. parviflora Burch.)

*** *Siliquae lanceolatae.*

macrosperma Burch. 34. H. suffruticosa glabra, foliis linearibus acutis integerrimis, siliquis stylo brevi terminatis oligospermis. *Afric. austr.*

INDEX.

Numerus prior major genera, posterior minor paginas signat. Nomina literis obliquis expressa synonyma sunt.

A.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Iſan-

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

T.

H a l i s,

typis expressum Gebauerianis.